四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂
國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第六六冊目次

蘭室秘藏六卷（金）李杲撰 明刻東垣十書本 〇〇一

普濟方一百六十八卷 存三十五卷（八至十 十六至二十一 二十三至二十七 三十四至三十六 四十至四十三 一百二十四 一百三十二至一百三十四 一百四十九 一百五十四 一百五十八至一百六十五）（一）（明）朱橚撰 明鈔本 一一四

蘭室秘藏六卷

（金）李杲撰

明刻東垣十書本

蘭室祕藏三卷 江蘇巡撫採進本

金李杲撰。其曰蘭室祕藏者，蓋取黃帝素問藏諸靈蘭之室語。前有至元丙子羅天益序，在杲歿後二十五年，疑即硯堅所謂臨終以付天益者也。其治病分二十一門，以飲食勞倦居首。他如中滿腹脹，如心腹痞，如胃脘痛諸門，皆諄諄於脾胃，蓋其所獨重也。東垣發明內傷之類外感，實有至理。而以土為萬物之母，脾胃為生化之源，脾虛損論一篇，極言寒涼峻利之害，尤深切著明。蓋預睹劉張兩家末流攻伐之弊，而早防其漸也。至於前代醫方，自金匱要略以下，大抵藥味無多。故唐書許允宗傳紀允宗之言曰：病之於藥，有正相當，惟須單用一味，直攻彼病。藥力既專，病即立愈。今人不能別脈，莫識病證，以情臆度，多安藥味，譬之於獵，未知兔所，多發人馬，空地遮圍，或冀一人偶然逢也。如此療病，不亦疏乎。其言歷代醫家傳為名論。惟杲此書載所自製諸方，動至一二十味，而君臣佐使相制相用，條理井然，他人罕能效之者。斯則事由神解，不涉言詮。讀是書者能喻法外之意，則善矣。

蘭室秘藏序

蘭室秘藏六巻吾師李東垣
先生所輯也不肖讀之而曰
至矣哉吾師之學術貫天人
洞微奥也其論飲食勞倦人

所日用而不知者故首及之
次中滿腹脹胃脘酒渴至於
眼耳鼻舌齒喉血分腰痛大
小便痔瘡瀉痢瘡瘍婦兒科
皆窮其旨要而論脈法尤詳

悉而切當言病證變換萬狀
皆形見於脈按之弦長浮縮
清濁伸引無盡吾師嘗云至
微者理也至著者象也體用
一源顯微無間得其理則象

可得而推矣是吾師有不言
言輒應與是編相符合非口
能辨說紙上陳言不能施用
者比然則人之欲自顯其精
順時却病與醫家溯流窮源

不拘執古方而收功者、合是
奚觀焉吾師合生氣之和
道五常之性使疾疢不心而
豈妖侵短折夭死扶傷合六
合咸寧萬世收頼非古聖王、、

、、亨嘉之致治乎聖王之世即
、、喙息蠕動之細莫不稟仰太
和沐浴玄澤蓋吾師彈厥心
且以較讐是編擢痿與寒如
灉範所謂身至康彊子孫逢

吉曰壽曰康寧曰考終者、是
編之効也吾師弗自秘藏以
公諸人不止一身行之欲人
人行之又昭天下萬世以之
不止一方蒙澤欲舉世蒙澤

又冀千世億世蒙澤也吾師
素豈無窮者吾師心思之所
係而精神之所聚也不有何
敘序但忝衣鉢之傳若太史
公云巖穴之人欲砥行立名

非附青雲之士惡能聲施後
世則序之鄙意云爾
至元丙子三月上巳門人羅
天益百拜書

蘭室秘藏目錄

卷之一
飲食勞倦門
飲食所傷論
勞倦所傷論
調中益氣湯
寬中喜食無厭丸
交泰丸
木香人參生薑枳朮丸
木香乾薑枳朮丸
扶脾丸
和中丸
檳榔丸
消積滯集香丸
黃芪湯
黃芪當歸湯
參朮湯
益智和中丸

益胃散
脾胃虛損論
三黃枳朮丸
巴豆三稜丸
白朮丸
草豆蔻丸
中滿腹脹門
中滿腹脹論
諸腹脹皆屬於熱論

中滿分消丸
中滿分消湯
廣茂潰堅湯
半夏厚朴湯
破滯氣湯
草豆蔻湯
心腹痞門
消痞丸
失笑丸
黃連消痞丸
消痞湯
葶藶丸
卷之二
胃脘痛門
草豆蔻丸
神聖復氣湯
麻黃豆蔻湯
酒客病論

葛花解酲湯
枳朮丸
半夏枳朮丸
橘皮枳朮丸
除溼益氣丸
除溼散
升麻黃連丸
上二黃丸
瓜蔕散

消渴門
消渴論
和血益氣湯
當歸潤燥湯
生津甘露湯
辛潤緩肌湯
甘草石膏湯
甘露膏
生津甘露飲子

眼耳鼻門
諸脉者皆屬於目論
內障眼論
芎辛湯
碧天丸
廣大重明湯
百點膏
選奇湯
神効明目湯
羌活退翳膏
明目細辛湯
復明散
助陽和血湯
吹雲膏
防風飲子
撥雲湯
神効黃芪湯
圓明內障升麻湯

黃芩黃連湯
蔓荆子湯
歸葵湯
救苦湯
熟乾地黃丸
益陰腎氣丸
羌活退翳丸
當歸龍膽湯
補陽湯

瀉陰火丸
升陽柴胡湯
溫衛湯
圓明膏
嗇藥麻黃散
療本滋腎丸
加味滋腎丸
退翳膏
龍膽飲子

柴胡聰耳湯
羌活退翳湯
還睛紫金丹
麗澤通氣湯
溫肺湯
禦寒湯
卷之三
頭痛門
頭痛論
清空膏
徹清膏
川芎散
白芷散
碧雲散
羌活清空膏
清上瀉火湯
補氣湯
細辛散

羌活湯
養神湯
安神湯
半夏白朮天麻湯
口齒咽喉門
口齒論
羌活散
草豆蔻散
麻黃散

麝香散
治蟲散
益智木律散
蝎梢散
白牙散
刷牙藥
獨聖散
當歸龍膽散
牢牙地黃散

細辛散
立效散
牢牙散
清胃散
神功丸
桔梗湯 又方
神驗法

嘔吐門

丁香茱萸湯

白朮湯
補肝湯
吳茱萸丸

衄血吐血門

麥門冬飲子
人參飲子
麻黃桂枝湯
黃芪芍藥湯
三黃補血湯

救脉湯
止衄血法

腰痛門

川芎肉桂湯
獨活湯
破血散疼湯
地龍散
蒼朮湯
麻黃復煎散

緩筋湯
拈痛湯
蒼朮復煎散
羌活蒼朮湯
壯本丹
加味青娥丸
加味補陰丸
卷之四
婦人門

經閉不行有三論
經漏不止有三論
升陽除濕湯
涼血地黃湯
酒煮當歸丸
固真丸
烏藥湯
助陽湯
水府丹
丁香膠艾丸
黃芪當歸人參湯
當歸芍藥湯
柴胡調經湯
益胃升陽湯
升陽舉經湯
半產誤用寒涼之藥論
全生活血湯
當歸附子湯

調經補真丸
坐藥龍鹽膏
勝陰丹
回陽丹
柴胡丁香湯
延胡苦楝湯
桂附湯
人參補
黃芪白朮湯

白术茯苓湯
增味四物湯
補經固真丸
溫衛補血湯
立効散
四聖散
溫經除濕湯
補氣升陽和中湯
麻黃桂枝升麻湯

大便結燥門
大便結燥論
通幽湯
潤燥湯
潤腸丸
麻黃白术湯
升陽湯
活血潤燥丸
潤腸湯

卷之五
小便淋閉門
小便淋閉論
通關丸
清肺飲子
導氣除濕湯
腎疸湯
痔漏門
痔漏論

秦艽白术丸
秦艽蒼术湯
七聖丸
秦艽防風湯
秦艽羌活湯
當歸郁李仁湯
紅花桃仁湯
秦艽當歸湯
陰痿陰汗門

陰痿陰汗及臊臭論
龍膽瀉肝湯
清震湯
固真湯
清魂湯
椒粉散
補肝湯
溫腎湯
延胡丁香丸

瀉痢門

訶子皮散
升麻補胃湯
升陽去熱和血湯
益智和中湯
芍藥蘗皮丸
和中益胃湯
槐花散
茯苓湯

黃芪補胃湯
升陽除濕湯
人參益胃湯
升麻補胃湯

瘡瘍門

散腫潰堅湯
升陽調經湯
連翹散堅湯
龍泉散

救苦化堅湯
柴胡連翹湯
黍粘子湯
淨液湯
消腫湯
內托羌活湯
升麻托裏湯
內托黃芪湯
柴胡通經湯

白芷升麻湯
保生救苦湯
一上散
聖愈湯
獨聖散
黄芪肉桂柴胡酒煎湯
卷之六
雜病門
安神丸

硃砂安神丸
補氣湯
當歸補血湯
柴胡升麻湯
火鬱湯
小黄丸
黄芩利膈丸
補益腎肝丸
太陽經嚏藥

麻黄茱萸湯
黄芪湯
除濕補氣湯
參歸湯
升陽湯
自汗門
自汗論
調衛湯
清燥湯

當歸六黄湯
紅豆散
活血通經湯
瀉榮湯
人參益氣湯
導氣湯
補中湯
麻黄蒼朮湯
上清湯

朮桂湯
正氣湯
趂痛湯
退熱湯
解表升麻湯
天麻黃芪湯
健步丸
白朮除濕湯
加味四君子湯

瀉血湯
洗面藥
瑩肌如玉散
面油摩風膏
小兒門
治驚論
黃芪湯
益黃散
升陽益血湯

厚腸丸
補陽湯
大蕪荑湯
塌氣退黃湯
中滿分消丸
消痞丸
癍疹論
消毒救苦散
桔梗湯

黍粘子湯
麻黃柴胡升麻湯

蘭室秘藏卷之一

元　鎮州　東垣李　杲明之　撰
明　吳郡　立齋薛　已新甫　校

飲食勞倦

飲食所傷論

陰陽應象論云水穀之寒熱感則害人六府痺論云陰氣者靜則神藏燥則消亡飲食自倍腸胃乃傷此乃混言之也分之為二飲也食也飲者水也無形之氣也因而大飲則氣逆形寒飲冷則傷肺病則為喘

欬為腫滿為水瀉輕則當發汗利小便使上下分消其溼解酲湯五苓散生薑半夏枳實白朮之類是也如重而有積為滿者芫花大戟甘遂牽牛之屬利下之此其治也食者物也有形之血也如生氣通天論云因而飽食筋脉橫解腸澼為痔又云食傷太陰厥陰寸口大於人迎兩倍三倍者或嘔吐或痞滿或下痢腸澼當分寒熱輕重而治之輕則內消重則除下如傷寒物者半夏神麯乾薑三稜廣朮巴豆之類主之如傷熱物者枳實白朮青皮陳皮麥蘗黃連大黃之類主之亦有宜吐者陰陽應象論云在上者因而越之瓜蒂散之屬主之然而不可過劑過劑則反傷腸胃蓋先因飲食自傷又加之以藥過故腸胃復傷而氣不能化食愈難消矣漸至羸困故五常正大論云大毒治病十去其六小毒治病十去其七凡毒治病不可過之此聖人之深戒也

勞倦所傷論

調經篇云陰虛生內熱歧伯曰有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通而胃氣熱熱氣薰胸

中故內熱舉痛論云勞則氣耗勞則喘且汗出內外皆越故氣耗矣夫喜怒不節起居不時有所勞傷皆損其氣氣衰則火旺火旺則乘其脾土脾主四肢故困熱無氣以動懶於語言動則喘乏表熱自汗心煩不安當病之時宜安心靜坐以養其氣以甘寒瀉其熱火以酸味收其散氣以甘溫補其中氣經言勞者溫之損者溫之者是也金匱要略云平人脉大為勞脉極虛亦為勞矣夫勞之為病其脉浮大手足煩熱春夏劇秋冬差（脉大者熱邪也極虛者氣損也春夏劇者時助邪也秋冬差者時勝邪也）

以黃芪建中湯治之，此亦溫之之意也。夫上古聖人，飲食有節，起居有常，不妄作勞，形於神俱，百歲乃去，此謂治未病也。今時之人，去聖人久遠則不然，飲食失節，起居失宜，妄作勞役，形氣俱傷，故病而後藥之，是治其已病也。推其百病之源，皆因飲食勞倦而胃氣元氣散解，不能滋榮百脈，灌溉臟腑，衛護周身之所致也。故蒼天之氣貴清靜，陽氣惡煩勞，噫，飲食喜怒之間，寒暑起居之際，可不慎歟。

調中益氣湯

治因飢飽勞役，損傷脾胃，元氣不足，其脈弦洪緩而沉，按之中之下得時一澀，其症四肢滿悶，肢節疼痛，難以屈伸，身體沉重，煩心不安，忽肥忽瘦，四肢懶倦，口失滋味，腹難舒伸，大小便清利而數，或上飲下便，或大便澀滯，或夏月飧泄，米穀不化，或便後見血，或便見白膿，胸滿短氣，咽膈不通，痰唾稠粘，口中沃沫，食入反出，耳鳴耳聾，目中流火，視物昏花，努肉紅絲，熱壅頭目，不得安臥，不思飲食，並皆治之。

橘皮 如腹中氣不轉運，加木香一分；如無此證不加。　黃蘗 酒洗，已上各二分

升麻 此一味為上氣不足，胃氣與脾氣下流，乃補上氣，從陰引陽。

柴胡 已上各三分　人參 有嗽者去　炙甘草

蒼朮 已上各五分　黃芪 一錢

○如是顯熱燥，是下元陰火蒸蒸然發也，加生地黃二分，黃蘗三分。

○如大便虛坐不得，或大便了而不了，腹中常常逼迫，皆是血虛血澀，加當歸身三分。無此證則去之。

○如身體沉重，雖小便數多，亦加茯苓二分，黃蘗三分，澤瀉五分，蒼朮一錢，時暫從權而去濕也，不可常用，兼足太陰已病，其脈亦絡於心中，故顯濕熱相合而生煩亂。

○如胃氣不和，加湯洗半夏五分，生姜三片。有嗽者，加生姜、生地黃二分，以制半夏之毒。

○如痰厥頭痛，非半夏不能除，此足太陰脾邪所作也。

○如兼燥熱，加黃蘗、生地黃各二分。

○如無已上證，只服前藥。

右件剉如麻豆大都作一服水二大盞煎去柤稍熱食遠服之寧心絕慮靜坐少語藥必為効耳

○如夏月須加白芍藥三分

○如春月腹中痛尤宜加

○如惡熱而渴或腹痛者更加芍藥五分生黃芩二分

○如惡寒腹痛加中桂二分去黃芩謂之桂枝芍藥湯亦於前藥中加之

○如冬月腹痛不可用芍藥蓋大寒之藥也只加乾薑二分或加半夏五七分以生薑少許製之

○如秋冬之月胃脉四道為衝脉所逆脇下少陽脉二道而反上行名曰厥逆其證氣上衝咽不得息而喘息有音不得臥加吳茱萸五分至一錢湯洗去苦觀厥氣多少而用之亦於前藥中作一服服之

○如夏月有此證為大熱也此病隨四時為寒熱溫涼也宜以

黃連酒洗 黃蘗酒浸 知母酒浸已上各等分

右為細末熟湯為丸如梧桐子大每服一百丸或二百丸白湯送下空心服仍多飲熱湯服畢少時便以美食壓之使不令胃中停留直至下元以瀉衝脉之邪也大抵治飲食勞倦所得之病乃虛勞七損證也常宜以甘溫平之甘多辛少是其治也

寬中喜食無厭丸 一名寬中進食丸

資形氣喜飲食

木香五分 青皮 人參

乾生薑已上各一錢 炙甘草一錢五分 白茯苓

澤瀉 檳榔 橘皮

白朮已上各二錢 縮砂仁 豬苓已上各二錢五分

枳實四錢 草豆蔻仁五錢 神麴五錢五分炒

半夏七錢 大麥蘖麵炒一兩

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三五十丸米湯下食遠服

交泰丸

升陽氣瀉陰火調榮氣進飲食助精神寬腹脇除怠惰嗜臥四肢沉困不收

乾薑炮製三分 巴豆霜五分 人參去蘆

肉桂去皮已上各一錢 柴胡去苗 小椒炒去汗并閉目及子

白术已上各一錢五分 厚朴去皮炒三錢秋冬加七錢 白茯苓
苦楝酒煮 縮砂仁已上各三錢 皁角水洗帶去皮弦六錢
知母四錢一半酒炒一半酒洗春夏用秋冬去之 川烏炮製去皮臍四錢五分
黄連去鬚七錢秋冬減一錢五分 吳茱萸湯洗七次五錢
紫菀去苗六錢
右除巴豆霜別研外同爲極細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服十丸溫水送下食遠虛實加減

木香人參生姜枳术丸

開胃進飲食

乾生姜三錢五分 木香三錢 人參三錢五分
陳皮四錢 枳實炒一兩 白术一兩五錢
右爲細末荷葉裹燒飯爲丸如梧桐子大每服三五十丸溫水下食前

木香乾姜枳术丸

破除寒滯氣消寒飲食
木香二錢 乾姜五錢炮 枳實一兩炒
白术一兩五錢
右爲細末荷葉裹燒飯爲丸如梧桐子大每服三五十丸溫水送下食前

扶脾丸

治脾胃虛寒腹中痛溏瀉無度飲食不化
乾生姜 肉桂已上各五分 乾薑
藿香 紅豆已上各一錢 白术
茯苓 橘皮 半夏
訶子皮 炙甘草 烏梅肉已上各二錢
大麥蘖炒 神麴炒已上各四錢
右爲細末荷葉裹燒飯爲丸如梧桐子大每服五

十丸白湯送下食前

和中丸

補胃進食
人參 乾生薑 陳皮已上各一錢
乾木瓜 炙甘草三錢
右爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服五十丸白湯送下食前

檳榔丸

破滯氣消飲食

炙甘草一錢　木香　人参
檳榔二錢已上各　陳皮五錢
右爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服五十
丸白湯下食前

消積滯集香丸
治傷生冷硬物不消
京三稜　廣茂　青皮
陳皮　丁香皮　益智
川楝子　茴香已上各一兩　巴豆和皮米炒焦五錢
右爲細末醋糊爲丸如菉豆大每服五七丸温水
生姜湯任下食前服

黄芪湯
補胃除濕和血益血滋養元氣
木香氣通去之　藿香葉已上各一錢　當歸酒洗
陳皮二錢已上各　人参　澤瀉已上各五錢
黄芪一兩
右㕮咀每服五錢水二大盞煎至一盞如欲汗加
生薑煎食遠熱服之

黄芪當歸湯
治熱上攻頭目沿身胸背發熱
當歸身一錢酒洗　黄芪五錢
右㕮咀作一服水二大盞煎至一盞食前熱服

參术湯
治脾胃虚弱元氣不足四肢沉重食後昏悶
黄蘗酒洗　當歸已上各二分　柴胡
升麻已上各三分　人参　陳皮
青皮已上各五分　神麴末七分　炙甘草
蒼术已上各一錢　黄芪二錢

右㕮咀都作一服水二大盞煎至一盞食遠服

益智和中丸季秋合
木香　黄連　生地黄
黄芪　人参　麥門冬
神麴末　當歸身　乾生姜
陳皮　姜黄已上各五分　縮砂仁七分
桂花一錢　桂枝一錢五分　益智仁二錢二分
炙甘草二錢五分　麥糵麵三錢　草豆蔻仁四錢

右爲細末，湯浸蒸餅爲丸，如梧桐子大，每服五十丸，白湯下，細嚼亦得。

益胃散

治因服寒藥過多，以致脾胃虛損，胃脘疼痛。

人參　甘草　縮砂仁

厚朴已上各二錢　白豆蔻　姜黄

乾生姜　澤瀉已上各三錢　益智仁六錢

黄芪　陳皮已上各七錢

右爲麄末，每服三錢，水二盞，生姜五片，煎至一盞，去柤，食前温服。

脾胃虛損論

易水張先生常戒不可峻利，食藥下咽，未至藥丸施化，其標皮之力始開，便言快也，所傷之物已去，若更待一兩時辰許，藥盡化開，其藥峻利，必有情性病去之後，脾胃既損，是真氣元氣敗壞，促人之壽。當時說下一藥，枳實一兩麩炒黄色爲度，白术二兩，只此二味，荷葉裹燒飯爲丸，以白术甘温，甘温補脾胃之元氣，其苦味除胃中之濕熱，利腰臍間血，故先補脾胃之弱，過於枳實克化之藥一倍。枳實味苦寒，泄心下之痞悶，消化胃中所傷。此一藥下胃，其所傷不能即去，須待一兩時辰許，食則消化，是先補其虛，而後化其所傷，則不峻利矣。當是之時，未悟用荷葉燒飯爲丸之理，老年味之，始得可謂奇矣。荷葉之物，中央空象震卦之體，震者動也，人感之生足少陽甲膽者，風也，先化萬物之根蔕也。内經云：履端於始，序則不愆。人之飲食入胃，營氣上行，即少陽甲膽之氣也。其手少陽三焦經，人之元氣也，手足經同法，便是少陽元氣生發也。胃氣、穀氣、元氣、甲膽上升之氣，一也，異名

雖多，止是胃氣上升者也。荷葉之體，生於水土之下，出於汚穢之中所染，挺然獨立，其色青，形乃空，青而象風木者也。食藥感此氣之化，胃氣何由不上升乎？其主意用此一味爲引用，可謂遠識深慮，合於道者也。更以燒飯和藥，與白术協力，滋養穀氣而補，令胃厚，再不至内傷，其利廣矣大矣。若内傷脾胃，以熱之物酒肉之類，自覺不快，覓藥於醫者，亦不問所傷，付之集香丸、小丁香丸、巴豆大熱藥之類下之，大便下

則物生遺留食之熱性藥之熱性重傷元氣則七神不職經云熱傷氣正謂此也其人必無氣以動而熱困四肢不舉傳變諸疾不可勝數使人真氣自此衰矣若傷生冷硬物世醫或用大黃牽牛二味大寒藥投之隨藥下所傷去矣遺留食之寒性藥之寒性重瀉其陽陽去則皮膚筋肉血脉無所依倚便有虛損之証論言及此令人寒心夫辛辣薄味之藥無故不可亂服非止牽牛而已至真要大論云五味入口各先逐其所喜攻酸者赴肝寫也辛味下咽先攻其肺

之五氣氣者真氣元氣也其牽牛之辛辣猛烈傷人尤甚飲食所傷腸胃邪當以苦泄其腸胃可也肺與元氣何以罪之有用牽牛大罪有五此其一也況胃主血所生病爲所傷物者有形之物也皆是血病寫其氣其罪二也且飲食傷之於中焦止合尅化消導其食重瀉上焦肺中已虛之氣其罪三也食傷腸胃當塞因塞用又曰寒因寒用枳實大黃苦寒之物以泄有形是也反以辛辣牽牛散瀉真氣大禁四也殊不知鍼經有云外來客邪風寒傷人五臟若誤瀉胃

氣必死誤補亦死其死也無氣以動故靜若內傷腸胃而反瀉五臟必死誤補亦死其死也陰氣有餘故躁今內傷腸胃是謂六腑不足之病反瀉上焦虛無肺氣肺者五臟之一數也雖不即死若更旬日之間必暗損人壽數謂如人壽應百歲爲牽牛之類朝損暮損其元氣消耗不得終其天壽但人不覺耳將爲天年已盡此乃暗裏折人壽數故特著此論並方麻令四海聞而行之不至天橫耳老夫之用心也胃氣不可不養復明養胃之理內經云安穀者昌絕穀者

亡去則榮散穀消則亡榮散衛亡神無所依仲景云水入於經其血乃成穀入於胃脉乃大行故血不可不養胃不可不溫血溫胃和榮衛將行常有天命穀者身之大柄也書與周禮皆云金木水火土穀惟修以奉養五臟者也內傷飲食固非細事苟妄服食藥而輕生損命其可乎哉黃帝鍼經有說胃惡熱而喜清冷大腸惡清冷而喜熱兩者不和何以調之岐伯曰調此者食飲衣服亦欲適寒溫寒無凄愴暑無汗飲食者熱無灼灼寒無凄凄寒溫中適故氣將乃不

致邪僻也是必有因用豈可用俱寒俱熱之藥倉卒致損與以刃傷人者何異內經說內傷者其氣口脈反大於人迎一倍二倍三倍分經用藥又曰上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死如但食不納惡心欲吐者不問一部二部不當正與瓜蒂散吐之但以指或以物探去之若所傷之物去不盡者更診其脈問其所傷以食藥去之以應塞因塞用又胃之寒因泄而下降乃應太陰之用其中更加升發之藥令其元氣上升塞因通用因曲而爲直何爲曲內傷胃氣

是也何爲直因而升發胃氣是也因其飲食之內傷而使生氣增益胃氣完復此乃因曲而爲之直也若分經用藥其所傷之物寒熱溫涼生硬柔軟所傷不一難立定一法只隨所傷之物不同各立治法臨時加減用之其用藥又當問病人從來稟氣盛衰所傷寒物熱物是喜食之邪不可服破氣藥若乘飢困而傷之邪當益胃氣或爲人所勉勸強食之宜損血而益氣也診其脈候傷在何臟可與對病之藥豈可妄瀉天真生氣以輕喪身寶乎且如先食熱物而不傷

繼之以寒物因後食致前食亦不消化而傷者當問熱食寒食孰多孰少斟酌與藥無不當矣如傷熱物二分寒物一分則當用寒藥二分熱藥一分相合而與之則榮衛之氣必得周流更有或先飲酒而後傷寒冷之食及傷熱食冷水與冰如此不等皆當驗其節次所傷之物約量寒熱之劑分數各各對證與之無不取效自忖所定藥方未敢便謂能盡性之理姑用指迷辨惑耳

三黃枳术丸

治傷肉溼麪辛辣味厚之物填塞悶亂不快

枳實 麩炒五錢　黃連 去鬚酒洗　大黃 濕紙裹煨

神麴 炒　橘皮　白术 已上各一兩

黃芩 二兩

右爲極細末湯浸蒸餅爲丸如菉豆一倍大每服五十丸白湯下臨時量所傷多少加減服之

巴豆三稜丸 一名木香見現丸

治傷生冷硬物心腹滿悶疼痛

巴豆霜 五分　木香 二錢　升麻

柴胡已上各三錢 草豆蔻麵裹燒熟用仁 香附子炒已上各五錢
神麴炒黃色 石三稜去皮煨 京三稜炒已上各一兩
右爲細末湯浸蒸餅爲丸如菉豆一倍大每服一
二十丸溫白湯下量所傷多少加減服之

白术丸

治傷豆粉濕麵油膩之物
白礬枯三分 黃芩五錢 橘皮七錢
神麴炒黃色 半夏湯洗七次 白术已上各一兩
枳實麩炒黃色一兩一錢

右爲極細末湯浸蒸餅爲丸如菉豆大每服三五
十丸白湯下素食多用乾姜故加黃芩以瀉之

草豆蔻丸

治秋冬傷寒冷物胃脘當心而痛上支兩脇咽膈
不通
炒鹽五分 乾生姜 青皮
橘皮已上各二錢 麥蘖麵炒黃色 生黃芩冬月不用
半夏湯洗七次 神麴炒已上各五錢 白术已上各一兩
枳實麩炒二錢 草豆蔻麵裹煨去皮取仁

右爲極細末湯浸蒸餅爲丸如菉豆大每服五十
丸白湯下

中滿腹脹門

中滿腹脹論

六元政紀論云太陰所至爲中滿太陰所至爲畜滿諸濕腫滿皆屬脾土論云脾乃陰中之太陰同濕土之化脾濕有餘腹滿食不化天爲陽爲熱主運化也地爲陰爲濕主長養也無陽則陰不能生化故云藏寒生滿病調經篇云因飲食勞倦損傷脾胃始受熱

中末傳寒中皆由脾胃之氣虛弱不能運化精微而制水穀聚而不散而成脹滿經云腹滿䐜脹支膈胠脇下厥上冒過在太陰陽明乃寒濕鬱遏也脉經所謂胃中寒則脹滿者是也脉經三卷雜病第八腹滿大便不利上走胸溢喘息喝喝然取足少陰又云脹取三陽三陽者足太陽寒水爲脹與通評虛實論說腹暴滿按之不下取太陽經絡胃之募也正同取者瀉也經云中滿者瀉之於內者是也宜以辛熱散之以苦瀉之淡滲利之使上下分消其濕正如開鬼門潔淨府溫

衣繆刺其處是先瀉其血絡後調其眞經氣血平陽布神清此治之正也或曰諸脹腹大皆屬於熱者何也此乃病機總辭假令外傷風寒有餘之邪自表傳裏寒變爲熱而作胃實腹滿仲景以大承氣湯治之亦有膏粱之人溼熱鬱於內而成脹滿者此熱脹之謂也大抵寒脹多而熱脹少治之者宜詳辨之

諸腹脹大皆屬於熱論

諸腹脹大皆屬於熱此乃入益之邪有餘之證自天外而入是感風寒之邪傳裏寒變爲熱作胃實日晡

潮熱大渴引飲讝語是太陽陽明并大實大滿者大承氣下之少陽陽明微滿實者小承氣下之泄之則脹已此之謂也假令痎瘧爲脹滿亦有寒脹熱脹是天之邪氣傷暑而得之不即時發至秋暑氣衰絕而瘧病作矣知其寒也局方用交解飲子者是也內虛不足寒濕令人中滿及五臟六腑俱有脹滿更以脉家寒熱多少較之胃中寒則脹滿濁氣在上則生脹䐜脹取三陽三陽者足太陽膀胱寒水爲脹腹暴滿按之不下取太陽經絡者胃之募也正同腹滿䐜脹

肢膈胠脇下厥上胃過在太陰陽明胃中寒溼鬱遏也太陰䐜脹後不利不欲食食則嘔不得臥按所說寒脹之多如此中滿治法當開鬼門潔淨府開鬼門者謂發汗也潔淨府者利小便也中滿者瀉之於內謂脾胃有病當令上下分消其氣下焦如瀆氣血自然分化不待泄滓穢如或大實大滿大小便不利從權以寒熱藥下之或傷酒溼麵及味厚之物膏粱之人或食已便臥使溼熱之氣不得施化致令腹脹滿此脹亦是熱脹治熱脹分消丸主之

如或多食寒涼及脾胃久虛之人胃中寒則脹滿或臟寒生滿病以治寒脹中滿分消湯主之

中滿分消丸

治中滿熱脹鼓脹氣脹水脹此非寒脹類

白朮　人參　炙甘草

猪苓去黑皮　姜黃已上各一錢　白茯苓去皮

乾生薑　砂仁已上各二錢　澤瀉

橘皮已上各三錢　知母炒四錢　黃芩去腐炒夏用一兩二錢

黃連淨炒　半夏湯洗七次　枳實炒已上各五錢

厚朴一兩 姜製

右除茯苓澤瀉生姜外共爲極細末入上三味和勻湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服一百丸煎熱白湯下食遠服量病人大小加減

中滿分消湯

治中滿寒脹寒疝大小便不通陰躁足不收四肢厥逆食入反出下虛中滿腹中寒心下痞下焦躁寒沉厥奔豚不收

川烏　澤瀉　黃連

人參　青皮　當歸

生薑　麻黃　柴胡

乾薑　蓽澄茄 已上各二分　益智仁

半夏　茯苓　木香

升麻 已上各三分　黃芪　吳茱萸

厚朴　草豆蔻仁　黃檗 已上各五分

右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞食前熱服忌房室酒溼麵生冷及油膩等物

廣茂潰堅湯

治中滿腹脹內有積聚堅硬如石其形如盤令人不能坐臥大小便澀滯上喘氣促面色痿黃通身虛腫

廣茂　紅花　升麻

吳茱萸 已上各二分　生甘草　柴胡

澤瀉　神麴　青皮

陳皮 已上各三分　厚朴 生用　黃芩

黃連　益智仁　草豆蔻仁

當歸梢 已上各五分　半夏 七分

如渴加葛根四分

右剉如麻豆大水二大盞煎至一盞稍熱服食遠忌酒醋溼麵服二服之後中滿減半其有積不消再服後藥

半夏厚朴湯

紅花　蘇木 已上各五分　吳茱萸

乾生薑　黃連 已上各三分　木香

青皮 已上各二分　肉桂　蒼朮

白茯苓　澤瀉　柴胡
陳皮　生黃芩　草豆蔻仁
生甘草已上各三分　京三稜　當歸梢
豬苓　升麻已上各四分　神麴六分
厚朴八分　半夏一錢　桃仁七箇
昆布少許
如渴加
葛根三分
右㕮咀作一服水三盞煎至一盞去柤稍熱服此

藥二服之後前證又減一半却於前藥中加減服
之

破滯氣湯一名木香化滯湯

破滯氣治心腹滿悶
炙甘草四分　白檀　藿香
陳皮　大腹子　白豆蔻仁
白茯苓　桔梗已上各五分　砂仁
人參　青皮　檳榔
木香　姜黃　白朮已上各二錢

右㕮咀每服三錢水二盞煎至一盞去柤溫服不
拘時

草豆蔻湯

治腹中虛脹
澤瀉一分　木香三分　神麴四分
半夏製　枳實　草豆蔻仁
黃芪春夏去之　益智　甘草已上各五分
青皮　陳皮已上各六分　茯苓
當歸已上各七分

右為麤末都作一服水二大盞生姜三片煎至一
盞去柤溫服冬月加黃芪五七分春夏止服正藥
食遠

心腹痞門

消痞丸

治心下痞悶一切所傷及積年不愈者
乾生薑　神麴炒　炙甘草已上各二錢
豬苓二錢五分　澤瀉　厚朴
砂仁已上各三錢　半夏湯洗七次　陳皮

人參四錢已上各　枳實五錢炒　黃連淨炒
黃芩六錢已上各　姜黃　白术一兩已上各
右爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服五七十丸至百丸白湯送下食遠服

失笑丸 一名枳實消痞丸
治右關脉弦心下虛痞惡食懶倦開胃進飲食
乾生姜一錢　炙甘草　麥糵麵
白茯苓　白术二錢已上各　半夏麴
人參三錢已上各　厚朴四錢炙　枳實
黃連五錢已上各

右爲細末湯浸蒸餅爲丸梧桐子大每服五七十丸白湯下食遠服

黃連消痞丸
治心下痞滿壅滯不散煩熱喘促不安
澤瀉　姜黃一錢已上各　乾生姜二錢
炙甘草　茯苓　白术三錢已上各
陳皮五錢　猪苓五錢　枳實七錢炒
半夏九錢　黃連一兩　黃芩二兩炒

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服五十丸溫湯下食遠

消痞丸 一名木香化滯丸
治因憂氣鬱結中脘腹皮裏微痛心下痞滿不思飲食
枳實炒　當歸梢二分已上各　陳皮
生姜　木香三錢已上各　柴胡四錢
草荳蔻　炙甘草五錢已上各　半夏一錢
紅花少許

右爲粗末作一服水二盞生薑三片煎至一盞食遠服忌酒濕麵

葶藶丸 一名人參順氣飲子
治心下痞胸中不利
半夏洗　厚朴炙　石膏
青皮五分已上各　當歸身七分　白荳蔻仁
縮砂　茵蔯酒製　乾葛一錢已上各
炙甘草　羌活　黃芩一半酒洗一半炒
苦葶藶　人參　柴胡

獨活 已上各三錢

右爲細末湯浸飪餅和勻篩子內搽如米大每服二錢臨卧一口湯下

蘭室秘藏卷之一 終

蘭室秘藏卷之二

元 鎮州 東垣李 杲明之 撰

明 吳郡 立齋薛 己新甫 校

胃脘痛門

草豆蔻丸

治脾胃虛弱而心火乘之不能滋榮上焦元氣遇冬腎與膀胱寒水旺時子能令母實以致肺金大腸相輔而來尅心乘脾胃此大復讎也經云大勝必大復理之常也故皮毛血脈分肉之間元氣已絕於外又大寒大燥二氣併乘之則苦惡風寒耳鳴及腰背相引而痛鼻息不通不聞香臭額寒腦痛大惡風寒目時眩不欲開腹中爲寒水反乘痰唾沃沫食則反出腹中常痛心胃作痛脇下縮急有時而痛腹不能努大便多瀉而少秘下氣不絕或腹中鳴此脾胃虛之至極也胸中氣亂心煩不安而爲霍亂之漸咽膈不通極則噎塞有聲喘喝閉塞或於日陽處或於暖室中少緩口吸風寒之氣則復作四肢厥逆身體沉重不能轉側頭不可

以回顧小便渡而時燥此藥主之秋冬寒凉大復氣之藥也

神麴末　柴胡詳脇下痛多少用之　姜黃已上各四分

當歸身　青皮已上各六分　黃芪

人參　益智仁　吳茱萸湯洗焙乾

陳皮　白殭蚕已上各八分　澤瀉小便數減半

半夏湯洗已上各一錢　甘草生六分熟六分　麥糵麵一錢五分炒

草豆蔻仁麵裹燒熟為度一錢四分　桃仁七箇湯浸去皮尖

右除桃仁別研如泥餘為細末同研勻湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五七十丸白湯下食遠服

神聖復氣湯

治復氣乘冬足太陽寒水足少陰腎水之旺子能令母實手太陰肺實反來侮土火木受邪腰背胸膈閉塞疼痛善嚏口中涎目中泣鼻中流濁涕不止或如息肉不聞香臭咳嗽痰沫上熱如火下寒如冰頭作陣痛目中溜火視物䀮䀮耳聾耳鳴頭并口鼻大惡風寒喜日晴暖夜卧不安常覺痰塞咽膈不通口不知味兩脇縮急而痛牙齒動搖不能嚼物臍腹之間及尻臀足膝不時寒冷前陰冷而多汗行步攲側起居艱難麻木風痺小便數氣短喘喝少氣不足以息遺失無度及婦人白帶陰戶中大痛牽心面色黧黑男子控睪痛牽心腹或面色如赭食少大小便不調煩心霍亂逆氣裏急腹不能努或腸鳴臍下筋急肩胛大痛此皆寒水來復火土之讎也

乾姜炮　黑附子炮已上各三分　防風

人參　郁李仁另研已上各五分　當歸身六分酒洗

半夏湯洗　升麻已上各七分　藁本

甘草已上各八分　柴胡　羌活已上各一錢

白葵花五朵去心剪碎

右件都作一服水五大盞煎至二盞入黃芪一錢橘紅五分草豆蔻仁一錢麵裹煨熟去皮同煎至一盞再入下項藥黃檗三分酒浸黃連三分酒浸枳殼三分生地黃三分酒洗此四味預一日另用新水浸又以華細辛二分川芎細末三分蔓荊子三分作二處浸此三味并黃檗等煎正藥作

一大盞不去柤入此所浸之藥再上火同煎至一
大盞去柤熱服空心又能治齒頰齒唇舌舌根强
硬等証如神忌肉湯宜食肉不助經絡中火邪也
大抵腎元與膀胱經中有寒氣不足者並宜服之
於月生月滿時食膈三五日一服如病急不拘時
候

麻黄豆蔻丸

治客寒犯胃心胃大痛不可忍

木香　青皮　紅花

厚朴 已上各二分　蘇木 三分　草澄茄 四分

縮砂仁　黄蓍　白术

升麻　半夏 湯洗　麥蘖麪

陳皮 去白　柴胡　炙甘草

吳茱萸　當歸身 已上各五分　益智仁 八分

神麯末 炒二錢　麻黄 不去節三錢　草豆蔻仁 五錢

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服五十
丸白湯下或細嚼湯下亦可

酒客病論

論酒大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也若傷之則
止當發散汗出則愈矣此最妙法也其次莫如利小
便二者乃上下分消其溼何酒病之有今之酒病者
往往服酒癥丸大熱之藥下之又有牽牛大黄下之
是無形元氣受病反下有形陰血乖悞甚矣酒性大
熱已傷元氣而復重瀉之况亦損腎水眞陰及有形
陰血俱爲不足如此則陰血愈虛眞水愈弱陽毒之
熱大旺反增其陰火是謂元氣消亡七神何依折人
長命雖不即死而虛損之病成矣金匱要畧云酒疸
下之久久爲黑疸愼不可犯此戒不若令上下分消
其溼當以葛花解酲湯主之

葛花解酲湯

木香 五分　人參 去蘆　猪苓 去黑皮

白茯苓　橘皮 已上各一錢五分　白术

乾生薑　神麯 炒　澤瀉 已上各二錢

蓮花青皮 三錢　縮砂仁　白豆蔻仁

葛花 已上各五錢

右爲極細末和匀每服三錢七白湯調下但得微

汗酒病去矣此蓋不得已而用豈可恃賴日日飲
酒此藥氣味辛辣偶因酒病服之則不損元氣何
者敵酒病故也若頻服之損人天命

枳朮丸

治痞消食强胃

枳實麩炒黃色一兩　白朮二兩

右爲極細末荷葉裹燒飯爲丸如菉豆一倍大每
服五十丸白湯下不拘時候量所傷多少加減服
之

半夏枳朮丸

治因冷物內傷

半夏湯洗七次一兩　枳實麩炒黃色　白朮已上各二兩

右三味爲極細末荷葉裹燒炊飯爲丸如菉豆一
倍大每服五十丸白湯下量所傷加減服之

橘皮枳朮丸

治元氣虛弱飲食不消或臟腑不調心下痞悶

橘皮　枳實麩炒黃色各一兩　白朮二兩

右爲極細末荷葉裹燒飯爲丸如菉豆一倍大每
服五十丸白湯下量所傷加減服之

除溼益氣丸

治傷溼麪心腹滿悶肢體沉重

紅花三分　蘿蔔子炒熟五錢　枳實麩炒黃色
黃芩生用　神麯炒黃色　白朮已上各一兩

右同爲細末荷葉裹燒飯爲丸如菉豆一倍大每
服五十丸白湯下量所傷加減服之

除溼散

治傷馬妳子并牛羊酪水一切冷物

甘草炙　紅花已上各二錢　半夏湯洗七次
乾生姜已上各三錢　車前子　澤瀉已上各五錢
茯苓七錢　神麯炒黃色一兩

右爲極細末每服三錢七白湯調下食前

升麻黃連丸

治多食肉口臭不欲聞其穢惡氣使左右不得近

白檀二錢　生甘草三錢　生薑取自然汁
蓮花青皮　升麻已上各五錢　黃連去鬚一兩
黃芩去腐酒洗二兩

右爲極細末湯浸蒸餅爲丸如彈子大每服一丸
細嚼白湯下食後

上二黃丸

治傷熱食痞悶兀兀欲吐煩亂不安

甘草二錢　升麻　柴胡已上各三錢

黃連酒洗一兩　黃芩二兩

一方加

枳實五錢

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如菉豆大每服五十丸

白湯下食遠

○治傷冷飲者以五苓散每服二錢三錢七加生姜
煎服之

○治傷食兼傷冷飲者煎五苓散送半夏枳朮丸

○治傷冷飲不惡寒者腹中亦不覺寒惟覺悶身重
食不化者或小便不利煎去桂五苓散依前斟酌
服之

瓜蒂散

上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死何謂下
部無脉此謂木鬱也飲食過飽塡塞胸中胸中者
太陰之分野經曰氣口反大於人迎三倍食傷太
陰故曰木鬱則達之吐者是也

瓜蒂　赤小豆已上各等分

右二味爲極細末每服二錢七溫漿水調下取吐
爲度若不至兩手尺脉絕無不宜便用此藥恐損
元氣令人胃氣不復若止是胸中窒塞悶亂不通
以指探去之如不得吐者以物探去之得吐則已
如食不去用此藥吐之解云盛食塡塞於胸中爲

之窒塞兩寸脉當主事兩尺脉不見其理安在胷
中有食故以吐出之食者物也物者坤土也是足
太陰之號也胸中者肺也爲物所塡肺者手太陰
金也金主殺伐也與坤土俱在於上而旺於天金
能剋木故肝木生發之氣伏於地下非木鬱而何
吐去上焦陰土之物木得舒暢則鬱結去矣食塞
於上脉絕於下若不明天地之道無由達此至理
水火者陰陽之徵兆天地之別名也故曰獨陽不
生獨陰不長天之用在於地下則萬物生長矣地

之用在於天上則萬物收藏矣此乃天地交而萬物通也此天地相根之道也故陽火之根本於地下陰水之源本於天上故曰水出高源故人五臟主有形之物物者陰也陰者水也右三部脉主之偏見於寸口食寒其上是絕五臟之源源絕則水不下流兩尺竭絕此其理也何疑之有假令所傷前後不同以分爲率傷熱物二分傷生冷硬物一分用寒藥三黃丸二停熱藥巴豆三稜丸一停合而服之如熱物傷少而寒物傷多則寒藥少而熱

藥多也假令夏月大熱之時傷生冷硬物當用熱藥巴豆三稜丸治之須加三黃丸謂天時不可伐故加寒藥以順時令若熱物只用三黃丸何謂此三黃丸時藥也假令冬天大寒之時傷羊肉溼麪等熱物當用三黃丸治之須加熱藥少許草豆蔻丸之類是也爲引用又爲時藥經云必先歲氣無伐天和此之謂也餘皆倣此

消渴門

消渴論

陰陽別論云二陽結謂之消脉要精微論云癉成爲消中夫二陽者陽明也手陽明大腸主津病消則目黃口乾是津不足也足陽明胃主血熱則消穀善飢血中伏火乃血不足也結者津液不足結而不潤皆燥熱爲病也此因數食甘美而多肥故其氣上溢轉爲消渴治之以蘭除陳氣也不可服膏粱芳草石藥其氣慓悍能助燥熱也越人云邪在六腑則陽脉不和陽脉不和則氣留之氣留之則陽脉盛矣陽脉大盛則陰氣不得榮也故皮膚肌肉消削是也經云凡

消癉仆擊偏枯痿厥氣滿發逆肥貴人則膏粱之疾也岐伯曰脉實病久可治脉弦小病久不可治後分爲三消高消者舌上赤裂大渴引飲逆調論云心移熱於肺傳於膈消者是也以白虎加人參湯治之中消者善食而瘦自汗大便硬小便數叔和云口乾飲水多食飢虛癉成中消者是也以調胃承氣三黃丸治之下消者煩燥引飲耳輪焦乾小便如膏叔和云焦煩水易虧此腎消也以六味地黃丸治之總錄所謂末傳能食者必發腦疽背瘡不能食者必傳中

滿鼓脹皆謂不治之証潔古老人分而治之能食而渴者白虎加人參湯不能食而渴者錢氏方白朮散倍加葛根治之上中既平不復轉下消矣前人用藥厥有旨哉或曰末傳瘡疽者何也此火邪勝也其瘡痛甚而不潰或赤水者是也經云有形而不痛陽之類也急攻其陽無攻其陰治在下焦元氣得强者生失强者死末傳中滿者何也以寒治熱雖方士不能廢其繩墨而更其道也然臟腑有遠近心肺位近宜制小其服腎肝位遠宜制大其服皆適其至所為故

如過與不及皆誅罰無過之地也如高消中消制之太急速過病所久而成中滿之病正謂上熱未除中寒復生者也非藥之罪失其緩急之制也處方之制宜加意焉

和血益氣湯

治口乾舌乾小便數舌上赤脉此藥生津液除乾燥生肌肉

柴胡 炙甘草 生甘草(此治口舌乾也)

麻黄根(已上各三分) 酒當歸梢(四分) 酒知母

酒漢防已 羌活(已上各五分) 石膏(六分治小便赤也)

酒生地黃(七分) 酒黃連(八分治舌赤脉) 酒黃檗

升麻(已上各一錢) 杏仁 桃仁(已上各六箇)

紅花(少許)

右㕮咀都作一服水二大盞煎至一盞去柤溫服

忌熱溼麵酒醋等物

當歸潤燥湯

治消渴大便閉澀乾燥結硬兼喜溫飲陰頭退縮舌燥口乾眼澀難開及於黑處見浮雲

細辛(一分) 生甘草 炙甘草

熟地黃(已上各三分) 柴胡(七分) 黃檗

知母 石膏 桃仁(泥子)

當歸身 麻子仁 防風

荊芥穗(已上各一錢) 升麻(一錢五分) 紅花(少許)

杏仁(六箇) 小椒(三箇)

右㕮咀都作一服水二大盞煎至一盞去柤熱服食遠忌辛熱物

生津甘露湯(一名清涼飲子)

治消中能食而瘦。口舌乾自汗大便結燥。小便頻數。

升麻四分　防風　生甘草

漢防已　生地黃已上各五分　當歸身六分

柴胡　羌活　炙甘草

黃芪　酒知母　酒黃芩已上各一錢

酒龍膽草　石膏　黃蘗已上各一錢五分

紅花少許　桃仁五箇　杏仁十箇

右㕮咀都作一服水二盞酒一匙煎至一盞稍熱服食遠。

辛潤緩肌湯 一名清肺補氣湯

前消渴證纔愈止有口乾腹不能努此藥主之。

生地黃　細辛已上各一分　熟地黃三分

石膏四分　黃蘗酒製　黃連酒製

生甘草　知母已上各五分　柴胡七分

當歸身　荊芥穗　桃仁

防已已上各一錢　升麻一錢五分　紅花少許

杏仁六箇　小椒二箇

右㕮咀都作一服水二大盞煎至一盞食遠稍熱服之。

甘草石膏湯

渴病久愈又添舌白滑微腫咽喉嚥津覺痛嗌腫時時有渴。喜冷飲。口中白沫如膠。

生地黃　細辛已上各一分　熟地黃

黃連已上各三分　甘草五分　石膏六分

柴胡七分　黃蘗　知母

當歸身　桃仁去皮尖　荊芥穗

防風已上各一錢　升麻一錢五分　紅花少許

杏仁六箇　小椒二箇

右如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞食後溫服。

甘露膏 一名蘭香膏

治消渴飲水極甚善食而瘦自汗大便結燥小便頻數。

半夏二分湯洗　熟甘草　白豆蔻仁

人參　蘭香　升麻

連翹　桔梗 已上各五分　生甘草
防風 已上各一錢　酒知母 一錢五分　石膏 三錢
右爲極細末湯浸蒸餅和勻成劑捻作薄片子日中晒半乾擦碎如米大每服二錢淡生薑湯送下食後

生津甘露飲子

治消渴上下齒皆麻舌根強硬腫痛食不能下時有腹脹或瀉黄如糜名曰飧泄渾身色黄目睛黄甚四肢痿弱前陰如冰尻臀腰背寒面生黧色脇下急痛善嚏喜怒健忘

藿香 二分　柴胡　黄連
木香 已上各三分　白葵花　麥門冬
當歸身　蘭香 已上各五分　蓽澄茄
生甘草　山梔子　白豆蔻仁
白芷　連翹　姜黄 已上各一錢
石膏 一錢二分　杏仁 去皮　酒黄蘗 已上各一錢五分
炙甘草　酒知母　升麻
人參 已上各二錢　桔梗 三錢　全蝎 二箇去毒

右爲細末湯浸蒸餅和勻成劑捻作片子日中晒半乾擦碎如黄米大每服一錢津唾下或白湯送下食遠服

眼鼻耳門

諸脉者皆屬於目論

陰陽應象論云諸脉者皆屬於目目得血而能視五臟六腑精氣皆上注於目而爲之精精之窠爲眼骨之精爲瞳子筋之精爲黑眼血之精爲絡其窠氣之精爲白眼肌肉之精則爲約束裹擷筋骨血氣之精

而與脉并爲系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢其身之虚其入深則即隨眼系入於腦則腦轉腦轉則引目系急目系急則目眩以轉矣邪中其精其精所中不相比也則精散精散則視岐故見兩物目者五臟六腑之精榮衛魂魄之所常營也神氣之所主也故神勞則魂魄散志意亂是故瞳子黑眼法於陰白眼赤脉法於陽故陰陽合傳而爲精明也目者心之使也心者神之舍也故神精亂而不轉卒然見非常之處精神魂魄散不相得故曰惑也夫二十

經脉三百六十五絡其血氣皆上走於面而走空竅其精陽氣上散於目而爲精其氣走於耳而爲聽因心事煩冗飲食失節勞役過度致脾胃虚弱心火大盛則百脉沸騰血脉逆行邪害空竅天明則日月不明矣夫五臟六腑之精氣皆稟受於脾上貫於目脾者諸陰之首也目者血脉之宗也故脾虚則五臟之精氣皆失所司不能歸明於目矣心者君火也主人之神宜靜而安相火化行其令相火者包絡也主百脉皆榮於目既勞役運動勢乃妄行又因動邪氣所并而損血脉故諸病生焉凡醫者不理脾胃及養血安神治標不治本是不明正理也

內障眼論

凡心包絡之脉出於心中以代心君之行事也與少陽爲表裏瞳子散大者少陰心之脉挾目系厥陰肝之脉連目系心主火肝主木此木火之勢盛也其味則宜苦宜酸宜涼大忌辛辣熱物是瀉木火之邪也飲食中常知此理可也瀉辛主散熱則助火故不可食諸酸主收心氣瀉木火也諸苦瀉火熱則益水也尤忌食冷水大寒之物此則能損胃氣不行則元氣不生元氣不生胃氣下流胸中三焦之火及心火乘於肺上入腦灼髓火主散溢瞳子開大大熱之物又助火邪此盖不可食驗也藥中云茺蔚子一味辛及主益睛睛者是助火也故去之乃知黄芩黄連瀉中焦之火芩能瀉上焦肺中之火以酒洗之乃寒因熱用也又去青箱子爲助陽火也加五味子以收瞳人開大且火之與氣勢不兩立故内經云壯火食氣氣食少火少火生氣壯火散氣諸酸之物能助元氣孫眞人云五月常服五味助五臟氣以補西方肺金法云以酸補之以辛瀉之辛瀉氣則明矣或曰藥中有當歸其味亦辛而甘其不去者何此辛甘一味以其和血之勝藥況有甘味又欲以爲鄉導爲諸藥之使耳

芎辛湯

治兩眼晝夜隱澀難開羞明惡日視物昏暗赤腫而痛

細辛 二分　芎藭　蔓荆子 已上各五分

甘草　白芷已上各一錢　防風一錢五分
右㕮咀都作一服水二盞煎至一盞臨卧温服

碧天丸 一名井珠丸

治目疾累服寒凉藥不愈兩眼蒸熱如火之熏赤而不痛滿目紅絲血脉貫睛瞀悶昏暗羞明畏日或上下瞼赤爛或冒風沙而内外眥皆破洗之神效

枯白礬二分　銅緑七分研　瓦粉炒黑一兩

右先研白礬銅緑令細旋入粉同研匀熟水和之共為一百丸毎服一丸熱湯半盞浸一二箇時

辰洗至覺微澀為度合半時辰許臨卧洗之瞑目便睡一丸可洗十遍再用湯内坐令熱此藥治其標若裏實者不宜用

廣大重明湯

治兩目瞼赤爛熱腫疼痛并稍赤及眼瞼痒痛抓之至破眼弦生瘡目多眵淚隱澀難開

龍膽草　防風　生甘草
細辛已上各一錢

右剉如麻豆内甘草不剉只作一鋌先以水一大椀半煎龍膽一味至一半再入餘三味煎至少半椀濾去柤用清帶熱洗以重湯坐令熱日用五七次但洗畢合眼一時去努肉泛長及痒亦驗

百點膏

張济氏眼病翳六年以至遮瞳人視物不明有雲氣之狀因用此藥而效

蕤仁去皮尖三分　當歸身　甘草已上各六分
防風八分　黄連揀淨二錢剉如麻豆大水一大椀煎至一半入蕤

右件剉如麻豆大蕤仁别研如泥同熬滴在水中不散入去沫蜜少許再熬少時為度令病人心静點之至目中微痛日用五七次臨卧點尤疾効名之曰百點膏但欲多點使藥力相繼也

選奇湯

治眉骨痛不可忍

炙甘草夏月生用　羌活　防風已上各三錢
酒黄芩一錢冬月不用此一味如能食熱痛倍加之

右㕮咀毎服五錢水二盞煎至一盞去柤食後服

之。

神效明目湯

治眼稜緊急，致倒睫拳毛，及上下瞼皆赤爛，睛疼昏暗，晝則冷淚常流，夜則眼澀難開。

細辛二分　蔓荊子五分　防風一錢

葛根一錢五分　甘草二錢

一方加

黃芪一錢

右㕮咀，作一服，水二盞，煎至一盞，去柤，稍熱臨臥服。

羌活退翳膏 一名復明膏

治足太陽寒水膜子遮睛，白翳在上，視物不明。

椒樹東南根二分 西北根二分　藁本　漢防巳已上各二分

黃連　防風　麻黃

柴胡　升麻　生地黃已上各三分

生甘草四分　當歸身六分　羌活七分

蕤仁六箇

右用淨水一大椀，先煎漢防巳、黃連、生甘草、當歸、生地黃，煎至一半，下餘藥，再煎至一盞，去柤，入銀石器中，再熬之，有力為度。

明目細辛湯

治兩目發赤微痛，羞明畏日，怯風寒，怕火，眼睫成紐，眵糊多，隱澀難開，眉攢腫悶，鼻塞，涕唾稠粘，大便微硬。

川芎五分　生地黃酒製　蔓荊子已上各六分

當歸梢　白茯苓　藁本已上各六分

荊芥一錢二分　防風一錢　麻黃根

羌活已上各二錢　細辛少許　紅花少許

椒八箇　桃仁二十箇

右㕮咀，分作四服，每服水二盞，煎至一盞，去柤，稍熱臨臥服之。忌酒醋溼麪。

復明散

治內障

青皮三分　橘皮　川芎

蒼朮已上各五分　炙甘草　生地黃

連翹　柴胡已上各一錢　黃芪一錢五分

當歸身二錢

右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去柤稍熱服之食後忌酒醋濕麵辛熱大料物之類

助陽和血湯

治眼發之後猶有上熱白睛紅隱澀難開睡多眵淚

蔓荊子二分　香白芷三分　柴胡

黃芪　炙甘草　當歸身酒洗

防風已上各五分　升麻七分

右㕮咀都作一服水一盞半煎至八分去柤稍熱服臨臥避風寒處睡

吹雲膏

治目中淚及迎風寒泣羞明畏日常欲閉目喜在暗室塞其戶牖翳瘼歲久遮睛此藥多點神驗

細辛二分　升麻　蕤仁已上各三分

青皮　連翹　防風已上各四分

柴胡五分　生甘草　當歸身已上各六分

荊芥穗一錢微取濃汁　生地黃一錢五分　揀黃連三錢

右㕮咀除連翹外用澄清淨水二椀先熬餘藥至半椀入連翹同熬至一大盞許去柤入銀石器內文武火熬滴入水成珠不散為度入煉去沫熟蜜少許熬勻用之

防風飲子

治倒睫拳毛

細辛　蔓荊子已上各三分　葛根

防風　當歸身一分半分　炙甘草

黃連　人參

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞食遠服避風寒

撥雲湯

戊申六月徐總管患眼疾於上眼皮下出黑白翳兩個隱澀難開兩目緊縮而無疼痛兩手寸脉細緊按之洪大無力知足太陽膀胱為命門相火煎熬逆行作寒水翳及寒瘼遮睛證呵欠善悲健忘嚏噴眵淚時自淚下面赤而白能食不大便小便數而欠氣上而喘

黃芪　細辛　生薑

葛根　川芎 已上各三分　柴胡 七分

荊芥穗　藁本　生甘草

升麻　當歸身　知母 已上各一錢

羌活　防風　黃蘗 已上各一錢五分

右㕮咀如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去柤熱服食後。

神効黃芪湯

治渾身麻木不仁或頭面手足肘背或腿腳麻木不仁並皆治之如兩目緊急縮小及羞明畏日隱澀難開或視物無力睛痛昏花手不得近或目少精光或目中熱如火服五六次可効

蔓荊子 一錢　陳皮 去白五分　人參 八錢

炙甘草　白芍藥 已上各一兩　黃芪 二兩

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去柤臨卧稍熱服。

○如小便淋澀加澤瀉 五分 一服去則止

○如有大便熱澁每服加酒洗黃蘗 三分

○如麻木不仁雖有熱不用黃蘗止加黃芪 一兩 通三兩也。

○如眼縮急去芍藥忌酒醋麪大料物葱韭蒜辛物

○如麻木甚者加芍藥 一兩 通用二兩

圓明內障升麻湯 一名沖和養胃湯

治內障眼得之脾胃元氣衰弱心火與三焦俱盛飲食不節形體勞役心不得休息故上為此疾

乾薑 一錢　五味子 二錢　白茯苓 三錢

防風 五錢　白芍藥 六錢　柴胡 七錢

人參　炙甘草　當歸身 酒洗

白朮　升麻　葛根 已上各一兩

黃芪　羌活 已上各一兩五錢

右㕮咀每服五七錢水三大盞煎至二大盞入黃芩黃連 一錢 同煎數沸去柤煎至一盞熱服食遠

黃芩黃連湯

黃芩 酒洗炒　黃連 酒洗炒　草龍膽 酒洗四次炒四次

生地黃 酒洗已上各一兩

右㕮咀每服二錢水二盞煎至一盞去柤熱服。

蔓荊子湯

治勞役飲食不節，內障眼病，此方如神效。

蔓荊子 二錢五分　黃蘗 酒拌炒四遍　白芍藥 已上各三錢

炙甘草 八錢　黃芪　人參 已上各一兩

右㕮咀，每服三錢或五錢，水二盞，煎至一盞，去柤臨臥溫服。

蕤葵湯 一名連翹飲子

治目中溜火，惡日與火，隱澀難開，小角緊，視物昏花，迎風有淚。

柴胡 二分　生甘草　蔓荊子

連翹　生地黃　當歸身

紅葵花　人參 已上各三分　黃芪

酒黃芩　防風　羌活 已上各五分

升麻 二錢

右㕮咀，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去柤食後溫服。

救苦湯

治眼暴發赤腫，瞼高，苦疼不任者。

桔梗　連翹　紅花

細辛 已上各一分　當歸身 夏月減半　炙甘草 已上各五分

蒼朮　草龍膽 已上各七分　羌活 太陽

升麻 陽明　柴胡 少陽　防風

藁本　黃連 已上各一錢　生地黃

黃蘗　黃芩　知母 已上各一錢五分

川芎 三錢

右㕮咀，每服一兩，水二盞，煎至一盞，去柤食後溫服。

○若苦疼，則多用苦寒者，兼治本經之藥，再行加減。

如睛昏，加知母黃蘗一倍。

熟乾地黃丸

治血弱陰虛，不能著心，致心火旺，陽火甚，瞳子散大，少陰為火，君主無為，不行其令，相火代之，兼心包絡之脉出心系，分為三道，少陽相火之體無形，其用在其中矣。火盛則令母實，乙木肝旺是也。心之脉挾於目系，肝連目系，況手足少陽之脉同出耳中，至耳上角斜起，於目外眥，風熱之盛，亦從此

逆而來上攻頭目致偏頭腫悶瞳子散大視物則花此目血虛陰弱故也法當養血凉血益血收火之散大除風之熱則愈矣

人參二錢　炙甘草　天門冬湯洗去心

地骨皮　五味子　枳殼炒

黃連三錢已上各　當歸身酒洗焙乾　黃芩五錢已上各

生地黃酒洗七錢五分　柴胡八錢　熟乾地黃一兩

右件同爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服一百丸茶湯送下食後日進二服

益陰腎氣丸

此壯水之主以鎭陽光

澤瀉　茯苓已上各二錢五分　生地黃酒洗乾

牡丹皮　山茱萸　當歸梢酒洗

五味子　乾山藥　柴胡已上各五錢

熟地黃二兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大硃砂爲衣每服五十丸淡塩湯下空心

羗活退翳丸

治內障右眼小眥青翳大眥微顯白翳腦痛瞳白子散大上熱惡熱大便秘澁小便如常遇天氣暄熱頭痛睛脹可服此藥翳在大眥加葛根升麻翳在小眥加柴胡羗活是也

黑附子炮　寒水石已上各一錢　酒防巳三錢

知母酒炒　牡丹皮　羗活

川芎已上各三錢　酒黃檗　生地黃酒洗炒

丹參　茺蔚子　酒當歸身

柴胡已上各五錢　熟地黃八錢　芍藥一兩三錢

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服五七十丸白湯下空心宿食未消待飢則服之藥後省語言以食壓之

當歸龍膽草

治眼中白翳

防風　石膏已上各一錢五分　柴胡

羗活　五味子　升麻已上各二錢

甘草　酒黃連　黃芪已上各三錢

酒黃芩炒　酒黃檗炒　當歸身酒洗

草龍膽酒洗　芍藥已上各五錢

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去柤入酒少許臨臥熱服忌言語

補陽湯

治陽不勝其陰乃陰盛陽虛則九竅不通令青白翳見於大眥及足太陽少陰經中鬱遏足厥陰肝經氣不得上通於目故青白翳內阻也當於太陽少陰經中九原之下以益肝中陽氣衝天上行此乃先補其陽後於足太陽太陰標中標者頭也瀉足厥陰肝經火下伏於陽中乃次治也內經云陰盛陽虛則當先補其陽後瀉其陰此治法是也每日清晨以腹中無宿食服補陽湯臨臥服瀉陰丸若天色變經大寒大風并勞役預日飲食不調精神不足或氣弱俱不可服待體氣和平天氣如常服之先補其陽使陽氣上升通於肝經之末利空竅於目矣

肉桂一錢去皮　知母炒　當歸身酒洗

生地黃酒炒　白茯苓　澤瀉

陳皮已上各三錢　白芍藥　防風已上各五錢

黃芪　人參　白朮

羌活　獨活　熟地黃

甘草已上各一兩　柴胡二兩

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一大盞去柤空心服之

瀉陰火丸一名連翹益陰丸

石決明三錢炒存性　羌活　獨活

甘草　當歸梢　五味子

防風已上各五錢　草決明　細黃芩

黃連酒炒　黃蘗　知母已上各一兩

右為細末煉蜜為丸如菉豆大每服五十丸至一百丸茶清下常多服補陽湯少服此藥多則妨飲食

升陽柴胡湯

肉桂五分　柴胡去苗一錢五分　知母酒炒如大者加作五錢

防風　白茯苓　澤瀉

陳皮已上各三錢　生地黃酒炒　楮實酒炒微潤

黃芪　人參　白朮已上各五錢
甘草梢　當歸身　羌活
熟地黃　獨活　白芍藥已上各一兩
右剉每服五錢水二盞煎至一盞去柤稍熱食遠
服。
別合一料煉蜜爲丸如梧桐子大每服五十丸茶
清下每日與前藥各一服食遠不可飽服。
○如天氣熱加五味子三錢　天門冬去心　芍藥桔實
已上各五錢。

溫衛湯

治鼻不聞香臭目中流火氣寒血熱冷淚多臍下
冷陰汗足痿弱
陳皮　青皮　黃連
木香已上各三分　人參　甘草炙
白芷　防風　黃蘗
澤瀉已上各五分　黃芪　蒼朮
升麻　知母　柴胡
羌活已上各一錢　當歸身一錢五分

右都作一服水二盞煎至一盞去柤食遠服之

圓明膏

治勞心過度飲食失節乃生內障及瞳子散大此
方收睛圓明
訶子皮濕紙裹煨　甘草已上各二錢　當歸身三錢
柴胡　生地黃　麻黃去節搗開
黃連已上各五錢
右七味先以水二椀煎麻黃至一椀掠去沫外六
味各㕮咀如豆大篩去末入在內同熬滴水中不
散爲度入熟蜜少許再熬勤點眼。

嗃藥麻黃散

治內外障眼
黃蘗一兩　當歸身一錢
右二味同爲麄末炒黑色入麝香乳香少許共爲
細末含水鼻內嗃之。

疏本滋腎丸

黃蘗酒炒　知母酒炒已上各等分
右爲細末滴水爲丸如梧桐子大每服一百丸至

一百五十丸，空心，鹽白湯下。

加味滋腎丸

肉桂二分　黄連一錢　姜黄一錢五分

苦參三錢　苦葶藶酒洗　石膏煑入肚內煑炒用

黄蘗酒炒　知母各酒炒已上五錢

右爲極細末，打薄麪糊爲丸，如梧桐子大，每服一百丸，空心服，白湯下，食壓之。

退翳膏

治黑白翳

蕤仁　升麻已上各三錢　連翹

防風　青皮已上各四分　甘草

柴胡已上各五分　當歸身六分　荊芥穗一錢水半盞別浸

生地黄一錢五分　黄連三錢

右用水一椀，入前藥煎至半椀，去柤，更上火煎至半盞，入荊芥水兩匙，入蜜少許，再上火熬勻，點之。

龍膽飲子

治疳眼流膿生疳翳，濕熱爲病。

穀精草　川鬱金　蛇退皮

炙甘草已上各五分　麻黄一錢五分　升麻二錢

青蛤粉　草龍膽　黄芩炒

羌活已上各三錢

右爲細末，每服二錢，食後溫茶清調服之。

柴胡聰耳湯

治耳中乾結，耳鳴耳聾。

連翹四錢　柴胡三錢　炙甘草

當歸身　人參已上各一錢　水蛭五分炒別研

麝香少許別研　虻蟲三箇去足炒別研

右除三味，別研外，生姜三片，水二大盞，煎至一盞，去柤，再下三味，上火煎一二沸，稍熱食遠服。

羌活退翳湯

治太陽寒水翳膜遮睛，不能視物。

羌活二兩　防風一兩　荊芥穗煎成藥加之

薄荷葉　藁本已上各七錢　酒知母五錢

黄蘗四錢　川芎　當歸身已上各三錢

酒生地黄一錢　小椒五分　細辛少許

麻黄二錢用根

右㕮咀，每服三錢，水二大盞，煎至一盞半，入荆芥穗，再煎至一盞，去柤，稍熱服，食遠，忌酒醋濕麪等物。

還睛紫金丹

治目眶歲久赤爛，俗呼為赤瞎是也。當以三稜針刺目眶外，以瀉濕熱。如眼生倒睫拳毛，兩目緊，盖內伏火熱而攻陰氣，法當去其熱內火邪，眼皮緩則毛立出，瞖膜亦退，用手法攀出內瞼向外，以針刺之出血。

白沙蜜 三十兩　甘石 十兩燒七遍碎連水浸拘之　黃丹 六兩水飛

黃連 三兩小便浸碎爲末　南乳香　當歸 各三錢已上

烏魚骨 二錢　硇砂 小盞內放於瓶口上熏乾　麝香 各一錢已上

白丁香 直者五分　輕粉 一字

右將白沙蜜於沙石器內，熳火去沫，下甘石，次下丹，以柳枝攪，次下餘藥，以粘手為度，作丸如雞頭大，每用一丸，溫水化開洗。

麗澤通氣湯

治鼻不聞香臭

黃芪 四錢　蒼朮　羌活

獨活　防風　升麻

葛根 各三錢已上　炙甘草 二錢　麻黃 不去節冬月加之

川椒　白芷 各一錢已上

右㕮咀，每服五錢，生薑三片，棗二枚，葱白三寸，同煎至一盞，去柤，溫服，食遠。忌一切冷物及風寒涼處坐卧行立。

溫肺湯

治鼻不聞香臭，眼多眵淚

丁香 二分　防風　炙甘草

葛根　羌活 各一錢已上　升麻

黃芪 各二錢已上　麻黃 四錢不去節

右為麄末，水二盞，葱白三根，煎至一盞，去柤，食後服。

禦寒湯

治寒氣風邪傷於皮毛，令鼻壅塞，咳嗽上喘之證

黃連　黃蘗　羌活 各二分已上

炙甘草　佛耳草　款冬花

白芷　防風已上各三分　升麻

人參　陳皮已上各五分　蒼朮七分

黃芪一錢

右㕮咀都作一服水二盞煎至一盞去柤食後熱服

蘭室秘藏卷之二終

蘭室秘藏卷之三

元　鎮州　東垣李　杲明之　撰
明　吳郡　立齋薛　己新甫　校

頭痛門

頭痛論

金匱眞言論云東風生於春病在肝俞在頸項故春氣者病在頭又諸陽會於頭面如足太陽膀胱之脉起於目內眥上額交巔上入絡腦還出別下項病衝頭痛又足少陽膽之脉起於目銳眥上抵頭角病則頭角額痛夫風從上受之風寒傷上邪從外入客於經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補有餘則瀉汗之則愈此傷寒頭痛也頭痛耳鳴九竅不利者腸胃之所生乃氣虛頭痛也心煩頭痛者病在耳中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也如氣上不下頭痛巔疾者下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也如頭半寒痛者先取手少陽陽明後取足少陽陽明此偏頭痛也有眞頭痛者甚則腦盡痛手足寒至節死不治有厥逆頭

痛者所犯大寒内至骨髓髓者以腦爲主腦逆故令
頭痛齒亦痛凡頭痛皆以風藥治之者總其大體而
言之也高巓之上惟風可到故味之薄者陰中之陽
乃自地升天者也然亦有三陰三陽之異故太陽頭
痛惡風脉浮緊川芎羌活獨活麻黄之類爲主少陽
經頭痛脉弦細往來寒熱柴胡爲主陽明頭痛自汗
發熱惡寒脉浮緩長實者升麻葛根石膏白芷爲主
太陽頭痛必有痰體重則腹痛爲痰癖其脉沉緩蒼
朮半夏南星爲主少陰經頭痛三陰三陽經不流行

而足寒氣逆爲寒厥其脉沈細麻黄附子細辛爲主
厥陰頭項痛或吐痰沫厥冷其脉浮緩吳茱萸湯主
之血虚頭痛當歸川芎爲主氣虚頭痛人參黄芪爲
主氣血俱虚頭痛調中益氣湯少加川芎蔓荊子細
辛其效如神白朮半夏天麻湯治痰厥頭痛藥也青
空膏乃風濕熱頭痛藥也羌活附子湯治厥陰頭痛
藥也如濕氣在頭者以苦吐之不可執方而治先師
嘗病頭痛發時兩頰青黄暈眩目不欲開懶言身體
沉重兀兀欲吐潔古曰此厥陰太陰合病名曰風痰

以爲方玉壺丸治之更灸俠谿穴即愈是知方者體
也法者用也徒執體而不知用者弊體用不失可謂
上工矣

清空膏

治偏正頭痛年深不愈者善療風濕熱頭上壅損
目及腦痛不止

川芎 五錢　柴胡 七錢　黄連 炒
防風 去蘆　羌活 已上各一兩　炙甘草 一兩五錢
細挺子黄芩 三兩去皮剉一半酒製一半炒

右爲細末每服二錢七熱盞內入茶少許湯調如
膏抹在口內少用白湯送下臨臥

○如苦頭痛每服加細辛 二分

○如太陰脉緩有痰名曰痰厥頭痛減羌活防風川
芎甘草加半夏 一兩五錢

○如偏正頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加
柴胡 一倍

○如發熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白虎湯加好
吳白芷

徹清膏

蔓荊子　細辛已上各一分　薄荷葉

川芎已上各三分　生甘草　熟甘草已上各五分

藁本一錢

右為細末每服二錢食後茶清調下

川芎散

治頭目不清利

川芎三分　柴胡七分　羌活

防風　藁本　生甘草

升麻已上各一錢炒　熟甘草　酒生地黃各二錢

酒黃連　酒黃芩已上各四錢五分

右為細末每服一錢或二三錢食後茶清調下忌

酒濕麵

白芷散一名鬱金散

治頭痛

鬱金一錢　香白芷　石膏已上各二錢

薄荷葉　芒硝已上各三錢

右為極細末口含水鼻內搐之

碧雲散

治頭痛

細辛　鬱金　芒硝已上各一錢

蔓荊子　川芎已上各一錢二分　石膏一錢三分

青黛一錢五分　薄荷葉二錢　紅豆一箇

右為極細末口噙水鼻內搐之

羌活清空膏

蔓荊子一錢　黃連三錢　羌活

防風　甘草已上各四錢　黃芩一兩

右為細末每服一錢茶清調下食後臨臥

清上瀉火湯

昔有人年少時氣弱常於氣海三里灸之節次約五七十壯至年老添熱厥頭痛雖冬天大寒猶喜寒風其頭痛則愈微來暖處或見煙火其痛復作五七年不愈皆灸之過也

荊芥穗　川芎已上各二分　蔓荊子

當歸身　蒼朮已上各三分　酒黃連

生地黃　藁本　甘草已上各五分

升麻 防風已上各七分 酒黃蘗
炙甘草 黃芪已上各一錢 酒黃芩
酒知母已上各一兩五錢 羌活三錢 柴胡五錢
細辛少許 紅花少許
右剉如麻豆大分作二服每服水二盞煎至一盞
去租稍熱服食後

補氣湯

服前藥之後服此藥
柴胡二分 升麻三分 黃芪八分
當歸身二錢 炙甘草四錢 紅花少許

右㕮咀作二服水二盞煎至一盞去租稍熱服食
後

細辛散

治偏正頭痛
細辛 瓦粉已上各二分 生黃芩
芍藥已上各五分 酒黃連 川芎已上各七分
炒黃芩 酒黃芩已上各一錢 炙甘草一錢五分
柴胡一錢

右爲麁末每服三錢水一大盞半煎至一盞取清
食後服之

羌活湯

治風熱壅盛上攻頭目昏眩
炙甘草七分 澤瀉三錢 酒洗瓜蔞根
白茯苓 酒黃蘗已上各五錢 柴胡七錢
防風 細黃芩酒洗 酒黃連
羌活已上各一兩
右爲麁末每服五錢重水二中盞煎至一盞取清
食後臨臥通口熱服之

養神湯

治精神短不得睡項筋腫急難伸禁甘溫宜苦味
木香 橘皮 柴胡已上各一分
酒黃芩二分 人參 黃蘗
白朮 川芎已上各三分 升麻四分
蒼朮 麥蘖麪 當歸身
黃連已上各五分 甘草 半夏已上各七分
黃芪一錢

右㕮咀每服五錢水二大盞煎至一盞去柤稍熱
服不拘時候

安神湯

治頭痛頭旋眼黑

生甘草 炙甘草已上各二錢 防風二錢五分
柴胡 升麻 酒生地黃
酒知母已上各五錢 酒黃蘗 羌活已上各一兩
黃芪二兩

右爲麄末每服五錢水二大盞半煎至一盞半加

蔓荊子五分川芎三分再煎至一盞去柤臨臥熱
服

半夏白朮天麻湯

范天駷之內有脾胃證時顯煩燥胸中不利大便
不通而又爲寒氣怫鬱悶亂大作火不伸故也疑
其有熱服疎風丸大便行其病不減恐其藥少再
服七八十丸大便復見兩行元證不瘳增以吐逆
食不能停痰唾稠粘湧出不止眼黑頭旋惡心煩
悶氣短促上喘無力以言心神顛倒目不敢開如
在風雲中頭苦痛如裂身重如山四肢厥冷不得
安臥余料前證是胃氣已損復下兩次則重虛其
胃而痰厥頭痛作矣與此藥而治之

黃蘗二分酒洗 乾薑三分 澤瀉
白茯苓 天麻 黃芪
人參 蒼朮已上各五分 炒神麯
白朮已上各一錢 麥蘗麪 半夏湯洗
橘皮已上各一錢五分

右㕮咀每服五錢水二大盞煎至一盞去柤熱服

食前一服而愈此頭痛苦甚謂之足太陰痰厥頭
痛非半夏不能療眼黑頭旋風虛內作非天麻不
能除黃芪甘溫瀉火補元氣實表虛止自汗人參
甘溫瀉火補中益氣二朮俱苦甘溫除濕補中益
氣澤瀉茯苓利小便導濕橘皮苦溫益氣調中升
陽神麯消食蕩胃中滯氣大麥麪寬中助胃氣乾
薑辛熱以滌中寒黃蘗大苦寒酒洗以療冬天少
火在泉發燥也

口齒咽喉門

口齒論

論曰夫齒者腎之標口者脾之竅諸經多有會於口者其牙齒是手足陽明之所過上齦隸於坤土乃足陽明胃之脉貫絡也止而不動下齦嚼物動而不休手陽明大腸之脉所貫絡也手陽明惡寒飲而喜熱足陽明喜寒飲而惡熱其病不一牙者腎之標亦喜寒寒者堅牢爲病不同熱甚則齒動齦斷袒脫作痛不已故所治療不同也有惡熱而作痛者有惡寒而作痛者有惡寒惡熱而作痛者有惡寒飲少熱飲多

而作痛者有惡熱飲少寒飲多而作痛者有牙齒動搖而作痛者有齒袒腫起爲痛者有脾胃中有風邪但覺風而作痛者又有牙上多爲虫所蝕其齒缺少而色變爲虫牙痛者有胃中氣少不能於寒袒露其齒作痛者有牙齒疼痛而穢臭之氣不可近者痛既不一豈可一藥而盡之哉

羌活散

治客寒犯腦風寒濕腦痛項筋急牙齒動搖肉齦袒脫疼痛

藁本　香白芷　桂枝已上各二分

蒼术　升麻已上各五分　當歸身六分

草豆蔻仁一錢　羌活一錢五分　羊脛骨灰二錢

麻黃去根節　防風已上各三錢　柴胡五錢

細辛少許

右爲細末先用溫水漱口淨擦之其痛立止

草豆蔻散

治寒多熱少牙齒疼痛

細辛葉　防風已上各二分　羊脛骨灰

熟地黃已上各五分　當歸七分　草豆蔻仁

黃連已上各一錢三分　升麻二錢五分

右爲細末同前牙痛處擦之

麻黃散

治冬寒時分寒濕腦痛項筋急牙齒動搖疼痛

防風　藁本已上各三分　羊脛骨灰

當歸身　熟地黃已上各六分　草豆蔻仁

升麻　黃連已上各一錢　羌活一錢五分

麻黃不去節　草龍膽酒洗　生地黃已上各二錢

細辛 少許

右爲細末依前藥法擦之

麝香散

治熱多寒少牙露根肉齦脫血出齒動欲落疼痛妨食忤涼少忤熱多

熟地黃 二分　益智仁 半二分　當歸身

生地黃　麻黃根　酒漢防巳

人參 巳上各二分　升麻 一錢　草豆蔻

黃連 巳上各一錢五分　羊脛骨灰 一錢　麝香 少許

右爲細末如前藥擦之

治蟲散 一名白芷散

治大寒犯腦牙齒疼痛及蟲痛胃經濕熱腫痛

桂枝 一分　熟地黃 二分　藁本

白芷 巳上各三分　當歸身　益智仁

黃連 巳上各四分　羌活 五分　吳茱萸 八分

草豆蔻　黃芪　升麻 巳上各一錢

羊脛骨灰 二錢　麻黃 不去節二錢五分

右爲細末同前擦之

益智木律散

治寒熱牙痛

木律 二分　當歸　黃連 巳上各四分

羊脛骨灰　益智皮　熟地 巳上各五分

草豆蔻皮 一錢二分　升麻 一錢五分

右爲細末用皮如前擦之

○如寒牙痛不用木律

蠍梢散

治大寒風犯腦牙痛

白芷　當歸身　柴胡 巳上各二分

桂枝　升麻　防風

藁本　黃芪 巳上各三分　羌活 五分

草豆蔻皮 一錢　麻黃 去節一錢五分　羊脛骨皮 二錢五分

蠍梢 少許

右爲細末如前法用之

白牙散

白芷 七分　升麻 一錢　石膏 一錢五分

羊脛骨灰 二錢　麝香 少許

右爲細末先用温水漱口擦之妙

刷牙藥

麝香一分　生地黄　酒防巳

熟地黄二分已上各　當歸身　人參三分已上各

草豆蔻皮五分　升麻一錢　羊脛骨灰

黄連二錢已上各　白豆蔻　草豆蔻三錢已上各

沒石子三箇　五倍一箇

右爲極細末如前法擦之妙

獨聖散

治一切牙痛風疳

北地蒺藜不以多少陰乾

右爲細末每用刷牙以熱漿水漱牙外糝末熱漿水刷牙大有神効不可具述

當歸龍膽散

治寒熱停牙痛

香白芷　當歸稍　羊脛骨灰

生地黄五分已上各　麻黄　草豆蔻

草龍膽　升麻　黄連一錢已上各

右爲細末如前法擦之神効

牢牙地黄散

治腦寒痛及牙痛

藁本二分　生地黄　熟地黄

羗活　防巳　人參三分已上各

當歸身　益智仁四分已上各　香白芷

黄芪五分已上各　羊脛骨灰　呉茱萸

黄連　麻黄一錢已上各　草豆蔻皮一錢二分

升麻一錢五分

右爲細末如前法擦之

細辛散

治寒邪風邪犯腦牙齒痛

柴胡　防風　升麻

白芷二分已上各　桂枝二分半　麻黄去節

藁本　蒼术三分已上各　當歸身四分

草豆蔻五分　羊脛骨灰　羗活一錢五分已上各

細辛少許

右爲細末先嗽後擦之佳

立效散

治牙齒痛不可忍及頭腦項背微惡寒飲大惡熱飲其脉上中下三部陽虛陰盛是五臟內盛六腑陽道脉微小小便滑數

細辛二分　炙甘草三分　升麻七分

防風一錢　草龍膽四分酒洗

右㕮咀都作一服水一盞煎至七分去柤以匙抄在口中煠痛處待少時則止

○如多惡熱飲更加草龍膽一錢此法不定隨寒熱多少臨時加減

○若更惡風作痛加草豆蔻黃連已上各五分勿加草龍膽

牢牙散

治牙齦肉綻有根牙疳腫痛牙動搖欲落牙齒不長牙黃口臭

羌活一兩　草龍膽一兩五錢酒洗　羊脛骨灰二兩

升麻四兩

右為細末以紗羅子羅骨灰作微塵末和勻臥時貼在牙齦上

清胃散

治因服補胃熱藥致使上下牙疼痛不可忍牽引頭腦滿面發熱大痛足陽明之別絡入腦喜寒惡熱乃是手陽明經中熱盛而作也其齒喜冷惡熱

當歸身　揀細黃連如連不好更加二分夏月倍之

生地黃酒製已上各三分　牡丹皮五分　升麻一錢

右為細末都作一服水一盞半煎至一盞去柤帶冷服之

神功丸

治多食肉人口臭不可近牙齒疳蝕牙齦肉將脫牙齒落血不止

蘭香葉如無藿香代之　當歸身　藿香用葉

木香已上各一錢　升麻二錢　生地黃酒洗

生甘草已上各二錢　黃連去鬚揀淨酒洗秤　縮砂仁已上各五錢

右同為細末湯浸蒸餅為丸如菉豆大每服一百丸或加至二百丸止白湯下食遠服兼治血痢及血崩及血下不止血下褐色或紫色黑色及腸澼

下血空心服米湯下其脉洪大而緩者及治麻木脉氣上衝逆氣上行妄聞妄見者

桔梗湯

治咽腫微覺痛聲破

當歸身　馬勃一分已上各　白殭蠶

黃芩三分已上各　麻黃五分不去節　桔梗

甘草一錢已上各　桂枝少許

右爲麁末作一服水二大盞煎至一盞去柤稍熱服之食遠

又方

治口瘡久不愈者

黃蘗不計多少真者蜜塗其上炙黃色

右爲細末乾糝瘡上臨卧忌醋醬塩

神驗方

治口瘡無問久新

夜間將二丸以歷緊左右交手揉三五十次但遇睡覺行之如此三五度因濕而生者一夜愈久病諸般口瘡三二夜愈如鼻流清涕者亦之二丸揉之數夜可愈

内經云膀胱移熱於小腸隔腸不便上口爲糜易老五苓散與導赤散合而飲之

嘔吐門

丁香茱萸湯

治嘔吐噦胃虛寒所致

黃蘗三分　炙甘草　丁香

柴胡　橘皮五分已上各　升麻七分

吳茱萸　蒼木　人參一錢已上各

當歸身一錢五分　草豆蔻仁　黃芪二錢已上各

右爲麁末每服五錢水二大盞煎至一盞去柤稍熱服食前

白术湯一名茯苓半夏湯

治胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐是風邪羈絆於脾胃之間當先實其脾胃

炒神麯二錢　陳皮　天麻三錢已上各

白术　白茯苓　麥糵麯炒黃色

半夏五錢已上各

右㕮咀每服五錢水二盞入生薑五片同煎至一
盞去柤稍熱服

補肝湯 一名柴胡半夏湯

治素有風證不敢見風眼澀頭痛眼黑胸中有痰
惡心兀兀欲吐遇風但覺皮肉緊手足難舉重如
居暖室少出微汗其證乃減再或遇風病即復

柴胡　升麻　藁本已上各五分
白茯苓七分　炒神麯　蒼朮已上各一錢
半夏二錢　生薑十片

右為麤末都作一服水二大盞煎至一大盞去柤
稍熱服

吳茱萸丸 一名木香利膈丸

治寒在膈上噎塞咽膈不通

木香　青皮已上各二分　白殭蠶
姜黃　澤瀉　柴胡已上各四分
當歸身　炙甘草已上各六分　益智仁
人參　橘皮　升麻
黃芪已上各八分　半夏一錢　草豆蔻仁
吳茱萸已上各一錢二分　麥蘖麵一錢五分

右為細末湯浸蒸餅為丸如菉豆大每服二三十
丸溫水送下勿多飲湯恐速下細嚼亦得

衄血吐血門

麥門冬飲子

治吐血久不愈以三稜鍼於氣街出血立愈

黃芪一錢　麥門冬　當歸身已上各三分
生地黃　人參已上各五分　五味子十箇

右為麤末都作一服水二盞煎至一盞去柤熱服

不拘時

人參飲子

治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血

麥門冬二分　人參去蘆　當歸身已上各三分
黃芪　白芍藥　甘草已上各一錢
五味子五箇

右為麤末都作一服用水二盞煎至一盞去柤稍
熱服

一貧者有前證以前藥投之愈繼而至冬天居大

室中臥大熱炕而吐血數次再來求治料此病久虛弱附脇有形而有火熱在內上氣不足陽氣外虛當補表之陽氣瀉其裏之虛熱是其法也冬天居大室衣盖單薄是重虛其陽表有大寒壅遏裏熱火邪不得舒伸故血出於口憶仲景傷寒論中一證太陽傷寒當以麻黃湯發汗而不愈遂成衄却與麻黃湯立愈此法相同予遂用之

麻黃桂枝湯

人參（益上焦元氣不足而實其表也） 麥門冬（保肺氣已上各三分） 桂枝（以補表虛）

當歸身（和血養血各五分） 麻黃（去根） 甘草（補其脾胃之虛）

黃芪（實表益衛各一錢） 白芍藥（已上各一錢） 五味子（五箇安其脈氣）

右以水三盞先煮麻黃一味令沸去沫至二盞入餘藥同煎至一盞去租熱服臨臥只一服而愈更不再作

黃芪芍藥湯

治鼻衄血多面黃眼澁多眵手麻木

葛根 羌活（已上各五錢） 白芍藥

升麻（已上各一兩） 炙甘草（二兩） 黃芪（三兩）

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞食後溫服

○六脈弦細而澁按之空虛其色必白而夭不澤者脫血也此大寒證以辛溫補血益血以甘溫甘熱滑潤之劑以佐之則愈此亡血亦傷精氣

三黃補血湯

治六脈俱大按之空虛必面赤善驚上熱乃手少陰心脈也此氣盛多而亡血以甘寒鎭墜之劑大瀉其氣以墜氣浮以甘辛溫微苦峻補其血

牡丹皮 黃芪（補之以助正虛元氣） 升麻（已上各一錢）

當歸 柴胡（已上各一錢五分） 熟地黃

川芎（已上各二錢） 生地黃（三錢） 白芍藥（五錢）

右㕮咀如麻豆大每服五錢水二大盞煎至一大盞去租稍熱服食前

○如兩寸脈芤血在上焦或衄血或嘔血與犀角地黃湯則愈

救脈湯（一名人參救肺湯）

治吐血

甘草 蘇木 陳皮（已上各五分）

升麻　柴胡　蒼朮已上各一錢
當歸梢　熟地黄　白芍藥
黄芪　人參已上各二錢
右為麄末都作一服水二大盞煎至一盞去柤稍
温食前服

止衄血法

治鼻血久不止素有熱而暴作者諸藥無驗神法
以大紙二張作八摺或十摺於水内濕置頂中以
熱熨斗熨至一重或二重紙乾立止

腰痛門

川芎肉桂湯

丁未冬曹通甫自河南來有役人小翟露宿寒濕
之地腰痛不能轉側兩脇搐急作痛已經月餘不
愈矣腰痛論中說皆為足太陽足少陰血絡中有
凝血作痛間有一二證屬少陽膽經外絡脉病皆
去血絡之凝乃愈其内經有云冬三月禁不得用
鍼只宜服藥通其經絡破其血絡中敗血以此藥
主之

酒漢防已　防風已上各三分　神麯
獨活已上各五分　川芎　柴胡
肉桂　當歸梢　炙甘草
蒼朮已上各一錢　羌活一錢五分　桃仁五箇去皮尖研如泥
右㕮咀都作一服好酒三大盞煎至一大盞去柤
稍熱食遠服

獨活湯

治因勞役腰痛如折沉重如山
炙甘草二錢　羌活　防風

獨活　大黄煨　澤瀉
肉桂已上各二錢　當歸梢　連翹已上各五錢
酒漢防已　酒黄蘗已上各一兩　桃仁三十箇
右㕮咀每服五錢酒半盞水一大盞半煎至一盞
去柤熱服

破血散疼湯

治乘馬所傷跌其脊骨惡血流於脇下其痛苦楚
不能轉側妨於飲食
羌活　防風　中桂已上各一錢

蘇木一錢五分 連翹 當歸梢

柴胡已上各二錢 水蛭二錢炒去煙盡別研 麝香少許別研

右件分作二服每服酒二大盞水一大盞除水蛭麝香另研如泥煎餘藥作一大盞去柤上火令稍熱調二味空心服之兩服立愈

地龍散

治腰脊痛或打撲損傷從高墜下惡血在太陽經中令人腰脊痛或脛腨臂股中痛不可忍鼻塞不通

當歸梢一分 中桂 地龍已上各四分

麻黄五分 蘇木六分 獨活

黄蘗 甘草已上各一錢 羌活二錢

桃仁六箇

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去柤溫服食遠

蒼朮湯

治濕熱腰腿疼痛

防風風能勝濕 黄蘗已上各一錢始得之時寒也久不愈寒化爲熱除濕止痛

柴胡二錢行經 蒼朮二錢去濕止痛

右都作一服水二大盞煎至一盞去柤空心服

麻黄復煎散

治陰室中汗出懶語四肢困倦無力走注疼痛乃下焦伏火而不得伸浮而燥熱汗出一身盡痛蓋風濕相搏也以升陽發汗漸漸發之火鬱乃濕在經者亦宜發汗況正值季春之月脉緩而遲尤宜發汗令風濕去而陽升以此困倦乃退氣血俱得生旺也

白术 人參 生地黄

柴胡 防風已上各五分 羌活

黄蘗已上各一錢 麻黄去節微搗不令作末水五大盞煎令沸去沫煎至三盞入下項藥再煎

黄芪已上各二錢 甘草三錢 杏仁三箇去皮

右㕮咀都作一服入麻黄湯煎至一盞臨臥服之勿令食飽取漸次有汗則效

緩筋湯一名羌活湯

治兩目如火腫痛兩足及伏兎筋骨痛膝少力身重腰痛夜惡寒痰嗽頸項皆急痛目外瞼目繫急

食不下

熟地黃一分　生甘草　柴胡

紅花　炙甘草　蘇木

獨活已上各二分　藁本　升麻

黃芩　草豆蔻仁　酒黃檗

生地黃　當歸身　麻黃已上各三分

羌活一錢　蒼朮五分

右爲麄末都作一服水二大盞煎至一盞去柤食

遠服之

拈痛湯

治濕熱爲病肩背沉重肢節疼痛胸膈不利

白朮一錢五分　人參去蘆　苦參酒炒

升麻去蘆　葛根　蒼朮已上各二錢

防風去蘆　知母酒洗　澤瀉

黃芩炒　猪苓　當歸身已上各三錢

炙甘草　黃芩酒洗　茵蔯酒炒

羌活已上各五錢

右㕮咀每服一兩水二大盞煎至一盞去柤食遠

服

蒼朮復煎散

治寒濕相合腦右痛惡寒項筋脊骨强肩背胛眼

痛膝髕痛無力行步沉重

紅花一分　黃檗三分　柴胡

藁本　澤瀉　白朮

升麻已上各五分　羌活一錢　蒼朮四兩水二椀煎至二大盞去柤入藥

右㕮咀先煎蒼朮湯二大盞復煎前項藥至一大

盞稍熱空心服取微汗爲效忌酒濕麪

羌活蒼朮湯

治脚膝無力沉重

炙甘草　黃檗　草豆蔻

生甘草　葛根已上各五分　橘皮六分

柴胡七分半　升麻　獨活

縮砂仁　蒼朮已上各一錢　防風一錢五分

黃芪二錢　知母二錢五分　羌活三錢

右㕮咀分作二服水二大盞煎至一盞去柤空心

服

壯本丹 秘方

治腎虛腰痛久則寒冷此藥壯筋骨補元氣利小大

養丹田治腰痛之妙劑

杜仲一兩 炒　肉蓯蓉五錢 酒洗　巴戟五錢 去骨

破故紙一兩 鹽水炒　茴香一兩　青鹽五錢

右爲末將猪腰子分開入藥在內縫住紙包煨熟

每一個一服用黃酒送下

加味青娥丸

治腎虛腰痛或風寒乘之血氣相搏爲痛

杜仲十二兩 薑汁炒　破故紙十二兩 水淘芝麻同炒去芝麻取上焙乾爲末

沉香六兩　胡桃去皮膜另研六兩　没藥另研

乳香六兩 各另研

右爲末用肉蓯蓉十二兩酒浸成膏和劑搗千餘

杵丸如梧桐子大每服三十丸空心溫酒或鹽湯

任下

加味補陰丸

治腎虛腰痛并一切腎氣虛憊筋骨軟弱等証

人參二兩　熟地四兩 酒浸　枸杞四兩

生地四兩 酒洗　歸身三兩 酒洗　山藥三兩 炒

龜版二兩 酒炙　虎脛骨二兩 酥炙　瑣陽二兩 酒洗

兎絲子三兩 酒蒸　杜仲二兩 去絲炒　牛膝二兩 酒洗

骨碎補二兩 碎　肉蓯蓉二兩 酒浸　破故紙二兩 炒

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服二錢漸加至

三錢空心淡鹽湯或溫酒任下冬月加乾薑五錢

蘭室秘藏卷之三 終

蘭室秘藏卷之四

元 鎮州 東垣李 杲明之 撰

明 吳都 立齋薛 已新甫 校

婦人門

經閉不行有三論

陰陽別論云二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳為風消為息賁者死不治婦人脾胃久虛或形羸氣血俱衰而致經水斷絶不行或病中消胃熱善食漸瘦津液不生夫經者血脈津液所化津液既絶為熱所爍肌肉消瘦時見渴燥血海枯竭病名曰血枯經絶宜瀉胃之燥熱補益氣血經自行矣此證或經適行而有子子不安為胎病者有矣或心包脈洪數燥作時見大便秘澀小便雖清不利而經水閉絶不行此乃血海乾枯宜調血脈除包絡中火邪而經自行矣内經所謂小腸移熱於大腸為虙瘕為沉月澀不利則月事沉滯而不利故云為虙瘕為沉也或因勞心心火上行月事不來安心補血瀉火經自行矣故内經云月事不來者胞脈閉也胞脈者屬心而絡於胞中今氣上迫肺心氣不得下故月事不來也

經漏不止有三論

陰陽別論云陰虛陽搏謂之崩婦人脾胃虛損致命門脈沉細而數疾或沉弦而洪大有力寸關脈亦然皆由脾胃有虧下陷於腎與相火相合濕熱下迫經漏不止其色紫黑如夏月腐肉之臭中有白帶者脈必弦細寒作於中中有赤帶者其脈洪數疾熱明矣必腰痛或臍下痛臨經欲行先見寒熱往來兩脇急縮兼脾胃證出見或四肢困熱心煩不得眠臥心下急宜大補脾胃而升舉血氣可一服而愈或人故貴脫勢人事疎少或先富後貧心氣不足其火大熾旺於血脈之中又致脾胃飲食失節火乘其中形質肌肉容顏似不病者此心病也不行於診故脾胃飲食不調其證顯矣而經水不時而下或適來適斷暴下不止治當先說惡死之言勸諭令拒死而心不動以大補氣血之藥舉養脾胃微加鎮墜心火之藥治其心補陰瀉陽經自止矣痿論云悲哀太甚則胞絡絶

也陽氣內動發則心下崩數溲血也故本病曰大經空虛發則肌痺傳爲脈痿此之謂也

升陽除濕湯 一名調經升麻除濕湯

治女子漏下惡血月事不調或暴崩不止多下水漿之物皆由飲食不節或勞傷形體或素有心氣不足因飲食勞倦致令心火乘脾其人必怠惰嗜臥四肢不收困倦乏力無氣以動氣短上氣逆急上衝其脈緩而弦急按之洪大皆中之下得之脾土受邪也脾主滋榮周身者也心主血血主脈二

者受邪病皆在脈脈者血之府也脈者人之神也心不主令包絡代之故曰心之脈主屬心系心系者包絡命門之脈也主月事因脾胃虛而心包乘之故漏下月水不調也況脾胃爲血氣陰陽之根蒂也當除濕去熱益風氣上伸以勝其濕又云火鬱則發之

當歸酒洗 獨活已上各三分 蔓荊子七分

防風 炙甘草 升麻

藁本已上各一錢 柴胡 羌活

蒼朮 黃芪已上各一錢五分

右剉如麻豆大勿令作末都作一服以潔淨新汲水五大盞煎至一大盞去粗空心熱服待少時以早飯壓之可一服而已如灸足太陰脾經中血海穴二七壯而已

此藥乃從權之法用風勝濕爲胃下陷而氣迫於下以救其血之暴崩也并血惡之物住後必須黃芪人參炙甘草當歸之類數服以補之於補氣升陽湯中加以和血藥便是也若經血惡物下之不

絕尤宜究其根源治其本經只益脾胃退心火之亢乃治其根蒂也若遇夏月白帶下脫漏不止宜用此湯一服立止

涼血地黃湯

治婦人血崩是腎水陰虛不能鎮守包絡相火故血走而崩也

黃芩 荊芥穗 蔓荊子已上各一錢

黃蘗 知母 藁本

細辛 川芎已上各二分 黃連

羌活　柴胡　升麻

防風已上各三分　生地黄　當歸已上各五分

甘草一錢　紅花少許

右㕮咀都作一服水三大盞煎至一盞去柤稍熱空心服之

足太陰脾之經中血海二穴在膝臏上內臁白肉際二寸中治女子漏下惡血月事不調逆氣腹脹其脉緩者是也灸三壯

足少陰腎之經中陰谷二穴在膝內輔骨後大筋

下小筋上按之應手屈膝取之治膝如錐不得屈伸舌縱涎下煩逆溺難少腹急引陰痛股內臁痛婦人漏血不止腹脹滿不得息小便黃如蠱女子如妊身可灸二壯

酒煮當歸丸

治癩疝白帶下疰脚氣腰已下如在氷雪中以火焙烘重重厚綿衣蓋其上猶寒冷不任寒之極也面白如枯魚之象肌肉如刀刮削瘦峻之速也小便不止與白帶長流而不禁固自不知覺面白目青藍如菜色目䀮䀮無所見身重如山行步欹側不能安地腳膝枯細大便難秘口不能言無力之極食不下心下痞煩心懊憹不任其苦面停垢背惡寒小便遺而不知此上中下三陽真氣俱虛欲竭噦嘔不止胃虛之極也脉沉厥緊而澀按之空虛若脉洪大而澀按之無力猶為中寒之證況按之空虛者乎按之不鼓是為陰寒乃氣血俱虛之極也

茴香二錢　黑附子　良姜已上各七分

當歸二兩

右四味剉如麻豆大以上等好酒一升半同煮至酒盡焙乾

炙甘草　苦楝生用　丁香已上各五分

木香　升麻已上各一錢　柴胡二錢

炒黄鹽　全蝎已上各三分　延胡索四分

右與前四味藥同為細末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服五七十丸空心淡醋湯下忌油膩冷物酒濕麪

固眞丸

治白帶久下不止臍腹冷痛陰中亦然目中溜火視物䀮䀮然無所見齒皆惡熱飲痛須得黃連細末擦之乃止惟喜乾食大惡湯飲此病皆寒濕乘其胞內故喜乾而惡濕肝經陰火上溢走於標故上壅而目中溜火腎水侵肝而上溢致目䀮䀮而無所見齒惡熱飲者是陽明經中伏火也治法當大瀉寒濕以丸藥治之故曰寒在下焦治宜緩大忌湯散以酒製白石脂白龍骨以枯其濕炮乾薑

大熱辛瀉寒水以黃蘗之大寒爲因用又爲鄉導故云古者雖有重罪不絕人之後又爲之伏其所主先其所因之意又瀉齒中惡熱飲也以柴胡爲本經之使以芍藥五分導之恐辛熱之藥大甚損其肝經故微瀉之以當歸身之辛熱大和其血脉此用藥之法備矣

黃蘗 酒洗　白芍藥 已上各五分　柴胡

白石脂 已上各一錢火燒赤水飛細研日乾　乾姜 四錢炮

當歸 酒洗　白龍 酒煮日乾水飛爲末已上各二錢

右件除龍骨白石脂水飛研外同爲細末水煮麪糊爲丸如雞頭仁大日乾空心多用白沸湯下無令胃中停滯待少時以早飯壓之是不令熱藥犯胃忌生冷硬物酒濕麪

烏藥湯

治婦人血海疼痛

當歸　甘草　木香 已上各五分

烏藥 一兩　香附子 二兩炒

右㕮咀每服五錢水二大盞去柤温服食前

助陽湯 一名升陽燥濕湯

治白帶下陰戶中痛空心而急痛身黃皮緩身重如山陰中如冰

生黃芩　橘皮 已上各五分　防風

高良姜　乾姜　郁李仁

甘草 已上各一錢　柴胡 一錢三分　白葵花 七朵

右剉如麻豆大分作二服每服水二大盞煎至一盞去柤食前稍熱服

水府丹

治婦人久虛積冷經候不行癥瘕痃塊腹中暴痛
面有野䵳黧黑羸瘠

硇砂紙隔沸湯淋熬取 紅豆已上各五錢 桂心另爲末
木香 乾姜已上各一兩 桃仁二兩
經煆花藥石研一兩五錢 班猫一百箇去頭翅
生地黃汁 童子小便各一升 臘月狗膽七枚
芫蜻三百箇去頭足熔末一升蛑米黃去米不用

右九味爲細末同三汁熬爲膏和丸如雞頭大硃砂爲衣每服一丸溫酒細嚼食前服米飲亦可孕婦不可服

丁香膠艾湯

治崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲食不節所得經隔少時其脉二尺俱弦緊洪按之無力其證自覺臍下如冰求厚衣被以禦其寒白帶白滑之物多間有如屋漏水下時有鮮血右尺脉時微洪也

熟地黃 白芍藥已上各三分 川芎
丁香已上各四分 阿膠六分 生艾葉一錢
當歸一錢二分

右川芎爲細末當歸酒洗剉熟地黃丁香爲細末艾亦剉都作一服水五大盞先煎五味作一盞零二分去粗入膠再上火煎至一大盞帶熱空心服之

黃芪當歸人參湯

丁未仲冬郭大方來說其妻經水暴崩不止先曾損身失血自後一次縮一十日而來今次不止其人心窄性急多驚以予料之必因心氣不足飲食不節得之大方曰無到彼診得掌中寒脉沉細而緩間而沉數九竅微有不利四肢無力上喘氣短促口鼻氣皆不調果有心氣不足脾胃虛弱之證胃脘當心而痛左脇下縮急有積當臍有動氣腹中鳴下氣大便難虛證極多不能盡錄擬先治其本餘證可以皆去安心定志鎮墜其驚調和脾胃大益元氣補其血脉令養其神以大熱之劑去其冬寒凝在皮膚內少加生地黃去命門相火不致四肢痿弱

黃連一分 生地黃三分 炒神麴

橘皮　桂枝已上各五分　草豆蔻仁六分
黃芪　人參　麻黃不去節已上各一錢
當歸身一錢五分　杏仁五箇另研如泥

右㕮咀作二服水二大盞半煎麻黃令沸去沫煎至二盞入諸藥同煎至一大盞於巳午之間食消盡服之一服立止其胃脘痛乃胃上有客寒與大熱藥草豆蔻丸一十五丸白湯送下其痛立止再與肝之積藥除其積之根源而愈

當歸芍藥湯

治婦人經脉漏下不止其色鮮紅時值七月處暑之間先因勞役脾胃虛弱氣短氣逆自汗不止身熱悶亂惡見飲食非惟不入亦不思食沉懶困倦四肢無力大便時泄後再因心氣不足經脉再下不止惟覺氣下脫其元氣逆上全無惟覺心腹中氣下行氣短少不能言是無力以言非懶語也此藥主之

柴胡二分　炙甘草　生地黃已上各三分
橘皮不去白　熟地黃已上各五分　黃芪一錢五分
蒼术泔浸去皮　當歸身　白芍藥
白术已上各二錢

右十味㕮咀如麻豆大分作二服水二盞半煎至一盞去柤稍熱空心服之

柴胡調經湯

治經水不止鮮血項筋急腦痛脊骨强痛

炙甘草　當歸身　葛根已上各三分
獨活　藁本　升麻已上各五分
柴胡七分　羌活　蒼术已上各一錢
紅花少許

右剉如麻豆大都作一服水四大盞煎至一盞去柤空心稍熱服取微汗立止

一婦人經候凝結黑血成塊左廂有血瘕水泄不止穀有時不化後血塊暴下并水俱作是前後二陰有形血脫竭於下旣久經候猶不調水泄日見三兩行食罷煩心飲食減少甚至瘦弱東垣老人曰夫聖人治病必本四時升降浮沉之理權變之宜必先歲氣無伐天和無盛無虛遺人夭殃無致邪無失正絕人

長命故仲景云陽盛陰虛下之則愈汗之則死陰盛陽虛汗之則愈下之則死大抵聖人立法且如升陽或發散之劑是助春夏之陽氣令其上升乃瀉秋冬收藏殞殺寒涼之氣此病是也當用此法治之升降浮沉之至理也天地之氣以升降浮沉乃從四時如治病不可逆之故經云順天則昌逆天則亡可不畏哉夫人之身亦有四時天地之氣不可止認在外人亦體同天地也今經漏不止是前陰之氣血已脫下矣水泄又數年是後陰之氣血下陷以脫矣後陰者主有形之物也前陰者精氣之戶下竭是病人周身之血氣常行秋冬之令陰主殺此等收藏之病是也陽生陰長春夏是也在人之身令氣升浮者穀氣上行是也既病人周身血氣皆不生長穀氣又不勝其肌肉消少是兩儀之氣俱將絕矣既下元二陰俱脫血氣將竭假令當是熱證今下焦久脫化爲寒矣此病火沉久降寒濕大勝當急救之瀉寒以熱除濕以燥大升大舉以助生長補養氣血不致偏竭聖人立治之法既濕氣大勝以所勝治之助甲風木上升是

也故經云風勝濕是以所勝平之也當先調和胃氣次用白朮之類以燥其濕而滋元氣如其不止後用風藥以勝濕此便是大舉大升以助春夏二濕之久陷下之至治也

益胃升陽湯

血脫益氣古聖人之法也先補胃氣以助生發之氣故曰陽生陰長諸甘藥爲之先務舉世皆以爲補殊不甘能生血此陽生陰長之理也故知先理胃氣人之身以穀氣爲寶

柴胡　升麻已上各五分　炙甘草
當歸身酒洗　陳皮已上各一錢　人參去蘆有嗽去之
炒神麴已上各一錢五分　黃芪二錢　白朮二錢
生黃芩少許

右㕮咀每服一錢水二大盞煎至一盞去柤稍熱服

如腹中痛每服加白芍藥三分中桂少許

○如渴或口乾加葛根二分不拘時候

升陽舉經湯

治經水不止如右尺脉按之空虛是氣血俱脫大
寒之證輕手其脉數疾舉指弦緊或澀皆陽脫之
證陰火亦亡見熱證於口鼻眼或渴此皆陰躁陽
欲先去也當溫之舉之升之浮之燥之此法當大
升浮血氣切補命門之下脫也

肉桂 去皮盛夏勿用秋冬用　白芍藥　紅花 已上各五分
細辛 六分　人參 去蘆　熟地黄
川芎 已上各一錢　獨活根　黑附子
炙甘草 已上各一錢五分　羌活　藁本 去土

防風 已上各二錢　白术　當歸
黄芪 已上各三錢　柴胡 三錢　桃仁 十箇湯浸去皮尖細研

右㕮咀每服三錢若病勢順當漸加至五錢每服
水三盞煎至一盞空心熱服

半產悞用寒凉之藥論

婦人分娩及半產漏下昏冒不省瞑目無所知覺蓋
因血暴亡有形血去則心神無所養心與包絡者君
火相火也得血則安亡血則危火上熾故令人昏冒
火勝其肺瞑目不省人事是陰血暴去不能鎮撫也
血已虧損往往用滑石甘草石膏之類乃辛甘大寒
之藥能瀉氣中之熱是血虧瀉氣乃陰虧瀉陽使二
者俱傷反爲不足虛勞之病昏迷不省者上焦心肺
之熱也此無形之熱用寒凉之藥驅令下行豈不知
上焦之病悉屬於表乃陰證也汗之則愈今反下之
幸而不死暴虧氣血生命豈能久活又不知內經有
說病氣不足宜補不宜瀉但瞑目之病悉屬於陰宜
汗不宜下又不知傷寒鬱冒得汗則愈是禁用寒凉
藥也分娩半產本氣不病是暴去其血亡血補血又

何疑焉補其血則神昌常時血下降亡今當補而升
舉之心得血而養神不昏矣血若暴下是秋冬之令
大旺今舉而升之以助其陽則目張神不昏迷矣今
立一方補血養血生血益陽以補手足厥陰之不足
也

全生活血湯

紅花 三分　蔓荆子　細辛 已上各五分
生地黄 夏月多加之　熟地黄 已上各一錢　藁本
川芎 已上各一錢五分　防風 諸陽既陷何以知之血下脫故也

羌活　獨活　炙甘草

柴胡 去苗　當歸身 酒洗　葛根 已上各二錢

白芍藥　升麻 已上各三錢

右㕮咀，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去柤，食前稍熱服。

當歸附子湯

治臍下冷痛，赤白帶下。

當歸 二分　炒鹽 三分　蠍梢

升麻 已上各五分　甘草 六分　柴胡 六分

黃蘗 少許 引用　附子 一錢　乾姜 良姜

右為麁末，每服五錢，水五盞，煎至一盞，去柤，稍熱服，或為細末，酒麵糊為丸亦可。

調經補眞丸

冬後一月，微有地泥水泮，其白帶再來，陰戶中寒，一服立止。

獨活　乾姜 炮　藁本

防風　蒼朮 已上各二分　麻黃 不去節

炙甘草　人參 去蘆　當歸身

白朮　生黃芩　升麻 已上各五分

黃芪 七分　良姜　澤瀉

羌活 已上各一錢　柴胡 四錢　杏仁 二箇

桂枝 少許　白葵花 七朶 去萼

右㕮咀，除黃芩、麻黃各另外，都作一服，先以水三大盞半，煎麻黃一味，令沸，掠去沫，入餘藥同煎至一盞零七分，再入生黃芩，煎至一盞，空心服之，候一時許，可食早飯。

坐藥龍鹽膏

茴香 二分　枯礬 五分　良姜

當歸梢　酒防己　木通 已上各一錢

丁香　木香　川烏 炮 已上各一錢五分

龍骨　炒鹽　紅豆

肉桂 已上各二錢　厚朴 三錢　延胡索 五錢

全蝎 五箇

右為細末，煉蜜為丸，如彈子大，綿裹留系在外，內丸藥陰戶內，日易之。

勝陰丹

為上藥力小再取三錢內加行性熱藥項下

柴胡　羌活　枯白礬

甘松　升麻已上各一分　川烏頭

大椒　三柰子已上各五分　蒜七分

破故紙八分與苦楝同炒　全蝎三箇　麝香少許

右為細末依前法用

廻陽丹

羌活　全蝎　升麻根

甘松已上各二錢　草烏頭　水蛭炒已上各三分

大椒　三柰子　蓽撥

枯礬已上各五分　柴胡　川烏已上各七分

破故紙　炒黃鹽為必用之物去之則不效

蒜已上各一錢　虻虫三箇去翅足炒

右為極細末依前製用臍下覺暖為效

柴胡丁香湯

治婦人年三十歲臨經先腰臍痛甚則腹中亦痛經縮三兩日

生地黃二分　丁香四分　當歸身

防風　羌活已上各一錢　柴胡一錢五分

全蝎一箇

右件都作一服水二盞煎至一盞去柤食前稍熱服

延胡苦楝湯

治臍下冷撮痛陰冷大寒白帶下

黃蘗一分為引用　延胡索　苦楝子已上各二分

附子炮　肉桂已上各三分　炙甘草五分

熟地黃一錢

右都作一服水二大盞煎至一盞食前服

桂附湯

治白帶腥臭多悲不樂大寒

黃蘗為引用　知母已上各五分　肉桂一錢

附子三錢

右㕮咀都作一服水二盞煎至一盞去柤食遠熱服

○如少食常飽有時似腹脹夯悶加白芍藥五分

○如不思飲食加五味子二十箇

〇如煩僴面上如蟲行乃胃中元氣極虛加黃芪一錢五分人參七分炙甘草升麻已上各五分

人參補氣湯

治四肢懶倦自汗無力

丁香末二分　生甘草梢　炙甘草已上各三分

生地黃　白芍藥已上各五分　熟地黃六分

人參　防風　羌活

黃蘗　知母　當歸身

升麻已上各七分　柴胡一錢　黃芪一錢五分

全蝎一箇　五味子二十箇

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去柤空心稍熱服

黃芪白朮湯

治婦人四肢沉重自汗上致頭際頭而還惡風頭痛躁熱

細辛三分　吳茱萸　川芎已上各五分

柴胡　升麻已上各一錢　當歸身一錢五分

黃蘗酒洗　炙甘草　羌活已上各二錢

五味子三錢　白朮　人參已上各五分

黃芪一兩

右㕮咀每服五錢水二大盞生姜五片煎至一盞去柤食前熱服

〇如腹中痛不快加炙甘草一錢汗出不止加黃蘗一錢

白朮茯苓湯

治胃氣弱身重有痰噁心欲吐是風邪羈絆於脾胃之間當先實其脾胃

白朮　白茯苓　半夏已上各一兩

炒麯二錢　麥蘗麵炒五分

右㕮咀每服五錢水二大盞入生姜五片煎至一盞去柤不拘時服

增味四物湯

治婦人血積

當歸　川芎　芍藥

熟地黃　京三稜　乾漆

肉桂　廣茂已上各七分

右爲麁末，每服五錢，水二大盞，煎至一盞，去柤，食前稍熱服。

補經固眞湯

白文舉正室，白帶常漏久矣，諸藥不效，診得心包尺脉微，其白帶下流不止。叔和云：崩中日久爲白帶漏下，時多骨木枯。崩中者，始病血崩，久則血少，復亡其陽，故白滑之物下流不止，是本經血海將枯，津液復亡，枯乾不能滋養筋骨，以本部行經藥爲引用，爲使，以大參甘油膩之藥，潤其枯燥而滋益津液，以大辛熱之氣味藥，補其陽道，生其血脉，以苦寒之藥，泄其肺而救上熱傷氣，以人參補之，以微苦溫之藥爲佐而益元氣。

白葵花 去萼，研爛，四分　陳皮 五分，不去白　生黃芩 細研，引入

郁李仁 去皮尖，研如泥　甘草 炙　柴胡 已上各一錢

乾姜 細末　人參 已上各二錢

右件除黃芩外，以水三盞，煎至一盞七分，再入黃芩同煎至一盞，去柤，空心熱服，少時以早飯壓之。

溫衛補血湯

治耳鳴，鼻不聞香臭，口不知穀味，氣不快，四肢困倦，行步欹側，髮脫落，食不下，膝冷，陰汗，帶下，喉中吩吩，不得卧，口舌嗌乾，太息，頭不可以回顧，項筋緊，脊強痛，頭旋眼黑，頭痛欠嚏。

生地黃　白朮　藿香

黃蘗 已上各一分　牡丹皮　蒼朮

王瓜根　橘皮　吳茱萸 已上各二分

當歸身 二分半　柴胡　人參

熟甘草　地骨皮 已上各三分　升麻 四分

生甘草 五分　黃芪 一錢二分　丁香 一箇

桃仁 三箇　葵花 七朶

右㕮咀，作一服，用水二大盞，煎至一盞，去柤，食前熱服。

立効散

治婦人血崩不止。

當歸　蓮花心　白綿子

紅花　茅花 已上各一錢

右剉如豆大，白紙裹定，泥固，炭火燒灰存性，爲細

末。

○如乾血氣，研血竭為引，好溫酒調服，加輕粉一錢。

○如血崩不止，加麝香為引，好溫酒調服。

四聖散

治婦人赤白帶下。

川烏 炮製　生白礬 已上各一錢　紅娘子 三箇

斑猫 十箇

煉蜜為丸，如皂子大，綿裹坐之。

溫經除濕湯

十月霜冷後，四肢無力，乃痿厥，濕熱在下焦也。醋心者，是濁氣不下降，欲為滿也。合眼麻木作者，陽道不行也。惡風寒者，上焦之分，皮膚中氣不行也。開目不麻者，目開助陽道，故陰寒之氣少退也。頭旋眩運者，風氣下陷於血分，不得伸越而作也。近火則有之。

黃連 一分　柴胡　草豆蔻

神麴 炒　木香 已上各二分　麻黃 不去節

獨活　當歸身　黃蘗 已上各三分

升麻 五分　羌活 七分　炙甘草

人參　白术　猪苓

澤瀉 已上各一錢　黃芪　橘皮

蒼术 已上各二分　白芍藥 三錢

右剉如麻豆大，分作二服，水二盞煎至一盞，食遠服。治肢節沉重疼痛無力之勝藥也。

補氣升陽和中湯

李正臣夫人病，診得六脈俱中得弦洪緩相合，按之無力，弦在上，是風熱下陷入陰中，陽道不行。其證閉目則渾身麻木，晝減而夜甚，覺而開目則麻木漸退，久則絕止。常開其目，此證不作。懼其麻木不敢合眼，致不得眠。身體皆重，時有痰嗽，覺胸中常似有痰而不利，時煩燥，氣短促而喘，肌膚充盛，飲食不減，大小便如常，惟畏其麻木不敢合眼為最苦。觀其色脈形病相應而不逆。內經曰：陽盛瞋目而動，輕；陰病閉目而靜，重。又云：諸脈皆屬於目。靈樞經云：開目則陽道行，陽氣遍布周身；閉目則陽道閉而不行，如晝夜之分，知其陽衰而陰旺也。

且麻木爲風三尺之童皆以爲然細校之則有區別耳久坐而起亦有麻木爲如繩縛之久釋之覺麻作而不敢動良久則自已以此驗之非有風邪乃氣不行也治之當補其肺中之氣則麻木自去矣如經脉中陰火乘其陽分火動於中爲麻木也當兼去其陰火則愈矣時痰嗽者秋凉在外在上而作也當以温劑實其皮毛身重脉緩者濕氣伏匿而作也時見燥作當升陽助氣益血微瀉陰火與去濕通行經脉調其陰陽則已矣非五臟六腑之本有邪也此藥主之

生甘草去腎熱　酒黄蘗瀉火除濕　白茯苓除濕導火

澤瀉除濕導火　升麻行陽助經　柴胡已上各一錢

蒼朮除濕補中　草豆蔻仁益陽退外寒已上各一錢五分

橘皮　當歸身　白朮已上各二錢

白芍藥　人參已上各二錢　佛耳草

炙甘草四分　黄芪已上各五分

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗食遠服之

麻黄桂枝升麻湯

治婦人先患渾身麻木睡覺則少減開目則已而全愈又治心中煩惱遍身骨節疼身體沉重飲食減少腹中氣不運轉

木香　生薑已上各一分　桂枝

半夏　陳皮　草豆蔻仁

厚朴　黑附子　黄蘗已上各二分

炙甘草　升麻　白朮

茯苓　澤瀉已上各三分　黄芪

麻黄不去節　人參已上各五分

右都作一服水二盞煎至一盞去粗食遠服之

大便結燥門

大便結燥論

金匱眞言論云北方黑色入通腎開竅於二陰藏精於腎又云腎主大便大便難者取足少陰夫腎主五液津液潤則大便如常若饑飽失節勞役過度損傷胃氣及食辛熱味厚之物而助火邪伏於血中耗散眞陰津液虧少故大便結燥然結燥之病不一有熱

燥有風燥有陽結有陰結又有年老氣虚津液不足而結燥者治法云腎惡燥急食辛以潤之結者散之如少陰不得大便以辛潤之太陰不得大便以苦泄之陽結者散之陰結者温之仲景云小便利而大便硬不可攻下以脾約丸潤之食傷太陰腹滿而食不化腹響然不能大便者以苦藥瀉之如血燥而不能大便者以桃仁酒製大黄通之風結燥而大便不行者以麻子仁加大黄利之如氣澀而大便不通者以郁李仁枳實皂角仁潤之大抵治病必究其源不可

一槩用巴豆牽牛之類下之損其津液燥結愈甚復下復結極則以至導引於下而不通遂成不救噫可不慎哉

通幽湯

治大便難幽門不通上衝吸門不開噎塞不便燥秘氣不得下治在幽門以辛潤之

炙甘草 紅花已上各一分 生地黄

熟地黄 升麻 桃仁泥

當歸身已上各一錢

右都作一服水二大盞煎至一盞去柤調檳榔細末五分稍熱食前服之

潤燥湯

升麻 生地黄已上各二錢 熟地黄

當歸梢 生甘草 大黄煨

桃仁泥 麻仁已上各一錢 紅花五分

右除桃仁麻仁另研如泥外剉如麻豆大都作一服水二盞入桃仁麻仁泥煎至一盞去柤空心稍熱服

潤腸丸

治脾胃中伏火大便秘澀或乾燥閉塞不通全不思食及風結血秘皆令閉塞也以潤燥和血疎風自然通利矣

桃仁湯浸去皮尖 麻仁已上各一兩 當歸梢

大黄煨 羌活已上各五錢

右除桃仁麻仁另研如泥外搗爲極細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三五十丸空心白湯下

○如病人不大便爲大便不通而澀其邪盛者急加

酒洗大黃以利之
○如血燥而大便燥乾者加桃仁酒洗大黃
○如風結燥大便不行者加麻仁大黃
○如風濕而大便不行加煨皂角仁大黃秦艽以利之
○如脉澀覺身有氣澀而大便不通者加郁李仁大黃以除氣燥
○如寒陰之病爲寒結閉而大便不通者以局方中半硫丸或加煎附子乾姜湯冰冷與之其病雖陰寒之證當服陽藥補之若大便不通者亦當十服中與一服藥微通其大便不令結閉乃治之大法
○若病人雖是陰證或是陰寒之證其病顯燥脉實堅亦宜與陽藥中少加苦寒之藥以去熱燥燥止勿加
○如陰燥欲坐井中者其二腎脉按之必虛或沉細而遲此易爲辯耳如有客邪之病亦當從權加藥以去之

麻黃白术湯

治大便不通五日一遍小便黃赤渾身腫面上及腹尤甚其色黃麻木身重如山沉困無力四肢痿軟不能舉動喘促唾清水吐噦痰唾白沫如膠時躁熱發欲去衣須臾熱過振寒項額有時如冰額寒尤甚頭旋眼黑目中溜火冷淚鼻不聞香臭少腹急痛當臍中動氣按之堅硬而痛

青皮去腐　酒黃連已上各一分　酒黃檗
橘紅　甘草　升麻已上各二分
黃芪　人參　桂枝
白术　厚朴　柴胡
蒼术　豬苓已上各三分　吳茱萸
白茯苓　澤瀉已上各四分　白豆蔻
炒麴已上各五分　麻黃不去節五分　杏仁四個

右㕮咀分作二服水二大盞半先煎麻黃令沸去沫再入諸藥同煎至一盞去租稍熱食遠服

此證宿有風濕熱伏於榮血之中其木火乘於陽道爲上盛元氣短少上喘爲陰火傷其氣四肢痿在腎水之間乃所勝之病今正遇冬寒得時乘其

肝木又實其毋肺金尅火變木是大腸必有大腹其證善恐欠多噎身中如有物不聞香臭目視䀮䀮多悲健忘少腹急痛通身黃腹大脹面目腫尤甚食不下痰唾涕有血目黃腸大便不通並宜此藥治之

升陽湯 一名升陽瀉濕湯

治膈咽不通逆氣裏急大便不行

青皮　槐子已上各二分　生地黃

熟地黃　黃蘗已上各三分　當歸身

甘草梢已上各四分　蒼朮五分　升麻七分

黃芪一錢　桃仁十箇另研

右㕮咀如麻豆大都作一服入桃仁泥水二大盞煎至一盞去租稍熱食前服

活血潤燥丸

治大便風秘血秘常常燥結

當歸梢一錢　防風三錢　大黃濕紙裹煨

羌活一兩已上各　桃仁二兩研如泥　麻仁二兩五錢研如泥

皂角仁燒存性去皮一兩五錢其性得濕則滑濕滑則燥結自除

右除麻仁桃仁另研如泥外爲極細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服五十丸白湯下三兩服後須以蘇麻子粥每日早晚食之大便日久不能結燥也以磁器盛之紙封無令見風

潤腸湯

治大腸結燥不通

生地黃　生甘草已上各二錢　大黃煨

熟地黃　當歸梢　升麻

桃仁　麻仁已上各一錢　紅花三分

右㕮咀水二盞煎至一盞去租食遠溫服

蘭室秘藏卷之四終

元　鎮州　東垣李　杲明之　撰

明　吳郡　立齋薛　己新甫　校

小便淋閉門

小便淋閉論

難經云病有關有格關則不得小便又云關無出之由皆邪熱為病也分在氣在血而治之以渴與不渴而辨之如渴而小便不利者是熱在上焦肺之分故渴而小便不利也夫小便者是足太陽膀胱經所主也長生於申申者西方金也肺合於未若肺中有熱不能生水是絕其水之源經云虛則補其母宜清肺而滋其化源也故當從肺之分助其秋令水自生焉又如雨如露如霜皆從天而降下也乃陽中之陰明秋氣自天而降下也且藥有氣之薄者乃陽中之陰是感秋清肅殺之氣而生可以補肺之不足淡味滲泄之藥是也茯苓澤瀉琥珀燈心通草車前子木通瞿麥萹蓄之類以清肺之氣泄其火資水之上源也如不渴而小便不通者熱在下焦血分故不渴而大

燥小便不通也熱閉於下焦者腎也膀胱也乃陰中之陰陰受熱邪閉塞其流易老云寒在胸中遏絕不入熱在下焦塡塞不便須用感北方寒水之化氣味俱陰之藥以除其熱泄其閉塞內經云無陽則陰無以生無陰則陽無以化若服淡滲之藥其性乃陽中之陰非純陽之劑陽無以化何能補重陰之不足也須用感地之水運而生太苦之味感天之寒藥而生大寒之氣此氣味俱陰乃陰中之陰也大寒之氣人禀之生膀胱寒水之運人感之生腎此藥能補腎與膀胱受陽中之陽熱火之邪而閉其下焦使小便不通也夫用大苦寒之藥治法當寒因熱用又云必伏其所主而先其所因其始則氣同其終則氣異也

通關丸　一名滋腎丸

治不渴而小便閉熱在下焦血分也

黃蘗去皮剉酒洗焙　知母剉酒洗焙乾已上各一兩　肉桂五分

右為細末熟水為丸如梧桐子大每服一百丸空心白湯下頓兩足令藥易下行故也如小便利前陰中如刀刺痛當有惡物下為驗

清肺飲子

治渴而小便閉澁不利邪熱在上焦氣分

燈心一分　通草二分　澤瀉

瞿麥　琥珀已上各五分　萹蓄

木通已上各七分　車前子炒一錢　茯苓去皮二錢

猪苓去皮三錢

右爲麁末每服五錢水一盞半煎至一盞稍熱食遠服或劑力八正散五苓散亦宜服之

導氣除燥湯

治小便閉塞不通乃血澁至氣不通而竅澁也

茯苓去皮　滑石炒黃已上各二錢　知母細剉酒洗

澤瀉已上各三錢　黃蘗去皮酒洗

右㕮咀每服五錢水三盞煎至一盞去柤稍熱空心服

如急閉不通者服

腎疸湯

治腎疸目黃甚至渾身黃小便赤澁

羌活　防風　藁本

獨活　柴胡已上各五錢　升麻五錢

已上治腎疸目黃渾身黃

白茯苓二分　澤瀉三分　猪苓四分

白朮五分　蒼朮一錢

已上治小便赤澁

黃蘗二分　人參三分　葛根五分

神麴六分　甘草三錢

右剉如大豆大分作二服水三盞煎至一盞去柤稍熱食前服

痔漏門

痔漏論

内經曰因而飽食筋脉横解腸澼爲痔夫大腸庚也主津本性燥清肅殺之氣本位主收其所司行津以從足陽明旺則生化萬物者也足陽明爲中州之土若陽衰亦殞殺萬物故曰萬物生於土而歸於土者是也以手陽明大腸司其化焉既在西方本位爲之害蜚司殺之府因飽食行房忍泄前陰之氣歸於大腸木乘火勢而侮燥金故火就燥也大便必閉其疾

甚者當以苦寒湯泄以辛溫和血潤燥疏風止痛是其治也以秦艽當歸稍和血潤燥以桃仁潤血以皂角仁除風燥以地榆破血以枳實之苦寒補腎以下泄胃實以澤瀉之淡滲使氣歸於前陰以補清燥受胃之濕邪也白朮之苦甘以苦補燥氣之不足其甘味以瀉火而益元氣也故曰甘寒瀉火乃假枳實之寒也古人用藥為下焦如瀆又曰在下者引而竭之多為大便秘澀以大黃推去之其津血益不足以當歸和血及油潤之劑大便自然軟利矣宜作剉湯以

與之是下焦有熱以急治之之法也以地榆惡人而壞胃故宿食消盡空心作丸服之

秦艽白朮丸

治痔疾并痔漏有膿血大便燥硬而作疼痛不可忍

秦艽去芦 桃仁湯浸去皮尖 皂角仁燒存性已上各一兩

當歸稍酒浸 澤瀉 枳實麩炒黃

白朮已上各五錢 地榆三錢

右為細末和桃仁泥研勻煎熟湯打麪糊為丸如雞頭仁大令藥光滑焙乾每服五七十丸白湯下空心服少時以美膳壓之忌生冷硬物冷水冷菜之類并濕麪酒及辣辛熱大料物之類犯之則藥無驗也

秦艽蒼朮湯

治痔疾若破謂之痔漏大便秘澀必作大痛此由風熱乘食飽不通氣逼大腸而作也受病者燥氣也為病者胃濕也胃刑大腸則化燥火以乘燥熱之實勝風附熱而來是濕熱風燥四氣而合故大腸頭成塊者濕也作大痛者風也若大便燥結者

主病兼受火邪熱結不通也去此四者其西方肺主諸氣其體收下亦助病為邪須當破氣藥兼之治法全矣以剉湯與之其效如神

秦艽去芦 桃仁湯浸去皮另研 皂角仁燒存性另研各一錢

蒼朮制 防風已上各七分 黃蘗去皮酒洗五分

當歸稍酒洗 澤瀉已上各三分 梹榔一分另研

大黃少許雖大便過澀亦不可多用

右除梹榔桃仁皂角仁三味外餘藥㕮咀如麻豆

大都作一服水三盞煎至一盞二分去粗入檳榔等三味末再上火煎至一盞空心熱服待少時以美膳壓之不犯胃氣也服藥日忌生冷硬物及酒濕麪大料物乾薑之類犯之則其藥無効

如有白膿加白葵花頭五朶去萼心青皮半錢不去白入正藥中同煎木香三分爲細末同檳榔等三味依前煎服餌古人治此疾多以歲月除之此藥一服則愈

七聖丸

治大腸疼痛不可忍叔和云積氣生於脾臟傍大腸疼痛陣難當漸交稍瀉三焦火莫謾多方立紀綱

羌活 一兩　郁李仁 湯泡去皮另研一兩五錢　大黃 八錢煨

檳榔　桂 去皮　木香

川芎 已上各五錢

右除郁李仁另研入外共爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三五十丸白湯下食前取大便微利一服而愈切禁不得多利大便其痛滋甚

秦艽防風湯

治痔漏每日大便時發疼痛如無疼痛者非痔漏也此藥主之

秦艽　防風　當歸身

白朮 已上各一錢五分　炙甘草　澤瀉 已上各六分

黃蘗 五分　大黃 煨　橘皮 已上各三分

柴胡　升麻 已上各二分　桃仁 三十個

紅花

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱空心服之避風寒忌房事酒濕麪大辛熱物

秦艽羌活湯

治痔漏成塊下垂不任其癢

羌活 一錢二分　秦艽　黃芪 已上各一錢

防風 七分　升麻　炙甘草

麻黃　柴胡 已上各五分　藁本 三分

細辛 少許　紅花 少許

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗空心服之忌風寒處大小便

當歸郁李仁湯

治痔漏大便硬努出大腸頭下血苦痛不能忍

郁李仁　皂角仁已上各一錢　枳實七分

秦艽　麻仁　當歸稍

生地黃　蒼朮已上各五分　大黃煨

澤瀉已上各三分

右剉如麻豆大除皂角仁別爲末水三盞煎至一盞去租入皂角仁末調空心食前服之忌如前

紅花桃仁湯

治痔漏經年因而飽食筋脉橫解腸澼爲痔治法當補北方瀉中央

黃蘗一錢五分　生地黃一錢　澤瀉三分

蒼朮六分　當歸稍　漢防已

防風稍　猪苓已上各五分　麻黃二分

紅花半分　桃仁十箇

右剉如麻豆大水三盞煎至一盞去租稍熱食前服之忌如前

秦艽當歸湯

治痔漏大便結燥疼痛

大黃煨四錢　秦艽　枳實已上各一錢

澤瀉　當歸稍　皂角仁

白朮已上各五分　紅花少許　桃仁二十箇

右都作一服水三盞煎至一盞去租食前熱服忌如前

陰痿陰汗門

陰痿陰汗及臊臭論

一富者前陰臊臭又因連日飲酒腹中不和求先師

治之曰夫前陰者足厥陰肝之脉絡循陰器出其挺末凡臭者心之所主散入五方爲五臭入肝爲臊此其一也當於肝經中瀉行間是治其本後於心經中瀉少衝乃治其標如惡針當用藥除之酒者氣味俱陽能生裏之濕熱是風濕熱合於下焦爲邪故經云下焦如瀆又云在下者引而竭之酒是濕熱之水亦宜決前陰以去之

龍膽瀉肝湯

治陰部時復熱痒及臊臭

柴胡稍　澤瀉已上各一錢　車前子
木通已上各五分　生地黄　當歸稍
草龍膽已上各三分
右剉如麻豆大，都作一服，水三盞，煎至一盞，去租，
空心稍熱服，便以美膳壓之。此藥柴胡入肝爲引，
用澤瀉車前子木通淡滲之味，利小便，亦除臊氣，
是名在下者引而竭之。生地黄草龍膽之苦寒，瀉
酒濕熱，更兼車前子之類，以撤肝中邪氣。肝主血，
用當歸以滋肝中血不足也。

清震湯
治小便溺黄，臊臭淋瀝，兩丸如冰，陰汗浸多。
羌活　酒黄檗已上各一錢　升麻
柴胡　蒼朮　黄芩已上各五分
澤瀉四分　麻黄根　猪苓
防風已上各三分　炙甘草　當歸身
藁本已上各二分　紅花一分
右剉如麻豆大，都作一服，水二盞，煎至一盞，去租，
臨臥服。大忌酒濕麪。

固真湯一名正元湯
治兩丸冷，前陰痿弱，陰汗如水，小便後有餘滴，尻
臀并前陰冷，惡寒而喜熱，膝下亦冷。
升麻　羌活　柴胡已上各一錢
炙甘草　草龍膽　澤瀉已上各一錢五分
黄檗　知母已上各二錢
右剉如麻豆大，分作二服，水二盞，煎至一盞，去租，
空心稍熱服，以早飯壓之。
清魂湯一名柴胡勝濕湯
治兩外腎冷，兩髀陰汗，前陰痿，陰囊濕痒，臊氣。

柴胡　生甘草　酒黄檗已上各二錢
升麻　澤瀉已上各一錢五分　當歸稍
羌活　麻黄根　漢防已
草龍膽　茯苓已上各一錢　紅花少許
五味子二十個
右剉如麻豆大，分作二服，水二盞，煎至一盞，去租，
食前稍熱服。忌酒濕麪房事。
椒粉散

治前陰兩丸濕痒痛秋冬甚夏月減

肉桂二分　小椒　當歸梢

猪苓已上各三分　蛇床子　黒狗脊已上各五分

麻黄根一錢　輕粉少許　紅花少許

斑猫二枚

右爲末乾糝上避風寒冷濕處坐臥

補肝湯

治前陰水冷并陰汗兩脚痿弱無力

黄芪七分　炙甘草五分　升麻

猪苓已上各四分　白茯苓　葛根

人參已上各三分　柴胡　羌活

陳皮　連翹　當歸身

黄蘗炒　澤瀉　蒼术

麯末　知母　防風已上各二分

右剉如麻豆大都作一服水大二盞煎至一盞去柤空心稍熱服忌酒濕麪

温腎湯

治面色痿黄身黄脚痿弱無力陰汗

柴胡　麻黄根已上各六分　白茯苓

白术　酒黄蘗　猪苓

升麻已上各一錢　蒼术　防風已上各一錢五分

澤瀉二錢

右分作二服每服水二大盞煎至一盞去柤食前稍熱服一時辰許方食

延胡丁香丸一名丁香疝氣丸

治臍下撮急疼痛并周身皆急痛小便頻數及五脉急獨腎脉按之不急皆虚無力名曰腎疝

羌活三錢　當歸　茴香已上各二錢

延胡索　麻黄根節　肉桂已上各一錢

丁香　木香　甘草

川烏頭已上各五分　防已三分　蝎十三箇

右爲細末酒煮麪糊爲丸如雞頭大每服五十丸空心鹽白湯服

瀉痢門

訶子皮散

癸卯冬白樞判家一老仆面塵脱色神氣特弱病

脫肛日久服藥未驗復下赤白膿痢作裹急後重白多赤少不任其苦以求其治曰此非肉食膏粱必多蔬食或飲食不節天氣雖寒衣蓋猶薄不禁而腸頭脫下者寒也眞氣不禁形質不收乃血滑脫也此乃寒滑氣泄不固故形質下脫也當以澀去其脫而除其滑微酸之味固氣上收以大熱之劑而除寒補陽以補氣之藥升陽益氣

御米殼去蒂萼蜜炒　橘皮已上各五分　乾薑炮六分

訶子七分煨去核

右爲細末都作一服水二盞煎至一盞和柤空心熱服

升麻補胃湯

治宿有陽明血證因五月間大熱喫杏腸澼下血唧遠散漫如篩腰沉沉然腹中不痛血色紫黑病名濕毒腸澼屬陽明少陽經血證也

白芍藥一錢五分　升麻　羌活

黃芪已上各一錢　生地黃　熟地黃

獨活　牡丹皮　炙甘草

柴胡　防風已上各五分　當歸身

葛根已上各三分　肉桂少許

右剉如麻豆大分作二服每服水二盞煎至一盞去柤食前稍熱服

升陽去熱和血湯

治腸澼下血另作一派其血唧出有力而遠射四散如篩春中血下行腹中大作痛乃陽明氣衝熱毒所作也當升陽去濕熱和血脈是其治也

橘皮二分　熟地黃　當歸身

蒼朮　秦艽　肉桂已上各三分

生地黃　牡丹皮　生甘草已上各五分

升麻七分　熟甘草　黃芪已上各一錢

白芍藥一錢五分

右㕮咀都作一服水四盞煎至一盞去柤空心稍熱服立效

益智和中湯

治腸澼下血或血色紫黑腹中痛腹皮惡寒右手關脉弦按之無力而喜熱物熨之內寒明矣

肉桂一分　桂枝四分　牡丹皮
柴胡　葛根　益智仁
半夏已上各五分　當歸身　炙甘草
黄芪　升麻已上各一錢　白芍藥一錢五分
乾薑少許
右爲麄末，都作一服，水三盞，煎至一盞，去柤，食後
温服。

芍藥蘗皮丸

治濕熱惡痢，血痢頻併，窘痛，無問膿血，並皆治之。

芍藥　黄蘗已上各一兩　當歸
黄連已上各五錢
右爲末，飯爲丸，如雞頭大，每服五七十丸，食前米
飲湯下。忌油膩酒濕麪等物。

和中益胃湯

治太陰陽明腹痛，大便常泄，若不泄，即秘而難見，
在後傳作濕熱毒，下鮮紅血，腹中微痛，脇下急縮，
脉緩而洪弦，中之下得之，按之空虚。
蘇木一分　藁本　益智仁已上各二分

熟地黄　炙甘草已上各三分　當歸身四分
柴胡　升麻已上各五分
右㕮咀，都作一服，水二盞，煎至一盞，去柤，空心温
服。

槐花散

治腸澼下血，濕毒下血。
川芎四分　槐花　陳皮
荆芥穗　熟地黄　白术已上各六分
當歸身　升麻已上各一錢
右爲細末，每服二錢，米飲湯調下，食前。忌酒濕麪

生冷硬物。

茯苓湯

治因傷冷飯水泄，一夜走十行，變作白痢，次日其
痢赤白，腹中㽲痛，減食熱躁，四肢沉困無力。
生黄芩三分　當歸身四分　肉桂
炙甘草已上各五分　猪苓　茯苓已上各六分
澤瀉一錢　芍藥一錢五分　蒼术
生薑　升麻　柴胡已上各二錢

右㕮咀如麻豆大分作二服每服水二盞煎至一盞去租稍熱食前服之

黄芪補胃湯

治一日大便三四次溏而不多有時便泄腹中鳴小便黄

黄芪　柴胡　當歸身

益智　橘皮已上各三分　升麻六分

炙甘草二錢　紅花少許

右㕮咀都作一服水二盞煎至一盞去租稍熱食前服之

升陽除濕湯

自下而上者引而去之

蒼朮一錢　柴胡　羌活

防風　升麻　神麴

澤瀉　猪苓已上各五分　炙甘草

陳皮　麥蘖麵已上各三分

右都作一服水二盞煎至一盞去租空心服之

如胃寒腸鳴加益智仁半夏各五分　生薑三片棗二枚同煎非腸鳴不得用

人參益胃湯

治頭悶勞動則微痛不喜飲食四肢怠惰躁熱短氣口不知味腹鳴大便微溏身體昏悶覺渴不喜冷物

黄芪　甘草　當歸稍

益智已上各二分　人參　黄芩

柴胡　半夏　白朮已上各三分

陳皮　升麻已上各五分　蒼朮一錢

紅花少許

右都作一服水二盞煎至一盞去租稍熱食前服之

升麻補胃湯

治因內傷服牽牛地黄食藥泄瀉過多腹中大痛

甘草七分　升麻　柴胡

草豆蔻　黄芪已上各五分　半夏三分

當歸身　乾薑已上各二分　紅花少許

右都作一服水二盞煎至一盞去租稍熱食遠服

之

瘡瘍門

散腫潰堅湯

治馬刀瘡結硬如石或在耳下至缺盆中或肩上或於脇下皆手足少陽經中及瘰癧遍於頦或至頰車堅而不潰在足陽明經中所出或二證瘡已破流膿水並皆治之

黄芩八錢酒洗炒半生用一半　草龍膽酒洗各炒四遍

瓜蔞根剉細酒洗　黄蘗酒製　酒知母

桔梗　昆布已上各五錢　柴胡四錢

炙甘草　京三稜酒洗　廣茂酒洗炒

連翹已上各三錢　葛根　白芍藥

當歸稍　黄連已上各二錢　升麻六分

右㕮咀每服六錢水二盞零八分先浸多半日煎至一盞去租食後熱服於臥處伸足在高處頭低垂每含一口作十次嚥服畢依常安臥取藥在膈上停畜故也另攅半料作細末煉蜜爲丸如菉豆大每服百餘丸用此藥湯留一口送下或加海藻

五錢炒亦妙

升陽調經湯

治瘰癧遶頸或至頰車此皆出足陽明胃經中來若瘡深遠隱曲肉底是足少陰腎經中來乃戊脾傳於癸腎是夫傳與妻俱作塊子堅硬大小不等並皆治之或作丸亦可

升麻八錢　葛根　草龍膽酒製

黄芩酒製　廣茂酒洗炒　京三稜酒洗炒

炙甘草　黄連酒洗　連翹

桔梗已上各五錢　生黄芩四錢　當歸稍

芍藥已上各三錢　黄蘗二錢酒炒　知母酒洗炒一兩

右另秤一半作末煉蜜爲丸如菉豆大每服百餘丸一半作㕮咀每服五錢若能食大便硬可旋加至七八錢水二盞先浸半日煎至一盞去租臨臥熱服足高去枕仰臥噙一口作十次嚥之留一口在後送下丸藥服畢其臥如常

連翹散堅湯

治耳下或至缺盆或肩上生瘡堅硬如石動之無

根名曰馬刀，從手足少陽經中來也。或生兩脇，或
已流膿，作瘡未破，並皆治之。
柴胡一兩二錢　草龍膽酒洗四次　土瓜根酒製，已上各一兩
黃芩酒炒三次，七錢　當歸稍　生黃芩
廣茂　京三稜同廣茂，酒炒　連翹
芍藥已上各五錢　炙甘草三錢　黃連酒炒二次
蒼朮已上各二錢
右另秤一半為細末，煉蜜為丸，如菉豆大，每服百
餘丸，一半㕮咀，每服五錢，水二盞，先浸多半日，煎

至一盞，去柤，臨臥熱服，去枕仰臥，每口作十次嚥
之，留一口送下丸藥，服畢臥如常，更以後藥塗之。
龍泉散
龍泉粉炒　瓦粉　廣茂
京三稜酒洗炒　昆布已上各五錢
右同為細末，煎熟水調塗之，用此藥去疾尤速。
救苦化堅湯
治瘰癧馬刀，挾癭，從耳下或耳後下頸至肩上，或
入缺盆中，乃手足少陽之經，分其瘰癧在頦下，或

至頰車，乃足陽明之經，分受心脾之邪，而作也。今
將二證合而治之。
黃芪一錢
護皮毛間腠理虛，及活血脈，生血，亦瘡家聖
藥也。又能補表，實元氣之弱也。
人參三分
補肺氣之藥也。如氣短不調，及喘者加之。
炙甘草五分
能調中，和諸藥，瀉火，益胃氣，亦能去瘡邪。

真漏蘆　升麻已上各一錢　葛根五分
此三味俱足陽明本經藥也。
連翹一錢
此一味十二經瘡中之藥，不可無也。能散諸
血結氣聚，此瘡家之神藥也。
牡丹皮三分
去腸胃中留滯宿血。
當歸身　生地黃　熟地黃已上各二分
此三味諸經中和血，生血，凉血藥也。

白芍藥 三分

如夏月倍之，其味酸，其氣寒，能補中，益肺之虛弱，治腹中痛，必用之，冬寒則不可用。

肉桂 二分

大辛熱，能散結積，陰證瘡瘍，須當少用之，此寒因熱用之意，又爲寒陰覆蓋其瘡，用大辛熱，以消浮凍之氣，如有煩燥者，去之。

柴胡 八分

功同連翹，如瘡不在少陽經，則去之。

黍粘子 三分

無腫不用

羌活 一錢 獨活 防風 已上各五分

此三味，必關手足太陽證，脊痛項强，不可迴視，腰似折，項似拔者，是也。其防風一味，辛溫，若瘡在膈已上，雖無手足太陽經證，亦當用之，爲能散結，去上部風邪，病人身拘急者，風也。

昆布 二分

其味大鹹，若瘡堅硬結硬者，宜用，鹹能軟堅。

京三稜 煨二分 廣茂 煨三分

此二味，若瘡堅硬甚者用之，如不堅硬，勿用。

益智仁 二分

如唾多者，胃不和也，或病人吐沫吐食，胃上寒者，加之，無則去之。

大麥蘖麵 一錢

治腹中縮急，兼能消食，補胃。

神麴末 炒黃二分

爲食不消化故也。

黃連 去鬚三分

以治煩悶。

黃蘗 炒三分

如有熱或腿脚無力，加，如有燥煩欲去衣者，腎中伏火也，更宜加之，無此證勿用

厚朴 二錢二分薑製

如腹脹者，加之，無則勿用。

右爲細末，湯浸蒸餅，和丸，捻作餅子，日乾，搗如米

粒大每服三錢白湯下

如氣不順加橘皮甚者加木香少許量病人虛實臨時斟酌與之無令藥多妨其飲食此治之大法也

如止在陽明分為瘰癧者去柴胡黍粘子二味餘皆用之

如在少陽分為馬刀挾瘦者去獨活漏蘆升麻葛根更加瞿麥穗三分

如本人素氣弱其病勢來時氣盛而不短促者不可考其平素宜作氣盛而從病變之權也宜加黃芩黃連黃蘗知母防已之類視邪氣在上中下三處

假令在上焦加黃芩（一半酒洗一半生用）在中焦加黃連（一半酒洗一半生用）在下焦則加酒製黃蘗知母防已之類選而用之

如本人大便不通而滋其邪盛者加酒製大黃以利

如血燥而大便燥乾者加桃仁酒製大黃二味

如風結燥不行者加麻仁大黃

如風澀而大便不行加煨皂角仁大黃秦艽以利之

如脈澀覺身有氣澀而大便不通者加郁李仁大黃以除氣燥也

如陰寒之病為寒結閉而大便不通以局方中半硫丸或加煎附子乾薑冰冷與之大抵用藥之法不惟瘡瘍一說諸疾病量人素氣弱者當去苦寒之藥多加人參黃芪甘草之類瀉火而先補其元氣餘皆倣此

柴胡連翹湯

治男子婦人馬刀瘡

中桂（三分） 當歸稍（一錢五分） 黍粘子（二錢）

炙甘草 酒黃蘗 生地黃（已上各三錢）

柴胡 黃芩（炒） 酒知母

連翹（已上各五錢） 瞿麥穗（六錢）

右剉如麻豆大每服五錢水二大盞煎至一盞去租稍熱食後服之

黍粘子湯

治耳痛生瘡。

昆布　蘇木　生甘草

蒲黃　草龍膽已上各一分　黍粘子

連翹　生地黃　當歸稍

黃芩　炙甘草　黃連已上各二分

柴胡　黃芪已上各三分　桔梗三錢

桃仁三箇　紅花少許

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去租稍熱食後服忌寒藥利大便

淨液湯一名連翹防風湯

治皮膚痒腋下瘡背上瘡耳聾耳鳴

桂枝二分　連翹　生地黃

桔梗　升麻　甘草已上各五分

當歸稍七分　麻黃　草豆蔻仁

羌活　防風　柴胡

蒼朮已上各一錢　酒黃芩二錢　紅花少許

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去租食後熱服。

消腫湯

治馬刀瘡

黍粘子炒　黃連已上各五分　當歸稍

甘草已上各一錢　瓜蔞根　黃芪已上各一錢五分

生黃芩　柴胡已上各二錢　連翹三錢

紅花少許

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去租稍熱食後服忌酒濕麵

內托羌活散

治足太陽經中左右尺脉俱緊按之無力尻臀生癰堅硬腫痛大作

肉桂三分　連翹　炙甘草

蒼朮　橘皮已上各五分　當歸稍

防風　藁本已上各一錢　黃芪一錢五分

黃蘗酒製　羌活已上各二錢

右㕮咀都作一服水二盞酒一盞煎至一盞去租稍熱空心服以夾衣蓋癰上使藥力行罷去蓋之

衣。

升麻托裏湯

治婦人兩乳間出黑頭瘡，瘡頂陷下，作黑眼子，其脉弦洪，按之細小。

黄檗二分　肉桂三分　黍粘子五分

黄芪　炙甘草　當歸身已上各一錢

連翹　升麻　葛根已上各一錢五分

右㕮咀，都作一服，水一大盞，酒半盞，同煎至一盞，去租，稍熱食後服

內托黄芪湯

賈德茂，小男，於左大腿近膝股內出附骨癰，不辨肉色，漫腫，皮澤木硬，瘡勢甚大，其左脚乃肝之髀土也，更在足厥陰肝經之分，少侵足太陰脾經之分，其脉左三部細而弦，按之洪緩微有力，此藥主之。

生地黄二分　黄檗二分　肉桂三分

羌活五分　當歸梢二分半　土瓜根酒製

柴胡梢已上各一錢　連翹一錢三分　黄芪二錢

右㕮咀，都作一服，酒一盞，水二盞，煎至一盞，去租，空心熱服。

柴胡通經湯

治小兒項側有瘡，堅而不潰，名曰馬刀瘡。

柴胡　連翹　當歸梢

生甘草　黄芩　黍粘子

京三稜　桔梗已上各二分　黄連五分

紅花少許

右剉如麻豆大，都作一服，水二大盞，煎至一盞，去

租，稍熱食後服，忌苦藥泄大便。

白芷升麻湯

尹老家素貧寒，形志皆苦，於手陽明大腸經分出癰，幼小有癩疝，其臂外皆腫痛，在陽明，左右寸脉皆短，中得之俱弦，按之洪緩有力，此癰得自八風之變，以脉斷之，邪氣在表，其證大小便如故，飲食如常，腹中和，口知味，知不在裏也，不惡風寒，止熱燥，脉不浮，知不在表也，表裏既和，邪氣在經脉之中，內經云：凝於經絡爲瘡癰，其癰出身半已上，故

風從上受之故納是入風之變爲瘡者也故治其
寒邪調其經脉中血氣使無凝滯而已

炙甘草 一分　升麻　桔梗 已上各五分
白芷 七分　當歸梢　生地黄 已上各一錢
生黄芩 一錢五分　酒黄芩　連翹
黄芪 已上各二錢　中桂 少許　紅花 少許

右㕮咀分作二服酒水各一大盞半同煎至一盞去租稍熱臨卧服一服而愈

保生救苦散

治火燒或熱油烙及脫肌肉者

生寒水石　大黄 火煨　黄檗 油烙已上各等分

右爲細末用油調塗之或乾用此藥塗之其痛立止日完復永無破傷風之患

一上散

治諸般疥癬必效

雄黄 通明手可破者　黑狗脊　蛇床子 炒
熟硫黄 已上各五錢　寒水石 六錢　斑猫 十三箇去翅足毛研碎

右另研雄黄硫黄寒水石如粉次入斑猫和蛇床子黑狗脊爲細末同研勻先洗疥癬令湯透去痂油調手中擦熱以鼻中嗅三兩次擦上可一上即愈

如痛甚及腫滿高起者加寒水石一倍
如不苦癢只加黑狗脊
如微癢只加蛇床子
如瘡中有蟲加雄黄
如喜火炙湯浴者加硫黄

聖愈湯

治諸惡瘡血出多而心煩不安不得睡眠亡血故也以此藥主之

生地黄　熟地黄　川芎
人參 已上各三分　當歸身　黄芪 已上各五分

右㕮咀如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去租稍熱無時服

獨聖散

治湯潑火燒破瘡毒疼痛

生白礬

右爲細末芝麻油調搽瘡破處不拘時候

黄芪肉桂柴胡酒煎湯

治附骨癰堅硬漫腫不辨肉色行步作痛按之大痛

黄芪　當歸稍已上各二錢　柴胡一錢五分

黍粘子炒　連翹　肉桂已上各一錢

升麻七分　炙甘草　黄蘗已上各五分

右㕮咀好糯酒一大盞半水一大盞半同煎至一大盞去柤空心温服少時便以早飯壓之不致大熱上攻中上二焦也

蘭室秘藏卷之五　終

蘭室秘藏卷之六

元　鎮州　東垣李　杲明之　撰

明　吳郡　立之薛　己新甫　校

雜病門

安神丸

治心神煩亂怔忡兀兀欲吐胸中氣亂而熱有似懊憹之狀皆膈上血中伏火蒸蒸然不安宜用權衡法以鎮陰火之浮行以養上焦之元氣經云熱淫所勝治以甘寒以苦瀉之以黄連之苦寒去心

煩除濕熱爲君以甘草生地黄之甘寒瀉火補氣滋生陰血爲臣以當歸補血不足以硃砂納浮溜之火而安神明也

黄連一錢五分酒洗　硃砂一錢水飛　酒生地黄

酒當歸身　炙甘草已上各五分

右件除硃砂水飛外擣四味爲細末同和勻湯浸飩餅爲丸如黍米大每服十五丸津嚥下食後

硃砂安神丸

治心煩懊憹心亂怔忡上熱胸中氣亂心下痞悶

食入反出

硃砂四錢　黄連五錢　生甘艸二錢五分

右爲末湯浸蒸餅爲丸如黍米大每服十丸食後津唾嚥下

補氣湯

治皮膚間有麻木乃肝氣不行故也

白芍藥　橘皮不去白已上各一兩五錢　炙甘艸

黄芪已上各一兩　澤瀉五錢

右㕮咀每服一兩水二盞煎至一盞去查溫服

當歸補血湯

治婦人肌熱燥熱目赤面紅煩渴引飲晝夜不息其脉洪大而虛重按全無内經曰脉虛血虛脉實血實又云血虛發熱證象白虎惟脉不長實爲辨也若誤服白虎湯必死此病得之於肌困勞役

黄芪一兩　當歸身二錢酒製

右㕮咀都作一服水二盞煎至一盞去柤稍熱空心服

柴胡升麻湯

治男子婦人四肢發熱肌熱筋骨熱表熱如火燎以手捫之烙人夫熱四肢者屬脾土也熱伏地中此病多因血虛而得之又有胃虛過食冷物鬱遏陽氣於脾土之中此藥主之

升麻　葛根　獨活

羌活　白芍藥　人參已上各五錢

炙甘艸　柴胡已上各三錢　防風二錢五分

生甘艸一錢

右㕮咀每服五錢水二大盞煎至一盞去柤熱服

忌寒冷之物

火鬱湯

治五心煩熱是火鬱於地中四肢者脾土也心火下陷於脾土之中鬱而不得伸故經云火鬱則發之

升麻　葛根　柴胡

白芍藥已上各一兩　防風　甘艸已上各五錢

右㕮咀每服五錢水二大盞入連鬚葱白三寸煎至一盞去柤稍熱不拘時候服

小黃丸

化痰涎，和胃氣，除濕，治胸中不利。

黃芩一兩　半夏湯洗薑製　白术已上各五錢

陳皮　青皮去白　黃芪已上各三錢

澤瀉二錢　乾薑一錢五分

右爲末，湯浸蒸餅爲丸，如菉豆大，每服五十丸，食遠溫水下。

黃芩利膈丸

除胸中熱，利膈上痰。

生黃芩　炒黃芩已上各一兩　半夏

黃連　澤瀉已上各五錢　南星

枳殼　陳皮已上各三錢　白术二錢

白礬五分

右爲末，湯浸蒸餅爲丸，如梧桐子大，每服三五十丸，食遠溫水下，忌酒濕麪。

補益腎肝丸

治目中流火，視物昏花，耳聾耳鳴，困倦乏力，寢汗惡風，行步不正，兩足欹側，臥而多驚，脚膝無力，腰

以下消痩，

柴胡　羌活　生地黃

苦參炒　防己炒已上各五分　附子

肉桂已上各一錢　當歸身三錢

右爲細末，熟水爲丸，如雞頭仁大，每服五十丸，食前溫水下。

太陽經嚏藥

防風二分　羌活三分　紅豆二箇

右爲細末，鼻內㗜之

麻黃茱萸湯

治胸中痛，頭痛，食減少，咽嗌不利，右寸脉弦急，

麻黃　羌活已上各五分　吳茱萸

黃芪　升麻已上各三分　黃芩

當歸　黃檗　藁本已上各二分

川芎　蔓荊子　柴胡

蒼术　黃連　半夏已上各一分

細辛少許　紅花少許

右剉如麻豆大，都作一服，水二盞，煎至一盞，去租

稍熱服食後

黃芪湯

治表虛惡風寒

黃芪五錢　甘草三錢　香白芷二錢五分

藁本　升麻已上各二錢　草豆蔻

橘皮已上各一錢五分　麻黃　當歸身已上各一錢

蓮花青皮七分　柴胡六分　黃檗少許

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去柤不拘時服

除濕補氣湯　一名清神補氣湯

治兩腿麻木沉重無力多汗喜笑口中涎下身重如山語聲不出右寸脉洪大

升麻六錢　蒼朮四錢　酒黃檗

柴胡　黃芪已上各三錢　酒知母

藁本　生甘艸　當歸已上各二錢

五味子　陳皮已上各一錢五分

右剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去柤空心服之待少時以早飯壓之

參歸湯

補氣血俱不足

黃芪七分　甘艸　生地黃已上各五分

柴胡　草豆蔻仁　升麻已上各四分

當歸身三分　熟地黃　人參已上各二分

益智仁少許　紅花少許

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去柤食遠服

升陽湯

治陽蹻痐疾足太陽經寒恐則氣下行宜升陽氣

炙甘草五錢　麻黃不去節　防風已上各八錢

羌活一兩五錢

右㕮咀每服五錢水三盞煎至二盞去柤稍熱空心服之

自汗門

自汗論

或問濕之與汗為陰乎為陽乎曰西南坤土也在人則為脾胃也人之汗猶天地之雨也陰滋其濕則為

霧露為雨也陰濕下行地之氣也汗多則亡陽陽去則陰勝也甚為寒中濕勝則音聲如從甕中出濕若中水也相法家有說土音如居深甕裏言其壅也遠也不出也以明其濕審矣又知此二者亦為陰寒也內經云氣虛則外寒雖見熱中蒸蒸為汗終傳大寒知始為熱中表虛亡陽不任外寒終傳寒中多成痺寒矣色以候天脉以候地形者乃候地之陰陽也故以脉氣候之皆有形無形之可見者也

調衛湯

治濕勝自汗補衛氣虛弱表虛不任風寒

黃芪　麻黃根已上各一錢　羌活七分
生甘草　當歸梢　生黃芩
半夏薑製已上各五分　麥門冬　生地黃已上各二分
猪苓二分　蘇木　紅花已上各一分
五味子七箇

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去柤稍熱服

中風證必自汗不得重發其汗

清燥湯

治六月七月間濕令大行子能令母實而熱旺濕熱相合必刑庚大腸寒涼以救之燥金受濕熱之邪絕寒水生化之源源絕則腎虧痿厥之病大作腰已下痿軟癱瘓不能動行步不正兩足欹側此藥主之

黃芪一錢五分　橘皮　白朮
澤瀉已上各五分　人參　白茯苓
升麻三分　炙甘草　麥門冬

當歸身　生地黃　神麯末
猪苓已上各二分　柴胡　酒黃檗
黃連　蒼朮已上各一分　五味子九箇

右剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去柤空心熱服

當歸六黃湯

治盜汗之聖藥也

當歸　生地黃　熟地黃
黃檗　黃芩　黃連已上各等分

黄芪倍加一

右為麄末每服五錢水二盞煎至一盞食前服小兒減半服之

紅豆散

治頭重如山此濕氣在頭也

麻黄根炒五錢　苦丁香五分　羗活炒

連翹炒已上各三分　紅豆十箇

右為細末鼻內㗜之

活血通經湯

靈壽縣董監軍癸卯冬大雪時因事到真定忽覺有風氣暴至診候得六脉俱弦甚按之洪實有力其證手攣急大便秘澁面赤熱此風寒始至加於身也四肢者脾也以風寒之邪傷之則搐急而攣痺乃風淫末疾而寒在外也內經曰寒則筋攣正謂此也本人素飲酒內有實熱乘於腸胃之間故大便秘澁而便赤熱內則手足陽明受邪外則足太陰脾經受風寒之邪用桂枝甘草以却其寒邪而緩其氣搐又以黄蘗之苦寒滑以瀉實而潤燥急救腎水用升麻葛根以升陽氣行手足陽明之經不令遏絶更以桂枝辛熱入手陽明之經為引用潤燥復以芍藥甘草專補脾氣使不受風寒之邪而退木邪專益肺金也加人參以補元氣為之輔佐加當歸身去裏急而和血潤燥此藥主之

芍藥五分　升麻　葛根

人參　當歸梢　炙甘草已上各一錢

酒黄蘗　桂枝已上各二錢

右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞熱

服不拘時令暖房中近火摩搓其手

瀉榮湯

治癘風滿面連頸極癢不任眉毛脫落先砭其處令惡氣消盡後服此藥

連翹　升麻已上各六分　桔梗五分

生黄芩　生地黄已上各四分　黄芪

蘇木　黄連　地龍

全蝎　當歸已上各三分　白豆蔻

人參已上各二分　甘草一分半　梧桐淚一分

麝香少許　桃仁三箇　䖟蟲去翅足炒三箇
水蛭三箇炒令烟盡
如斟如麻豆大除連翹梧桐淚白豆蔻另爲細末
麝香䖟蟲水蛭三味同爲細末都作一服水二盞
酒一盞入連翹煎至一盞去柤再入白豆蔻二味
并麝香等再煎至七分稍熱早飯後午前服之忌
酒濕麪生冷硬物

人參益氣湯

治兩手指麻木四肢困倦怠惰嗜臥乃熱傷元氣
也

黄芪八錢　生甘草　人參已上各五錢
白芍藥三錢　柴胡二錢五分　炙甘草
升麻已上各二錢　五味子一百四十箇
右㕮咀分作四服每服水二盞煎至一盞去柤稍
熱食遠服

導氣湯　闕

治兩腿麻木沉重
黄芪八錢　甘草六錢　青皮四錢

升麻　柴胡　當歸稍
澤瀉已上各二錢　橘皮一錢　紅花少許
五味子一百二十箇
右㕮咀分作四服每服水二大盞煎至一盞去柤
食前熱服

補中湯

治面黄汗多目赤四肢沉重减食腹中時時痛欬
嗽兩手寸脉短右手脉弦細兼澀關脉虚
升麻　柴胡　當歸已上各二分

神麴炒三分　澤瀉四分　大麥蘖麪
蒼术已上各五分　黄芪二錢五分　炙甘草八分
紅花少許　五味子二十箇
右㕮咀分作二服水二盞煎至一盞去柤食遠服

麻黄蒼术湯

治秋冬每夜五更嗽連聲不絶乃至天曉日高方
緩口苦兩脇下痛心下痞悶臥而多驚筋攣肢節
疼痛痰唾涎沫日晚神昏呵欠不進飲食
麻黄八錢　蒼术五錢　黄芪一錢五分

草豆蔻六分 柴胡 羌活已上各五分
生甘草 當歸稍 防風已上各四分
炙甘草 黄芩已上各三分 五味子九箇
右㕮咀分作二服水二盞煎至一盞稍熱臨卧服

上清湯

清利頭目寬快胸膈

人參 蔓荊子已上各五分 防風一錢
葛根一錢五分 黄芪三錢 甘草四錢
右㕮咀分作二服水二盞煎至一盞去租臨卧熱
服以夾衣蓋覆不語須臾汗出爲效

术桂湯 一名麻黄蒼术湯

治寒濕所客身體沉重胃脘痛面色痿黄

蒼术二錢 麻黄 炒神麯
橘皮 白茯苓 澤瀉已上各一錢
桂枝 半夏 草豆蔻仁
豬苓已上各五分 黄芪三分 炙甘草二分
杏仁十箇
右都作一服水二盞生薑五片煎至一盞去租食
前熱服

正氣湯

治盜汗

炒黄蘗 炒知母已上各一錢五分 炙甘草五分
右爲細末作一服水二盞煎至一盞食前温服

趂痛丸

治打撲閃損腰痛不可忍

白萵苣子一兩炒黄 乳香 沒藥已上各一錢
白粟米一抄炒黄 烏梅一箇

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸細嚼温
酒空心下

退熱湯

治表中虚熱或遇夜則甚

黄芪一錢 柴胡七分 生甘草
黄連酒製 黄芩 芍藥
地骨皮 生地黄去血熱 蒼术已上各五分
當歸身 升麻已上各三分
右㕮咀作一服水二盞煎至一盞去租食遠温服

如身體力困者加麥門冬五味子已上各五分人參甘草已上各一錢

解表升麻湯

治遍身壯熱骨節疼痛

升麻　羌活　蒼朮已上各一錢
防風八分　柴胡　甘草已上各七分
當歸　藁本已上各五分　橘皮三分

冬加麻黃不去節
春加麻黃去節

右㕮咀作一服水二盞煎至一盞去柤溫服後以葱醋湯發之得微汗爲效

天麻黃芪湯

治表有風證因連日醉飲其證復來右口角并眼頰有侧視及左手左脚腿麻木疼痛

天麻　芍藥　神麯炒
羌活肢節不痛去之　茯苓已上各三分　人參
黃連已上各四分　當歸五分　黃芪
甘草　升麻　葛根
黃蘗　蒼朮已上各六分　澤瀉七分
柴胡九分

右㕮咀作一服水三盞煎至一盞去柤食遠溫服

或加猪苓六分

健步丸

治膝中無力伸而不得屈屈而不能伸腰背腿脚沉重行步艱難

防巳酒洗一兩　羌活　柴胡
滑石炒　炙甘草　瓜蔞根酒洗已上各五錢

澤瀉　防風已上各三錢　苦參酒洗
川烏已上各一錢　肉桂五分

右爲細末酒糊爲丸如梧桐子大每服七十丸煎愈風湯下空心服

白朮除濕湯

治午後發熱背惡風四肢沉困小便或多或少黃色此藥又治汗後發熱

白朮一兩　生地黃炒　地骨皮
澤瀉　知母已上各七錢　赤茯苓

人參　炙甘草　柴胡已上各五錢

右為麄末每服五錢水二盞煎至一盞去柤食遠溫服

如小便快利減茯苓澤瀉一半

如有刺痛一料藥中加當歸身七錢酒洗

加味四君子湯

治久瘧熱多寒少不止

白朮　白茯苓　人參

甘草　柴胡　薄荷葉

黃芩已上各等分

右㕮咀每服五錢水二盞生薑三片棗二枚煎至一盞去柤不拘時候服

瀉血湯

治發熱晝少而夜多太陽經中尤甚晝病則在氣夜病則在血是足太陽膀胱血中浮熱微有氣也既病人大小便如常知邪氣不在藏府是無裏證也外無惡寒知邪氣不在表也有時而發有時而止知邪氣不在表不在裏知在經絡也夜發多而晝發少是邪氣下陷之深也此雜證當從熱入血室而論之

生地黃酒洗炒　熟地黃　蒲黃

丹參酒炒　當歸酒洗去土　漢防己酒洗炒

柴胡去芦　甘草梢炙　羌活已上各一兩

桃仁去皮三錢湯浸

右為麄末每服五錢水一盞半煎至一盞去柤空心溫服

洗面藥

治面有䵟黷或生瘡或生痤疿及粉刺之類并去皮膚燥癢去垢膩潤澤肌膚

皂角三斤去皮弦子另搗　好升麻八兩　楮實子五兩

白芨一兩細剉　甘松七錢　縮砂連皮

白丁香臘月收　三柰子已上各五分　菉豆八合揀淨另搗

糯米一升二合

右為細末用之如常

瑩肌如玉散

白丁香　白芨　白牽牛

白斂 已上各一兩　白芷 七錢　當歸稍

白蒺藜　升麻 已上各五錢　白茯苓

楮實子 已上各三錢　麻黃 去節二錢　白附子

連翹 已上各一錢五分　小椒 一錢

右爲細末用之如常

面油摩風膏

麻黃　升麻 去黑皮　防風 已上各二錢

羌活 去皮　當歸身　白芨

白檀 已上各一錢

右用小油半斤以銀器中熬綿包定前藥於油中熬之得所澄淨去柤入黃蠟一兩再熬之爲度

小兒門

治驚論

外物驚宜鎮心以黃連安神丸若氣動所驚宜寒水石安神丸大忌防風丸治風辛溫之藥必殺人何也辛散浮溫熱者火也能令母實助風之氣盛皆殺人也因驚而泄青色先鎮肝以硃砂之類勿用寒涼之氣大禁凉驚丸風木旺必克脾胃當先實其土後瀉其木闕孝忠編集錢氏方以益黃補土悞矣其藥有丁香辛熱助火火旺土愈虛矣青橘皮瀉肺金丁香辛熱大瀉肺與大腸脾實當瀉子今脾胃虛反更瀉子而助火重虛其土殺人無疑矣其風木旺證右關脉洪大掌中熱腹皮熱豈可以助火瀉金如寒水來乘脾土其病嘔吐腹痛瀉痢青白益黃散聖藥也今立一方先瀉火補金大補其土是爲神治之法

黃芪湯

黃芪 二錢　人參 一錢　炙甘草 五分

右㕮咀作一服水一大盞煎至半盞去柤食遠服

加白芍藥尤妙

此三味皆甘溫能補元氣甘能瀉火內經云熱淫于內以甘瀉之以酸收之白芍藥酸寒寒能瀉火酸味能瀉肝而大補肺金所補得金土之位大旺火虛風木何由而來克土然後瀉風之邪

夫益黃散理中丸養神丸之類皆治脾胃寒濕大盛神品之類也若得脾胃中伏熱火勞役不足之證及服熱藥巴豆之類胃虛而成慢驚之證用之

必傷人命。夫慢驚風者，皆由久瀉，脾胃虛而生，若錢氏以羌活膏療慢驚風，誤矣。脾虛者，由火邪乘其土位，故曰從後來者，為虛邪。火旺能實其木，木旺故來，尅土。當於心經中以甘溫補土之源，更於脾土中瀉火，以甘寒；更於脾土中補金，以酸涼，致脾土中金旺火衰，風木自虛矣。損食多進藥愈，前藥是也。

益黃散

治胃中風熱。

黃芪二錢　陳皮去白　人參已上各一錢

芍藥七分　生甘草　熟甘草已上各五分

黃連少許

右為細末，每服二錢，水一盞，煎至五分，食前服。

升陽益血湯

二月間，有一小兒未滿一百日，病腹脹，二日大便一度，瘦弱，身黃色，宜升陽氣，滋血益血，補血，利大便。

蠍梢二分　神麴末　升麻已上各三分

當歸　厚朴已上各一錢　桃仁十個

右都作一服，水一大盞，煎至半盞，去柤，食遠熱服。

厚腸丸

治小兒失乳，以食飼之，未有食腸，不能尅化，或生腹脹，四肢瘦弱，或痢色無常。

厚朴　青皮已上各二分　橘紅

半夏　蒼朮　人參已上各三分

枳實　麥糵麵　神麴末已上各五分

右為極細末，水煑麵糊為丸，如麻子大，每服二十丸，溫水送下，食前。忌飽食。

補陽湯

時初冬，一小兒二歲，大寒，證明堂青，脈額上青黑，腦後青絡高起，舌上白滑，喉鳴而喘，大便微青，耳尖冷，目中常常泪下，仍多眵，胸中不利，臥而多驚，無搐則寒。

黃蘗　橘皮　葛根

連翹　蠍梢　炙甘草已上各一分

升麻　黃芪　柴胡已上各二分

當歸身　麻黃已上各三分　吳茱萸
生地黃　地龍已上各五分
右㕮咀都作一服水一大盞半煎至六分去柤乳食後熱服服藥之後添喜笑精神出氣和順乳食旺

大蕪荑湯 一名梔子茯苓湯

治黃疸土色為熱為濕當小便不利今反利知黃色為燥胃經中大熱髮黃脫落知膀胱與腎俱受土邪乃大濕熱之證鼻下斷作瘡者上逆行營氣伏火也能乳者胃中有熱也寒則食不入喜食土者胃不足也面黑色者為寒為痺大便青寒褐色血黑色熱畜血中間黃色腸中有熱治法當滋營潤燥除寒熱致津液

防風　黃連已上各一分　黃檗
炙甘草　麻黃不去根節　羌活已上各二分
山梔子仁　柴胡　茯苓已上各三分
當歸四分　大蕪荑　白朮已上各五分
右剉如麻豆大都作一服用水一大盞半煎至六

分去柤食前稍熱服

塌氣退黃湯 一名茯苓滲濕湯

治小兒面色痿黃腹䐜脹食不能下

白朮　柴胡已上各半分　升麻一分
桂枝　麻黃　吳茱萸
厚朴　羌活　草豆蔻
神麴末　蒼朮　澤瀉
橘紅已上各二分　青皮　黃連已上各五分
白茯苓　豬苓　黃檗
杏仁二箇
右都作一服水二大盞煎至一盞去柤食前溫服

中滿分消丸

枳實　黃連去鬚　厚朴已上各五分
生薑　薑黃　豬苓已上各一錢
橘皮　甘草　白朮已上各一錢五分
砂仁　澤瀉　茯苓已上各三錢
半夏四錢　黃芩一兩二錢
右為細末湯浸蒸餅為丸如黍米大每服三五十

丸溫水下。

消痞丸

黄連五錢　黄芩二錢　厚朴七分

薑黄五分　乾生薑　人參已上各四分

甘草三分　枳實二分　橘皮一分

右為細末湯浸蒸餅為丸如黍米大每服三十丸隨乳下。

瘡疹論

夫瘡疹始出之證必先見面燥腮赤目胞亦赤呵欠煩悶乍涼乍熱欬嗽嚏噴足稍冷多睡驚並瘡疹之證或生膿胞或生小紅瘢或生癮疹此三等不同何故俱顯上證而後乃出蓋以上諸證皆太陽寒水起於右腎之下煎熬左腎足太陽膀胱寒水夾脊逆流上頭下額逆手太陽丙火不得傳導逆於面上故顯是證蓋壬癸寒水尅丙丁熱火故也諸瘡證皆從寒水逆流而作也醫者當知此理乃敢用藥夫胞者一名赤宮一名丹田一名命門主男子藏精施化婦人繫胞有孕俱為生化之源非五行也非水亦非火此

天地之異名也象坤土之生萬物也夫人之始生也血海始淨一日二日精勝其血則為男子三日四日五日血脉已旺精不勝血則為女子二物相搏長生先身謂之神又謂之精道釋二門言之本來面目是也其子在腹中十月之間隨母呼吸呼吸者陽氣也而生動作滋益精氣神飢則食母血渴則飲母血兒隨日長皮肉筋骨血脉形氣俱足十月降生口中尚有惡血啼聲一發隨吸而下此惡血復歸命門胞中僻於一隅伏而不發直至因內傷乳食濕熱之氣下流合於腎中二火交攻致榮氣不從逆於肉理惡血乃發諸瘡疹皆出於膀胱壬水其瘍後聚肉理歸於陽明故三番瘡始顯之證皆足太陽壬膀胱尅病小腸其始出皆見於面終歸於陽明肉理熱化為膿者也二火熾甚反勝寒水遍身俱出此皆出從足太陽傳變中來也當外發寒邪使令消散內瀉二火不令交攻其中令濕氣上歸復其本位可一二服立已仍令小兒以後再無二番瘡出之患此內經之法覽者詳之

消毒救苦散

治瘡證悉具消化便令不出如已出稀者再不生瘡

防風　羌活　麻黄根

升麻　生地黄　連翹（初出者減 出大者加）

酒黄蘗（已上各五分）　當歸身　黄連（已上各三分）

川芎　藁本　柴胡

葛根　酒黄芩　生黄芩

蒼朮（已上各二分）　細辛　生甘草

白朮　陳皮　蘇木

紅花（已上各一分）　吳茱萸（半分）

右剉如麻豆大每服五錢水二大盞煎至一盞去柤稍熱空心服

夫瘡疹出者皆因內傷必出瘡榮氣逆故也大禁牽牛巴豆食藥宜以半夏枳朮大黄益智仁之類去其青瀉止其吐若耳尖冷呵欠睡中驚嚏噴眼澀知必出瘡也諸大膿泡小水瘡疹癮三色皆榮氣逆而寒復其表宜於四味升麻湯中加當歸身連翹此定法也

如肺成膿瘡先欬喘或氣高而喘促加人參少加黄芩以瀉伏火而補元氣

如心出小紅瘡必先見嗌乾驚悸身熱肌肉腫脉弦洪少加黄連

如命門出癮疹必先骨疼身熱其疼痛不散動揺少加生地黄又加黄蘗諸瘡疹皆為陰證瘡須皆因內傷飲食脾胃不足榮氣逆行雖大熱內熾陰覆其外治法如前

辯小兒瘡證

呵欠　嚏噴　睡中發驚

或耳尖冷　眼澀

或辯復食

口熱　或口噴氣　亦辯不消

或腹中痛

如瘡證少具其瘡未發乃與升麻湯三五錢帶熱服之待身表溫和瘡疹已顯服藥乃止

如其身凉其瘡未出辯得是瘡證無問服數直候

身表温和及瘡瘡已顯然後乃止只時時與桔梗
湯寛胸膈利咽喉

桔梗湯

如瘡已出只時時與之快咽喉寛利胸膈

桔梗二錢　甘草一錢炙

右爲麄末每服三錢水一大盞煎至六分去柤大
温時時服之不可計服數

如見傷食證又見瘡證先與不犯大黄巴豆藥尅
化過再與升麻湯

如食重傷前藥不能過再與犯大黄巴豆藥過

如大便行當即便與升麻湯服之恐瘡子内陷已
後臨時作罪過

如瘡子已出稠密身表熱急與下項

黍粘子湯

如瘡子已出稠密身表熱急與此藥服之防後青
乾黑陷

黍粘子炒香　當歸身酒洗　炙甘草已上各一錢

柴胡　連翹　黄芪

黄芩已上各一錢五分　地骨皮已上各二錢

右同爲麄末每服二錢水一大盞煎至六分去柤
温服腹空服藥畢日休與乳食

麻黄柴胡升麻湯

治小兒寒鬱而喘喉鳴腹中鳴腹滿鼻流清涕脉
沉急而數

麻黄　草豆蔻仁　益智仁已上各一錢五分

吳茱萸　厚朴已上各二分　當歸稍

甘草　柴胡　生黄芩已上各一分

升麻　神麴　蘇木已上各半分

全蝎二個　紅花少許

右剉如麻豆大分作二服水一大盞煎至七分食
遠服忌寒微有汗則効

蘭室秘藏卷下終

普濟方一百六十八卷 存三十五卷（八至十十六至二十一 二十三至二十七 三十四至三十六 四十至四十三 一百二十四 一百三十二至一百三十四 一百四十九 一百五十四 一百五十八至一百六十五）

（一）

（明）朱橚撰

明鈔本

普濟方四百二十六卷（浙江范懋柱家天一閣藏本）

明周定王橚撰。橚有救荒本草，已著錄。是書取古今方劑，彙輯成編。橚自訂定，又命教授滕碩、長史劉醇等同考論之。李時珍本草綱目所附方，採於是書者至多。然時珍稱為周憲王，則以為橚子有燉所作，誤矣。元本一百六十八卷，明史藝文志作六十八卷，蓋脫一百二字也。凡一千九百六十論，二千一百七十五類，七百七十八法，六萬一千七百三十九方，二百三十九圖。採摭繁富，編次詳析，自古經方，無更賅備於是者。其書蒐羅務廣，頗不免重複牴牾。醫家病其雜糅，罕能卒業。又卷帙浩博，久無刊版，好事家轉相傳寫，舛謬滋多，故行於世者頗罕，善本尤稀。然宋元以來名醫著述，今散佚十之七八。橚當明之初造，舊籍多存。今以永樂大典所載諸祕方勘驗，是書往往多相出入。是古之專門祕術，實藉此以有傳。後人能參考其異同，而推求其正變，博收約取，應用不窮。是亦仰山而鑄銅，煮海而為鹽矣，又烏可以繁蕪病哉。

原缺

普濟方卷之□目錄

心虛 心臟風邪 心健忘 心勞
心實熱 心脾 怔忡驚悸 虛病

安心散 茯神丸 牽角正心湯
湯 人參湯 竹瀝湯 黃連散 鎮心丸

原缺

補心丸 養心丹 茯神丸 人參散
參香圓 心和散 鎮心大牛黃丸
乳香丸 降心丹 養氣鎮心丹 白朮酒
定神丸 四味補心丸 治心虛風邪精神恍惚健忘
潤心肺 清凿解心臟蘊熱 寧心志清神
治五臟邪氣戰殺者 五味砂法

心煩熱 [illegible]

茯苓湯 鐵粉丸 龍腦湯 涼心丸 遠志湯
麥門冬湯 黃耆湯 犀參湯 黑豆湯 地黃散
地骨皮湯 瀉心散 鎮心丹 治大熱心悶者
理心煩悶益氣力止渴 治心煩心中熱 治心煩去熱
治熱攻心煩躁恍惚 治解勞發汗通利關節 安神丸
金華散 大黃湯 治心臟積熱口臭 柴胡升麻湯
犀角湯 人參散 地黃散 涼膈湯 鐵粉丸

療煩悶 止心煩躁悶 止心悶煩熱
治心脾熱舌煩生瘡方 解煩悶 治心腹煩悶
主大毒熱心腹煩痛 止煩悶 兼利五臟
治胃中煩悶邪氣止渴 治散支節筋骨煩熱毒及消腫脹
治熱攻心煩躁恍惚

○心胃煩熱 論一首 方一十四方

羚羊角散 麥門冬散 真珠散 人參散 地骨皮散
含化玉液丸 黃芩散 甘露散 除胃膈熱痰
治胃中痞塞熱結者 止心中煩水
一方去心胃煩熱 治眼澀失度心中為煩
利膈却去五臟中煩悶氣 治胃中煩熱或夜心煩
除胃中客熱氣 解肌不飢去胃中煩熱

○心臟風熱 論一首 方一十一方

散 朱砂丸 犀角散 鐵粉散 升麻散
牛黃丸 牛黃散 氣針丸 治心熱口瘡
利五臟 去心臟風熱 涼心肺風熱毒熱悶并不得口瘡煩悶
下心肺五臟熱毒氣 療心熱 治殊導五臟風熱壅
去五臟風

○心熱多汗 論一首 方一十五方

羚羊角湯 地骨皮丸 麥門冬湯 七枝湯 犀角湯
石膏丸 麥門冬散 竹葉湖散 牡蠣散 小麥湯
瀉心湯 黃連散 熟乾地黃湯
治心悶汗出不識人 淡竹葉湯

○心中寒 論一首 方八方

桔梗散 赤石脂丸 八味丸 茯苓丸 大腹皮散

又茱萸丸 水蒼散 一分心臟中風法

○心健忘 論一首 方

菖蒲丸 檳榔丸 定志湯 烏頭丸 薯蕷丸
神仙丹 延齡煮散 茯神丸 二丹丸 人參丸
補心虛治健忘 菖蒲益智丸 八味散
補脾湯 人參湯 桂心湯 遠志散
養命開心益智方 加味茯苓湯 十聖丸
小定志丸 人參麥散 治多忘令人不忘方 又方
遠志散 山芋丸 龜甲散 治健忘方 茯神散
預知散 又方 治人心昏塞多忘喜誤
治好忘久服聰明益智 治人心昏塞多忘喜誤方
治人心昏悶多忘喜誤 治人心昏塞多忘喜誤
治好忘久服聰明益智 療人心孔昏塞多忘喜誤
方 續方靈海丸 排風湯 琥珀丸

丸 養心丹 遠志丸 真珠丸
鎮安魂魄珠當丸 安魂鎮神令人聰明

○怔忡驚悸 論一首 方八十七方

鎮心丸 大鎮心丸 神明補心丹 大鎮心散
鎮心熟乾地黃丸 牛黃丸 鎮心爽神湯
牛黃散 蔚黃散 遠志湯 菖蒲散 小鎮心散
法丹 鎮心丸 人參茯苓湯 大定心湯
鐵精丸 龍齒散 小鎮心散 紫石英散 心腎丸
大定心散 寒水丸 養心湯 遠志丸 益榮湯
龍齒丹 柏子人散 虎睛散 茯神散 茯神丸
虎睛丸 朴上白生散 寧志丸 補心湯
白茯苓散 何茯散 十味溫膽湯 冰煮散
小草散 龍骨飲 茯神散 八味丸 七寶丹
增減定志丸 茯苓飲子 牛黃膽星丸

黃耆散　茯神散　炙甘草湯　小定心湯　龍齒散
加味四七湯　化瘀丸　遠志丸　人參散
遠志丸　養木湯　遠志丸　酸棗人丸　荊瀝湯
茯苓甘草湯　遠志散　朱砂安神丸　安神丸
寒水石散　參乳丸　棗肉靈砂　治驚憂怖迫遂成驚恐
天地煎　治心臟風邪恍惚狂言意志不定　治心臟不安
治心下虛悸方　二丹丹
治心血驚悸不定氣疲　治卒驚悸九竅血皆溢出
人方　治膽虛睡臥不安心多驚悸　鎮心
秘傳酸棗仁湯　寧心丹　青牛道士封君達傳施山人治驚悸
朱附丹　生火歸失心　大驚失心恍惚不識人并下脉
治驚悸心忪頭疼明目　半夏麻黃丸

○心狂　論　方

鎮心丸　朱砂散　鎮心丸　犀角丸
散　茯神散　真珠散　治癲狂者　龍齒丸
朱砂丸　升麻湯　玄參湯　丹砂丸　牛黃丸
治心恙方　藥珠丸　朱雀丸　一醉散　丁香散
治驚勞失志方　遠志丸　茯神散　治心風
第二方　治失心方　寧志膏　治失心方
辛金丸　長砂丸　下品湯　金箔丸　清心散
排風湯　鉛丹散　靈丹　治狂邪發作　陳砂丹

○心勞　論　方

鎮肝丸　遠志散　菊花湯　人參湯　苦參丸
王不留行湯　犀角散　木香湯　人參散
麻黃湯　竹瀝湯　麥門冬丸　遠志湯　茯苓丸
前胡麥門冬散　人參散　茯神散　磁石散
泄熱湯　黃芩湯　遠志飲子　磁石湯　赤茯苓丸
石膏飲子　人參湯　麥門冬飲　小定心湯　地黃湯

麥門冬湯　大黃泄熱湯　[illegible]散　治心實勞熱
[illegible]散

○[illegible]病　論　方

肉蓯蓉丸　牛髓丸　五味子丸　建中湯　茯苓鍾乳丸

○脉極　論　方

生地黃煎　麻黃湯　人參散　半夏湯　補虛丸
鎮心丸　石膏散　地黃湯　麥門冬湯　防風丸
茯苓湯　升麻湯　人參散　茯苓散　茯神湯
柏葉木[illegible]丸　治脉極虛寒鬢髮墮落方
桑白皮沐頭方

普濟方卷之八目錄

普濟方卷之八

心臟門

夫心者火也[illegible]之本也[illegible]夏王七十二日位任物[illegible]心也[illegible]所以任物謂之心[illegible]心之[illegible]當五味矣心在竅為[illegible]也其通[illegible]上[illegible]口和[illegible]榮華於[illegible]外[illegible]十三合神名呴呴主藏[illegible]在氣為[illegible]在液為汗心氣虛[illegible]得其時則夢燔[illegible]心[illegible]人凡心臟象火與小腸合為腑其經手少陰與太陽為表裏其脉洪相於春王於夏夏時

[illegible]洪心脉[illegible]皆下垂如鉤故名曰鉤心脉洪大而長洪則衛氣[illegible]實則氣鬱從出大則榮氣萌萌洪相搏可以發汗故名曰長長洪相得則引水漿溉灌經絡津液皮膚太陽洪大皆是母軀幸得戊己用字根株枝葉氣上出于見外班五內乾枯肥中空虛當反下之此為重虛脉浮有表無裏陽無所使不但危身并中其母○夏脉如鉤夏脉心也南方火也萬物之所以盛長也故其氣來盛去衰故曰鉤反此者病何如而反其氣來盛去亦盛此謂太過病在外其來不盛去反盛此謂不及病在內太過則令人身熱而膚痛為浸淫不及則令人煩心上見欬唾下為氣泄○心脉來累累如連珠如循琅玕曰平夏以胃氣為本心脉來喘喘連屬其中微曲曰心病心脉來前曲後居如操帶鉤曰心死○真心脉至堅而搏如循薏苡子累累然赤黑不澤毛折乃死○夏胃微鉤曰平鉤多胃少曰心病但鉤無胃曰死胃而有石曰冬病石甚曰今病○心藏脉脉舍神怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破䐃脫肉毛悴色夭死于冬○手少陰氣絕則脉不通少陰者心脉也心者脉之合也脉不通則血不流血不流則色不澤而黑如漆柴者血先死壬

其脉外不勝火也○心死藏浮之實如豆麻擊手按之益躁疾者死○夏心火王其脉洪大而散○平○反得弦細而長者是肝之乘心母之歸子為虛邪雖病易治反得大而緩者是脾之乘心子之乘母為實邪雖病自愈反得沉濡而滑者是腎之乘心水之剋火為賊邪大逆十死不治反得微濇而短者是肺之乘心金之陵火為微邪雖病即瘥腎乘心必癃○左手關前寸口陰絕者無心脉也苦心下熱痛掌中熱時時善嘔口中傷爛刺手少陽治陽○左手關前寸口陰實者心實也苦心下有水氣憂恚發之刺手心主治陰○心脉來累累如貫珠滑利再至曰平三至曰離經病四至脫精五至死六至命盡手少陰脉也○心脉急甚為瘈瘲微急為心痛引背食不下緩甚為狂笑微緩為伏梁在心下上下行有時唾血大甚為喉吤微大為心痺引背善淚出小甚為善噦微小為消癉滑甚為善渴微滑為心疝引臍小腹鳴濇甚為瘖微濇為血溢維厥耳鳴癲疾○心脉搏堅而長當病舌卷不能言其耎而散者當病自已○赤脉之至也喘而堅診曰有積氣在中時害於食名

[illegible]得之外疾思慮而心虛故邪從之扁鵲曰心有病則口生瘡爛○心在聲為笑在變動為憂在志為喜喜傷心精氣并於心則喜心虛則悲悲則憂實則笑笑則喜○時主夏病者時間時甚知其源取其輸脫其俞當其穀○病先發於心者心痛一日之肺喘欬三日之肝脇痛支滿五日之脾閉塞不通身痛體重三日不已死冬夜半夏日中○病在心日中慧夜半甚平旦靜○假令心病北行若食豚魚得之不者當以冬時發得病以壬癸日也○凡心病之狀胸中痛脇支滿兩脇下痛膺背肩甲間痛兩臂內痛虛則胸腹大腰下與腰背相引而痛取其經手少陰太陽舌下血者其變病刺郄中血者○心脉沉之小而緊浮之不喘苦心下聚氣而痛食不下喜咽唾時手足熱煩滿時忘不樂喜太息得之憂思○心病其色赤心痛短氣手掌煩熱或啼笑罵詈悲思愁慮面赤身熱其脉實大而數此為可治宜服[illegible]春當刺中衝夏刺勞宮季夏刺大陵皆補之秋刺間使冬刺曲澤皆瀉之[illegible]又當灸巨闕五十壯背第五椎百壯○邪在心則病心痛喜悲時眩仆視有

餘不足何以其間○愁憂思慮則傷心心傷則苦驚喜忘善怒
心中風者翕翕發熱不能起心中飢食則嘔○心中寒者
其人病心如啖蒜齏狀劇者心痛徹背背痛徹心如蠱注其脈浮
者自吐乃愈○心傷者其人勞倦頭面赤而下重心中痛徹背自煩發
熱當臍跳手其脈弦此為心臟傷所致也○心水者其人身重而
少氣不得臥煩而躁其陰大腫○真心痛手足青至節心痛甚者
旦發夕死夕發旦死○心脹者煩心短氣臥不安○凡心脈急名
曰心疝少腹當有形其以心為牡藏小腸為之使故小腹當有形
○診得心積沉而芤時上下無常處病胸滿悸腹中熱面赤咽乾
心煩掌中熱甚則唾血身瘛瘲主血厥夏差冬劇色赤也○心病
煩心小氣大熱熱上衝心喉乾吐逆往頭汗出如珠身體厥冷其
脈當浮今反沉濡而滑其色當赤而反黑者此是水之剋火為大
逆十死不治○徵音人者主心聲也心聲笑其音竽其志喜其經
手少陰厥逆太陽則榮衛不通陰陽反錯陽氣外擊陰氣內傷
[illegible]則驚掣心悸定心湯主之語聲前寬後急後聲不

出後濁口喎冒昧好自笑此為厲風入心荊瀝湯主之心風
寒半身不遂背節緩弱不收便利無度口面喎邪薑附湯
主之此病不盈旬日宜急治之又笑而呻呻而反憂此為水剋火
陰擊陽陰起而陽伏伏則實實則傷熱熱則狂閉亂冒昧言多謬
誤不可採聽此心已傷若其人口脣正赤可療其青黃白黑不可療
也○赤為心心合脈赤如雞冠者吉心主舌舌是心之官其人火
形相比於上徵赤色廣䏴兌面小頭好肩背髀腹小手足行安地疾
心行搖肩背肉滿有氣輕財少信多慮見事明好顏急心不壽暴
死耐春夏不耐秋冬秋冬感而生病主手少陰核核然髑骬長短
傾正則心應之正赤色小理者則心小小則邪弗能傷易傷以憂
粗理者則心大大則虛虛則寒寒則憂不能傷易傷於邪無髑骬
者心高高則滿於肺中悶而善忘難開以言髑骬
骬小短舉者則心下下則藏外易傷於寒易恐以言髑骬長者
心下堅堅則藏安守固髑骬弱以薄者則心脆脆則善病消癉熱中
髑骬直下不舉者則心端正端正則和利難傷髑骬倚一方者則

心偏傾偏傾則操持不一無守司也[illegible]
[illegible]
○凡人部分陷起者必有病生小腸太陽為
心之府其處陷起即病生矣藏含內外部亦內外沉濁為內浮清
居外若外病內入小腹滿起內病外出所部陷起外入內病從陽
從陰愈內出外則從陰陽則實熱陰則虛寒在陽主外在
陰主內凡人死生休咎則藏神前變形於外人心前病則口為之閉
舌捲心[illegible]不轉若天中等分墓色應之必死不治
有[illegible]則可出四一日以從出不勝旬月之間心病
少愈若[illegible]何以知之以赤黑色應如此若見顏黑變年上此必
死心之地日死何以知之兩目以耳從白色死凡面赤目白
憂恚思慮心氣內索面色反好急求醫治不過十日死又面黃目
赤不死赤如衃血死吉凶之兆也若在於寸部脈而見赤黑入口此
亡死不出其年名曰行尸若年上無應三年之中病必死矣○夏
脈色赤主手太陽也夏取盛經分腠是者大始治心氣始長

氣弱陽氣留溢熱熏分腠內至於經故取盛經分腠絕膚而
病去者邪居淺也所謂盛經者陽脈也其脈本在外踝之後走在
命門之上一寸命門者在心上一寸也脈根在少澤在手小指
端○手少陰之經獨無俞何也曰少陰者心脈也心者五藏六腑
之大主也為帝王精神之所舍其藏堅固邪不能容容之則傷心
心傷則神去神去則身死矣故諸邪在於心者皆在心之包絡包絡
者心主之脈也故少陰無俞也少陰無俞心不病乎曰其外經病
而藏不病故獨取其經於掌後銳骨之端也○夏三月主心小腸赤
脈攢病也其源從少陰太陽之氣相搏而停則榮衛不通皮肉痛
起太陽動發少陰淫邪之氣因而作則藏腑隨時受夏疫病也其
病相反者則心病也從所不勝其病損從所不勝藏實則為陽
毒所侵陰陽為病治之以陰為本治陰陽調和則藏腑疾有云發背
肝心[illegible]治[illegible]
不生矣○若不作治必如其言治之者其論凡脈虛實之應主
手心小腸其所有脈熱生則應其時應腑也

心實

夫心實者，左手寸口人迎以前脈陰實者，手少陰經也。病苦悶，大便不利，腹滿，四肢重，身熱，名曰心實熱也。○心實則生熱，熱則心神煩亂，面赤身熱，口舌生瘡，咽燥頭痛，喜笑恐悸，手心煩熱，汗出衄血，其脈洪實者，是其候也。○心與小腸俱實，左手寸口人迎以前脈陰陽俱實者，手少陰與巨陽經俱實也。病苦頭痛身熱，大便難，心腹煩滿，不得臥，以胃氣不轉，水穀實也，名曰心小腸俱實也。

茯神湯　治心實熱，口乾煩渴，眠臥不安

茯神　麥門冬　木通　知母　紫菀　竹茹　赤石脂　桂　竹葉[illegible]

右[illegible]細，每服五錢，水一中盞，入棗一枚，大[illegible]，煎至一盞，去滓，食前臨臥溫服

[illegible]散　治心實熱，煩渴驚悸[illegible]

白石英　赤石脂　茯苓

麥門冬　知母　紫菀　石膏　人參

桂心　麻黃　黃芩　遠志　甘草

右為麤散，先以水五升，煮竹葉一握，取三升，去滓，每服一方寸匕，[illegible]以消息調[illegible]之，取八合，為一服，日再。

茯神丸　治心實熱，口乾煩渴，眠臥不安[illegible]

茯神　[illegible]　生乾地黃　[illegible]

防風　桔梗　人參　升麻　大棗子

黃芩　白前　赤芍藥　柴胡

黃耆[illegible]

右為細末，煉蜜為丸，如梧桐子大，每服三十丸，食後竹葉湯下，臨臥時更加服

犀角正心湯　治心經實熱，[illegible]中煩悶，不能多眠，[illegible]

犀角[illegible]　[illegible]　生乾地黃　菊花　白朮

甘草[illegible]　[illegible]

[illegible]　麥門冬　前胡[illegible]

右搗篩，每服五錢，水一盞半，入生薑一片，大棗[illegible]，八分，去滓，食後溫服

抑心氣散　治心經實熱，人氣[illegible]，若人患[illegible]心虛[illegible]脈洪大[illegible]，得心脈即先服此

黃芩　赤茯苓　玄參　甘草　麥門冬

牡丹皮　升麻　桔梗　貝母　犀角屑

地[illegible]　木香[illegible]

右為末，每服三錢，水一盞，煎至七分，食後溫服

人參湯　治心實熱，口舌乾燥，[illegible]煩渴，不思飲食

人參　赤茯苓　龍骨　遠志

麥門冬　生乾地黃　甘草　丹砂

天竺黃　天門冬

右搗羅，每服三錢，水一盞，棗一枚去核，淡竹葉五片，煎至七分，去滓溫服，一方治心熱多汗，用白茯苓[illegible]

淡竹茹湯　治心實熱，驚夢喜笑，恐畏悸懼不安

淡竹茹　生地黃汁　石膏　芍藥

白朮　人參　梔子仁　赤石脂　紫菀

知母　茯神

右㕮咀，以水九升，煮十味，取二升七合，去滓，下竹瀝更煎，取三升，若須利，入芒硝二兩，去竹茹，分三服

黃連散　治心實熱，[illegible]不安

黃連　人參　麥門冬　梔子人

赤芍藥　知母　紫菀　石膏

川芎[illegible]

右為麤散，每服三錢，水一中盞，煎至五分，去滓，入竹瀝半合，生地黃汁半合，更煎一兩沸，每於食後溫服

鎮心丸　治心熱驚悸[illegible]夜臥不安

丹砂　人參　甘草　黃芩　寒水石

牛黄半两 知母 桔梗

右件细末炼蜜丸如弹子大每服一丸人参汤嚼下

柴胡汤 治心热上焦壅热口舌生疮或多渴

柴胡 地骨皮 羚羊角 麦门冬 甘菊

茵陈 赤芍药 前胡 升麻 甘草

右一㕮咀每服一钱水一盏煎七分去滓食後温服

泻心汤 治心脏积热心下痞满烦躁身热不得眠水饮不下吐喘急

黄连半两 黄芩 甘草 人参

右一㕮咀每服四大钱水煎加生姜代

水壶丸 治心生热化风痰解烦热

牛黄 真珠 人参 白茯苓 安息香

丹砂 硝 胡黄连 龙脑 麦门冬

远志 牛黄 龙脑 铁粉

铁粉 金箔 银箔

右为细末炼蜜同安息香和丸如鸡头大每服一丸同人参茯苓汤化下

治心下坚大如盘水饮所作

用枳实七枚术三两以水一斗煮取三升分三服腹中软即消

硃砂膏 治心烦安神及解热血痰

金末 末 真珠末 生犀角 牛黄

人参 琥珀 西琥珀 羚羊角 麝香

龙脑 南硼砂 赤茯苓 远志

铁粉 苏合香 安息香

右都为末炼蜜合和诸药以小子更以金箔为衣

每服一丸食後化下

通心汤 治心经壅热

沉香 乱 有

麦门冬 栀子 当归 茯神

竹叶 大黄 升麻 木通

右件㕮咀每三钱水一盏煎去滓食後温服

山栀子汤 治心脏大热

山栀子三两 大黄 朴硝 甘草 石膏

黄芩 大青 竹茹

右件㕮咀每服三钱水一盏入竹叶七片煎七分去滓食後服

羚羊角汤 治心实热烦夜不安

羚羊角 茯神 黄芩 麦门冬

升麻 知母 朴硝

右件㕮咀每服三钱水一盏煎七分去滓食後温服

通神汤 治心脏壅热口舌生疮赤心中不安

升麻 犀角 龙胆 玄参 防风

黄芩 竹叶 甘草

右件每服五钱水一盏半煎八分去滓食後温服

茯苓散 治心气实热烦闷不安

赤茯苓 麦门冬 木通 川升麻

葳蕤 紫菀 川大黄 甘草

右为散每服三钱水一中盏入竹茹煎六分去滓每於食後温服

大黄散 治心脏实热身体烦口干

川大黄 黄芩 柴胡 知母 赤芍药

黄连 甘草 葳蕤

右为散每服三钱水一中盏煎六分去滓每於食後温服

麻黄汤 治心热心大口

麻黄 细辛 子芩 茯苓

竹叶 白术 桂心 生地黄

右㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服

犀角汤 治心

犀角鎊 黃芩 人參 白茯苓
麥門冬去心 升麻 甘草
右剉每服五錢水一盞半煎八分去滓食後溫服
遠志湯 治心藏實熱煩燥不下臥
遠志 生地黃 赤茯苓 半夏
茯神 麥門冬 甘草
右等分每服三錢水一盞生薑五片煎六分去滓溫服
治赤脉貫心兩瞼痛心藏實熱兩眼赤腫口乾舌破
川鬱金散 治心熱赤目
天門冬 麥門冬 車前子 梔子仁 黃芩
升麻 寒水石 甘草
右剉散每服五錢水二盞煎七分去滓食前服
至寶丹 治心熱煩燥驚癇風痰[illegible]小兒驚熱女人血[illegible]
伏暑後心煩[illegible]等症
生犀角 生玳瑁 琥珀 朱砂 雄黃
牛黃 [illegible] 金箔 銀箔
安息香
右丙六味各研為末以安息香膏丸如皂莢子大人參湯下一丸小兒
丹量度加減
竹葉湯 治心熱煩燥咳吐不出煩悶多頭痛
石膏 淡竹葉 陳皮 小麥 地骨皮
茯苓 梔子仁
右㕮咀以水一斗五升煮小麥竹葉取八升次下諸藥煮取
二升去滓分三服
升麻湯 治心熱主心煩熱
升麻 黃芩 蕤仁 梔子人 淡竹葉
芒硝 生地黃
右㕮咀以水七升煮取三升去滓下芒硝分三服
石膏散 治心熱氣吐[illegible]吐不止咽喉[illegible]急頭痛
石膏 麥門冬 桃仁皮 赤茯苓 甘草
葛根 梔子人

右為散每服一錢水一中盞生薑[illegible]各五十枚竹葉
七片煎[illegible]六分去滓溫服
清心丸 治心熱[illegible]
人參 蔓荊 鬱金 生地黃 天麻
天南星[illegible]
右為末[illegible]糊和丸如梧桐子大每服三十丸人參湯下日三小
兒[illegible]
酸棗仁煎 治不得眠
酸棗仁 乳香 人參 牛黃
糯米 辰砂
右用[illegible]以火[illegible]如稀餳每服一匙溫酒調下臨
空心服
麥門冬湯 治心臟實熱[illegible]吐不出咽[illegible]
麥門冬 石膏 地骨皮 梔子仁 甘草
右件每服三錢水一盞入小麥五十粒竹葉十片煎至七分去滓食後
臥溫服
定心丸 治熱
黃柏 天門冬 黃連 麥門冬 龍腦
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十丸食後臨卧竹葉湯下
牛黃散 治心臟風熱
牛黃 何首烏 甘草 玄明粉
右同研細散和勻每服一錢半麥門冬熟水調下
大定志丸 治心風熱[illegible]不守
硃石 朱砂 白茯苓 人參
右研為末[illegible]和丸如彈丸大每服一丸[illegible]薄荷湯[illegible]服
上治一年[illegible]
熱用此方[illegible]服[illegible]
火府丹 治[illegible]小便[illegible]
黃芩 黃連 生地黃 木通
右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二三十丸溫水下臨卧一服

方劑皆見[illegible]

定心丸[illegible]

[illegible]丹砂[illegible]

右細研[illegible]丸如櫻桃大每服[illegible]丸生[illegible]入油一兩[illegible]青

瑯玕[illegible]

一方[illegible]治心中客熱膀胱間連脇下氣妨常日憂愁不樂兼心忪者

取苦參根一大斤剉然令乾以生絹袋盛之於三大斗無灰清酒中

浸之春三[illegible]一日[illegible]服冬十日夏即七日近暖處乃佳每空腹

飲盡日飲二兩服之常令酒氣相續以知爲度若不飲酒即取其

根十兩加桂心五兩搗羅爲散以蜜和爲丸搗一千杵

丸如梧子大每空腹以酒及蜜湯飲汁等下二十丸日再服稍加

至三十丸以瘥爲度本草圖經曰莎草根又名香附子[illegible]不著所出

州土但云生田野今處處有之或云交州者勝大如棗近道生者如

杏仁許苗莖葉都似三稜根若附子周匝多毛今近道生者苗葉如

薤而瘦根如筋頭大二月八月採[illegible]天寶單方圖載水香稜功狀

與此頗相類但味差不同其方云水香稜味辛微寒無毒性澁元生

博平郡池澤中苗名香稜根名莎結亦名草附子河南及淮南下濕

地即有名水莎隴西謂之地藾根蜀郡名續根草亦名水巴戟今涪

郡最饒名三稜草用莖作鞋履所在皆有單服療腸風又[illegible]療

丈夫心肺中虛風及客熱膀胱連脇下氣妨皮膚瘙癢癮疹飲食不多日漸瘦損常有憂愁心

忪少氣並春收苗及花陰乾冬採根切於風涼處有患前病者取

苗二十餘斤剉以水二石五斗煮取一石五斗於浴斛中浸身令汗

出五六度並熏其肺中風皮膚瘙痒即止每歲四時常用則癮疹風

永差

沙參散[illegible]治心實熱驚悸善笑心神不安泄熱安心

沙參[illegible] [illegible] 川芒硝[illegible] 茯神[illegible] 梔子仁

羚羊角屑 子芩[illegible] 石膏[illegible] 人參[illegible] 甘草[illegible]

右件藥搗篩爲散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓入生地黃汁一合竹瀝

半合更煎一兩沸每於食後温服忌炙煿熱麵

導赤散治心臟實熱口乾煩渴口舌生瘡驚悸不安

黃連[illegible] 麥門冬[illegible] 半夏[illegible] 地骨皮[illegible] 茯神[illegible]

赤芍藥 木通[illegible] 生地黃[illegible] 黃芩[illegible] 甘草[illegible]

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎八分去滓温服不拘時服

○心虛 附論

夫心虛寒者左手寸口人迎以前脈陰虛者手少陰經也病苦悸恐不樂

心腹痛難以言心如寒恍惚名曰心虛寒也○心虛之狀氣血衰少面

黃煩熱多恐悸不樂心腹痛難以言時出清涎心膈脹滿善忘多驚

夢寐不寧精神恍惚皆手少陰經虛寒所致其脈見於左手寸口人迎

以前陰虛者乃其候也○夫人稟中和充實氣血和平榮衛通流陰陽調

順則心神安靜疾無所生也若血脈虛損神性不寧則多恐畏善忘[illegible]

以致精神恍惚此皆心氣不足之所致也○心小腸俱虛左手寸口人迎以前脈陰陽俱

虛者手少陰與巨陽經俱虛也病若洞泄苦寒少氣四肢厥腸鳴名曰心小腸俱虛也

方

補心丹[illegible]寧心保神益血固精壯力強志令人不忘

焦化痰涎袪煩熱除驚悸療咽乾口燥育養心氣

熟地黃[illegible] 人參[illegible] 白茯苓[illegible] 遠志[illegible] 石菖蒲[illegible]

玄參 柏子仁 桔梗[illegible] 天門冬[illegible] 丹參[illegible]

酸棗仁[illegible] 甘草[illegible] 杜仲[illegible] 茯神[illegible] 當歸[illegible]

麥門冬[illegible] 百部[illegible] 五味子[illegible]

右爲末煉蜜丸每一兩作十丸金箔爲衣每服一丸燈心棗湯化下

食後臨臥服作梧桐子大丸各服亦可

遠志散治心氣虛驚悸喜忘不思飲食

遠志[illegible] 菖蒲[illegible] 人參[illegible] 甘草[illegible]

芎藭 獨活 五味子 半夏[illegible]

桂心 防風[illegible] [illegible] 熟乾地黃 茯神

麥門冬[illegible] 黃耆[illegible] 紫石英[illegible]

右爲散每三錢水一盞生薑半分棗三枚煎六分食後温服

補心丸[illegible]治臟虛善恐怖如魘狀及女人產後餘疾月經不調

當歸 防風 芎藭 附子 芍藥

甘草　防風　細辛　桂心
半夏　厚朴　大黃　豬苓　茯苓
遠志
右爲末煉蜜丸如梧桐子大酒服五丸日二服不知加至十丸令微加熱
藥亦可
小補心丸
天門冬　麥門冬　乾山藥　熟乾地黃　五味子
石菖蒲　人參　茯神　茯苓　遠志
官桂　地骨皮　酸棗仁　龍齒　栢子仁
右爲末煉蜜丸如梧桐子大硃砂爲衣每服三十丸溫酒鹽湯
下亦可
丹砂茯神丸　治心氣虛弱時發昏悶驚悸恍惚忘誤心忪安定神
志補心不定
丹砂　茯神　人參　天麻　白殭蠶
天竺黃　眞珠末　琥珀　菖蒲　遠志
鉛霜　麝香　水銀砂子　乾蠍　牛黃
右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服十丸至十五丸煎人參茯苓湯
下食後臨臥服
大補心湯　治虛損不足心氣弱悸或時妄語四肢損變氣力顛
色不榮腰背相引痛不能俛仰
黃芩　附子　甘草　茯苓　麥門冬
乾地黃　桂心　阿膠　半夏　遠志
石膏　生薑　粘糖　大棗
右取十三味以水二斗五升煮取五升成下糖分四服
育神散　治心亂不寧又年不愈健忘多語無端打罵憤悶心志不定飲食無味小便白濁色皆怔忪
赤石脂　白茯苓　甘草　乾薑　當歸
龍骨　白茯神　防風　人參　白术
紫菀　遠志　紫苑　桂心
右爲末每服一錢水一盞薑三片棗一枚煎七分食後服

長以遠志丸　安神鎮心……補智益志
白附子　茯神　人參
麥門冬　川芎　山藥　半夏麴　鐵粉
南星　天麻　朱砂　北細辛
右爲末生薑五兩取汁入水煮糊丸梧桐子大別以朱砂爲衣每服
一十丸夜臥生薑湯下小兒減丸數　方治……
醉如癡……神不守大便閉小便澀……與上方同但去天
麻南星……用水煮丸如梧子大每服四十丸生薑薄荷湯下日午夜
臥服名遠志平肝丸　一方……用半兩其餘各味各一兩夜服一兩
四參人參……爲衣
十四友丸　補益氣血……於心氣理怔忪昏憒神志不寧睡臥不得
經曰臥有所傷精有所倚則臥不安大治丈夫婦人心氣不定
白茯苓　龍齒　當歸　紫石英
人參　茯神　黃芪　栢子人　酸棗人
肉桂　遠志　熟地黃　阿膠
朱砂
右爲末煉蜜和丸如梧子大朱砂爲衣每服三十丸煎棗湯下
食後臨臥服　昔歸魏公云胡總幹言曾有心疾怔忡健忘夢遺皮
不得睡千治萬狀無所不有凡世所謂心藥者無不服之皆無效驗
忽遇一良醫言此疾本由憂愁思慮耗散心血而得當用地黃當歸
滋養其血以心主血故也如更服菖蒲之類則心氣愈散今當收斂
之又心本因……以白虛當用黃蓍以勝……乃遍諸家方處
之大抵有如此謂收斂……可用手子……但入腸豈不如龍齒肉
桂大……無……也……此傳人無不効者此十
四物各之益交……名……其言極有理
茯苓補心湯　治心虛寒病苦悸恐不樂心腹痛難以言心寒恍
惚喜悲愁恚怒衄血面黃……五心熱……語不覺喉痛舌本強冷
……婦人懷娠惡阻……四肢……息肩全不納食
白茯苓　人參　川芎　半夏　甘草
橘皮　紫蘇　桔梗

右為散每服四大錢水一盞半生薑五片棗一枚煎七分去滓食前服

平補鎮心丹 治丈夫婦人心氣不足志意不定神情恍惚夜多異夢忪悸煩鬱及肝腎氣少氣多乃夜夢遺精常服不

酸棗人 白茯苓 五味子 肉桂

麥門冬 茯神 車前子 天門冬

龍齒 熟地黃 山藥 人參 朱砂

遠志 甘草

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心飯飲下溫酒亦得加至五十丸常服益精髓養氣血悅色駐顏 此方有五味子白茯苓車前子肉桂人參酸棗人排可以治心氣不足而白濁消渴尤為切要之藥若方無此六味却有生地黃苦梗柏子人石菖蒲當歸只宜心氣不足腎氣傷敗血少氣多耳一方無甘草

英散 治心氣不足虛悸恐畏悲思恍惚心神不定惕惕而

紫石英 菖蒲 白茯苓 白朮

黃耆 遠志 赤小豆 附子 桂心

人參 乾薑 防風 龍骨 熟乾地黃

右為細散每於食前以溫酒調下二錢

定心湯 理心氣不足榮血衰少精神恍惚夢中失精

人參 白茯苓 茯神 黃耆 白朮

赤石脂 川芎 厚朴 官桂 紫菀茸

麥門冬 甘草 防風

右㕮咀每服三錢水一盞赤小豆七十粒煎七分食後服

分氣補心湯 治心氣鬱結忪悸噎悶四肢浮腫上氣喘急

大腹皮 香附 白茯苓 桔梗 木通

甘草 川芎 前胡 青橘 枳殼

白朮 細辛 木香

右剉散每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎七分去滓食前溫服

山茱萸丸 治心氣不足

山茱萸 杜仲 茯神 柏子人 甘草

天門冬 白茯苓

麥門冬 乾山藥 百部

防風

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼食後麥門冬熟水溫服

熟乾地黃散 治心氣不足恍惚振悸煩躁舌強語澀心中懊憹悶而不下食精神不爽不識人昏

熟乾地黃 當歸 龍骨 人參 甘草

桔梗 桂心 茯神 枳殼

半夏 黃耆 遠志 白朮

右為散每服二錢水一中盞入生薑三片棗一枚粳米五十粒煎至六分去滓不拘時溫服忌炙煿熱物

心丸 治憂愁思慮過度心血虛氣滯不樂舌強語澀恍惚煩悶多汗不進飲食

紫石英 熟地黃 菖蒲 茯神 當歸

附子 黃耆 遠志 川芎 桂心

龍齒 人參

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服七十丸不拘時以棗湯下

龍齒湯 治心下怔忪常憂夢悸恐多驚若將捕小便或赤或濁

官桂 半夏 人參 白茯苓 甘草

當歸 龍齒 桔梗 遠志 枳殼

茯神 麥門冬

右為末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎至七分煎服

鎮心丸 治心氣不足志意不定精神恍惚語言錯妄忪悸煩鬱悲憂慘戚喜怒多恐健忘少睡夜多異夢寤即驚魘或發狂眩不知人並宜服之

酸棗子 白茯苓 遠志 茯神 石菖蒲

枸杞子 朱砂 柏子人 地骨皮

山藥 人參
右件[illegible]為末煉蜜[illegible]丸[illegible]服一丸細嚼人參
湯下[illegible]
白朮散 治心氣虛損夢寐不定精神恍惚[illegible]
白朮 甘草 麥門冬 茯苓 半夏
知母 當歸 白茯苓 附子
桂心 熟地黃 木香
右為散每服一錢水一中盞入生薑[illegible]分[illegible]煎[illegible]分去[illegible]
空心分去滓食前[illegible]
薯蕷丸 治心[illegible]驚悸[illegible]不樂
薯蕷 遠志 菖蒲 甘草
柏子仁 川芎 茯神 芎藭 人參
丹參 防風 熟乾地黃
右為末煉蜜和擣二三百杵丸如梧桐子大每服不計時以溫酒下

十九

石英湯 治心經邪熱虛煩[illegible]頭目不利神思昏倦
紫石英 麥門冬 生乾地黃
人參 紫蘇葉 遠志 茯神 當歸
甘草 防風 赤小豆
右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓早晚食後溫服 方治
心氣不足[illegible]心中煩悶[illegible]不自知[illegible]
驚悸[illegible]
茯神丸 治心虛[illegible]
附子
右為末[illegible]
神丸[illegible]
[illegible]
龍齒湯 治心虛[illegible]
人參 [illegible] 麥門冬 當歸
茯神 木香
半夏

右件[illegible]
右件[illegible]每服[illegible]五分煎至八分去
滓食後溫服
辰砂妙香散 治[illegible]心氣不足[illegible]恍惚[illegible]
香散飲食[illegible]
安鎮心神
茯苓 茯神 山藥 黃耆
人參 甘草 桔梗 [illegible] 木香
麝香
右為細末[illegible]每服二錢溫酒調下
又方安神鎮心[illegible]人參[illegible]各一兩茯苓茯神
遠志[illegible]每服二錢空心
以溫酒調下[illegible]
白茯苓散 治心[illegible]
白茯苓 人參 防風 遠志 白朮

十八

桂心 桔梗 枳殼 半夏
甘草
右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候
人參遠志丸 治[illegible]
人參 遠志 黃耆 酸棗仁 桂心
桔梗 丹砂 天門冬 白茯苓 菖蒲
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十丸至二十丸[illegible]飲下不計時服
沉香散 治[illegible]夜臥不寧
沉香 白茯苓 酸棗仁 人參
天麻 [illegible] 遠志 藿香葉
甘草 白僵蠶
右為散每服二錢[illegible]湯調下
茯苓散 治心虛[illegible]
白茯苓 遠志 人參 麥門冬 白僵蠶
羚羊角 [illegible] 甘草 牛黃 鐵粉

右研爲散每服二錢食後煎竹葉湯調下或薄荷熟水下

硃砂丸 鎮心神化痰涎退潮熱利咽膈止煩渴

鉛粉 天竺黃 人參 金銀箔 腦子

生麝香 牙硝 犀角 海金沙 硃砂

右爲末水丸以硃砂爲衣共丸作六百丸每一丸至五丸夜臥含化或生薑汁煎竹葉湯化下狂言譫語涎壅膈上地龍三兩薄荷汲水研心神不寧金銀箔薄荷湯化下

人參散 治心氣不足或喜或悲時時嗔怒煩悶或昇眼目黃赤或獨言語不自覺知咽喉痛口乾燥冷汗自出驚悸心煩面赤

人參 白茯苓 麥門冬 紫石英 川升麻

赤芩 桂心 白朮 射干

甘草

右爲散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不拘時候溫服忌炙煿熱麵

[illegible]丸 治心虛不足補心氣

人參 熟乾地黃 百子人 茯神

防風 丹參 貝母 菖蒲

甘草 遠志

右爲末研令勻用蜜和丸如彈子大每日食後含一丸含化咽津

半夏補心湯 治心虛寒心中脹滿悲憂或夢山丘平澤

半夏 茯苓 桂心 枳實

橘皮 白朮 防風 遠志

右㕮咀以水一斗煮取三升分三服不拘時服

防風丸 治血虛脈虛心氣不足言語不正健忘不安夢寐驚悸

八物定志丸 補益心神安定魂魄去心中痰熱

人參 菖蒲 遠志 茯神 茯苓

白朮 麥門冬 牛黃

右爲末煉蜜丸如梧桐子大米飲湯下三十丸若髓不足加生地黃當歸若肺氣不足加天門冬麥門冬五味子若心氣不足加

若肝氣不足加天麻若膽氣不足加細辛酸棗仁

川芎若脾氣不足加白朮若腎氣不足加

茯神丸 治心臟虛熱驚悸心神不安

茯神 人參 麥門冬 龍齒 防風

雲母粉 犀角 黃芩

右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服食後米飲下十五丸至二十丸

熟地黃散 治心氣虛恍惚心腹痛脹滿

熟乾地黃 牡丹皮 遠志

桂心 人參 白茯苓

右件每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候服

紫石英散 治心氣虛苦悲恐驚悸恍惚謬忘心中煩悶面目或赤或黃

紫石英 桂心 白茯苓 人參 熟乾地黃

麥門冬 白朮 黃耆 甘草

右爲散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎六分去滓不拘時溫服

遠志丸 治心氣不足驚悸多忘

遠志 麥門冬 赤石脂 熟乾地黃 人參

茯神 菖蒲 白朮 甘草

右爲末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食後清粥飲下三十丸

人參丸 治心氣不足多驚悸耳目不明及健忘

人參 麥門冬 茯神 龍齒

黃耆 菖蒲 赤石脂 熟乾地黃 遠志

右爲末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食後以清粥飲下二十丸

麥門冬散 治心氣不足多汗心煩喜獨語多夢不自覺咽喉痛時吐血舌本強水漿不通

紫石英 茯苓 人參 桂心 麥門冬

紫苑 甘草 人參 赤小豆

右㕮咀以水八升煮取二升半分二服[illegible]服佳一方無人參

茯苓補心湯 治心氣不足[illegible]善悲愁恚怒衄血面黃煩悶五心熱或

獨語不覺喉咽痛舌本強冷涎出一則善忘恐走不定婦人崩中面色

赤

茯苓四兩 桂心 甘草各二 紫石英 人參各一

大棗二十枚 麥門冬三兩 赤小豆二十四枚

右以㕮咀以水七升煮取二升半分三服

寧志丸 安神定魄令人神爽氣清目明耳聰強記預知

琥珀 預知子 遠志 人參 白朮

白茯苓 菖蒲 桂

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸食前溫酒下

人參湯 治心氣不足脾乏主氣肝氣受邪先診其脉若心脾脉俱弱即

宜先服益心氣

人參 藿香 遠志 菖蒲 菖蒲

白朮 白芷 陳橘皮

右為末每服二錢水一盞煎八分去滓食前服

黃耆湯 治心虛驚悸精神恍惚多驚

黃耆 麥門冬 人參 芍藥

白茯苓 當歸 桂 甘草

右每服五錢水一盞半棗二枚煎至一盞去滓不拘時服

鎮心丸 治心虛驚悸或因憂慮神不安

茯神 人參 甘草 龍齒 升麻

柏子仁 鐵粉 麥門冬

右為末蜜丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸米飲下早

晚食後服

大補心丹 治[illegible]多忘神志不寧[illegible]失守[illegible]

[illegible]

[illegible]使用之婦人[illegible]常服安心神調血

[illegible]

黃芪 茯神 酸棗仁 熟地黃 長大[illegible]

五味子 人參 栢子仁

右為末煉蜜丸如梧桐子大用[illegible]每服三十丸米湯送下盜汗不止麥

麩湯下[illegible]人參龍骨湯下[illegible]乳香湯下肌熱驚煩麥

門冬湯下[illegible]人參[illegible]大便下血當歸地黃湯下小便不

[illegible]

定心丸 治[illegible]神志不寧[illegible]

[illegible]

茯神 龍齒

[illegible] 人參 茯苓

[illegible] 麥門冬 升麻 桔梗 甘草

[illegible]

[illegible] 人參

[illegible] 水一盞半煎[illegible]去滓食後服

菖蒲散 治精神[illegible]不寧[illegible]神不眠[illegible]

菖蒲 人參 生乾地黃 遠志

白茯苓 上等 桂

右為散每服一錢溫酒調下食後臨卧服

人參遠志散 治心虛不足[illegible]不足[illegible]

人參 遠志 熟乾地黃

白茯苓 甘草 鐵粉 琥珀

右研匀每服一錢煎金銀湯調下

人參湯 治心虛不足[illegible]不安言語[illegible]

人參 茯神 黃芪

龍齒 桂

右細末如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑三片同煎至八分去滓

溫服日二

寧志丸 治[illegible]不得眠[illegible]心悸[illegible]

[illegible]

[illegible]

益用研金銀箔入灸藥末六件，庭既泉內為丸，留火煅為末[illegible]
隔日先服下半[illegible]指二日[illegible]去皮夜服[illegible]兩用此方
廣十大[illegible]之子六件[illegible]至帝[illegible]一[illegible]十之八矣
人參 白茯苓 當歸 石菖蒲 乳香別研
酸棗仁[illegible]
右為末，煉蜜丸如梧桐子大，以金箔為衣，每服五十丸，人參湯下，不拘時
服
定志丸[illegible]
附子 人參 茯苓[illegible] 牡[illegible]
[illegible]
右為末同[illegible]小豆大，每服五七丸[illegible]薑湯下
補心湯 治心氣不足，或善悲，或[illegible]，或[illegible]，或鼻衄，眼目黃赤[illegible]
語顛倒，健忘[illegible]口乾[illegible]盜汗自出[illegible]心悸[illegible]
人參 白茯苓 桂 紫菀
麥門冬 紫石英
右[illegible]每服五錢，水一盞半，生薑[illegible]，棗二枚，赤小豆三十粒，煎至八分
去滓食後溫服
杏人丸 治心虛神氣不寧，動多驚悸，臥不安
杏仁[illegible]
[illegible]
菖蒲[illegible] 麥門冬[illegible] 黃連[illegible] 遠志[illegible] 茯苓[illegible]
右為末，煉蜜為丸，如梧桐子大，每服三十丸，人
參湯下
淡竹茹湯 治心虛煩悶，頭痛[illegible]不能，心中悶亂，及婦人產
後心虛驚悸煩悶欲絕[illegible]虛煩者，方論中所謂心虛煩悶是也，大抵陰虛
生內熱[illegible]外熱[illegible]不分[illegible]分也[illegible]
[illegible]之後，皆從人心虛[illegible]婦人產[illegible]多[illegible]
身不[illegible]不[illegible]皆虛煩也，方例皆虛煩
近[illegible]不可不[illegible]小便[illegible]
之所[illegible]

麥門冬[illegible] 人參[illegible] 甘草[illegible] 白茯苓[illegible]
半夏[illegible]
右剉散，每服四大錢，水一盞半，生薑七片，棗三枚，煎[illegible]
七分，去滓，食前服[illegible]
硃砂安神丸 治心神煩亂，怔忡，不安，兀兀欲吐[illegible]
[illegible]之[illegible]胸中[illegible]
以為上焦[illegible]
茯苓菖蒲丸 治心氣不足
茯苓 菖蒲[illegible] 茯神 赤小豆
右為末，用飲糊[illegible]丸如菉豆大，每服三十丸至五十丸，食後熟水
下
菖蒲散 補心益智
菖蒲[illegible] 遠志[illegible] 蒲黃 白茯苓
龍骨
右為末，每服一錢匕，以新水調服，如[illegible]以[illegible]日再服
定心小丸 治心氣不足，五臟不足，甚者憂愁悲傷不樂，忽忽喜忘，朝差暮劇，暮差朝發，狂眩者
菖蒲 遠志[illegible] 茯苓 人參
右為末，蜜丸如梧子大，飲服七丸，日三。加茯神為茯神丸，散服之亦
佳[illegible]方寸匕，日[illegible]
引神歸舍丹 治心[illegible]
大天南星[illegible] 附子[illegible]
辰砂[illegible]
右為末，用豬心血為丸，如梧桐子大[illegible]
寧神膏[illegible]
香參散 治心[illegible]
新羅人參[illegible]
生薑[illegible]
右㕮咀[illegible]
服[illegible]

國
向

人

此兩愈

歸神丹 治一切驚憂思慮或夢[illegible]作事多忘但是一切心氣不足

癲癇狂亂 [illegible] 並皆治之 [illegible]

顆塊辰砂 [illegible] 兩 [illegible]

右將猪心 [illegible]

度曉取出下用猪心 [illegible] 只 [illegible]

[illegible] 煮 [illegible] 和丸如梧桐子大每服九丸至十五丸加

至二十一丸用去心麥門冬 [illegible] 癲癇至甚者乳香人參湯

下夜睡不寐或多亂夢 [illegible] 下

玉匱丸 [illegible] 治心氣不足大南心氣

大木瓜 [illegible]

大附子 [illegible]

右二味 [illegible] 入附子 [illegible] 木瓜 [illegible] 盛木瓜內蓋

[illegible] 研如 [illegible] 入乾茯神末拌和丸如梧桐

子大每服二十丸人參湯下溫酒亦可

醫方類聚卷之八十八　十五

分丸 治丈夫婦人因驚憂失心或因思慮過多氣結不散積成痰涎

留在心包 [illegible] 以致狂言妄語 [illegible] 奔走

顆塊辰砂 [illegible] 附子 [illegible]

治 和 [illegible] 以猪心血和丸如梧桐子大別以 [illegible] 為衣每服二粒用人

參菖蒲湯下常服一粒能安魂定魄補心益 [illegible]

人參湯 治一切虛損 [illegible]

人參 [illegible] 石菖蒲 [illegible]

右件為麁末每服 [illegible] 水一盞生姜三片棗子一枚煎至七分去滓溫服

不拘時

辰珠丹 [illegible]

[illegible]

右為末 [illegible] 大每服 [illegible]

下午前臨臥服

寧月心腋 [illegible]

人安 [illegible]

右為末 [illegible]

治心氣不足 [illegible]

服之

[illegible] 大 [illegible]

[illegible] 地黃

[illegible] 十年者 [illegible] 兩

[illegible]

治心氣虛損 [illegible] 張 [illegible] 子 [illegible] 知府閣

中服之有効

用猪腰子一隻用水兩碗煮至一盞半將腰子細切入人參半兩當

歸上去蘆下去細者取中段半兩並切同煎至八分喫腰子以汁送

下有喫不盡腰子同二味滓焙乾為末山藥糊丸如梧桐子大每服

三五十丸米飲熱水下此藥服為佳平江葛者 [illegible] 御藥為葛樞密云此

藥本治心氣怔忡而自汗者不過一二服即愈蓋奇方也

又 治一切心氣 百一選方

醫方類聚卷之八十八　十六

以辰砂一兩有墻壁透明者方可用以石韋葉裹之以布線縛定用

人乳汁一小碗入銀石器內以物覆之重湯內煮候乳汁乾研細丸如

梧桐子大空心溫酒下六丸石韋葉當以新布拭去毛方可用

歛辰砂法 治痛心氣 [illegible] 手足 [illegible] 百一選方

用頸 [illegible] 有墻壁 [illegible] 一兩研如粉以好青麻油四兩白芨二兩木通

一兩於 [illegible] 令 [illegible] 如人體溫於磁器內和辰砂末

令如 [illegible] 水洗去 [illegible] 新 [illegible] 水洗去臭氣 [illegible] 磁合內

以新水養之每日 [illegible] 換水空心就舌上丸七粒如梧桐子大若用

一料 [illegible] 有人病心虛 [illegible] 動之物 [illegible] 之

服此遂愈

寶陀僧散 [illegible] 治驚氣入心瘖不能言語

用寶陀僧研極細如粉以茶清調服一錢匕一服即愈昔有人為狼

及惡蛇所驚 [illegible] 中太醫 [illegible] 方 [illegible] 風 [illegible] 陀僧

大如指者一塊 [illegible] 空掛之四邊以火煅

令通紅 [illegible] 一件合和 [illegible] 醋 [illegible] 出火毒一宿研令

[illegible]分[illegible]不[illegible]入[illegible]壞

心[illegible]脈上

延壽水仙丹[illegible]眼大[illegible]度

[illegible]以[illegible]其[illegible]

[illegible]人[illegible]

人參　木香　白芨

右用[illegible]一味[illegible]用[illegible]之[illegible]

候三味藥末[illegible]水上[illegible]透明[illegible]末[illegible]不

搗多火細研如[illegible]用[illegible]水洗去[illegible]入水中[illegible]

日[illegible]水[illegible]丸如[illegible]大每服三丸[illegible]下日正午時服一服[illegible]忌

俞山人鎮心丹[illegible]治憂愁思慮過傷心氣不足恍惚驚悸[illegible]

勞失精[illegible]飛尸[illegible]色黃食[illegible]心[illegible]不[illegible]至大[illegible]

及吐血[illegible]心疾[illegible]主治之常服安神去百病[illegible]

此藥性[illegible]無毒能[illegible]勞疾病

龍齒[illegible]　牛膝[illegible]　兔絲子[illegible]　五味子[illegible]

人參[illegible]　山藥[illegible]　鹿角霜[illegible]　遠志[illegible]

黃耆[illegible]　茯苓[illegible]　石菖蒲[illegible]　茯神[illegible]

右件爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十丸鹽米飲或酒鹽湯

吞下空心服[illegible]加至四十丸用辰砂爲衣人參湯下食後服[illegible]

驚氣圓[illegible]治憂愁思慮喜怒不常或因驚怕而傷心或因思慮而

神[illegible]心[illegible]或手足不仁[illegible]自[illegible]少[illegible]

驚飲食無味及治產後中風一切驚疾

代赭石[illegible]　朱砂[illegible]　茯苓[illegible]　人參[illegible]

白殭蠶[illegible]　[illegible]　鐵粉[illegible]　酸棗人[illegible]

[illegible]　遠志[illegible]　五味子[illegible]

右件[illegible]爲末[illegible]如[illegible]大每服一[illegible]湯[illegible]下[illegible]

[illegible]日進三五服[illegible]一服不拘時候

加味烏沉湯[illegible]補心[illegible]虛損之人服此勝大建中湯

人參　當歸[illegible]　白朮[illegible]　天台烏藥　白茯苓[illegible]

附子[illegible]　沉香[illegible]　肉桂[illegible]

右剉散每服三錢水一盞[illegible]空心服

沉香湯[illegible]治心[illegible]飲食不入[illegible]吐[illegible]大病

得[illegible]不復[illegible]以[illegible]飲食[illegible]

藿香　人參[illegible]　桔梗　木香

白朮[illegible]　茯苓[illegible]　[illegible]　半夏[illegible]

右爲散每服[illegible]水二盞入[illegible]空心服

遠志散[illegible]治心[illegible]不足

白朮　白茯苓　人參[illegible]　朱砂[illegible]　川芎

羌活[illegible]　防風一兩　當歸[illegible]　白芍藥[illegible]　熟乾地黃[illegible]

[illegible]

右除朱砂外並爲細末[illegible]入朱砂研令[illegible]每服二錢[illegible]空心

[illegible]下食後臨臥服

定志圓[illegible]治心氣不足

遠志[illegible]　天門冬[illegible]　茯苓　麥門冬[illegible]　茯神

龍骨　巴戟　[illegible]　辰砂[illegible]

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大空心每服二十丸食遠夜臥麥門

冬湯[illegible]下[illegible]

鎮神丹[illegible]治心氣[illegible]常服寧心定志

[illegible]　牛黃[illegible]　紫石英[illegible]

石菖蒲[illegible]　白龍骨[illegible]

代赭石[illegible]　赤石脂[illegible]　酸棗仁[illegible]

乳香[illegible]　辰砂[illegible]　白茯苓[illegible]

右件爲細末和勻煮棗肉爲丸如梧桐子大每服二三十粒遠心煎

湯下不以時候[illegible]以乳香[illegible]服如不[illegible]以酸棗仁煎湯

下亦得

救命丹[illegible]治心虛[illegible]神志不寧或多驚悸語言顛錯

辰砂[illegible]　猪血四兩

右用水一斗同煮於銀石器中用[illegible]一[illegible]放冷別用清水湯

去猪血[illegible]令淨朱砂乾以[illegible]丸如麻子大每服十丸去用心麥門

冬煎湯下五臟立效

築心丹 治心氣不足

朱砂 酸棗仁 真青 人參

茯苓 遠志肉 天南星 人腦子

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十粒人參湯下

大建心散 治心氣不足白濁遺精等疾

石蓮肉 赤茯苓 細辛 遠志

桔梗 人參 白朮 甘草 白芷

麥門冬 青皮 川芎

右為細末每服二錢水一盞生薑三片棗子一箇煎至七分空心食

前服

鎮心丹 治心氣之病多自憂愁思慮無多所以先不足然後生疾也

人參 茯神 綿黃耆 酸棗仁

熟乾地黃 柏子仁 白茯苓

遠志 五味子 朱砂

[illegible]

右為細末用柏子仁一處和勻煉蜜為丸如梧桐子大朱砂為衣每

服二十丸用少湯調各下或空心臨臥食後服

臨臥散 治心氣白濁

茯苓 蓮肉 龍骨

右為末每服二錢空心食前白湯調服

補心丹 治心虛諸疾方

乾山藥 人參 茯苓 菖蒲 熟地黃

貴壽 麥門冬

右為末煉蜜丸如彈子大辰砂半兩為衣臨臥白湯化下一丸

養心丹 服之能寧神定志聰明不忘

光明朱砂 明乳香 酸棗仁 白茯苓

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大空心清米飲吞下十丸

茯神丸 治心虛血少神不守舍多驚恍惚睡卧不寧

人參 茯神 黃耆 熟乾地黃 當歸

酸棗仁 朱砂 龍齒

右件各等分研細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸煎人參

湯下不拘時候

人參散 治心虛血脈不充心神煩亂不得安睡全不思食

人參 黃耆 麥門冬 甘草

熟地黃 川芎

酸棗仁

白朮

右為散每服三錢生薑半分棗二枚同煎非時

溫服之

人之氣血虛損治心虛因驚風所觸風邪乘虛而入乎

或因驚恐而入心經則神志昏亂迷惘乎

是謂驚風之也

天南星 白附子 白茯苓 天麻 人參

遠志肉 酸棗仁

[illegible]

右為細末水煮丸如梧桐子大食後或臨臥

溫湯下三五十丸用米飲為衣

心氣散子 治心氣不足脾之虛

先服此藥

鎮心大半夏丸 治心虛風神情恍惚

子語似病癡

牛黃 真珠 琥珀 朱砂 麝香

天竺黃 石膏 龍腦 雄黃

馬牙硝 鐵粉 天門冬

防風 升麻 人參 黃芩 甘草

茯神 遠志 秦艽

知母 犀角末 釣藤 川大黃

金箔 銀箔 麥門冬

右件三十味各依法修事用天門冬以下至大黃搗為細末與前藥

粉金箔銀箔同研令勻細為度煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸溫水

卜者數二服水亦為根

孔聖[illegible]治心虛有驚悸多忘，淳精神恍惚，語言顛錯心亂

[illegible]

乳香 朱砂 白蒺藜 [illegible]

[illegible] 琥珀 半夏 [illegible]

右七味為細末，以薑汁為糊丸如梧子大，每服十五丸，生薑湯下

驚悸將瘥，金銀湯下

寧心丹 治心腎不交，多思慮，精神恍惚，多忘，上盛下虛

健忘，白濁，服藥益心血

熟乾地黃 朱砂 茯苓 人參

當歸 茯神 肉桂 山藥 [illegible]

遠志 麥門冬 [illegible]

右為末，煉蜜丸如梧桐子大，每服三十丸，食後[illegible]湯下

養氣鎮心丸

遠志 人參 茯神 麥門冬

石菖蒲 生龍腦一錢 白茯苓一兩

右為細末，煉蜜丸如梧桐子大，用朱砂龍腦為衣，每服二三十丸，煎

人參湯送下，食後臨臥服。◎長樂陳居士[illegible]朱砂[illegible]史載之[illegible]

[illegible]其[illegible]傳方書一編，載此方云人以為補下元，而使氣實[illegible]

居常不[illegible]充補心，則五臟皆實，心氣正，則元氣自實也。若更以[illegible]補

下元[illegible]此方[illegible]心[illegible]右止補不[illegible]自然[illegible]之理也。中年

以後宜服之，以[illegible]益不[illegible]留[illegible]知之

心不[illegible]補心志，是氣[illegible]心[illegible]心手不隨，語言[illegible]

其[illegible]風[illegible]心[illegible]所[illegible]

白朮 地骨皮 熟乾地黃 菊花二兩

右四味以水三石煮取一石五斗，去滓，澄清取十[illegible]蒸朮二十斤[illegible]如

常法，[illegible]取半[illegible]令[illegible]

定神丸 治[illegible]心氣虛[illegible]神志不安，怔忡不[illegible]

白茯苓 人參 白附子 酸棗仁 [illegible]

辰砂 [illegible]

右件為細末，煉蜜丸如梧桐子大，每服三十丸，煎人

參湯送下，食後臨臥

四味補心丸 治心[illegible]安神定志，治怔忪驚悸恍惚健忘

當歸 [illegible] 茯神 [illegible]

右件為細末，以杏仁[illegible]和如乾[illegible]

丸如[illegible]大，每服三十丸，用米飲送[illegible]下，不拘時候

治心氣不足，精神恍惚健忘

以[illegible]四兩[illegible]中，如此七次，即[illegible]

[illegible]子大，以水二大盞，煎至七分[illegible]服一小盞

鎮心[illegible]

以丹砂服之

以[illegible]水調為末[illegible]食之

寧心[illegible]

右[illegible]子[illegible]其[illegible]中[illegible]之去[illegible]上[illegible]留[illegible]為末入

[illegible]

治五臟[illegible]及[illegible]

以[illegible]令[illegible]

[illegible]

茯苓一兩 人參二兩 酸棗仁[illegible]

右以[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

心煩熱

夫人心煩熱之病，由少陰[illegible]所致也，其不足則可令人[illegible]大抵

心脉大热，[illegible]其支[illegible]则[illegible]生血[illegible]血[illegible]心脉[illegible]不
得其平[illegible]方[illegible]心中不[illegible]

方

黄芩汤 治心热烦燥面赤小便血

黄芩 升麻 麦门冬 [illegible]

紫苑 柴胡 桔梗 牡丹 木香

胡黄连

右㕮咀每服三钱，水一盏，煎七分，去滓，温服，不拘时

朱砂丸 治心虚烦热，怔忡，头目昏眩，夜卧不宁

朱砂 蛤粉 黄连 [illegible]

远志 麦门冬 白茯苓 人参 犀角

右为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服二十丸，熟水下，日三服

犀角汤 治心实烦热，狂躁[illegible]不欲见人

犀角 升麻 麦门冬 [illegible]

茯神 玄参 [illegible] 甘草

[redacted]

右㕮咀每服三钱，水一盏，入生地黄汁半盏，生地黄五七寸，同煎至七分，去滓，温服

凉心丸 治心热烦躁

朱砂 [illegible] 人参 白茯苓

远志 [illegible] 麦门冬 [illegible] 龙脑

金箔 [illegible]

右件为末，研匀，炼蜜和丸，如[illegible]大，每一服[illegible]人参汤化下

远志汤 治心虚多惊[illegible]面色变赤[illegible]

远志 白茯苓 犀角 [illegible]

白术 黄芩 [illegible]

右㕮咀每服三钱，水一盏，入生姜半分，煎至七分，去滓，温服不拘时

[illegible]

麦门冬汤 治[illegible]

麦门冬 [illegible] 远志 [illegible]

[illegible] 甘草

羚羊角 木通 [illegible] 甘草

右㕮咀每服三钱，水一盏，煎至七分，去滓，不拘时温服

黄芩汤 治心虚烦躁

黄芩 麦门冬 栝楼根 黄连 甘草

右㕮咀每服五钱，水一盏半，煎一盏，去滓，不拘时温服

[illegible]参汤 治心热烦躁小便赤涩

[illegible]参 麦门冬 木通 黄连 甘草

右㕮咀每服三钱，水一盏，入竹叶十片，同煎至七分，去滓，不拘时温服

黑豆汤 治心脏虚烦燥[illegible]

黑豆 防风 甘草 麦门冬

右件黑豆外为细末，用水七升，煎取五升，[illegible]，温服，从早至夜，
分作四服，[illegible]

[illegible]汤 治心热烦躁

生地黄汁 [illegible]一两 [illegible] 甘草

右将地黄汁[illegible]和下三味，[illegible]为散，每服一钱，用新汲水
调下，日三服，食后临卧

[redacted]

地骨皮汤 治心烦热，咽干舌燥，面赤溺涩

地骨皮 防风 甘草

右㕮咀每服三钱，水一盏，入竹叶五七片，煎至七分，去滓，温服，不
拘时

[illegible]心散 治心[illegible]

大黄 黄芩 黄连 [illegible]

右剉散，每服四钱，水一盏半，煎服

[illegible]丹 治心风不足，[illegible]不知人及语[illegible]不眠，自汗[illegible]
[illegible]

[illegible]女子带下

光明砂 [illegible] 白[illegible]

右为末，水丸如[illegible]大，每服一丸，[illegible]下，食后服

治大[illegible]心闷者

用槐子烧末，[illegible]

理心煩悶益氣不止渴用苦竹茹煮任性食之

治心脾煩心中熱或葛根主之

心心煩去熱不嗜食 [illegible] 又主心痛並傳

治熱攻心煩躁悶以竹葉粥汁一升食後分溫三服良

治解勞發熱 [illegible] 利門即以導行 [illegible] 十服去心臟風熱

安神丸 [illegible] 治心煩 [illegible] 心中 [illegible] 吐食胃中 [illegible] 亂兩氣 [illegible]

上血中伏火蒸蒸不安且用補 [illegible] 去之 [illegible] 人之手 [illegible] 心 [illegible] 舌上生之

元 [illegible] 用甘草之 [illegible] 又云 [illegible] 長生後血 [illegible] 也補其不足以黃連

夫心煩 [illegible] 之 [illegible] 也以 [illegible] 之 [illegible] 神明也 [illegible]

金花散 [illegible] 治心虛壓熱 [illegible] 上焦 [illegible] 生瘡連年不差

黃連 [illegible] 人參 [illegible] 枳殼 [illegible]

甘草 [illegible] 半夏 [illegible]

右為末每服一錢入生薑二片煎 [illegible] 分食後臨臥時溫服

大壽易 [illegible] 治五心煩熱是火鬱於地中四肢者土也以下論

脾土之中 [illegible]

升麻根　葛根　柴胡根　白芍藥 各等分

右剉以水 [illegible] 每服三錢或五錢水二大盞入連鬚葱白三寸煎至一 [illegible]

治心臟積熱口臭呼中和 [illegible] 神元 [illegible] 心中煩躁面赤非時頭熱 [illegible]

治去涼清熱服 [illegible]

黃芩　貝母　升麻　玄參　麻黃

麥門冬　紫苑　柴胡　桔梗　牡丹皮

木香　胡黃連

右為末每服二錢水一盞煎服八分食後去滓溫服

柴胡升麻湯 [illegible] 治男子婦人四肢發困熱筋骨熱表熱如火燎於肌

膚之 [illegible] 四肢者屬脾脾者土也熱伏地中此病多因血虛而得之

也又有胃虛過食冷物鬱遏陽氣於脾土之中並宜服之

羌活　升麻　葛根　白芍藥　人參

獨活　柴胡　甘草　防風　生薑

右件㕮咀如麻豆大每服五錢水三盞煎至一盞去滓溫服忌寒冷之物

大壽易 [illegible] 治五心煩熱是火鬱於地中四肢者脾土也心火下陷於

脾土之中鬱而不得伸故經云火鬱則發之是也

升麻　葛根　柴胡　白芍藥　甘草

防風

右㕮咀如麻豆大每服秤三錢或四錢水二盞入連鬚葱白三寸煎

至一盞去滓溫服 [illegible]

人參散 [illegible] 治 [illegible]

新羅人參　白茯苓　人參　[illegible]　丁香

右為末每服二錢水一中盞生薑二片煎至六分去姜和滓熱

服 [illegible]

地黃散 [illegible] 治心臟積熱口乾煩渴頰赤舌生瘡夜 [illegible]

防風　[illegible]　甘草　人參

右為末每服三錢水一盞入青蒿五七葉同煎至七分去滓溫服

如無青蒿用竹葉五七片

補圖 [illegible] 治心經積熱思慮過多一切白濁日久則 [illegible]

食 [illegible] 成勞 [illegible] 此藥上京心臟下補元氣

肉蓯蓉　[illegible]　石菖蒲　兔絲子

黃香 [illegible]　川楝子

山茱萸　熟地黃

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸食前空心鹽湯下

或下如五淋疾用豆淋酒服

[illegible] 粉丸 [illegible] 治心熱 [illegible] 共 [illegible] 上 [illegible]

寒 [illegible]　辰砂　牛黃　白礬

天竺黃

右為末生薑自然汁糊為丸如梧桐子大每服五丸

麥門冬 [illegible]

以回不來水 [illegible]

止心煩悶 [illegible]

以鹽十服 [illegible]

主心熱煩熱本草 [illegible] 心中煩悶 [illegible] 驚悸
治止消渴除煩令人不睡
米泔並汁飲令人上方之 [illegible] 五十 [illegible] 飲之
治心脾熱舌煩生瘡本草
用藥 [illegible] 各一分入生 [illegible] 研 [illegible]
涎即嘔
解煩悶本草
以白梁米二五升 [illegible] 米作粉食之
治心腹煩躁本草
以乾荔 [illegible] 水研如泥飲之即止
主大毒熱心腹煩 [illegible] 本草
以硝石 [illegible] 水和服之
止煩悶本草
用白冬瓜 [illegible] 搗絞汁服之
李五臟本草

用芥子 [illegible] 研之作粥食
治胃中積熱 [illegible] 止渴本草
以 [illegible] 食之 [illegible] 服 [illegible] 不可食
治 [illegible] 胃熱 [illegible] 本草
取牛李子二七 [illegible] 之十服後甚良細研根如小豆大
搏麵作飯 [illegible] 食尤良
治熱攻心煩 [illegible]
用黑豆 [illegible] 水二升煮取七合去滓食後服之

心胸煩熱 附論

夫心氣盛實氣血壅塞陰陽不和 [illegible] 上焦 [illegible]
羚羊角屑 柴胡 赤茯苓 茅根 赤芍藥
甘草 梔子仁 石膏 麥門冬 黃芩
羚羊角散 [illegible] 治心胸煩熱 [illegible] 止煩痛

右為散每服 [illegible] 錢水一中盞入竹葉七片 [illegible] 煎至六分去滓
不計時溫服
麥門冬散 治心胸煩熱眼目不安 [illegible] 大小便不利口舌生瘡
麥門冬 黃芩 梔子仁 [illegible] 青 黃連
犀角屑 川升麻 小草 甘草
川芒硝
右為散每服一錢水一中盞煎至六分去滓入芒硝 [illegible] 溫服
真珠散 治心胸煩熱口舌乾燥心神不安
真珠粉 琥珀末 寒水石 天竺黃
鐵粉 [illegible] 甘草末 馬牙硝 [illegible]
右同研細令 [illegible]
人參散 治心胸煩熱不思飲食
人參 沙參 赤茯苓 黃耆
麥門冬 柴胡 羚羊角屑 地骨皮 甘草
右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時溫服

當歸散 治心胸中久積煩熱口乾 [illegible]
犀角屑 玄參 黃耆 子芩
麥門冬 川升麻 甘草 [illegible]
右為散每服三錢水中一盞入竹葉七片煎至五分去滓入生地黃
[illegible]
金花丸 [illegible] 治心胸 [illegible] 口乾 [illegible] 心神煩悶
寒水石 石膏 葛根
赤茯苓 烏梅肉 麥門冬 栝蔞根
龍腦
右為末入研了藥令勻煉蜜和丸如梧子大每服一丸嚼破 [illegible]
含化咽津
黃芩散 治心胸煩熱頭痛目疼頭昏不止
黃芩 赤茯苓 麥門冬
石膏 甘草 [illegible] 根
[illegible] 花

右剉散每服二錢水一中盞入豉二七粒竹葉二七片煎至五分去
滓入生地黃汁一合更煎一兩沸不計時候溫服

牛黃散 治心胸煩熱不得安眠

牛黃 不灰木 各半兩

右藥俱是礦石用瓷缽研令極細以水飛過澄乾又以入水浸四五三
二十度後澄令極乾每細細研散每服不計時候以竹葉水調下一錢

食治心胸煩熱

消二日竹瀝飲汁服令人吐之

食治中風煩熱 可多食好生梨即通

中風心人煩 少食之

治心胸煩熱熱風悶急明目頭心熱痛久服好顏色變白去風不忘

用大豆食煮良生服亦佳

治服藥天麥心中煩悶 水生鵝梨 食之大良冬生 煮服五合亦可煮服之

以瀉去五臟中煩悶氣 以竹葉用調食之八月後食之佳

當中有熱或是心躁

用竹葉細研同先以水煮米半升作粥 相拌令勻

乾食之

以竹瀝一合以作粉食之

治熱不解去心中煩以竹瀝 作汁服之

○心臟風熱 附論

夫心為火主於熱血則生熱風邪傳人傷經傷血脈榮氣不行
心臟壅熱邪熱之氣時留不散則令心胸煩躁語多驚故名
心熱也

龍齒散 治心臟風熱心神恍惚煩躁多驚不得眠臥

龍齒 細研 牛黃 細研 甘菊花 半兩 朱砂 細研 羚羊角屑

防風 遠志 細辛 枳殼

天竺黃 細研 茯神 人參 天麻 川升麻

子芩 麥門冬 羚羊角屑 牛黃 研入 龍腦 研一分

右件藥搗細羅為散入研了藥令勻每服食後煎竹葉湯調下一錢

朱砂丸 治心臟風熱多驚忪悸煩燥語澀

朱砂 細研 龍齒 細研 天竺黃 細研 馬牙硝 細研 犀角屑

人參 茯神 川升麻 麥門冬 天麻

麥門冬 遠志 甘菊花 子芩 龍腦 細研

牛黃 細研 甘草

金銀箔

右件藥搗羅為末入研了藥令勻煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服不計
時候以荊芥湯下十丸

牛黃散 治心臟久積風熱煩躁至夜口乾神思不安

牛黃 細研 朱砂 細研 防風 細辛 天竺黃 細研

茯神 龍腦 川大黃 羌活 麥門冬 去心

赤芍藥 白蒺藜 檳榔 羚羊角屑 甘草

梔子人 子芩

右件藥細羅為散入研了藥令勻每服不計時候煎竹葉湯調下一錢

鐵粉散 治心臟風熱痰涎恍惚時多驚悸精神錯亂

鐵粉 細研 龍齒 細研 琥珀 細研 犀角屑 赤茯苓

子芩 石膏 人參 防風

遠志 甘草 金箔 牛黃

右件藥細羅為散入研了藥令勻每服不計時候以溫水調下一錢

川升麻 羌活 葛根

甘草 防風 黃芩

石膏

升麻散 治心臟風熱心煩舌腫口乾頭痛

右件藥搗篩為散每服三錢水一中盞入生姜半分竹葉二七片煎至六分去

[illegible]食後並服

牛黃丸 治心臟風熱口中煩熱神思不安

牛黃 細研 羚羊角屑 朱砂 細研 麥門冬 去心

遠志 去心 茯神 白附子 炮 犀角屑 地骨皮 各半兩

天竺黃 細研 龍腦 細研

右為末入研了藥令勻煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以荊芥薄荷湯下十丸

牛黃散 治心臟風熱口乾舌燥恍惚神情悶

牛黃 細研 羚羊角屑 川升麻 鉛霜 細研 各 玄明粉

甘草 炙微赤剉

右為細散更都研令勻食後以麥門冬湯調下一錢

鐵粉丸 治心臟風熱[illegible]驚悸止煩燥

鐵粉 石膏 大黃 炮 鉛霜 甘草 各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大溫水下二十丸

治心熱心氣 本草

以淡竹瀝[illegible]

利五臟 本草

以桑根白皮煮汁服之

去心臟風熱 本草

以薄荷杵汁服

治心肺風熱壅悶不通口乾唇燥 本草

以葛粉和水服

下心肺五臟熱 本草

以苦竹根細剉一斤以水五升煮取十一升分三服

淨心 本草

以紫花[illegible]十段之[illegible]風示附此[illegible]不敢食[illegible]山荊道人以

此菜從大和進[illegible]食連衣去風此菜常山忽有一種[illegible]

覆以曲作多食之解煩燥[illegible]

右煉道五臟風熱癰 本草

用[illegible]以為去[illegible]取汁服人以易之又以麥飯以[illegible]之食

去五臟風

以蒼耳汁煮粥食之

心熱多汗 附論

夫心主血血行於分肉[illegible]熱則[illegible]理開腠理開則汗出蓋心之液為汗出亡陽傷津熱甚不已則腠[illegible]也○夫血[illegible]緊閉不行心氣壅塞上焦煩熱即多汗出心家於大腑夜為汗令滿氣發泄並行或令汗出也

方

羚羊角湯 治心熱汗出及背悶嘔吐[illegible]不食不生肌

羚羊角屑 地骨皮 秦艽 去苗 麥門冬 去心焙

枳殼 麩炒 大黃 剉 柴胡 去苗 白茯苓 去皮

桑根白皮 剉 芍藥 黃芩 人參

鱉甲 醋炙

右搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓食後服不拘時

骨蒸丸 治心風壅熱煩熱多汗出

地骨皮 一兩 柴胡 去苗 子芩

生乾地黃 麻黃根 知母

川升麻 人參 赤茯苓 各一兩

麥門冬 去心 羚羊角屑 牡蠣粉

甘草 炙微赤剉

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候煎淡竹葉湯下二十丸

降氣湯 治心熱多汗言笑無度四肢煩熱

麻黃 去節 梔子仁 黃芩

白茯苓 去皮 白朮 剉 芒硝 各二兩

石膏 生地黃 桂 去皮 一兩

甘草 炙剉 一兩 赤小豆 合

右搗篩每服五錢水二盞棗二枚煎取一盞下竹瀝少許每煎去滓溫服

七寶湯治心熱口苦舌乾……煩悶不思飲食
方見本門一卷中
犀角湯治心煩熱……
犀角 前胡 黃芩 麥門冬 地骨皮
茯神 人參 麻黃根 知母 甘草
右搗篩每服五錢水一盞半入竹葉二七片煎至一盞去滓食後溫
服忌炙煿熱麵
石膏丸治心臟壅熱口舌乾燥多汗
石膏 栝樓根 麻黃根 烏梅肉
天竺黃 牡蠣 甘草 麥門冬 龍膽
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸新汲水下不拘時
麥門冬散治心實熱血脈壅滯口乾心躁常多汗出
麥門冬 寒水石 川升麻 犀角屑 生乾地黃
天竺黃 麻黃根 甘草
右為細散不計時以竹葉湯調下一錢
柴胡散治心熱多汗及骨蒸盜汗心煩熱
柴胡 知母 防風 芍藥 玄參
黃芩 甘草
右搗麤末每服三錢水一盞半煎至一盞去滓分溫兩服日午臨
卧……加杏仁二十枚去皮尖……研
牡蠣散治心熱汗出不止
牡蠣粉 寒水石 龍膽 朱砂
甘草
右搗羅入乳缽研令細每服半錢新汲水調下不計時服
小麥湯治心熱多汗又心肩客熱嘔逆不食
小麥一合 蘆根 竹茹 人參 白茯苓
右搗篩每服五錢水一盞半煎一盞去滓溫服不拘時
瀉心湯……治熱多汗欲吐不出煩悶喘急頭痛並皆治之
黃連散治心熱汗出及盜汗
黃連 柴胡 前胡

右為細散每服一錢溫酒調下日三
熟乾地黃湯治病熱多汗
以用熟乾地黃五兩剉如麻豆大以水五盞煎至三盞去滓溫分三
服空心日午臨卧服之
治心悶汗出不識人
以水并華水和蜜飲之甚妙
陳艾湯治盜汗只因心液出名曰心汗
用艾 茯苓二兩半為末每服二錢濃煎艾湯調下

心中寒 附論

夫心中寒者心痛徹背背痛徹心……注之狀甚……中寒則寒
必甚心背徹痛則寒邪所藏深矣

桔梗散治心中寒急疼痛肋下……氣噎咽中……不多食宜常食之
桔梗 當歸 芍藥 橘皮 茯苓
厚朴 白朮 人參 吳茱萸 檳榔
桂心 訶黎勒皮
右為散每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚煎至八分去滓空心溫服日三
赤石脂丸治心中寒心背徹痛
赤石脂 乾薑 烏頭 人參
細辛 桂 蜀椒
右為末煉蜜和丸梧桐子大每服五丸食前米飲下日三未效漸加
丸數以知為度
吳茱萸湯治中寒心痛
吳茱萸 乾薑 厚朴 附子 甘草 芎藭
右搗篩每服五錢水一盞半棗二枚擘破同煎至一盞去滓溫服不
計時日三如人行十里再服
薑附丸治中寒心痛徹背背痛徹心或心下結實
附子 乾薑 烏頭

右爲末煉蜜和丸梧桐子大空腹以酒下二十丸日三夜一未効稍加

丸數

大腹皮丸 治心中寒發痛甚

大腹皮 吳茱萸 高良薑 芍藥

右爲散每服二錢溫酒調下不飲酒生薑湯亦得

又茱萸丸 治心中寒痛脇下[illegible]中[illegible]食不[illegible]

吳茱萸 桂心 當歸

右爲末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸溫酒下漸加至四十丸

八常散 治中寒脉浮當吐 ○全生指迷方 張德明閣中服中

吐迷甚多[illegible]

瓜蒂 赤小豆一分

右搗羅拌勻每服一錢以香豉一合熱湯一盞煮作稀糜去滓

取汁調散溫頓服之不吐者少加服之快吐乃止諸亡血虛人不可

服一方熱水調散一錢藥入半錢得吐即止張德明閣中服三錢方吐

數日後又服遠金壺

一方治心臟中風心中常如寒熱[illegible]冷汗自出言語[illegible]

不多方[illegible]

細辛 遠志 人參 五味子 菖蒲

芎藭 杜蘅 防風

右件藥細杵羅爲末每服二錢水一盞煎取八分空心和滓去滓

溫服

心健忘 附論

夫健忘之病本於心虛血氣衰少精神昏憒故志動亂而多忘也蓋心

者君主之官神明出焉[illegible]

致使疾故[illegible]其返

也雖曰此證皆出[illegible]其心[illegible]神舍不清[illegible]

而[illegible]

方

菖蒲丸 補心益智治健忘除虛損

菖蒲 熟乾地黃 麥門冬 天門冬 杜仲

白茯苓 人參 丹參 防風 柏子人

百部 遠志 五味子 桂心 薯蕷

右爲末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大食前以溫粥飲下二十丸

檀香丸 治心常忪悸恐惧多忘

檀香 菖蒲 犀角 天竺黃 生乾地黃

蘇合香油 桂 甘草 白茯苓

遠志 天門冬 人參

右除蘇合香油外爲末以蘇合香油同少酒化入煉蜜丸如櫻桃大食

後含化一丸

白石英散 治心氣虛精神不足健忘陰痿不起懶語多驚

恐虛即小便白數怒多恚失精使心則小便赤

白石英 人參 藿香葉 白朮 芎藭

紫石英 甘草 細辛 石斛 菖蒲

續斷

右爲麤散每服二錢水一盞煎至七分去滓空心溫服

烏犀丸 治心虛驚悸健忘精神恍惚言語無度心中忪悸夢寐不定恍

犀角 羚羊角 龍齒 茯神 人參

遠志 麥門冬 酸棗人 丹砂 鐵粉

龍腦

右爲末煉蜜和爲劑旋丸如雞頭大每日空心臨臥時嚼一丸溫酒下金

銀薄荷湯亦得小兒可服半丸

薯蕷丸 補心益智安神除忘

薯蕷 牛膝 人參 白茯苓 附子

枸杞子 遠志 桔梗 天門冬 菖蒲

桂心

右爲末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前溫酒下

三十丸 一方有麥子無桂心

歸神丹 治一切驚憂思慮恍惚作事多忘心氣不足癲癇狂亂及

大病後心虛神不守舍又服養神丹益眼力
硃砂 [illegible] 金箔 [illegible]
眞珠 [illegible] 酸棗仁 [illegible]
遠志 [illegible] 白茯苓 [illegible] 當歸 [illegible]
龍齒 [illegible]
右爲末酒煮糊丸如梧桐子大每服二丸至三丸去心麥門冬湯下顛病甚者乳香人參湯下夜臥不寐或多亂夢妙酸棗仁湯下

遠志散 治心臟氣虛上健忘安神養氣常服
茯神 益智 防風 人參
藿香葉 甘草 沉香 熟乾地黃 [illegible]
右爲散每服二錢水一盞煎至七分空心去滓溫服一方加澤瀉

養神丸 治心氣不足驚悸多忘
遠志 麥門冬 菖蒲
人參 茯神 甘草 白朮 熟乾地黃 山芋
右爲末煉蜜和丸搗三二百下丸如梧桐子大每服三十丸食後米飲下

二丹丸 治健忘養神定志和血以安神外華腠理
熟地黃 天門冬 丹參 茯苓 甘草
遠志 麥門冬 人參 硃砂
右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服五十丸至百丸空心煎愈風湯下常服安神定志一藥清肺… [illegible]

人參丸 [illegible] 方有菖蒲
人參 [illegible] 石斛 杜仲 桂心 遠志
菖蒲 白茯苓 [illegible] 柏子人
右爲末煉蜜和搗一二百杵丸如梧桐子大食前溫酒下二十丸
補心虛治健忘令耳目聰明宜服此方 [illegible]

[illegible] 石 [illegible] 熟乾地黃
菖蒲 [illegible] 柏子人 [illegible]
右爲末煉蜜和搗一二百杵丸如梧桐子大每服溫酒下二十丸
益智丸 治 [illegible] 明耳目
茯苓 [illegible] 桂心
右爲末蜜丸如梧桐子大一服七丸加至二十丸日三夜一禁如藥法
一方用溫酒 [illegible] 下
八味散 [illegible] 益智
天門冬 桂心 茯苓 熟乾地黃 五味子
菖蒲 遠志 石葦
右擣篩爲散食後或酒或水服方寸匕三十日力倍六十日氣力強志意足

歸脾湯 治思慮過制勞傷心脾健忘怔忡
人參 茯神 黃芪 龍眼肉 酸棗人
白朮 木香 甘草
右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片棗一枚煎七分去滓溫服不拘時

人參湯 治善忘小便赤黃喜忘人或多唇水中恐畏恍惚目視䀮䀮不明吸悸不知人安神定志
人參 甘草 半夏 龍骨
遠志 麥門冬 石膏 熟乾地黃
右擣篩每服五錢水一盞半大棗二枚擘破小麥五十粒煎八分去滓入麥門冬一合煎至半盞再煎少頃食後溫服日三

桂心湯 治驚悸失志健忘
桂心 白龍骨 防風 遠志 麥門冬
牡蠣 甘草 茯神
右剉如麻豆每服五錢水一盞半入大棗二枚擘破煎八分去滓空心溫服日三

遠志散 補心定志益智明目

遠志去心 人參 菖蒲 熟乾地黃
茯神 [illegible] 菖蒲 [illegible] 桂心
右爲細散 [illegible]
養命開心益智方 [illegible]
乾地黃 人參 茯苓 [illegible] 肉蓯蓉 [illegible] 五味子
遠志 [illegible] 蛇床子 [illegible]
右擣下篩服方寸匕日二 [illegible]
加味茯苓湯 治痰迷心包健忘失事言語如癡
人參 [illegible] 半夏 [illegible] 陳皮 [illegible] 白茯苓 [illegible] 粉草 五分
益智 去殼 香附子 [illegible]
右每服 [illegible] 水一盞半薑三片 [illegible] 煎 [illegible] 不拘時溫服
七聖丸 治健忘 [illegible]
[illegible] 茯苓 [illegible] 桂 [illegible] 遠志 [illegible] 人參
天門冬 [illegible] 菖蒲 [illegible] 地骨皮 [illegible]
右爲末煉蜜丸如梧桐子大食後米湯下三十丸 [illegible]
[illegible]
定志丸 治心氣不定 [illegible] 不足甚者憂愁悲傷不樂忽忽喜忘 [illegible]
[illegible] 朝 [illegible] 不安 [illegible] 狂 [illegible] 多 [illegible] 不祥 [illegible] 涉險
[illegible] 心神 [illegible] 不安 [illegible] 恍惚 [illegible] 明 [illegible] 心神 [illegible] 人不 [illegible]
菖蒲 [illegible] 遠志 [illegible] 茯神
人參 [illegible] 辰砂 [illegible]
右爲末 [illegible] 梧子大 每服 [illegible] 十 [illegible]
[illegible] 名開心散
[illegible]
[illegible] 方中 [illegible] 無朱砂
[illegible] 不安 [illegible]
人參 遠志 [illegible] 牡丹皮 [illegible]
沉香 [illegible]
右爲散每服二錢水一盞煎八分溫服不拘時
治多忘令人不忘
菖蒲 [illegible] 茯苓 [illegible] 茯神 [illegible] 人參 [illegible] 遠志 [illegible]
右爲散酒服方寸匕日三夜一五日後知神良開心散無茯神 [illegible]

又方 千金方
蓯蓉 續斷 [illegible] 遠志 菖蒲 茯苓各三
右爲散酒服方寸匕日三至老不忘
遠志散 治心虛健忘補心氣強力益志
遠志 去心 菖蒲 一兩 白茯苓 [illegible] 人參 一兩半
右爲散食後酒調方寸匕日二夜一
山芋丸 治心脾氣虛 [illegible] 恍惚健忘煩悶 [illegible]
山芋 熟乾地黃 [illegible] 菖蒲 半兩 遠志 去心 [illegible]
右爲末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸溫酒或米飲下不拘時
[illegible] 服
[illegible] 散 千金方 治善忘開心強力益志
[illegible] 甲 [illegible] 龍骨 [illegible] 遠志 [illegible] 菖蒲 [illegible]
右爲散酒服方寸匕日三常服令人大聰一方食後水服
治健忘 千金方
天門冬 遠志 茯苓 乾地黃 等分
[illegible]
右爲末煉蜜丸如梧桐子大酒服二十丸日三加至三十丸常服勿絕
茯神散 [illegible] 補心 [illegible] 治健忘久服聰明益智
茯神 [illegible] 人參 [illegible] 熟乾地黃 [illegible] 菖蒲 [illegible]
遠志 [illegible] 天門冬 [illegible]
右爲散每服三錢水一中盞棗三枚煎至六分去滓食後溫服
[illegible] 知散 [illegible] 服聰明益智 [illegible]
龍骨 [illegible] 虎骨 [illegible] 遠志 [illegible]
右爲散食後方寸匕日二 一方酒服方寸匕 一方生薑湯下
又方 [illegible]
以七月七日取菖蒲一斤人參二兩 [illegible]
益知四方之事 一方 [illegible] 溫 [illegible]
治人心昏塞多忘喜誤
取商陸花陰乾百日擣末日暮水服方寸匕 [illegible]
中自覺 [illegible]
治好忘久服聰明益智 [illegible]

常以五月五日取東向桃枝日未出時作三寸木人著衣帶中令人
不忘矣 一方戊子日取東邊桃枝二七枚縛著床中枕之不忘

治人心昏塞忘喜誤方

以七月七日取蜘蛛網著衣領中勿令人知則不忘

治人心昏憒多忘喜誤

以丙午日取鱉甲著衣帶上良 一用五月五日

治人心昏塞多忘喜誤

以丁酉日密自至市買遠志著巾角中還為末服之勿令人知 一方
著衣常帶之令人不忘 抱朴子云陵陽仲子服遠志二十年開書所
視便記而不忘

治好忘久服聰明益智

以七月七日取菖蒲為末服方寸匕飲酒不醉好事者服而驗之不
可犯鐵若犯之令人吐逆 一方常以甲子日取石上菖蒲一寸九節者
陰乾百日治下篩服方寸匕日三耳目聰明不忘

治人心孔惛塞多忘喜誤

取牛馬猪雞心干之末向日酒服方寸匕日三 聞一知十

養生方

男子勿以首北臥神覺不安多忘

定心丸 治驚悸健忘神志不安[illegible]重腳弱行步[illegible]精神恍惚小便頻數常服益心氣補
丹田婦人常服有子

白茯苓 破故紙

右為細末酒糊為丸如梧桐子大空心食前溫酒米飲下三四十丸

排風湯 治健忘

茯苓 茯神 酸棗仁 人參 黃耆
當歸 白芍藥 遠志 甘草 蓮肉

右㕮咀每服[illegible]煎服

琥珀丸 安神養志[illegible]養精血[illegible]益營衛

人參 [illegible] 附子
遠志 沉香 龍骨 琥珀 巴戟

防風 半夏 蓮子 紫石英 白茯苓
石菖蒲 茯神 熟地黃 柏子仁 乳香
麥門冬 牡蠣 辰砂 酸棗仁

右件為細末次入辰砂乳香琥珀末和勻人參[illegible]煉蜜和丸如梧
桐子大每服五十丸日午及臨臥溫熟水送下

定志丸 治怔忪健忘精神恍惚[illegible]不寧[illegible]心痺

人參 白茯苓 石菖蒲 遠志 龍齒
酸棗仁 鐵粉 朱砂 麥門冬 乳香
麝香 琥珀

右件各等分為末入朱砂鐵粉同研勻絞生地黃汁浸蒸餅為丸如
梧桐子大別用朱砂為衣每服二十丸溫熟水下

養心丸 治憂愁思慮太過健忘怔忪驚悸多恐懼夢多寢眠盜汗不止
五心煩熱口苦舌乾日漸羸瘦全不思食

茯神 黃耆 酸棗仁
熟乾地黃 遠志 五味子 柏子仁

朱砂

右件為細末入麝香和勻研細煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸
食後臨臥煎人參湯送下

遠志丸 治[illegible]心神恍惚健忘[illegible]不寧

遠志 石菖蒲 茯苓 天竺黃
酸棗仁 朱砂 龍齒

右件除別研外並為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸溫熟
水送下食後臨臥

真珠丸 治心氣不足上焦虛熱[illegible]上盛臥不寧身體發熱
口燥咽乾

真珠末 白朮 朱砂 白茯苓
人參 麝香 附子

右件為末用猪心血為丸如梧桐子大朱砂為衣每服三十丸煎人參
湯送下食後

主鎮安丸 琥珀壽方

求真珠如大豆以安一枚研和一服與豆許日三大宜小兒
安魂鎮神令人聰明 出外臺
研朱根具勿和蜜食之

怔忡驚悸 附忘

夫怔忡者此心血不足也蓋心主於血血乃心之主心乃形之君血富則心君自安矣多因汲汲富貴戚戚貧賤又思所愛觸事不意真血虛耗心帝失輔漸成怔忡怔忡不已變生諸證舌[illegible]恍惚善悲少顏色皆心病之候難經云損其心者益其營法當專補真血真血若富心帝有輔無不愈者矣又有因感風寒暑濕閉塞諸經令人怔忡五飲停蓄堙塞中脘亦令人怔忡當隨其證施以治法○驚悸與怔忡不同驚悸有所大驚或聞虛響或見異相登高陟險驚忤心神氣與涎鬱遂使驚悸名曰心驚膽寒在心膽經屬不內外因其脈必動怔忡則因汲汲富貴戚戚貧賤久思所愛遽失所重觸事不意氣鬱涎聚遂致怔忡心脾經意思所主屬內所因或因寒暑濕塞閉諸經令人忽忽若有所失恐恐如人將捕中脘忪悸此乃外邪非內心病況五飲停蓄閉於中脘最使人忪悸治屬飲家[illegible]悸與外內因所治○人之所主者心心之所養者血心血一虛神氣不守此驚悸之所肇端也曰驚曰悸其可無辨乎驚者恐怖之謂悸者怔忪之謂心虛而鬱痰則耳聞大聲目擊異物遇險臨危觸事喪志心為之忤使人有惕惕之狀是則為驚心虛而停水則胸中滲漉虛氣流動水既上乘心火惡之心不自安使人有怏怏之狀是則為悸驚者與之豁痰定驚之劑悸者與之逐水消飲之劑所謂扶虛不過調養心血和平心氣而已若一切以刚燥風藥或[illegible]者[illegible]自熱主風之證[illegible]心為帝王神之所舍諸藏之主不受外邪若人動止非宜寒熱失節臟腑內損氣血外傷鬼邪乘虛入於心經則令人心神不足性識失常宜壽下[illegible]或安或哭精神離散恍惚不恒故名鬼邪也

方

鎮心丸 [illegible] 治男子婦女虛損夢語驚悸或哭精神衰惆人亦白注漏或月水不利風邪男子虛勞熱及肢中積聚夏重結氣諸病宜服

紫石英 茯苓 菖蒲 蓯蓉 遠志

麥門冬去心 大黃 當歸 細辛 卷柏

大豆卷 乾姜 防風 人參 澤瀉

秦艽 丹參 石膏 芍藥 柏子人各三分

烏頭 桂心 桔梗 甘草 薯蕷各七分

白斂 鐵精 銀屑 前胡 牛黃各二分

乾地黃 白朮 半夏各八分 䗪蟲 大棗五十枚

右為末蜜棗和搗五千杵丸如梧桐子大酒服五丸日三加至二十丸一本無大豆卷大棗

大鎮心丸 [illegible] 所治與前方大同凡是心病並皆主之

乾地黃 牛黃 羌活 桂心 麥門冬

秦艽 茯苓 人參 遠志 紫石英

丹砂 阿膠 甘草 大黃 銀屑

白斂 當歸 乾姜 防風各八分 杏人

蜀椒 澤瀉 黃芩 茯苓 大豆卷

薯蕷 茯神 前胡 鐵精 柏子人各五

[illegible]

大棗四十枚 赤蟾蜍十二枚

右為末白蜜棗和丸酒服七丸日三加至二十丸

神明補心丹 [illegible] 治心氣不足神志不寧健忘多驚虛煩少睡心情沉默惡聞人聲一切心虛之證並可常服

遠志 紫石英研 石菖蒲 熟地黃 白茯苓去皮各

丹參 人參 巻柏 麥門冬去心 黃耆

白朮 澤瀉 山茱萸 防風 秦艽

桔梗 川芎 柏子人 白斂 乾山藥

石膏研 神麯炒 當歸 半夏 陳皮

鐵粉研 芍藥各 朱砂 [illegible]

右為末入朱砂令勻煉蜜和丸每兩作十丸朱砂為衣每服一丸人參湯化下温酒亦得不拘時服

大鎮心散 [illegible] 治心虛驚悸夢寐恐畏

紫石英 茯苓 防風 人參 甘草

澤瀉各八 黃耆 秦艽 白朮 薯蕷

已[illegible]麥門冬[illegible]茯神[illegible]桔梗 大黃

栢子人 桂心 遠志 大黃 石膏

蜀椒 竹葉 乾姜 細辛

右為散每服二方寸匕日二 一方無紫石英茯苓有乾姜有大棗

四次蜜丸如梧桐子大每服十五丸

熟乾地黃丸 治心臟風虛多驚悸神思昏亂喜忘不定

熟乾地黃 白茯苓 黃耆 獨活 桂心

秦艽 麥門冬 [illegible] 人參

前胡 栢子人 牛黃 芎藭

遠志 紫石英 防風 甘草

鐵精 人參 [illegible]

右為末入研了藥令勻煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服不

計時以溫酒下十丸

牛黃丸 治心臟風邪狂亂失志不得安定

牛黃 鐵精 白石英 龍齒 地骨皮

[illegible]

升麻 玄參 [illegible] 乾地黃

黃芩 茯神 人參 麥門冬

枳實 甘草 金銀箔

朱砂 虎睛一對

右為末都研令勻煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大不計時薄荷湯

竹葉湯下十丸

鎮心安神湯 治心中不安上盛下虛人神不寧多驚悸小便數白濁常服鎮心安神

石菖蒲 甘草 人參 赤茯苓

當歸 南星 陳皮 乾山藥 紫苑

半夏 川芎 五味子 細辛 栢子仁

枸杞子 酸棗仁 麥門冬

通草 覆盆子

右㕮咀每服四錢水一盞半姜一匙煎至七分去滓取帶冷入麝香少許

再煎一二沸溫服不拘時

牛黃散 治心臟風邪神思恍惚[illegible]

牛黃 龍齒 朱砂 雄黃 麝香

沙參 [illegible] 羚羊角 [illegible] 白花蛇

[illegible] 大黃 防風 [illegible] 細辛

麥門冬 茯神 人參

右為散入研了藥都研令勻每服不計時煎金銀湯調下一錢服

鎮心散 治心臟[illegible]心神不安[illegible]忘不定精神恍[illegible]

[illegible]

桂心 防風 遠志 麝香 甘草

人參 麥門冬 菖蒲 茯神 琥珀

雄黃 蛇蛻皮 朱砂

右為散都研令勻每服不計時以麥門冬湯調下一錢

遠志湯 治心氣虛驚悸喜忘不進食

遠志 乾姜 白朮 桂心 黃耆

當歸 防風 當歸 人參 茯苓

甘草 芎藭 茯神 羌活 麥門冬

半夏 大棗 五味子

右㕮咀以水一斗二升煮取三升半分五服日三夜二

菖蒲散 治心臟風邪虛氣恍惚悲泣狂走如有鬼神之狀身體強直或疼痛口噤喉痹水漿不通時自發不識人者

菖蒲 秦艽 桂心 當歸 蔓荊子

人參 附子 黃芩 甘草 遠志

防風 龍骨 赤石脂 白茯苓 白芍藥

芎藭 漢防己

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

小鎮心丸 治心氣少弱驚虛振悸胸中逆氣魘夢參錯謬忘恍惚

紫石英 朱砂 茯神 銀屑 雄黃

菖蒲 人參 桔梗 乾姜 遠志

甘草 當歸 桂心 防風 細辛

鐵精 防己

右為末，蜜丸如大豆，每服十丸，日三，稍至二十丸。一方用茯苓二分。

法丹 治男子婦人心氣不足，神志不寧，一切心疾，憂愁思慮，謀用過度，或因驚恐傷神失志，耗傷心血，怔忡恍惚，夢寐不安。

新羅人參 熟乾地黃 遠志 白朮 當歸

黃耆 茯苓 石蓮肉 茯神 益智仁

麥門冬 酸棗仁 石菖蒲 柏子仁 朱砂

右加人參等各如法製碎，拌勻，以新藥袋盛[illegible]，用[illegible]以大瓦上蓋大銀鍋一口，著長流水令及七分，重安銀鍋，入以少麥二十斤，[illegible]袋懸於中，勿令著底，使懸煮，[illegible]以桑柴燒，勿令火歇，煮三日夜足，住火，取出，淘去藥，淨砂令乾，入牛心內，蒸七次，[illegible]銀一口，候大鍋水[illegible]，溫水[illegible]心，如前去蒸，凡換七次，其砂已熟，即用溫水淘[illegible]，乾，以乳鉢研，直候十分細，米糊為丸如豌豆大，陰乾，每服十粒至二十粒，食後參湯、棗湯、麥門冬湯任下。一方無本[illegible]，用[illegible]棗[illegible]煩[illegible]有甘[illegible]

鎮心丸 治心風光惚，驚悸失志，或喜或悲，恚怒不常。

紫石英 朱砂 白石英 龍齒 人參

細辛 赤箭 天門冬 熟乾地黃 白茯苓

犀角屑 沙參 菖蒲 防風 遠志

右為末，都入乳鉢更同研令勻，鍊蜜和搗三二百杵，丸如梧桐子大，每服不計時候，溫酒下三十丸。

人參茯苓湯 治心氣忽忽，頭眩，喜夢驚怵，心神恐懼，不下食，陰陽氣衰，脾胃不磨，不欲聞人聲，定志下氣。

人參 茯苓 遠志 甘草 生姜

桂心 當歸 龍齒 桔梗 茯神

半夏 枳實 當骨 大棗

右㕮咀，以水一斗，先煮粳米五合，熟去滓，入藥，煮取四升，服八合，日三夜二。

大定心湯 治心氣虛悸，恍惚多忘，或夢寤驚魘，志少不足。

人參 茯苓 茯神 遠志 赤石脂

龍骨 乾姜 當歸 甘草 白朮

芍藥 桂心 紫菀 防風 大棗

右㕮咀，以水一斗二升，煮取三升半，分五服，日三夜二。

鐵精丸 治心臟風虛，驚悸恍惚，悲愁妄語失志。

鐵精 龍齒 朱砂 熟乾地黃 人參

白茯苓 遠志 甘草 白薇 獨活

茯神 麥門冬 防風 赤石脂 白朮

右為末，入研了藥，都研勻，鍊蜜和搗三二百杵，丸如梧桐子大，每服不計時候，粥飲下二十丸。

龍齒散 治心風恍惚，驚恐，心氣不安。

龍齒 防己 麥門冬 黃耆 人參

獨活 羚羊角 生乾地黃 白茯苓 甘草

細辛 桂心 遠志 杏人

右為散，先以水一大盞，入銀一兩，煎六分，去銀，次入藥末四錢，又煎至四分，去滓，入竹瀝半合，更煎一兩沸，不計時溫服。

小鎮心散 治心氣不足，虛悸恐畏，悲思恍惚，心神不定，惕惕然驚。

人參 遠志 白朮 附子 乾地黃

赤小豆 桂心 黃耆 細辛 乾姜

龍齒 防風 菖蒲 茯苓

右為散，酒服二方寸匕，日三服。

紫石英散 治心臟風虛，驚悸善忘，或瞋恚悲愁，志意不樂，恍惚。

紫石英 防風 人參 細辛

羚羊角 遠志 朱砂 龍骨 白鮮皮

熟乾地黃 鐵精 甘草 白茯苓

牛黃

右為細散，入研了藥令勻，每服不計時候，煎棗湯調下一錢。

心腎丸　治水火不既濟，恍惚多忘，心忪盜汗，夜夢驚恐，目暗耳鳴，腰痛足痿，
不勝肢節痠疼，小便赤濁，精滑遺泄，心神補氣
血，生津液，進飲食，安神定志。

牛膝　當歸　茯神　鹿茸
附子　五味子　黃芪　人參　遠志
熟地　山藥　當歸　白茯神
龍骨　菟絲子

右爲末，用浸藥酒煮麵糊爲丸，如梧桐子大，每服五七十丸，棗湯
下，空心食前服。

大定心散　治心風虛悸，恍惚多忘，或夢寐驚魘。

人參　茯神　熟乾地黃　遠志　龍齒
白朮　琥珀　白芍藥　紫菀　防風
赤石脂　柏子仁　甘草

右爲散，每服四錢，水一中盞，棗三枚，煎至六分，去滓，不拘時溫服。

真珠丸　治心膽虛怯，恍惚夜臥驚恐，不得眠。

真珠　琥珀　朱砂　雄黃
胡黃連　遠志　烏犀角　牛黃
鐵粉　龍腦　麝香　虎睛

右爲末，入研了藥和勻，煉蜜和搗三二百杵，丸如綠豆大，每服
五丸，不計時，煎金銀薄荷湯下。

湯　治心虛驚悸，少睡。

前胡　白朮　茯神　當歸
川芎　酸棗仁
柏子仁　五味子　人參　甘草

右爲末，每服三錢，水一盞半，棗二枚，同煎服。

保命丹

遠志丸　治心臟風虛，多驚悸。

遠志　白朮　茯神　防風　麥門冬
細辛　龍骨　人參　桂心　熟乾地黃
杏仁　牛黃　紫菀　甘草　虎睛

右爲末，入研藥令勻，煉蜜和搗二三百杵，丸如梧桐
子大，每服不計時，溫水下二十丸。

茯神湯　治思慮過制，耗傷心血，心帝無輔，怔忪恍惚，善悲憂，少顏
色，夜多不寐，小便或濁。

當歸　黃芪　小草　酸棗仁
麥門冬　茯神　白芍藥　紫石英
木香　人參　甘草　柏子仁

右㕮咀，每服四錢，水一盞半，生薑五片，棗一枚，煎至七分，去滓
溫服，不拘時。

靜神丹　治心血虛寒，怔忪不已，痰多恍惚。

龍齒　遠志　酸棗仁　當歸
附子　官桂　琥珀　南星
木香　紫石英　沉香　熟地黃

右爲末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，每服五十丸，用棗湯送下，
不拘時。

柏子仁散　治心臟風邪，恍惚，飲食不下。

柏子仁　桂心　赤茯苓　半夏　人參
當歸　獨活　羚羊角　遠志　麥門冬
麻黃　甘草

右爲散，每服三錢，水一中盞，生薑半分，煎至六分，去滓，不計時
溫服。

虎睛散　治心臟風邪，恍惚，不識水火。

虎睛　赤茯苓　桂心　防風
獨活　人參　甘草　天雄
烏頭　石菖蒲　石長生　桑寄生

右爲細散，每服不拘時，煎金銀湯調下一錢。

茯神散　治心臟風虛，四肢驚悸，心忪恐懼，或狂叫妄走，如見鬼神，
發如癲癇，時時發動。

茯神　升麻　麥門冬　羚羊角　鐵粉
人參　白鮮皮　防風　杏仁

薯蓣各[illegible] 甘草[illegible]

右為散，每服[illegible]，以酒[illegible]水一中盞，煎至六分，去滓，不拘時溫服。

茯神丸 治心臟風虛，驚悸心忪，常多健忘

茯神 人參 麥門冬 熟乾地黃 黃芩

羚羊角 菖蒲 柏子人 甘菊 薯蓣

防風 [illegible] 遠志

右為末，煉蜜和搗三二百杵，丸如梧桐子大，每服不計時，溫酒下二十丸。

麝香丸 治心臟風虛，驚悸心忪，或夜間常如見鬼神，心神不定

虎睛 金箔 鐵粉 光明砂

雄黃 牛黃 琥珀 真珠 龍齒

麝香 人參 茯神

右件搗研如粉，以煉蜜和丸如菉豆大，每服不計時，以金銀湯下七丸。

[illegible]之八 六十一

[illegible]散 治心臟風邪，神思恍惚，悲愁憂恚，喜忘失聲

[illegible] 菖蒲 細辛 附子 乾薑

天雄 桂心 茯苓 白朮 遠志

甘草

右為散，每服[illegible]，以水一中盞，煎至[illegible]，不計時溫服。

寧志丸 治心臟風虛多驚

人參 白茯苓 茯神 柏子仁 琥珀

當歸 酸棗仁 遠志

乳香 朱砂 石菖蒲

右為末，煉蜜丸如梧桐子大，每服三十丸，食後棗湯下。

補心湯 治心氣不足，其病苦驚悸汗出，心中煩悶，短氣，喜悲，意不自得，常苦咽痛，口唇黑，嘔吐血，舌本強，不通水漿

紫石英 茯苓 人參 遠志 當歸

茯神 甘草 紫菀 麥門冬 赤小豆

大棗

右㕮咀，以水一斗，煮取三升，分三服。

白茯苓散 治心臟風虛，驚悸好忘，恍惚，安定神志

白茯苓 桂心 人參 熟乾地黃

遠志 甘草 防風 黃耆

麥門冬 鐵粉

右為散，每服[illegible]，以水一中盞，入生薑[illegible]，棗三枚，煎至六分，去滓，不拘時[illegible]

犀角散 治心臟風邪，恍惚失常，語言失錯

防風 人參 [illegible] 茯神

羚羊角 天麻 防風 桂心 甘草 遠志

右為散，每服[illegible]，以水一中盞，煎至六分，去滓，不拘時溫服。

[illegible]湯 治心臟虛損，驚悸，夢寐不祥，[illegible]

或[illegible]飲食[illegible]心虛[illegible]

半夏 [illegible] 白茯苓

[illegible]之八 六十二

[illegible] 大棗 遠志 [illegible] 甘草 [illegible]

右為散，每服[illegible]，以水[illegible]，煎[illegible]，不以時服。

沙參散 治心臟風虛，恍惚多忘驚恐

沙參 白茯苓 遠志 犀角屑 甘草

防風 龍齒 天門冬 生乾地黃

右為散，每服[illegible]，以水一中盞，[illegible]二枚，煎六分，去滓，不拘時溫服。

小草散 治心風煩悶，恍惚，時復驚悸，不自覺知發作有時

小草 柏子人 茯苓 天竹黃

生乾地黃 琥珀 犀角屑 龍齒

右為細末，入研了藥令勻，每服[illegible]，以竹葉湯調下[illegible]

龍骨散 治心風恍惚，驚悸[illegible]，悲傷不息

龍齒 白茯苓 柏子人 麥門冬 寒水石
硃砂 牛黃 甘草 [illegible]
右為細散，每服一錢，以金銀湯放溫調下。
茯神散 治心臟風邪，夢中驚悸，恍惚
茯神 人參 菖蒲 [illegible]
赤小豆 [illegible] 遠志 [illegible] 甘草 [illegible]
右為散，每服二錢，水一中盞，[illegible]
人參丸 治心臟風虛，心神驚悸，恍惚不安
人參 [illegible] 鐵粉 [illegible] 茯神 白朮
麥門冬 甘草 防風 [illegible] 金銀箔
右為末，煉蜜和搗三二百杵，丸如梧子大，每服
[illegible]
七聖散 治心氣不足，安神定志
琥珀 當歸 川芎 沒藥 [illegible]

乳香 辰砂 [illegible] 麝香 [illegible]
右為末，猪心血為丸如梧桐子大，每服三十丸，溫酒下，空心日午臨臥
各一服，大能安神養志。
[illegible]
[illegible] 菖蒲 茯神 [illegible] 遠志 [illegible]
右為末，[illegible]，每服三十丸
茯苓 [illegible]
青茯苓 半夏 茯神 [illegible] 麥門冬
甘草 [illegible]
右以[illegible]水[illegible]，煎七分，去滓溫服，不拘時。
牛黃鐵粉丸 [illegible]
牛黃 鐵粉 [illegible] 白石英 [illegible]
茯神 [illegible] 人參 [illegible]

乙為末，入研藥和勻，煉蜜丸如梧子大，每服五十丸，煎人參湯
下。
金箔散 治心虛驚悸，神思不安
菖蒲 [illegible] 甘草 [illegible] 茯神
麥門冬 [illegible]
茯神散 治心風，恍惚，語言錯亂
右為散，每服三錢，水一中盞，煎六分，去滓溫服
茯神 人參 防風 犀角屑
鐵粉 菖蒲 金箔
右為細散，[illegible]，每服以金銀湯調下一錢
麥門冬湯 治心不安，[illegible]
甘草 人參 [illegible] 桂 生薑 大棗 麻仁
麥門冬
右為細末，每服三大錢，水一盞半，煎至八分，入清酒
片[illegible]，溫和服，日三服，不拘時。

小定心湯 治虛羸，心氣驚弱多魘
茯苓 桂心 甘草 白芍藥 乾薑
遠志 人參 大棗
右以水八升，煮取二升，分四服，日三夜一
[illegible] 治心臟虛，驚悸，神思不安
菖蒲 茯神 遠志 防風 甘草
人參 麥門冬 [illegible]
右為散，每服三錢，水一中盞，生薑半分，棗三枚，煎至六分，去滓不
[illegible]
加味四七湯 治心氣驚怯，[illegible]
半夏 白茯苓 厚朴 茯神 紫蘇葉
遠志 甘草 [illegible]
右剉，每服四錢，水一盞，生薑七片，石菖蒲半寸，棗一枚，煎服。
化痰丸 治心臟風熱，[illegible]
鐵粉 龍齒 [illegible] 朱砂 [illegible] 麝香 [illegible]

金箔 銀箔各二十片
右件研如粉，煉蜜和丸如梧桐子大，每服五丸，竹瀝
湯下
遠志丸 治心虛勞思，驚悸，神不守舍
遠志去心 茯神去木 黃耆 熟地黃 人參各一兩
石菖蒲 當歸
右為末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服三十丸，不拘時
人參散 治心臟風虛，神情恍惚
人參 羚羊角 赤茯苓 菖蒲 甘菊各
龍齒
右為末，每服二錢，水一中盞，煎至六分，去滓，不計時候溫服
遠志丸 治因事有所大驚，夢寐不祥，登高涉險，神魂不安，驚悸
恐怯
遠志 石菖蒲 茯神 白茯苓 人參
龍齒
右為末，煉蜜為丸如梧桐子大，辰砂為衣，每服七十丸，用熟水送下，
食後臨臥服。一方有麥門冬湯下
[illegible]
白朮 茯苓 半夏 肉桂
甘草
右剉散，每服三錢，水一盞半，薑三片，棗一枚，煎，溫服，不拘時
遠志丸 治精神恍惚，坐臥不寧，鎮心安神
遠志 麥門冬 人參 酸棗仁
甘草
右為末，煉蜜丸如梧桐子大，每服三十丸，空心溫酒下
[illegible]
有
茯神 人參
菖蒲 朱砂
右為末，煉蜜丸如梧桐子大，以朱砂為衣，每服三十丸，不拘時

下，空心煎人參湯下
補心湯 治心虛，驚悸不寧
遠志 白茯苓 人參二兩
右三味，以水一斗，煮取三升，分三服
茯苓甘草湯 治心下停水，怔忡
茯苓 桂枝 甘草 生薑
右剉，每服水煎服
遠志散 治心氣不足，心痛驚恐
遠志 蒲黃 人參 茯苓
右以水一斗，煮取三升半，分三服
朱砂安神丸 治心煩懊憹，心神顛倒
[illegible]
朱砂 黃連 生甘草
右為末，蒸餅為丸如黍米大，每服十五丸，津液嚥下
寒水石散 治因驚心氣不行，鬱而生涎，涎結為飲，遂成大疾，
忪悸，頭目昏眩，不自勝持，少氣，或不省人事
寒水石 甘草
右為末，每服二錢，熟水調下
參乳丸 治心氣不足
人參 乳香
右末，山藥糊丸如梧桐子大，每服四十丸，食後棗湯下
[illegible]
靈砂 人參
右為末，棗肉丸，每服五十丸
治驚氣，每遇驚則心神顛倒
下，空心
白朮 茯苓 白附子 天麻 各

右以水一升煮取八合，去滓，入竹瀝[illegible]，分溫二服。

天門冬湯治心煩熱，[illegible]心煩喜冷，怔忡，小便赤澀，或生瘡

天門冬 麥門冬 熟地黃 [illegible]

右為末，煉蜜為丸，如梧桐子大，每服五十丸，用燈心人參湯化下，不拘時服。

治心臟風邪恍惚，言語不正，心悸

金箔 [illegible] 腦麝 [illegible]

右藥以新瓦罐中，先布金箔，[illegible]以粉[illegible]之，用[illegible]一小盞，用文武火煎，[illegible]以火上焙乾，研為末，用[illegible]煉蜜加為丸，如小豆大，每服食後，用剪刀以水下五丸。

治心臟不安，驚悸善忘，上膈風熱，化痰安神

白石英 朱砂 [illegible]

右同研為散，每服半錢，食後夜卧煎金銀湯調下。

治心下虛悸，[illegible]

麻黃 半夏 [illegible]

右為末，蜜丸，服如大豆三丸，日三，稍增之。

一方用[illegible]白芥大不清，耳聞虛聲，[illegible]怔忡，頭目眩暈

磁石 [illegible] 朱砂 [illegible]

右研細，以糊為丸，如梧桐子大，每服一丸，用人參湯調下，不拘時候。

治心虛驚悸不定，羸瘦

用[illegible]三升，煮取大[illegible]，入[illegible]六合，分服，[illegible]日三夜一。

治心驚悸，九竅皆血出

以井花水噀面，當止，勿使知之。

又方

取新屠牛[illegible]熱血二升，飲之。

治膽虛驚悸，不能安眠，多驚恐

用酸棗仁一兩，以金香[illegible]細為散，每服一錢，竹葉湯調下，不拘時服。

鎮心丹

用新[illegible]，如人參，焙乾，一兩，以[illegible]，治心虛人氣不安，驚悸，怔忡恍惚

溫膽湯 治心[illegible]

遠志 [illegible] 酸棗仁 [illegible] 黃芩 [illegible]

羅參 當歸 白茯苓 茯神 陳皮

粉草 [illegible]

右㕮咀，每服四錢，水一盞半，生薑三片，棗一枚，煎七分，日三服，卧一服。

寧心丹 治[illegible]，心神不安，驚悸恍惚，卧不安

人參 茯神 [illegible] 辰砂 乳香 白附子

琥珀 紫石英 真珠末 [illegible] 腦子

麝香 金箔

右為末，煉蜜為丸，[illegible]大，別以金箔為衣，每服一丸，先用[illegible]，煎湯化下，兒童丸

[illegible]治心驚恐，[illegible]驚悸，心神不定

白朮 甘草 石菖蒲 羚羊角 天竺黃

[illegible] 麝香 [illegible] 茯苓 人參

[illegible] 天門冬 茯神

[illegible]

右為細末，煉蜜為丸，如[illegible]大，每服[illegible]，治心虛不足，[illegible]，用人參湯下。

石為末，以[illegible]為丸，如梧桐子大，每服二十丸，空心，溫湯下。

主人驚夫心[illegible]

以[illegible]之

大驚夫心[illegible]不識人，下[illegible]

以[illegible]，可以有[illegible]，如似[illegible]三尸[illegible]形，非一

或言是人所[illegible]，有似[illegible]，有如刺刀

表方不安，几[illegible]，問石作[illegible]

得[illegible]人可[illegible]作[illegible]不[illegible]，名[illegible]

[illegible]散[illegible]明目
並以暖酒調下[illegible]
車前子[illegible] 治心狂
以車前子[illegible]一物等分為末[illegible]大如[illegible]服一丸日三

心狂 附論

夫邪入於陰則為狂[illegible]心[illegible]者[illegible]
[illegible]

壽夭在乎志意[illegible]心氣[illegible]則神有所[illegible]
[illegible]之證

方

七寶鎮心丸 治心風狂語[illegible]如邪祟發作有時

玉屑 金屑 銀屑 黃丹
朱砂 [illegible] 遠志 去心 [illegible]
人參 茯神 龍齒 麥門冬 去心
犀角屑 真珠 細研 [illegible]
琥珀 白蘚皮 牡丹 防風
龍腦 羚羊角 虎睛
牛黃 麝香

右為末入研了藥都研令勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服不計時候以溫水下五丸

硃砂散 治心風煩躁狂言精神恍惚不安

朱砂 細研 茯神 人參 犀角屑

防風 [illegible] 麥門冬 [illegible] 羚羊角屑
子芩 [illegible] 大竹茹 甘菊花
川升麻 牛黃 龍腦 麝香
鐵粉 甘草

右為細散入研了藥都研令勻每服不計時候煎金銀湯調下一錢

鎮心丸 治心風狂言多驚[illegible]

犀角屑 人參 茯神 天竹黃
朱砂 龍齒 遠志 [illegible]
龍腦 牛黃 金箔 [illegible]
鐵粉

右為末[illegible]煉蜜和丸如[illegible]每服[illegible]湯下七丸

犀角丸 治心風[illegible]心神不安

犀角屑 天竹黃 [illegible] 防風
人參 川升麻 [illegible] 光明砂
[illegible] 龍齒 金箔 [illegible]

右為末入研了藥都研令勻煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候溫水下二十丸

升麻散 治心風狂言神思不定口乾煩悶

川升麻 朱砂 犀角屑 茯神 甘草
龍齒 人參 麥門冬 寒水石 天竹黃
牛黃

右為細散入研了藥都研令勻每服不計時候以薄荷湯調下一錢

茯神散 治心風狂言恍惚恐懼

茯神 [illegible] 川升麻 白蘚皮
沙參 [illegible] 遠志 去心 犀角屑 石膏

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓食後溫服

真珠散 治心風狂語神思不安如見鬼魅

真珠 水精 鉛霜 琥珀
牛黃 人參 朱砂 雄黃
金銀箔

右並細研令勻每服食後溫荷湯調下半錢

治發狂者

用車轂中脂如彈子大以淨水調以投脂甚攪令消服令盡

龍齒丸 治心神狂亂多驚恚如邪祟

龍齒 遠志去心 生乾地黃 白茯苓 天門冬去心

山羊 防風去叉 五味子 車前子 麥門冬去心

地骨皮 人參各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每日以心竹葉湯下二十丸日三服

龍膽丸 治心實熱驚悸善笑

龍膽 山梔子仁 白薇 茯神去木 大黃剉炒

麥門冬去心 人參 甘草炙 羚羊角屑 玄參各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服食後荊芥湯下三十丸

升麻湯 治心氣實熱神思不安常思狂走喜笑無度多言不

安語其心脈洪實大

升麻 黃芩 白茯苓 麥門冬去心 大青

羌活 犀角 沉香 玄參各等分

朱砂

右搗篩每服三錢水一盞煎至八分去滓食後服

玄參湯 治心實熱驚悸喜笑心神不安

玄參 白薇 茯神去木 山梔子仁 羚羊角屑

石膏 人參 朱砂 黃芪

右件如麻豆大每服五錢水一盞煎至八分去滓入竹瀝一合攪

丹砂丸 治心神恍惚狂悶喜笑無止不常

前三兩為末不拘時服

丹砂 麝香 鐵粉人參

右件合研令勻再細研如月如梧桐子大令水下十丸不拘時服

丹砂酒 治心神不定妄為狂走如見鬼神……自笑自語

識時人事不……

神異方

丹砂……

右同研細和勻用無灰酒二升於瓷瓶內以慢火煨時用銀箸攪

令熟每服隨患人平時飲酒多少令至醉仍患人被蓋急用厚衣被

蓋之令汗出病愈若患人不能多飲只用丹砂一分麝香半錢酒一升

製如前法時時飲之以盡為度心神以定卻服補心氣藥即愈昔

許學士云寅丁家觀稍稍之後遂成狂易之疾服此一劑即定繼以

驚仁之藥心氣七日後安寧知有云

治心風方

肉桂去皮 荊芥穗 藿香葉去土 蔓荊子去土

香白芷 麻黃去根節 沒藥別研 天麻 牛膝酒浸

南星 川烏炮 片腦 川芎 細辛各二兩

右細末合和糯米糊為丸每服作十五丸男子女人一切風疾每服

丸藥化開溫酒下不拘時候中不下清以服

一傷風頭疼荊芥湯下 四肢頭面虛腫赤豆湯下 風熱

荊生瘡荊芥湯下 背腳疼 氣痛茶下 半身左

癱瘓用丁香湯下 肉癢 猪腰子細嚼鹽湯送下 腰疼腿痛

乳香酒下 風毒攻注 菊花茶下 乾濕腳氣木瓜酒下 婦人

血氣攻刺當歸酒下 血風瘡癬酒下

茯苓珠丸 治台心恙

豬心血 朱砂 青黛花

右先將青黛末納入取豬心血一處同研入朱砂末丸梧桐子

大每服二十丸茶酒下不拘時 不過三服

未在丸 治心神不定恍惚不樂 不下 常服有陰

養火全心散

茯神 沉香

右為末煉蜜丸如小豆大每服三十丸食後人參湯

一醉散 治心恙

用無灰酒二……在 同楊柳枝一十條攪一二百

下 如……亦可 狂者令

執或吐或不吐

猫物丁香散 治心疾狂不止……上

於心以苗伐其原
以苦丁濃煎汁調此爲末服一錢或用井花水調下並搽少許
大壯以下發熱作渴以人參和生薑汁入目翻吐時令開口更用冬不
省人事以今人以手按之信手而之序少爲頭散之膚吐不止
以牛黃散各少許蜜調服

治驚癇安心方

甘草　桂心　龍骨　防風　麥門冬
牡蠣　遠志　茯神　人參
右㕮咀以水八升煮取三升分三服相去如人行五里久再進服

遠志丸　治因驚語言顛錯不能服溫者

硃砂　金箔五片　遠志
白附子　白茯苓　龍齒　人參　南星
右爲末煉蜜和丸如梧桐子大硃砂爲衣每服三十丸薄荷湯送下
食後臨臥服　一方加人參

茯神散

茯神　熟乾地黃　白芍藥　川芎　當歸
桔梗　白茯苓　遠志　人參各等分
右爲末每服二錢水一盞煎至七分不拘時
七十四歲因戰鬥驚恐心上癢服此二方獲效

治心風　恍惚失明開中大心恐痺服此而愈再作服無三不遲志
并受邪狂言妄語不定

水銀一兩　生薄荷　麝香一分
半夏　麝香一錢
右爲末人在薄荷汁內更研千百轉丸如芥子大金銀湯下十五丸
臨睡時服三日再進一服

寧志膏

硃砂　乳香　人參　白茯苓　茯神
酸棗仁
遠志
右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服一十丸食後薄荷湯下日進二服如
不能飲酒以麥湯下此常服

治失心方

紫石英　代赭石各四兩　鐵粉二兩　麝香二錢
硃砂五錢
右爲末用糯米粥二兩作糊爲丸如梧桐子大每服一二九棗
湯送下

寧志膏　治因驚失心氣虛神不守舍恐怖驚悸恍惚健忘
睡臥不寧多涕危險者并宜服之一切心疾悉皆治之常神定志安恍痛

人參　酸棗仁　辰砂
滴乳香
右爲末煉蜜和丸如彈子大每服一丸薄荷湯化下一方治心驚悶
屢神志不守恐怖驚惕常多憂慮易於健忘睡臥不寧者治一
切心疾並皆治之用酸棗仁煎湯亦可空心臨臥化下一方溫人參湯
化下剩亦湯亦可又云人有錯婦兵大夫心驚此方無之一服二
十粒愈人多傳服之甘驗

治失心妙方

黃丹　南石各一兩
右搬研石成汁以火炙角連小鼓子於其中直與火方止去角取以
弄向府一旦將竹刀刮作片子攙飛末一錢於中同夾食之後體明
壽春大聖以治風涎之疾

紫金丸　治失心及心恙癡

蝎梢　明礬
右爲末糊丸如梧桐子大每服六十九湯水任下有恙病者
三服見效重者亦令全人於此日服心神凡有物形去神無益
再服而愈此不是痰涎心竅所致也

辰砂丸　治在失語言不得精神此由鬱悲過甚

辰砂一兩
右以豬心血搗爲四十九丸夜細研入牛黃一分豬心如鷄豆大每
日空心甘水下一丸

水雄湯

水煎半兩 兄者 遠志一錢 人參一錢 麥門冬二錢

石菖蒲 茯神各一兩

右㕮咀水一升煮取半升空心服

金箔丸 治癲癇心疾恍惚狂言婦人產後血上衝心或哭或笑言語狂

亂並宜治之

生乾地黃 貝母 巴豆 [illegible]

黃連 桔梗 柴胡 [illegible] 防風

柴胡 葛根 乾薑 白茯苓 獨活

厚朴 枳殼 [illegible] 人參 甘草

甘松 草烏頭 當歸 桂心 一方用甘遂

右為末 [illegible] 丸如梧桐子大每服 [illegible] 丸 [illegible]

右為末每服 [illegible] 頭痛 [illegible] 一切 [illegible] 荊芥湯下 [illegible] 心痛 [illegible]

入 [illegible] 氣 [illegible] 下 [illegible] 白 [illegible] 乾 [illegible] 附子湯下 [illegible]

人血氣 [illegible] 小 [illegible] 氣上 [illegible]

食後 [illegible] 酒 [illegible] 黃 [illegible] 結 [illegible] 用 [illegible] 湯下

沈香散 治 [illegible] 白 [illegible] 口 [illegible]

白朮一兩 麻黃 [illegible] 甘草

附子 大 [illegible] 砂 [illegible]

右為末生薑 [illegible]

排風湯 治風 [illegible] 恍惚 [illegible]

白朮 白鮮皮 川芎 白芍藥 當歸

肉桂 防風 杏仁 甘草 川獨活

麻黃 茯苓各三

右㕮咀每服 [illegible] 薑七片棗二枚煎 [illegible] 服

育神散 治 [illegible] 多驚 [illegible] 語言不 [illegible]

人參 白朮 茯苓 茯神 當歸

乾薑 遠志 紫石英 赤石脂 桂心

紅芍藥 龍骨

右㕮咀 [illegible] 食後 [illegible]

[illegible] 丹 [illegible] 治顛狂 [illegible]

[illegible] 丹 [illegible]

右作 [illegible] 一 [illegible] 可 [illegible] 二 [illegible] 以炭五斤燒 [illegible]

[illegible] 研 [illegible] 不 [illegible] 如 [illegible] 大每 [illegible] 丸或二十丸用 [illegible]

皮湯 [illegible] 下 [illegible] 心丸 [illegible]

治 [illegible] 大 [illegible] 人不 [illegible]

用 [illegible] 丸如梧桐子大每服 [illegible] 湯下

辰砂 天仙子 [illegible]

右以水一 [illegible] 天仙子 [illegible] 天仙子不 [illegible]

[illegible] 細 [illegible] 大 [illegible] 人 [illegible] 下一丸

心勞(附論)

夫心勞者 [illegible] 則 [illegible] 心 [illegible] 手太陽不

足 [illegible] 心氣 [illegible] 之則 [illegible] 之則 [illegible] 足

[illegible] 則生 [illegible] 不 [illegible]

[illegible] 心 [illegible] 目 [illegible] 手足 [illegible]

[illegible] 升麻

黃連 天門冬 [illegible] 地骨皮 犀角屑

知母 天門冬 茯神 紫菀 百合

前胡 貝母 麻人 杏人

甘草 [illegible] 生乾地黃

右 [illegible] 末 [illegible] 如梧桐子大每日 [illegible] 三十丸 [illegible] 再服

遠志散 [illegible] 心 [illegible]

遠志 [illegible] 人參 [illegible]

川椒 [illegible] 牛膝 白茯苓 菖蒲

山茱萸 柏子人 [illegible] 乾地黃 石斛 [illegible]

肉桂 天門冬 [illegible] 甘草

右為散每服一錢以溫 [illegible] 食前服 [illegible]

[illegible] 花 [illegible] 心 [illegible] 口中 [illegible]

菊花 升麻 獨活 防風 知母
黃芩 前胡 芎藭 大黃 枳殼
桂枝 [illegible] 麥門冬 [illegible]
右㕮咀每服五錢水一盞半煎八分去滓食後溫服
人參湯 治心經煩悶虛熱驚悸[illegible]
人參 白茯苓 前胡 麥門冬 [illegible]
知母 木通 甘草 乾地黃 防風
遠志 陳橘皮 [illegible] 枸杞
右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後溫服
黃連丸 治心經熱[illegible]傷心[illegible]
黃連 茯神 石膏 梔子
茯苓 [illegible] 黃芩 白蘞 青葙子
前胡 犀角 [illegible]
地骨皮 [illegible]
右為末煉蜜丸如梧桐子大每日空心用米飲下七丸未愈更加
至二七丸夜臥再服以知為度 一方無石膏有熟艾 [illegible]
王不留行湯 治[illegible]憂恚思慮傷心經方本[illegible]
王不留行 桂枝 桔梗 大黃 當歸
甘草 [illegible] 前胡 白芷 天雄
[illegible] 桑根白皮
右㕮咀每服一錢生薑三片水一盞煎至七分去滓溫服
犀角散 治心經風熱心神不寧少得睡眠
犀角屑 地骨皮 玄參 甘草
遠志 枳殼 麥門冬 黃芩 川升麻
茯神 [illegible]
右為散每服[illegible]溫酒調下[illegible]
朱雀丸 治心氣[illegible]
茯苓 [illegible] 人參 大棗 [illegible]
紫石英 小草 [illegible] 紫菀 丹參
甘草

右㕮咀每服[illegible]水一盞煎[illegible]去滓溫服
人參散 [illegible]用水一盞[illegible]分去滓溫服[illegible]不安
人參 [illegible] 赤茯苓 赤芍藥 紫蘇
茯神 遠志 甘草 [illegible]
[illegible]
右為散每服五錢用水一大盞煎至六分去滓入竹瀝半合生地黃
汁半合[illegible]食遠[illegible]服
麻黃湯 治[illegible]熱[illegible]無度四肢煩熱止[illegible]
麻黃 梔子 赤茯苓 白朮
黃芩 石膏 甘草 生地黃 赤小豆 桂心
右㕮咀[illegible]每服[illegible]生薑[illegible]竹瀝半合水二盞煎至一盞去
滓[illegible]分溫三服空腹日午夜臥各一服
竹茹湯 治心[illegible]煩悶[illegible]
竹茹 前胡 白茯苓 人參 甘草
貝母 [illegible] 麥門冬
右㕮咀每服五錢水一盞入生薑竹葉各[illegible]煎至七分不拘時去
滓溫服
麥門冬湯 治心氣不足[illegible]
麥門冬 遠志 熟乾地黃 天門冬 黃連
茯神 石菖蒲 人參 白茯苓 [illegible]
右為末煉蜜和丸如梧桐子大每日食後[illegible]用[illegible]水下二十丸
遠志湯 [illegible]
[illegible]心[illegible]使人多忘不足[illegible]
遠志 [illegible] 芍藥 人參
赤茯苓 黃芩 [illegible] 麥門冬 知母
右㕮咀每服五錢水一盞[illegible]至[illegible]去滓[illegible]食遠服如人行
三五里再服
茯苓[illegible]心[illegible]不[illegible]
或言語[illegible]
白茯苓 [illegible] 防風 人參

梔子人 細擘 杜蘅 車前子 各 甘草 各一兩
右為末，鍊蜜丸如梧桐子大，每服三十丸，米飲下。
麥門冬散 治心勞實熱[illegible]頭目昏眩
前胡 去蘆　麥門冬 去心　羌活　玄參　[illegible]
人參　射干　芍藥　甘草 炙，各一兩
右件搗篩為散，每服五錢，水一盞半，生薑半分，淡竹葉 小麥三十粒，煎至八分，去
滓，食後服。
大黃散 治心勞熱，口舌生瘡，心煩，腹滿，小腸不利。
川大黃 剉碎，微炒　黃芩　梔子人　柴胡 去苗
羚羊角屑　甘草 炙赤，剉　木通 剉　石膏 二兩
右為散，每服四錢，水一中盞，入竹葉二七片，煎至六分，去滓，食前
溫服。忌炙煿熱麵生冷。
茯神散 治心勞實熱[illegible]心神不安
茯神　木通 剉　川升麻　赤石脂　遠志 去心，各一兩
犀角屑　[illegible]　甘草 炙，各半兩　麥門冬 去心，一兩半
右為散，每服四錢，水一中盞，入[illegible]一分，煎至六分，去滓，食後溫服。
磁石散 治心勞熱，心氣[illegible]，若心病則耳聾[illegible]
則不能聽遠
磁石 二兩，細研，水飛　赤茯苓　人參 去蘆頭
羚羊角屑　赤石脂　菖蒲　遠志 去心　麥門冬 去心，一兩半
右為散，每服四錢，水一中盞，入[illegible]二七片，煎至六分，去滓，每於食
後溫服。
石膏湯 治心勞實熱[illegible]大便閉澀不通，心滿痛，小腸熱
竹葉　梔子人　黃芩 各三兩　桂心　赤芍藥 各二兩
石膏 八兩　大黃　甘草 炙
右件剉，每服五錢，以水一盞半，煎至七分，去滓，熱服，加[illegible]
錢，服不以時。方加大棗二十枚。
黃芩湯 治心勞實熱，口瘡，心煩[illegible]不利
甘草　梔子人　黃芩　麥門冬 去心　木通
生乾地黃、當歸[illegible]

右㕮咀，每服四錢，水一盞半，生薑五片，煎至八分，去滓溫服，不拘時。
遠志飲子 治心勞虛寒，驚悸恍惚，多忘不安，夢寐驚魘
遠志 去心　茯神 去木　桂心　酸棗人 炒　人參
黃芪 去蘆　當歸 [illegible]　甘草 炙，半兩
右㕮咀，每服四錢，水一盞半，生薑五片，煎至七分，去滓溫服，不拘時服。
磁石湯 治心勞熱，耳聾多忘，不能聽遠
磁石 [illegible]　赤茯苓　大青　人參
白朮　菖蒲　芍藥 各一兩　赤石脂 一兩
右件搗篩，每五錢，水一盞半，入竹葉五片，煎至一盞，去滓，分溫二服。
食後臥服。
赤茯苓湯 治心勞實熱[illegible]小腸急，小便淋澀白濁
赤茯苓　大黃　冬葵子　苦參
黃芩　山梔子人　車前子 [illegible]
右為末，鍊蜜丸如梧桐子大，每服溫水下三十丸，空心臨臥服。
[illegible]湯 治心勞[illegible]好驚[illegible]
石膏 碎　茯神　麥門冬 去心　川芎　羚羊角 一兩　梔子人 半兩
生地黃　甘草 炙　赤小豆 一合
右細剉，分為七服，每服半兩，水一大盞，煎至五分，去滓，入竹瀝半合，更
煎一兩沸，不計時候服。
人參[illegible]治心勞[illegible]或憂思過度[illegible]傷即不
欲食，心煩驚悸
人參　木通　麥門冬 去心　茯神 去木
百合　柴胡　龍齒 一兩
右件搗篩為散，每五錢，水一盞半，入棗二枚，煎至[illegible]去滓，分溫二服。
食後相次服之。
麥門冬散 治心勞[illegible]不眠
麥門冬　白茯苓　人參　遠志 去心
防風 去叉　赤芍藥　陳橘皮
右剉如麻豆大，每服五錢，水一盞半，煎至八分，去滓溫服，日二服。

不足心忪[illegible]心勞虛熱[illegible]志不
足[illegible]
地黃[illegible]心勞實熱[illegible]心煩多欲[illegible]小便不利
生乾地黃[illegible] 石膏[illegible] 赤小豆[illegible]
木通[illegible]
右件藥每服[illegible]水一盞入竹葉[illegible]分去滓溫服不拘
時候服
麥[illegible]心勞熱不止[illegible]口舌乾燥心中煩悶
梔子[illegible] 淡竹茹[illegible] 麥門冬[illegible]
右以水五盞先煮米[illegible]取三盞去米[illegible]下藥[illegible]煎五
七味[illegible]取[illegible]分服三服空心日午晚服
大黃泄熱湯 治心勞熱口為生瘡大便苦難[illegible]不通心滿痛小
腸熱
大黃 澤瀉 黃芩 芒硝 梔子仁[illegible]
桂心 通草 石膏[illegible] 甘草[illegible] 大棗[illegible]

右[illegible]以水九升先漬水一[illegible]別漬大黃[illegible]
取二升五合去滓下大黃[illegible]再服[illegible]下芒硝[illegible]分三服
保生散 治一切男子女人心受勞氣[illegible]五行受病[illegible]傳其所勝
[illegible]病之[illegible]傳之[illegible]心氣受邪[illegible]精神不足恍惚
健忘[illegible]喜[illegible]口無味小便[illegible]恐[illegible]先[illegible]
[illegible]解邪氣[illegible]宜服此[illegible]
前胡[illegible] 木香[illegible] 牡丹皮[illegible] 前胡[illegible]
桔梗 柴胡[illegible] 貝母[illegible]
鱉甲[illegible] 杏人[illegible] 茯苓[illegible] 官桂
荊芥穗[illegible] 麻黃[illegible]
右細杵羅為末每服[illegible]
脈[illegible]
治心受勞氣不足[illegible]
足[illegible]
亦不[illegible]

柴胡[illegible] 鱉甲[illegible] 肉豆蔻[illegible] [illegible]
當歸[illegible] 官桂[illegible] 桔梗[illegible] 荊芥穗[illegible] 麥門冬[illegible]
烏梅 茯苓 人參 [illegible] 甘草
乾地黃 陳皮 [illegible] 木香 [illegible]
[illegible] 檳榔[illegible]
右件藥細末每服二錢水一盞生薑一片同煎[illegible]食後[illegible]若是已
發[illegible]有傳[illegible]心勞[illegible]
[illegible]
銀州柴胡[illegible] 白朮
蒼朮[illegible] 人參 附子[illegible] 石斛[illegible] 牡丹皮
右同為細末[illegible]在上[illegible]
[illegible]空心[illegible]

虛勞病[illegible]

[illegible]經謂[illegible]不治[illegible]傳之[illegible]筋脈相引而急病名曰[illegible]

[illegible]脈[illegible]筋脈和[illegible]
[illegible]
方
[illegible]
[illegible]腰肚不[illegible]
肉蓯蓉[illegible] 山芋 乾地黃[illegible] 菟絲子[illegible]
五味子 杜仲[illegible] 澤瀉 覆盆子 山茱萸
遠志[illegible] 桂[illegible] 附子[illegible] 甘草[illegible]
白茯苓[illegible] 鹿茸[illegible] [illegible] 巴戟天[illegible]
人參[illegible]
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心日午夜臥溫酒下
牛膝丸 治[illegible]
牛膝[illegible] 萆薢[illegible] 白蒺藜[illegible]
白茯苓[illegible] 麥門冬[illegible]
[illegible] 乾薑[illegible] 桂[illegible] 當歸[illegible]
生乾地黃[illegible]

人參 五味子 防風[illegible] 細辛[illegible] 白朮[illegible]

右除前五味外搗羅爲末次入[illegible]相和入[illegible]銀
石器中重湯煮之至丸即丸如梧桐子大每服三十丸加至四十丸酒下日
再

五味子丸 治腎病筋脈相引[illegible]腰[illegible]去原脈久坐上焦[illegible]心[illegible]
五味子一兩 熟乾地黃[illegible] 肉蓯蓉[illegible] 牛膝[illegible]
澤瀉 菟絲子[illegible] 白茯苓[illegible] 巴戟天[illegible] 赤石脂
山茱萸 杜仲[illegible] 山芋 石菖蒲 遠志[illegible]
狗脊[illegible]
右爲末煉蜜和搗入臼[illegible]丸如梧桐子大每服二十丸至
三十丸空心日午[illegible]下

[illegible]治[illegible]一切脈相引而[illegible]五勞七傷小便數腹痛難立
[illegible]
甘草[illegible] 桂[illegible] 茯苓[illegible] 當歸[illegible]
黃耆[illegible] 龍骨 麥門冬[illegible] 芍藥
生乾地黃[illegible] 附子[illegible] 厚子[illegible]

右件藥搗麁羅爲散每服三錢水一盞半生薑三片棗一枚擘破煎至一盞去滓
溫服日三服

[illegible]茯苓散 治心病[illegible]脈相引[illegible]百節[illegible]
白茯苓[illegible] 當歸[illegible] 肉蓯蓉[illegible] 五味子[illegible] 陳皮[illegible]
牛膝[illegible] 人參 白[illegible] 柏子仁[illegible]
熟乾地黃[illegible] 菟絲子[illegible]
右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服[illegible]

[illegible]丸 治[illegible]
熟乾地黃[illegible] 天門冬[illegible] 巨勝子[illegible]
白茯苓 [illegible] 牛膝[illegible] 山芋[illegible]
桂[illegible] 人參[illegible] 甘草[illegible] 巴戟天[illegible]
右爲末煉蜜和丸[illegible]梧桐子大每服二十丸至
四十丸空心日午[illegible]
[illegible]茯[illegible]脈[illegible]
石[illegible] 牛膝[illegible] 人參[illegible]

白茯苓[illegible] 肉蓯蓉[illegible] 生乾地黃[illegible] 菟絲子[illegible] 白朮[illegible]
右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心日午食前溫酒下

脈極 附論

凡脈極者主心也心應脈脈與心合心有病從脈起又曰以夏遇病爲
脈痺脈痺不已復感於邪內舍於心則飲食不爲肌膚欽散色不澤
其脈空虛口唇見赤色凡脈氣不足則[illegible]則[illegible]日[illegible]之傷
風損脈爲心風[illegible]多汗[illegible]若脈氣實則熱熱則傷心使人好
怒口爲色赤甚則言語不快血脫色乾燥不澤飲食不爲肌膚故脈氣
虛血則寒寒則咳咳則心痛喉中介介如梗甚則咽腫喉痺故曰心風虛
實候右陽[illegible]於三陰[illegible]陰陽[illegible]病[illegible]定其血氣各守其鄉脈實
宜寫氣虛宜補[illegible]病在[illegible]定[illegible]之取[illegible]病在皮毛肌膚筋脈則
全[illegible]至[illegible]五臟則半死矣脈絕不治三日死何以知之脈氣空虛則
顏色發落脈絕手少陰氣絕則脈不通血先死矣

[illegible]黃芪[illegible]治脈極虛則血氣脫色白乾燥不澤飲食不爲肌膚[illegible]
生地黃汁[illegible] 赤[illegible] 生麥門冬[illegible]
甘草[illegible] 人參 茯苓[illegible] 乾薑[illegible] 附子
白朮[illegible] 石膏[illegible] 澤瀉[illegible]
右[illegible]咀以水[illegible]先[illegible]取二升[illegible]去滓下地黃汁[illegible]更[illegible]取三升五
合分[illegible]服

麻黃[illegible]治[illegible]脈[illegible]多汗[illegible]虛[illegible]止[illegible]
升麻[illegible] 人參[illegible] 杏子仁 黃芩[illegible]
防風[illegible] 紫菀[illegible] 升麻 桂[illegible]
茯神[illegible] 人參[illegible] 石膏[illegible] 麥根 白[illegible]
右搗篩每五錢匕水一盞半入棗三枚擘煎一盞去滓分溫二服早
晚食後各一

人參散 治脈極[illegible]語不快精神恍惚脈虛驚跳不定
人參[illegible] 黃蓍 鐵粉 生乾地黃 酸棗人[illegible]
茯神[illegible] 牛黃[illegible] 麥門冬[illegible] 龍齒[illegible]

麦芽 炒　甘草 炙

右為散入酥少許同研令匀每服二錢 [illegible] 白湯下 食後不計時服

平炎丹 [illegible] 治 [illegible] 心氣 [illegible] 如 [illegible] 則 [illegible] 止痛

益氣

半夏　芎藭　附子

乾薑　人參　當歸　甘草　桂

白茯苓　杏人

右判如麻豆每服五錢水一盞半入生薑三片棗大擘破同煎至一盞去滓

分三服早晚食後各一

補虛湯 治心脈極虛 [illegible] 宜服補虛安神

人參　麥門冬　黃耆　甘草

防風　遠志　附子　白茯苓　五味子

桂

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸米飲下

鎮心丸 治 [illegible] 心 [illegible]

硃砂　龍齒　遠志　人參　茯神

牛黃　麝香　琥珀　金箔

鐵粉

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十丸金銀薄荷湯下

石膏散 治心經風熱 [illegible] 多汗 [illegible] 頭 [illegible]

石膏　梔子人　黃耆　防風　羚羊角屑

茯神　人參　桑根白皮　杏人

桂心　麥門冬

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時溫服

黃芩湯 治心 [illegible] 恍惚 [illegible] 悲傷 [illegible] 言語不快

不澤飲食不為肌膚

人參　茯苓　龍齒

麥門冬　甘草　白朮

右判散每服四錢水一盞半 [illegible] 不以時服

麥門冬湯 [illegible]

麥門冬　人參　茯苓　生地黃

茯神　石膏　甘草

右為散每服四錢水一盞半 [illegible] 不計時服

防風丸 治心脈虛極 [illegible] 則 [illegible] 如 [illegible]

防風　桂心　甘草　茯苓　人參

遠志　甘草　白石英　麥門冬

右為末煉蜜丸如梧桐子大 [illegible] 服三十丸 [illegible]

茯苓湯 治心脈極虛 [illegible] 悲傷 [illegible] 言語不快

補氣調血脈理中

青茯苓　黃芩　梔子人　赤石脂

紫菀　麥門冬　甘草　石膏 一兩

右判細每五錢水一盞半入竹葉五片煎至一盞去滓下芒硝

一錢七分分三服早食後日午各一 [illegible] 生地黃

升麻湯 治心脈實熱 [illegible] 面色 [illegible] 不 [illegible]

香豉 [illegible] 上氣

升麻　射干　芎藭　人參

麥門冬　葳蕤　生乾地黃　赤小豆

右為粗散每服五錢水一盞半入生薑一棗大拍破竹葉五片煎至 [illegible]

去滓 [illegible] 早晚食後各一 [illegible] 甘草一兩

大人參散 治心脈 [illegible]

人參　赤茯苓　牛黃　麝香

遠志　黃 [illegible]　羚羊角屑

右研為散每服二錢 [illegible] 竹葉 [illegible] 調下

茯苓散 治心脈極實 [illegible] 血氣傷心好生嗔怒 [illegible] 言語不快

脈理中

赤茯苓　赤石脂　麥門冬　黃芩

梔子人　人參　羚羊角屑

右為散每服三錢水一中盞入竹葉二七片煎至六

分去滓食後溫服

茯神煎 治脉極虛寒則咳咳則心痛喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痺不安

茯神 人參 遠志 甘草 麥門冬

當歸 桔梗 五味子

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎七分去滓溫服不拘時

補脉本事丸 治脉極虛寒

生地黃 枸杞子 黃耆

右件搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸

治脉極

麻子

右以米一斗五六升去滓

桑白皮

用桑根白皮

為之佳

普濟方卷之八

普濟方卷之九目錄

脾臟門

總論

脾實熱 脾虛冷 脾臟虛 脾氣虛 脾勞 脾痺

脾實熱

脾痛

治脾胃有冷食已即痛

脾實熱咽喉不利 論一首 方七首

射干散 枳殼散 含化丸 升麻散
地骨皮散 犀角散 柴胡散

脾虛冷 論一首 方五十八首

大建脾散 補脾黃耆丸 椒附建脾散 溫氣黃散
[illegible] 枳脾山藥丸 心腹痛脅肋自有時發動急補之
大建中丸 大養脾丸 藿香湯 丁香白朮飲
附子建中湯 豆蔻調紅散 半夏湯 補脾麴麵丸
溫脾丸 大溫脾丸 養脾散 厚朴丸
人參湯 硇砂煎丸 吳茱萸丸 補脾湯
安中湯 白豆蔻湯 蓽澄茄散 補脾煎
熟脾湯 蓽撥丸 豆蔻湯 白朮湯
補脾益氣勁散 補脾白豆蔻散 禦寒散

五加酒 厚朴丸 白朮散 蓽撥丸
三建丸 陳曲丸 六君子湯 快脾餃子
鳥頭煮香丸 阿魏勒湯 溫中丸 石子朴丸
益氣和胃丸 禦豆散 附子湯 前脾臟虛冷與食誠以可
治脾臟虛冷中焦宿食見鬲氣 沉香散 白脾補傷冷益多飲食
台脾嘴虛冷腸勝相於胃 麝臍丸 補脾散

脾臟冷氣攻心腹疼痛 論一首 方二十一首

沉香丸 蓽豆蔻丸 蓽香茹湯 麝香丸
京三稜散 京三稜丸 沉香丸 白豆蔻散
阿魏丸 木香丸 丁香丸 厚朴丸
附子丸 木香散 蓽撥丸 丁香丸
桃雲丸 [illegible] 大香散 沉香湯
茱萸丸 茱萸丸 [illegible] 茱萸丸 保益丸
吳茱萸湯 人參和中丸 治中湯

脾臟冷氣腹內虛鳴 論一首 方十九首

陳橘皮湯 [illegible] 橘皮煎散 桔梗散
訶梨勒丸 厚朴湯 厚朴丸 肉豆蔻丸 補脾散
赤茯苓散 白朮丸 吳茱萸丸 進食丸 草豆蔻丸
人參散 丁香丸 人參湯 溫脾丸

脾氣虛腹脹滿 論一首 方二十五首

京三稜煎丸 草豆蔻散 大腹木香湯 桔梗丸 小沉香丸
訶黎勒散 訶梨勒散 白豆蔻丸 育神湯
[illegible] 厚朴散 人參湯 理中散 紫桂大丸
思仙散 人參湯 檳榔散 黃耆散 白朮丸
草豆蔻散 益智子散 陳橘皮散 七氣湯 茱萸丸
豆蔻散 橘紅散 順氣煮散 溫中散 黑散子
補脾湯 人參散 通中散

脾臟虛冷泄痢 論一首 方三十三首

茯苓湯 桃仁散 蓮荷湯
厚朴散 木香丸 木香湯 溫脾湯 白朮散
厚朴丸 蓽撥丸 縮香散 白朮散 訶黎散
厚朴散 厚朴散 保安丸 厚朴散 人參湯
建脾湯 香橘湯 訶梨勒散 白朮湯 訶黎勒散
訶梨勒丸 肉豆蔻丸 烏頭丸 赤石脂丸 肉豆蔻丸
附子散 木香丸 治脾胃冷泄不止 神聖香黃散
天雄散 台脾冷泄 台脾胃虛

脾勞 論一首 方二十九首

豬肚丸 補脾丸 葫蘆巴丸 厚朴丸 蒸薷煎丸
燒脾散 厚朴丸 牛髓補虛寒丸 拌肝散
茴香丸 烏梅丸 七傷散 半夏散 生乾地黃散

白朮散　枳殼丸　五香丸　前胡湯　人參散
丁香散　鱉甲散　附子湯　白朮飲　生地黃煎
半夏湯　厚朴散　黃耆湯　小甘露飲　前胡散
大黃丸　藿香丸　厚朴丸　羊脊丸　半夏湯
麥門冬湯　消食前酒　茱萸根湯　二聖丸
治一切男子女人脾痿方義

穀勞

論　一道　方九道
沉香湯　京三稜湯　木香湯　木香湯　沉香湯
檳榔散　丁沉丸　豆蔻丸　分氣丸

脾癉

論　一道　方十一道
麥門冬煎　竹葉湯　知母湯　前胡湯　茯苓湯
葛根湯　麥門冬湯　赤茯苓湯　三和飲子　蘭草湯
羚羊角丸

肉極

論　一道　方二十道
大黃芪湯　黃芪丸　石南散　枸杞湯　獨活湯
小麥散　茯苓散　石斛散　防風散　石南散
十味丸　羌活仁散　半夏湯　續命湯　人參丸
麻黃湯　小風引湯　半夏湯　半夏湯　越婢湯

普濟方卷之九目録　畢

普濟方卷之九

脾臟門

總論

夫脾主意脾藏營營舍意者存之志也乃為諫議大夫并四藏之所受心有所憶謂之意意之所存謂之志因志而存變謂之思因思而遠慕謂之慮因慮而處物謂之智智意為脾之藏也口唇者脾之官脾氣通於口口和則能別五穀味矣故云口為脾之候唇者肌肉之本循環中宮上出頤頰次於舌下近脾中宮第於舌外主肉內主味脾重二斤三兩扁廣三寸長五寸有散膏半斤主裹血溫五臟神名常在主藏營秩稟為意藏通於肌故曰脾藏營營舍意在氣為噫在液為涎脾氣虛則四肢不用五臟不安實則腹脹涇溲不利脾氣盛則夢歌樂不足則夢飲食不足得其時則夢築垣蓋屋脾氣盛則夢歌樂身體重手足不舉厥氣客於脾則夢見丘陵大澤壞屋風雨心脾為牝土脾者陰中之至陰為太陰與陽明為表裏其脉緩相於夏王於季夏脾者土也敬而稱敷和其令也萬物象色不同故曰名備化其德濡萬物從根往蕃於土[illegible]土之德則為化其政為謐故令太陰之化[illegible]不可以[illegible]若辛大妙而主互行其時所以各行無不稟氣其可常取土其則生土熱則涼土則一大名之曰倉稟地抱之不離其母故乃使人而食之亦兼其母也於水中水為金子而萬人神以門戶以內外不通以調各時土失其主其氣衰微水為子其地之學受氣而目望輸於四肢濕當見水直注下之座脾空胃水遂吞之胸而滿[illegible]故下及下有利則傷其不遊在一邊以為不化之食則伏其所散日此故之不伏而也上黨近古因惟凡也到其使送不水自目下流傳其陰陽端[illegible]則是安[illegible]山金得矣[illegible]王脾[illegible]土也爪[illegible]以何名也其惡者不可得[illegible]何如且宗如水之泊者此消大消而在外[illegible]令人四肢沈重

五

不及則令人[illegible]名曰重強○脾脈來[illegible]如雞踐

地[illegible]脈來實[illegible]如雞舉足曰脾病脾脈來堅

[illegible]如鳥之喙如[illegible]如屋之漏如水之流曰脾死○真脾脈至而弱

[illegible]病[illegible]胃少曰

脾病但代無胃曰死[illegible]有石曰冬病石甚曰今病○脾藏營營舍意

[illegible]不解則傷意[illegible]四肢不舉[illegible]死于春○足太

陰[illegible]口唇者肌肉之本也脈弗榮則肌肉[illegible]

[illegible]人中滿[illegible]唇反者肉先死甲篤乙死木勝土也○脾

[illegible]

[illegible]王之時[illegible]大[illegible]何[illegible]者足心

[illegible]

[illegible]病自[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]右手[illegible]上[illegible]中[illegible]大如[illegible]

狀大[illegible]○脾脈長[illegible]再至曰平三至

曰[illegible]病[illegible]至[illegible]六至命盡[illegible]大[illegible]脈也○脾脈[illegible]

[illegible]中[illegible]飲食入[illegible]出[illegible]四

肢不[illegible]若[illegible]大[illegible]大[illegible]

之外[illegible]

[illegible]

[illegible]○黃[illegible]之至也大[illegible]有[illegible]

在[illegible]女子[illegible]之疾也[illegible]○[illegible]

小[illegible]

壯[illegible]

[illegible]

[illegible]

守[illegible]○[illegible]

[illegible]之[illegible]二日之[illegible]

病小便[illegible]一日[illegible]日中

滑　　　　　　　　　　　　　　　[illegible]　　　　　　　　　　　　　　　小

於下[illegible]○[illegible]

[illegible]之[illegible]者[illegible]甲乙日也○[illegible]

[illegible]

壯[illegible]食不化[illegible]陽明[illegible]

之[illegible]胃中有[illegible]

不得之[illegible]月[illegible]不[illegible]○脾病其[illegible]

[illegible]大也不[illegible]

[illegible]

[illegible]之不當[illegible]五十壯[illegible]

[illegible]肉病[illegible]有[illegible]不足[illegible]

有[illegible]中[illegible]有[illegible]

[illegible]○有[illegible]

[illegible]中[illegible]不從[illegible]三分[illegible]

[illegible]如[illegible]人腹中[illegible]皮肉[illegible]

[illegible]人[illegible]大四肢[illegible]不[illegible]

者善[illegible]不能[illegible]

[illegible]大便[illegible]

病[illegible]下[illegible]大便[illegible]不能[illegible]出不止[illegible]

[illegible]○寸口脈[illegible]則為[illegible]

[illegible]

[illegible]○寸口[illegible]

出[illegible]有[illegible]心下[illegible]

[illegible]不[illegible]

[illegible]○寸口脈[illegible]

[illegible]

[illegible]

腹不[illegible]

[illegible]

[illegible]

不[illegible]○[illegible]人[illegible]

夫人身病者左安而強[illegible]不能[illegible]故令[illegible]煩[illegible]則
愈○[illegible]得脚[illegible]大[illegible]如[illegible]
起見外腫滿[illegible]重足脛腫不能則是主氣[illegible]色黃
也○脾[illegible]其色黃体[illegible]
以[illegible]
之[illegible]大[illegible]不治○[illegible]
思[illegible]
[illegible]
[illegible]如山[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
黃如[illegible]土[illegible]上[illegible]黃色[illegible]
頰[illegible]面[illegible]大腹[illegible]小手足[illegible]
好利人不喜[illegible]不耐春夏[illegible]足太陰
敦敦然脾[illegible]小大[illegible]
脾[illegible]不正[illegible]
[illegible]不堅[illegible]上下[illegible]
堅者[illegible]
和利人[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

入後必病不出其年[illegible]若年上不病[illegible]之[illegible]
也○手[illegible]脾脉[illegible]足太陰脉也[illegible]不在中[illegible]前主四寸之中
而在背[illegible]不中[illegible]一寸[illegible]從中封上四
寸是也[illegible]在足大指[illegible]是也○四季之月各餘
十八日此爲四季之[illegible]用土[illegible]陰陽[illegible]
[illegible]三[illegible]不[illegible]四時[illegible]
外[illegible]
[illegible]
[illegible]又云
[illegible]
須[illegible]矣

脾實熱 附論

大脾實則[illegible]
[illegible]

不利腹脹[illegible]不得安[illegible]四肢[illegible]是脾實之候

方

治脾熱面黃目赤[illegible]
半夏 [illegible] 枳實 梔子 茯苓
芒硝 三 細辛 五兩 白朮 杏仁 各四 生地黃
麥門冬 [illegible]
右㕮咀水九升煮取三升去滓下芒硝分三服
治脾熱偏一邊痛[illegible]
茯苓 橘皮 [illegible] 芍藥 白朮 各四
人參 桂心 各二兩 石膏 [illegible] 半夏 [illegible] 生薑 [illegible]
桑白皮根 [illegible]
右[illegible]以水[illegible]升煮取三升去滓分三服若須利下加芒硝
二兩佳
瀉脾湯 治脾實熱[illegible]腹脹[illegible]不得臥
舌本強[illegible]

於心慶
茯苓 橘皮 草果去皮 白朮 半夏
人參 桂心 白芷 甘草 川芎
右剉散每四大錢水一盞半薑七片棗三枚同煎七分去滓服欲通利
加大黃[illegible]
清脾湯[illegible]
白芷 [illegible] 丹[illegible] 人參 甘草
半夏[illegible]
右各等分散每服四錢水一盞半薑五片棗二枚小麥三十粒煎七分
去滓不拘時服
瀉熱湯[illegible]治舌本強直或夢歌樂而體重不能行
前胡 茯苓 龍膽草 細辛 芒硝
杏仁 玄參 大青 苦竹葉
右㕮咀水九升煮三升分三服食後服
大黃湯[illegible]治脾實[illegible]中滿[illegible]咽喉不利

大黃 赤茯苓 枳殼 甘草
黃芩 陳皮 麥門冬 半夏 前胡
右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大拍碎煎七分不拘時候溫服
[illegible]赤茯苓湯 治脾實[illegible]腸[illegible]不思飲食
赤茯苓 [illegible] 旋覆花 人參 石膏 [illegible]
竹葉 枳殼 射干 甘草
右粗搗篩每服二錢匕水一盞生薑一棗大煎七分不拘時候溫服
前胡飲 治脾[illegible]
飲食
前胡 大腹皮 [illegible] 赤茯苓 桔梗
羚羊角 旋覆花 [illegible] 甘草
右搗篩每服三錢匕水一盞生薑[illegible]一棗大拍碎煎七分去滓
不拘時溫服
[illegible] 治脾[illegible]四肢[illegible]兩脇脹滿小便不利
[illegible] 枳殼 川芎 川大黃

木通 大黃 [illegible] 赤茯苓根白皮
右搗羅為細末煉蜜和丸梧桐子大每服食前以溫水下二十丸
[illegible]升麻湯 治脾臟壅實口內生瘡食少心煩
升麻 羚羊角屑 茯神 黃連 柴胡
麥門冬 人參 甘草
右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓食後溫服一方有黃芩
石膏湯[illegible]治脾實[illegible]口[illegible]
[illegible]
石膏 麥門冬 柴胡 [illegible]
[illegible] 地骨皮 葛根 甘草
右搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉[illegible]七片煎七分去滓入蜜半合
生地黃汁一合[illegible]溫服
瀉脾湯 治脾[illegible]實胸中滿不能食
茯苓 厚朴 甘草 人參 黃芩
桂心 生薑 半夏

右切以水七升煮取三升分[illegible]三服[illegible]
[illegible]
檳榔丸 治脾實腸腹堅脹坐臥不利
檳榔 木香 [illegible] 枳殼
桂 大黃 [illegible]
右搗羅為末煉蜜丸梧桐子大每服[illegible]米飲下十丸[illegible]
[illegible] 治舌強或夢歌樂[illegible]體重不能行
射干 大青 石膏 赤[illegible]
右以水[illegible]煮一升[illegible]去滓下蜜[illegible]一升分[illegible]服
治脾熱[illegible]不歇[illegible]口乾裂
[illegible] 生地黃 [illegible]
右[illegible]水[illegible]取七升去滓[illegible]取一升五合
去滓下地黃[illegible]三升[illegible]
治脾[illegible]
[illegible]

又方 [illegible]用赤小豆末[illegible]雞子白傅之

生[illegible]氣[illegible]人[illegible] [illegible]治胃痛腹脹常嘔吐反胃[illegible]

用大黃[illegible]取一升分服又主食飲吐并大便不通

者加甘草[illegible]服[illegible]

麥門冬煎[illegible]治脾胃壅實[illegible]口乾燥[illegible]水不止

治脾藏積熱[illegible]中[illegible]氣[illegible]安臥

大黃 [illegible] 桔梗 杏仁 羌活

訶子 枳殼 麻黃 防風 芍藥

右細杵羅為末每服一錢水一盞生薑二片[illegible]煎[illegible]入分食後和滓服

○脾痛

參朮散 治虛弱人脾疼

人參 白朮 當歸 白茯苓 砂仁

丁香 陳皮 甘草

右等分為散每服一錢[illegible]入鹽[illegible]入鹽一大錢

併服

胃痛氣痛[illegible]

草豆蔻 陳皮 丁香 [illegible] 甘草

右調散每服二錢水一大盞[illegible]分入[illegible]不拘[illegible]

[illegible]

木香[illegible]

白朮 青皮 桑[illegible] 大枳殼

[illegible] 茯苓 神麴 甘草 [illegible]

[illegible] 官桂 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

治脾疼方

巴豆 [illegible] 陳皮

右為末醋糊丸如菉豆大每服十丸生薑湯下婦人血氣醋湯下痃

氣[illegible]湯下五[illegible]食積傷[illegible]小兒[illegible]飲下[illegible]

[illegible]

胡椒丸 治脾疼不可忍及[illegible]冷氣疼

陳茱萸 胡椒 蚌粉

右為末醋糊丸如桐子大每服一十丸用溫酒或鹽湯下不拘時服

甚者不過二三服效

八珍散 治脾疼不進飲食

白豆蔻 石蓮肉 白茯苓 薏苡仁 白扁豆

木香 陳皮 甘草

右為[illegible]每服[illegible]

合[illegible]方[illegible]得此疾[illegible]

治胃元氣弱無時痛不可忍

茱萸 桃仁

右和炒合焦黑為度去茱萸取桃仁去皮尖研細蔥白三莖煨熟

酒調下分三次

良薑拈痛散 治脾疼

用良薑切作大片先用吳茱萸慢火炒[illegible]入東壁土[illegible]

[illegible]以米醋[illegible]茱萸[illegible]每服一錢[illegible]

服[illegible]空心[illegible]

治脾疼久不效者

用大川烏[illegible]

[illegible]

又三次[illegible]

草果散 治脾疼

草果[illegible]

甘草[illegible]

右一處[illegible]

末每服一錢[illegible]○[illegible]不用[illegible]之未見

[illegible]中[illegible]何[illegible]人任

[illegible]後[illegible]飲[illegible]進[illegible]脾[illegible]時[illegible]不可思

一日[illegible]客攻疾作[illegible]下[illegible]未得[illegible]服[illegible]斷根

[illegible]散[illegible]男子脾疾[illegible]

桃仁[illegible]

右為[illegible]木[illegible]月[illegible]服

小脾丸[illegible]治脾疾經久諸藥不効者

大[illegible]巴豆[illegible]七[illegible]入[illegible]七粒分十四片

[illegible]以[illegible]赤去[illegible]巴[illegible]不用[illegible]香為末

棗肉為丸如菉豆大每服[illegible]下不拘時候

温中丸[illegible]治脾痛

大棗七個[illegible]胡椒二[illegible]粒[illegible]桃仁[illegible]肉[illegible]用[illegible]香[illegible]去

紙[illegible]以[illegible]香湯[illegible]下一二十丸服

快氣丸[illegible]治脾疼

蚌粉一兩　木香一分　丁香一分　陳皮一兩　草豆蔻三個

右蚌粉先以火燒一次取出研用生薑自然汁[illegible]前[illegible]

細末煉蜜丸如[illegible]子大空心食前[illegible]丸薑湯[illegible]下

鷄舌香散[illegible]治脾[illegible]發[illegible]

良薑[illegible]

右件為細末每服一錢入鹽一捻[illegible]食前

[illegible]安脾散[illegible]治脾[illegible]之[illegible]

[illegible]

右研為末[illegible]時[illegible]一錢[illegible]

[illegible]

治噎[illegible]

用[illegible]

[illegible]

[illegible]又飲木[illegible]中遂

惡[illegible]之疾[illegible]道[illegible]一道人曰我曾

常人[illegible]作所[illegible]服[illegible]椒二十一粒[illegible]水[illegible]中[illegible]

[illegible]白[illegible]已[illegible]日[illegible]下[illegible]作

潤脾散[illegible]治脾疼[illegible]

木香[illegible]　丁香　檳榔　大腹[illegible]　天台烏藥

蓬术[illegible]　辣桂　生薑[illegible]　青皮[illegible]　白豆蔻仁

縮砂仁[illegible]　甘草[illegible]

右剉每服[illegible]錢[illegible]紫蘇四葉煎服

二陳湯[illegible]治脾痛

雞心大檳榔[illegible]

右細剉每服二錢陳米百粒煎服

脾疼方[illegible]

用大栗[illegible]

[illegible]兩[illegible]以三盞煎[illegible]盞飲其中[illegible]

治一切[illegible]痛[illegible]

枳殼[illegible]　甘草[illegible]

右為末[illegible]研椒[illegible]三錢[illegible]

治[illegible]

[illegible]

右[illegible]丸[illegible]一升分[illegible]又方加[illegible]

[illegible]

治[illegible]

用[illegible]

治[illegible]

[illegible]

○脾實熱咽喉不利　附論

大腸者心之府候於舌[illegible]通於咽喉[illegible]白木[illegible]之道[illegible]神氣

之注表[illegible]

射干散 治脾胃熱咽喉腫痛[illegible]

射干 [illegible] 白芍[illegible] 大青 [illegible] 麻黃 赤茯苓[illegible]

川升麻 [illegible] 桔梗[illegible] 甘草[illegible] 石膏[illegible]

杏仁[illegible]

右為散每服[illegible]錢水一中盞入竹葉二七片生地黃一分煎至六分去滓不計時候溫服

六分去滓不計時候溫服忌炙煿熱麵

枳殼散 治脾胃實熱咽喉乾澀[illegible]

枳殼 [illegible] 石膏 [illegible] 柴胡

玄參 [illegible] 赤茯苓 [illegible] 川升麻 [illegible] 射干 [illegible] 羚羊角屑

甘草[illegible] 麥門冬[illegible]

右為散每服三錢水一中盞入竹葉二七片煎六分去滓不計時服

犀角丸 治脾藏實熱咽喉不利口舌乾燥

卷六十

犀角屑 [illegible] 牛蒡子 [illegible] 射干 [illegible] 川升麻 [illegible] 麥門冬[illegible]

[illegible] 木通 [illegible] 黃芩 [illegible] 馬牙硝 [illegible] 龍腦[illegible]

甘草[illegible]

右搗細羅為末入研了藥令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服竹葉湯下

二十丸食後服之忌炙煿熱麵

升麻散 治脾胃實熱咽中腫痛氣不通

川升麻 [illegible] 射干 [illegible] 羚羊角屑 [illegible] 木通 [illegible] 赤芍藥[illegible]

甘草 [illegible] 川大黃 [illegible] 川芒硝 [illegible] 黃芩[illegible]

[illegible]

右為散每服[illegible]錢水一中盞入生地黃一分煎至六分去滓不計時候溫服

[illegible]散 [illegible] 咽喉不利轉動不能行步

[illegible] 赤茯苓 [illegible] 玄參 [illegible] 大青 [illegible] 龍腦[illegible]

杏仁 [illegible] 川芒硝 [illegible] 絡石 [illegible] 川升麻[illegible]

右[illegible]散[illegible]不計時候溫服[illegible]

地骨皮散 [illegible]

[illegible] 川升麻 [illegible] 青竹茹[illegible]

細

[illegible] 射干 [illegible] 龍腦[illegible]

右為散每服[illegible]以水一中盞煎至五分去滓入牛蒡汁一合更煎一兩

沸食後溫服

牙硝散 [illegible]

犀角屑 [illegible] 鍼砂 [illegible] 黃芩 [illegible] 川升麻 一兩

馬牙硝 [illegible] 玄參 [illegible] 射干 一兩 甘草[illegible]

右為散每服[illegible]水一中盞煎至五分去滓入竹瀝半合更煎一兩

沸不計時候溫服

脾虛冷

人脾氣偏虛中央土王於四季受水穀之精[illegible]化氣血以榮華周養身體

凡脾虛者[illegible]

[illegible]

[illegible]四肢[illegible]

春是脾虛之候也

卷六十

大建脾散 治脾胃虛冷不進飲食

蓽澄茄 乾薑 白豆蔻 丁香 白茯苓

甘草 肉豆蔻 青皮 半夏 茴香

縮砂仁 厚朴 神麴 陳皮 檀香

草豆蔻[illegible] 附子[illegible] 草果仁[illegible] 白朮[illegible]

右為末每服三錢水一盞生薑[illegible]棗一枚煎七分食前服

補脾[illegible]

[illegible] 石斛[illegible] 五味子[illegible] 肉桂[illegible] 附子[illegible]

白茯苓[illegible] 人參[illegible] [illegible] 益智子[illegible] 白朮[illegible]

[illegible] 白茯苓[illegible] 丁香[illegible]

高良薑[illegible] 厚朴[illegible]

右[illegible]為末煉蜜和丸如梧桐子大每服[illegible]

[illegible]

枳殼 [illegible] 白豆蔻
[illegible] 木香 [illegible] 良薑
[illegible] 甘草 [illegible] 青皮 [illegible] 半夏
大參蘇 [illegible]
右八味每服二錢水一盞薑五片棗一枚煎[illegible]空心服食
[illegible]
異功散 治脾胃虛冷不思飲食
木香 [illegible] 當歸
陳皮 [illegible] 前胡 [illegible] 蓮肉 [illegible] 藿香
甘草 [illegible] 白茯苓 [illegible] 沉香
右為細末每服二錢水一盞入鹽少許同煎至六分食前溫服
[illegible] 訶梨勒皮
[illegible]不進胃膈痞滿或不食而脹或已食而不消痰逆惡心胸膈吐食

氣虛或未發不化心腹脹滿已病不止應是一切脾胃病並不思男子婦人皆可服之
朱砂 [illegible] 人參 砂仁 白豆蔻 草果
肉豆蔻 紅豆 良薑 附子 白朮
厚朴 丁香 藿香 五味子 乾薑
胡椒 益智仁 麥門冬 草菓仁 橘紅 各[illegible]
右一如[illegible]棗去但不用牛心只用棗後研細為丸[illegible]每服十粒至
二十粒[illegible]
以銀鍋一口用白沙蜜五斤將藥一半同蜜拌入鍋內[illegible]
[illegible]
前藥一半和勻再[illegible]三夜取砂[illegible]入丸[illegible]
分細米[illegible]為丸[illegible]大法[illegible]
消脾胃[illegible]脾氣[illegible]腹脹滿胃脘不利食即嘔噫
水穀不消[illegible]
肉豆蔻 [illegible] 白朮 [illegible] 石斛

肉桂 [illegible] 丁香 [illegible] 蓽澄茄 [illegible] 訶梨勒
縮砂 [illegible] 人參 [illegible] 當歸 [illegible] 高良薑 [illegible] 木香
厚朴 [illegible]
右為末生薑[illegible]丸如梧桐子大每服[illegible]鹽湯下三十丸
治虛脾胃[illegible]
五加根皮 丹參 橘皮 地骨皮 乾薑
白朮 [illegible] 豬椒根皮 熟地黃 芎藭 附子
桂心 桔梗 大棗 甘草
右以清酒四斗漬五七日服七八合加至一升日再服
大理中丸 治脾胃虛冷心腹脹痛不思飲食
厚朴 [illegible] 桂心 陳橘皮 白朮
甘草 芎藭 五味子 縮砂 藿香子
檳榔 [illegible] 乾薑 胡椒 丁香
右為末煉蜜丸[illegible]每服一丸細嚼鹽湯或溫酒下
大[illegible] 治脾虛飲食減少[illegible]

[illegible] 白朮 蓽撥 [illegible] 胡椒
白茯苓 [illegible] 附子 [illegible] 陳橘皮 [illegible] 訶梨勒 [illegible] 桂心
厚朴 [illegible] 乾薑 [illegible] 陳麴 [illegible] 大麥蘗
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸[illegible]米飲下食前服
藿香湯 治脾胃[illegible]
藿香葉 [illegible] 神麴 [illegible] 白朮
厚朴 [illegible] 生薑 [illegible] 棗 [illegible] 半夏
甘草 [illegible] 人參 [illegible] 陳橘皮 [illegible] 高良薑
右剉如麻豆大每服三錢水一盞[illegible]煎至[illegible]
丁香白朮飲 治脾[illegible]
丁香 [illegible] 白朮一兩 白豆蔻 桂心 高良薑
白茯苓 [illegible] 陳橘皮 [illegible] 乾薑 [illegible] 檳榔
蒼朮 [illegible] 厚朴 [illegible]
烏頭 [illegible]
右剉如麻豆每服三錢水一盞生薑二片[illegible]煎至六分[illegible]

右爲末，每服[illegible]食前服

治[illegible]

不食水穀[illegible]大腸自利

肉豆蔻 [illegible] 附子 [illegible] 白豆蔻 [illegible] 厚朴 [illegible] 白朮

乾薑 炮 紅豆 神麴 [illegible] 丁香 胡椒

木香 [illegible] 甘草 炙 各半兩

右㕮咀，每服[illegible]水一盞半，生薑五片，棗子一枚，煎七分，去滓，[illegible]服[illegible]

[illegible]

半夏湯 [illegible]

服藥[illegible]

半夏 [illegible] 大麻仁 [illegible] 生薑 各一[illegible] 白朮 [illegible] 茯苓

五味子 [illegible] 人參 [illegible] 橘皮 [illegible] 白朮 四兩 附子 五兩

甘草 一兩 大棗 三枚

右㕮咀，以水一斗二升，煮取三升，去滓，下大麻仁[illegible]更上火一沸，分三服

補脾麴朮丸 [illegible]心腹脹滿，食少無力

神麴 炒 [illegible] 附子 [illegible] 兩 [illegible] 陳皮 [illegible] 二兩 [illegible] 陳皮

蓽澄茄 一兩 [illegible] 丁香 半兩 白豆蔻 去皮

白朮 [illegible] 人參 [illegible] 蓽澄茄 [illegible] 木香 [illegible] 陳橘皮

[illegible]

右爲末，[illegible]丸如梧桐子大，每服[illegible]米飲[illegible]湯下，二十丸至三十五

十丸，米飲下

温脾丸 治久病虛羸，脾氣弱，食不消，喜噫

黃蘗 大麥蘗 吳茱萸 桂心 乾薑 炮

細辛 附子 炮 當歸 大黃 [illegible] 神麴 炒

甘草 [illegible]

右爲末，煉蜜丸如梧桐子大，每服三十丸，空心酒飲任下

大溫脾丸 [illegible]

神麴 [illegible] 人參 [illegible] 附子 [illegible] 乾薑 [illegible] 良薑

吳茱萸 [illegible] 枳殼 [illegible] 橘皮 [illegible] 細辛 [illegible]

枳殼 一兩

右爲末，[illegible]丸如梧桐子大，每服五十丸，[illegible]米飲下

養胃[illegible]散 治脾胃虛[illegible]不思飲食，[illegible]

東垣[illegible]

人參 白茯苓 去皮 附子 [illegible] 訶梨勒皮 [illegible] 甘草 炙

白豆蔻 [illegible] 草豆蔻 [illegible] 乾薑 [illegible] 麥蘗 [illegible] 一兩

白豆蔻 [illegible] 丁香 [illegible]

右爲散，每服一錢，[illegible]七八沸[illegible]

厚朴丸 治脾虛[illegible]飲食不消[illegible]

厚朴 [illegible] 白朮 [illegible] 大麥蘗 [illegible]

乾薑 [illegible] 人參 [illegible] 茯苓 [illegible] 陳橘皮 [illegible]

甘草 [illegible] 訶梨勒皮 [illegible]

右爲末，煉蜜丸如梧桐子大，[illegible]空心米飲下二十丸，加至三十丸，日再

人參湯 治脾[illegible]腹脹[illegible]

人參 一兩 石斛 [illegible] 黃耆 [illegible] 東橘皮 [illegible]

枳殼 [illegible] 白朮 [illegible] 附子 [illegible] 桂 [illegible]

丁香 白茯苓 [illegible] 草豆蔻 [illegible]

右剉如麻豆，每服三錢，水一盞，入生薑[illegible]分，棗三枚[illegible]

分，去滓，稍熱服，不拘時候[illegible]

胸[illegible]

健[illegible]

[illegible]

[illegible]

補脾湯 治脾氣不足，心腹脹滿[illegible]

厚朴 [illegible] 白朮 [illegible] 人參

乾薑 [illegible] 白茯苓 [illegible] 良薑 [illegible] 陳橘皮 [illegible]

右[illegible]每服三錢，水一盞半，[illegible]

安中散 [illegible]

[illegible]脾胃[illegible]

白豆蔻 人參 白朮 川芎 白茯苓

橘皮 厚朴 甘草

乾薑 丁香

右剉如麻豆大每服一錢七水一盞生薑三片棗子一枚煎至六分

去滓食前溫服

草豆蔻散 治脾臟久虛積冷不散 ...

草豆蔻 附子 楝實 山茱萸

青橘皮 乾薑 益智 天雄 [illegible]香子

沉香

右剉如麻豆大每服一錢七水一盞生薑三片鹽米錢乙文七莖同

煎六分去滓稍熱空心服

補脾湯 治脾胃虛冷 ...

畫 [illegible] 食不 ...

人參 白茯苓 草果 乾薑 麥蘗

甘草 厚朴 橘皮 白朮

右為散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服

枳殼湯

川芎 陳皮 青皮 乾薑 白朮

草果 縮砂仁 官桂 甘草

右為細末每服一大錢入鹽少許沸湯點服不拘時

華撥丸 亦名華撥丹又名縮水丹 ...

華撥 人參 白茯苓 乾薑 胡椒

大附子 草豆蔻 官桂 訶子

右為末煉蜜和杵三二百下丸梧桐子大食前鹽米飲下四五十粒

豆蔻湯 治脾虛腹脹 ...不思飲食

草豆蔻 人參 白茯苓 陳橘皮

麥蘗 白朮 附子 甘草

右剉如麻豆每服一錢七水一盞 ... 煎取七分去滓 ...

白朮湯 治脾虛下泄 ... 飲食 ... 不補脾

白朮 五味子 白芍藥 甘草

訶黎勒皮

桂

右剉如麻豆每服二錢七水一盞入生薑半分切棗二枚擘破煎

六分去滓 ... 不拘時 ...

補脾訶黎勒散 治脾氣虛大腸下泄腹痛不思飲食

四肢少力

訶黎勒皮 草豆蔻 陳橘皮

附子 甘草 木香 當歸

縮砂 厚朴

右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗一枚煎六分去滓不計時

補脾散

補脾白豆蔻散 治脾氣虛食欲減腹脹少思飲食

白豆蔻 乾薑 人參 附子

甘草 陳橘皮 枳殼

白朮 厚朴

右為散每服三錢水一中盞棗三枚煎六分去滓食前稍熱服之

撥脾散 治脾虛飲食不消常倦氣眼暗多忘不眠

撥脾 人參 茯苓 東麵

麥蘗 吳茱萸 白朮 厚朴

右治下脈食後服二方寸匕日再一方用橘皮兩半

五加皮 治肉虛坐不安床好動主脾病寒氣所傷

五加皮 枸杞皮 乾地黃 丹參 石膏

杜仲 乾薑 附子

右㕮咀以清酒二斗漬三宿一服七合日再

厚朴丸 治脾虛不能飲食補脾

厚朴 附子 白朮 桂

人參 赤茯苓 甘草 青橘皮

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸至五十丸空心溫湯下

白朮散 治脾虛腹脹不思食

白朮 厚朴 吳茱萸

人參 白茯苓去黑皮 麥蘗炒 芍藥炒 陳麯炒

右搗羅爲散每服二錢空心溫酒調下日二 一方加大腹檳皮

治脾虛心腹脹滿[illegible]黃腫脹滿

蓽撥 木香 附子炮去皮臍 胡椒

桂去粗皮 乾薑炮 訶梨勒皮[illegible]

右爲末煉蜜丸梧桐子大每服空心溫酒下十五丸日三

豆蔻丸 治脾胃虛弱不下飲食[illegible]

陳麯丸 治脾胃虛冷飲食不消

陳麯炒 乾薑炮 枳殼麩炒 附子炮去皮臍

人參 蜀椒去目[illegible] 甘草炙

右爲末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸早晚食前服

六君子湯 治脾臟不和不進飲食上燥下寒服熱藥不得者

人參 白朮 各一兩 橘紅

半夏湯洗 枳殼去瓤麩炒 甘草炙 各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑七片棗子一枚煎七分去滓溫服不[illegible]

[illegible]

快脾飲子

連皮生薑 甘草炙 附子炮去皮臍 陳皮去白各四兩

良薑 厚朴去皮薑汁制各二兩

右㕮咀爲散每服四錢生薑二十片棗二枚水一大盞半煎八分去滓

空心服

烏藥丸 治脾[illegible]

烏藥炒 沉香 檳榔 白芷

木香 草豆蔻 各三

右爲末煉蜜丸梧桐子大每服十五丸食前生薑米飲下

訶梨勒湯 治脾虛不思飲食[illegible]

訶梨勒 厚朴 人參一兩

乾薑炮 白茯苓

右爲細末每服二錢以水一盞煎六分去滓空心溫服日再

溫中丸 治脾[illegible]

白朮 乾薑炮 半夏 細辛 胡椒

右爲末煉蜜丸如梧子大每服五十丸空心溫酒下 米飲亦得

石斛丸 治脾虛[illegible]不思飲食

石斛 乾薑炮 附子炮去皮

肉豆蔻 橘皮[illegible]

右爲末[illegible]丸梧桐子大每服十丸至三十丸空心米飲下日再

治橘丸

生薑 陳皮 神麯

右爲細末麵糊丸梧桐子大每服三十丸至五十丸空心熱水任下不

拘時候

麻仁散

大黃 大麻子

右治下藥飲和服一合日四五任情多少

附子湯 治脾虛

附子 人參

右剉如麻豆每服二錢以水一盞入棗二枚生薑三片煎至六

分食前去滓溫服

治脾虛冷嘔食不下[illegible]脈右手關脈微細大

脾虛冷宜服此方

吳茱萸 肉豆蔻

甘草 丁香

附子 各一 石斛 青橘皮

右件細剉每服二錢水一盞煎取八分空心和滓去滓溫服

白朮

治脾臟虛冷[illegible]

前胡[illegible]

肉豆蔻 藿香 人參 防風

桔梗 芎 甘草

半夏 木香 石斛

右先把[illegible]

每服二錢水一盞煎至七分[illegible]空心[illegible]食前溫服

沉香散 治脾元氣不和中焦氣悶氣滿[illegible]

沉香 [illegible] 木香 [illegible] 人參 [illegible] 郁李仁 [illegible]

[illegible] 青橘皮 [illegible] 檳榔 [illegible] 肉桂 [illegible]

甘草 [illegible] 乾薑 [illegible]

右為末每服二大錢水一盞煎至七分不計時候溫服

治脾臟冷氣攻心腹疼痛飲食即吐[illegible]

草豆蔻 [illegible] 木香 [illegible] 枳殼 [illegible] 甘草 [illegible]

[illegible] 蓬莪朮 [illegible] 人參 [illegible] 青橘皮 [illegible]

右細剉每服二錢水一盞[illegible]煎至[illegible]分空心[illegible]

右[illegible]

治脾臟虛[illegible]

厚朴 [illegible] 白橘皮 [illegible] 甘草 [illegible] 芍藥 [illegible] 肉豆蔻 [illegible]

茯苓 [illegible] 防風 [illegible] 吳茱萸 [illegible]

右細剉每服二錢水一盞煎[illegible]

果脾丸

檳榔 [illegible] 益智 [illegible]

右為細末用[illegible]每服七十丸[illegible]

[illegible]

[illegible]

服[illegible]

脾臟冷氣攻心腹疼痛 附論

夫脾臟冷氣攻心腹疼痛者[illegible]

[illegible]

[illegible]

沉香[illegible] 肉豆蔻 [illegible]

草豆蔻 [illegible] 巴戟天 [illegible] 丁香 [illegible] 丁香 [illegible]

[illegible] 胡椒 [illegible] 乾薑 [illegible] 阿魏 [illegible]

木香 [illegible] 茴香 [illegible] 當歸 [illegible] 白豆蔻 [illegible] 芍藥 [illegible]

[illegible] 蓽澄茄 [illegible] 陳橘皮 [illegible] 益智 [illegible] 五味子 [illegible]

遠志 [illegible] 桃仁 [illegible]

右為末[illegible]丸如[illegible]大每服[illegible]

[illegible]

[illegible] 人參 [illegible] 大腹皮 [illegible]

地榆 [illegible] 當歸 [illegible] 白朮 [illegible]

木香 [illegible] 白茯苓 [illegible] 桂 [illegible] 茯苓 [illegible] 乾薑 [illegible]

赤石脂 [illegible] [illegible]人 [illegible]

右為末[illegible]飲丸梧桐子大每服二十丸空心米飲下

京三稜丸 治脾臟冷氣攻心腹疼痛[illegible]不思飲[illegible]

京三稜 [illegible] 鱉甲 [illegible] 木香 [illegible] 白朮 [illegible]

川大黃 [illegible] 當歸 [illegible] 京[illegible] 厚朴 [illegible]

[illegible] 乾薑 [illegible] 吳茱萸 [illegible] 陳橘皮 [illegible]

[illegible] 訶黎勒 [illegible] 防葵 [illegible] 桂心 [illegible]

檳榔 [illegible] 附子 [illegible]

右為末煉蜜和丸梧桐子大每服不計時候生薑橘皮湯下二十丸

蓽澄茄湯 治脾臟冷氣攻心腹疼痛悶亂煩燥手足[illegible]吐[illegible]

蓽澄茄 [illegible] 沉香 [illegible] 人參 [illegible] 赤茯苓 [illegible]

五味子 [illegible] 巴戟天 [illegible] 桂 [illegible] 白朮 [illegible] 芍藥 [illegible]

木香 [illegible] 肉豆蔻 [illegible] 附子 [illegible] 茯[illegible] 陳麴 [illegible]

右剉如麻豆每服三錢匕以水一盞入生薑三片棗二枚擘破煎七分去滓食前溫服

蓽澄茄丸 治脾臟冷氣攻心腹[illegible]霍亂嘔吐[illegible]

治[illegible]冷氣[illegible]不可忍[illegible]

麝香[illegible] 硇砂[illegible] 石斛[illegible]

蓽澄茄[illegible] 蓽茇[illegible] 木香[illegible]

阿魏一兩 丁香 [illegible] 桂去皮[illegible]

當歸切焙 吳茱萸[illegible] 檳榔[illegible]

右搗羅十二味為末入研藥拌勻用醋煮麵糊丸梧桐子大每服二十

丸至三十丸溫酒下未效[illegible]空心服

治[illegible]冷氣攻心腹疼痛及[illegible]不散面色萎黃

手足常冷不思飲食

京三稜[illegible] 白朮一兩 桂心半兩 青橘皮[illegible]

木香[illegible] 芍藥[illegible] 枳殼[illegible] 訶[illegible]

人參[illegible] 乾薑[illegible] 甘草[illegible]

[illegible]

右[illegible]為末每服[illegible]

[illegible]丸

訶梨勒[illegible] 人參[illegible] 桂心半兩 乾薑[illegible]

白茯苓一兩 木香半兩 肉豆蔻[illegible] 當歸[illegible]

京三稜[illegible] 檳榔子一兩[illegible] 當歸[illegible]

檳榔一兩 青橘皮[illegible] 桔梗[illegible] 附子[illegible]

右為末煉蜜和丸梧桐子大每服不計時溫酒下三十丸

治脾胃冷氣心腹刺痛[illegible]飲食[illegible]化痰[illegible]和

乳香丸

[illegible]止[illegible]

乳香[illegible] 沉香[illegible] 沒藥研 木香[illegible] 砂研

枳殼[illegible] 蓬莪朮[illegible] 烏頭[illegible] [illegible]

[illegible] 乾薑[illegible] 阿魏[illegible] 青橘皮[illegible]

右為末以硇砂一兩[illegible]

入前末和丸如梧桐子大每服十丸至十五丸溫酒或薑湯下

[illegible]丸

[illegible]攻心[illegible]

[illegible]

桂[illegible] 乾薑[illegible] 紅豆蔻[illegible] 枳殼[illegible]

木香[illegible] [illegible] [illegible]

甘草[illegible]

右為末[illegible]丸梧桐子大每服二十丸生薑米飲下不拘時

[illegible]四肢

肉豆蔻散

[illegible] 白朮[illegible] 木香[illegible] [illegible]

丁香[illegible] [illegible] 當歸[illegible] [illegible]

[illegible] 甘草[illegible] 桂心

右為散每服三錢水一中盞入薑半分棗一枚煎六分去滓不計時候

溫服

檳榔丸

治[illegible]氣[illegible]不思飲食

色萎黃四肢無力

檳榔[illegible] 青橘皮[illegible] [illegible]

丁香 蓽撥 白豆蔻去皮 人參[illegible]

附子[illegible] 乾薑[illegible] 蓬莪朮[illegible] 訶黎勒[illegible]

木香 桂心

右為末煉蜜和丸梧桐子大每服不計時[illegible]下二十丸

益智丸

治脾胃冷氣攻心腹疼痛[illegible]不思飲食[illegible]

化[illegible]

[illegible] 青橘皮[illegible]

益智去皮 [illegible] 巴豆[illegible] 桂[illegible]

木香 [illegible]

[illegible]

[illegible]

蓬莪子沙 [illegible]

[illegible]

右件[illegible]

五十丸[illegible]

[illegible]

丁香 人參 白茯苓

縮砂 木香 京三稜 [illegible]

肉豆蔻 甘草 [illegible] 吳茱萸

右為細末每服二錢空心米飲[illegible]

[illegible]治脾[illegible]多痰[illegible]

[illegible]食[illegible]

[illegible]手足逆冷肌體[illegible]

丁香 [illegible] 肉豆蔻 [illegible] 附子 [illegible]

太平聖惠方卷[illegible]

高良薑 桂 乾薑炮 丁香 檳榔

胡椒 巴豆 [illegible] 大黃 [illegible]

[illegible]

右除巴豆外[illegible]末[illegible]如[illegible]丸

[illegible]大每服五丸至七丸[illegible]

[illegible]

附子丸[illegible]

[illegible]

附子 [illegible] 人參

右為末[illegible]

[illegible]大每服二十丸空心[illegible]

木香 當歸 [illegible]氣攻心[illegible]不思飲食

[illegible]

[illegible] 當歸 [illegible]

吳茱萸 [illegible]

右為散每服[illegible]中盞[illegible]

[illegible]腳氣[illegible]攻心[illegible]

[illegible]食

[illegible] 木香 [illegible] 當歸 [illegible] 桂心 [illegible] 高良薑 [illegible]

[illegible] 訶黎勒 [illegible] 草豆蔻 [illegible] 附子 [illegible]

陳橘皮一兩 [illegible] 白朮 [illegible] 神麴 [illegible]

右為散每服三錢水一中盞入棗[illegible]

[illegible]治脾[illegible]冷氣攻心腹疼痛[illegible]不思

[illegible]

蓽撥 三分 木香 半兩 桂心 半兩 白茯苓 [illegible] 檳榔 一兩

附子一兩 [illegible] 胡椒 三分 [illegible]

[illegible] 訶黎勒 一兩 [illegible] 人參 [illegible]

右搗羅為末[illegible]和丸如梧桐子大每服不計時候[illegible]下二十丸

丁香丸[illegible]治[illegible]心腹[illegible]痛及女人血氣

丁香 [illegible] 肉豆蔻 [illegible] 青橘皮 [illegible]

胡椒 [illegible] 檳榔 [illegible] 麝香 [illegible] 乳香 [illegible]

巴豆 [illegible]

右將[illegible]以上[illegible]大人[illegible]三[illegible]大用

[illegible]每服五丸[illegible]下[illegible]

[illegible]下七丸女人血氣[illegible]當歸[illegible]下五丸[illegible]大[illegible]有神效

[illegible]治[illegible]氣[illegible]

木香 [illegible] 一香 [illegible] 蓽澄茄 [illegible]

阿魏 [illegible] 桂 [illegible] 肉豆蔻 [illegible]

[illegible]豆 [illegible]

右為末用粳米飯和丸如綠豆大每服三丸至五丸食後生薑湯下

[illegible]如[illegible]

[illegible]冷氣攻[illegible]心腹[illegible]痛及下元[illegible]冷

烏頭 [illegible] 木香 [illegible] 附子 [illegible]

[illegible] 木香 [illegible]

硇砂 [illegible]

右搗羅為散每服一錢水八分入[illegible]煎四分至[illegible]心[illegible]服

[illegible]令散 治[illegible]心腹[illegible]

人參 [illegible] 京棗 [illegible] 陳橘皮 [illegible]

京三稜 [illegible] 青橘皮 [illegible] 春藥 [illegible]

水香 甘草 [illegible]

右搗羅為細散每服一錢[illegible]生[illegible]不拘時服

木香散 [illegible]

木香 [illegible] 人參 [illegible] 吳茱萸 [illegible]

青橘皮 [illegible] 檳榔 [illegible] 桂心 [illegible] 蓬莪茂 一兩

當歸 [illegible] 乾薑 [illegible]

右搗羅為散不計時候熱酒調下一錢

治[illegible]心腹[illegible]不思飲食令氣[illegible]因[illegible]吐酸水

沉香 桂 [illegible] 白豆蔻 [illegible] 青橘皮 [illegible]

高良薑 [illegible] 吳茱萸 [illegible] 厚朴 [illegible]

右[illegible]為散每服三錢水一盞煎[illegible]不拘時候

[illegible]心腹[illegible]刺痛[illegible]

紫[illegible] 芫花 [illegible]

[illegible]巴豆[illegible]

右[illegible]巴豆[illegible]每服[illegible]水[illegible]

每服一丸[illegible]生薑湯下

吳茱萸散 治[illegible]攻心腹疼痛不可忍

吳茱萸 [illegible] 高良薑 [illegible] 桂心 [illegible] 厚朴 [illegible]

木香 [illegible]

右為散每服二錢水一中盞煎六分去滓不計時候熱服

[illegible]湯 治脾胃氣不足[illegible]上[illegible]心腹疼痛

附子 [illegible] 桂 [illegible] 當歸 [illegible] 甘草 [illegible] 草豆蔻 [illegible]

右剉如麻豆每服二錢水一盞薑三片煎七分去滓服

治[illegible]心腹[illegible]

吳茱萸丸 [illegible] 檳榔 [illegible]

右為末[illegible]為丸[illegible]每服[illegible]五丸[illegible]

[illegible]

附子 [illegible] 檳榔 [illegible] 木香 [illegible]

右同入[illegible]以[illegible]心[illegible]

[illegible]

治[illegible]茱萸湯 治[illegible]藏虛冷心腹疼痛

同[illegible]每服[illegible]水二盞[illegible]

[illegible]

人參[illegible]治脾藏[illegible]心腹[illegible]氣逆中[illegible]不進飲食

傷冷作寫[illegible]

人參 白术 大麥蘗 陳橘皮 乾薑

甘草 青橘皮 神麴 [illegible]

右件[illegible]細末[illegible]為丸[illegible]每服一丸[illegible]食前

服不進飲食[illegible]

[illegible]

右為粗末每服三錢水一盞煎至七分去滓食前溫服

脾藏冷氣腹內虛鳴 附論

夫脾為中州主[illegible]水穀[illegible]諸藏[illegible]

[illegible]

方

[illegible] 陳橘皮 [illegible]

枳殼 白朮 人參

半夏 訶梨勒 桂心

草豆蔻

右剉如麻豆大，每服三錢，水一盞，入生姜三片，棗一枚，煎至六分，去滓溫服。

烏頭丸 治脾藏冷氣腹脹，心腹疞痛，食少，嘔逆，口中多涎。

草烏頭 乾姜 芍藥 陳橘皮

桂心 檳榔 烏頭 胡椒 茴香子

天雄 丁香

紅豆蔻

右件藥搗羅為末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服不計時候，以溫酒下二十丸。

丁香散 治脾臟冷氣，腹脇脹滿，食不消化。

陳橘皮 白木 訶梨勒 乾姜

枳殼 桂心 人參 木香 人參 甘草

右細為羮散，每服三錢，水一盞，入生姜三片，棗二枚，煎至七分，

去滓食前溫服。

益智麥散 治脾臟冷氣腸鳴，不進飲食，無味稍虛。

益智 烏藥 桂心 天仙藤

陳橘皮 甘草 乾姜 木香 荳蔻

白木 丁香 人參

右搗為篩散，每服三錢，水一盞，入生姜三片，棗三枚，擘破，煎六分，

去滓空腹服。

桔梗散 治脾臟久積冷氣，流走腹內虛鳴，兩脇脹滿，少思飲食。

桔梗 白朮 丹參 白豆蔻 附子

高良薑 木香 沉香 檳榔 訶梨勒

陳橘皮

右為散，每服三錢，水一中盞，入生姜半分，煎六分，去滓食前稍熱服。

訶梨勒丸 治脾臟冷氣，腹內虛鳴，胸脇氣滿，不能飲食，雖食不消。

訶梨勒 人參 赤茯苓 白朮 桔梗 柴胡 桂心

紅豆蔻 乾薑 厚朴

右為末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服不計時，生薑湯下二十丸。

厚朴湯 治脾臟虛冷，腹脇脹滿，吐利不化。

厚朴 白茯苓 人參 草豆蔻

陳橘皮 半夏

桂心 木香 白朮 枳殼

右為散，每服四錢，水一盞，生薑三片，棗一枚，擘破，同煎至七分，

去滓食前溫服。

厚朴丸 治脾臟冷氣，腹內虛鳴，困倦嗜臥，不欲飲食，大便下利。

厚朴 白朮 乾姜 桔梗

當歸 陳橘皮 甘草

訶梨勒 白茯苓

右為末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服食前以粥飲下二十丸，忌生冷油膩。

肉豆蔻丸 治脾臟虛冷，氣攻心腹疞痛，腸鳴。

肉豆蔻 乾薑 陳橘皮 桂心

吳茱萸 厚朴 烏頭 半夏 白茯苓

右為末，煉蜜丸如梧桐子大，每服食前生薑湯下十五丸。

補脾散 治脾臟冷氣，腹內虛鳴，泄瀉及食乳瀉，日漸羸瘦。

木香 草豆蔻 陳橘皮 藿香子

厚朴 乾薑 訶梨勒 大麥蘗

右搗羅為散，每服食前以生薑鹽湯調下二錢。

赤茯苓散 治脾臟冷氣，胃滿不利，腹內虛鳴，少思飲食。

赤茯苓 白朮 桔梗 檳榔

吳茱萸 木香 沉香

當歸 枳實

右為散，每服二錢，水一中盞，生薑半分，棗一枚，煎六分，去滓食前稍熱服。

脹□□分出鹽
大棗七□ 右㕮咀每服□□□□□ 食前溫服
川人 [illegible] 甘草 [illegible] 柑 [illegible] 烏梅
參 [illegible] 人參 [illegible] 川椒
沉香 [illegible] 陳皮
右為末煉蜜丸梧桐子大每服□□空心米飲下
十丸

吳茱萸丸治脾藏冷氣積滯□□不化□腹痛
吳茱萸 [illegible] 神麴 [illegible] 陳橘皮
川椒 [illegible] 人參 [illegible] 桂 [illegible] 熟乾地黃
乾姜 [illegible] 當歸
右為末煉蜜丸梧桐子大每服食前粥飲下二十丸忌生冷

順氣丸治脾虛□冷□腹脹□□
細辛 [illegible] 木香 [illegible] 檳榔 [illegible] 訶梨勒皮

陳橘皮 [illegible] 白豆蔻 [illegible] 茯苓子一兩
右為末生薑汁□丸如梧子大每服二十丸生薑湯下
易下不利時

草豆蔻丸治脾胃久冷氣攻心腹痛嘔吐不下飲食
草豆蔻 [illegible] 乾姜 [illegible] 桂 [illegible] 訶梨勒皮 [illegible] 甘草
白茯苓 [illegible] 人參一兩
右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸

人參散治脾胃氣虛□□飲食不化嘔逆不止
人參 [illegible] 訶梨勒皮 [illegible] 丁香 [illegible] 木香
檳榔 [illegible] 陳橘皮
右為散每服二錢□□調下空心服

丁香丸治脾氣冷□心腹□□不利
丁香 [illegible] 沉香 [illegible] 桂 [illegible] 陳橘皮
甘草 [illegible] 胡椒
右為末煉蜜丸□□每服□□生姜湯下

大□湯治脾虛冷腹中□痛
附子 [illegible] 青橘皮 [illegible] 乾姜
使君子 [illegible] 木香
右㕮咀如麻豆大每服三錢水一盞入生姜大棗一枚同煎至七分去滓溫服不拘時

固脾丸治脾藏冷氣腹脹□□
高良姜一兩 附子 [illegible] 乾姜 [illegible] 胡椒
右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸生姜陳皮湯下不拘時

脾氣虛腹脹滿

大抵脾□水穀之精化為氣血□□□□於臟腑□□□□□不和則不能□□□□□□□□□□□□四肢不舉□□□□□□□□不化□□□□□□□□□之所由也

京三棱丸治脾虛冷□腹脹□□飲食不消□□□□□
京三棱 [illegible] 當歸 [illegible] 白朮 [illegible] 乾姜
厚朴 [illegible] 訶梨勒皮 [illegible] 吳茱萸
橘皮 [illegible] 枳殼 [illegible] 莪朮 [illegible] 陳麴 [illegible] 蓬莪朮
桂 [illegible] 檳榔 [illegible] 木香 [illegible] 當歸 [illegible] 甘草
人參 [illegible] 白茯苓一兩
右為末煉蜜和搗丸如梧桐子大空心米飲下三十丸加至四十丸日二服

木香湯治脾氣虛心腹脹滿嘔吐□□脾不和腹脅□□不思飲食
大腹皮 [illegible] 木香 [illegible] 肉豆蔻 [illegible] 人參
白茯苓 [illegible] 京三棱 [illegible] 乾姜 [illegible] 青橘皮
訶梨勒 [illegible] 沉香 [illegible] 桂
厚朴 [illegible] 半夏
右為粗末每服二錢水一盞入生姜三片棗一枚煎至七分去

[illegible]飲食前服

小沉香丸 治脾胃虛弱中脘不和脇肋脹滿[illegible]嘔吐[illegible]思

飲食

沉香 丁香 木香 枳殻[illegible] 人參

白茯苓[illegible] 陳皮[illegible] 人參[illegible] 荊三稜[illegible] 白朮[illegible]

肉豆蔻[illegible] 丁香皮 桂[illegible] 蓬莪朮[illegible] 白朮一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸[illegible]湯下不以時[illegible]空心服

白朮散 治脾氣不足心腹脹滿不思飲食若食則[illegible]盡服

白朮一兩 訶黎勒[illegible] 丁香[illegible] 人參一兩

草豆蔻[illegible] 青皮[illegible] 附子[illegible] 白茯苓[illegible] 藿香一兩

參[illegible] 沉香[illegible] 陳橘皮[illegible] 木香[illegible]

檳榔[illegible] 甘草[illegible]

右為散每服[illegible]錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎六分去滓不計

時溫服忌生冷油膩[illegible]

草豆蔻散 治脾胃氣不和心胃不快脇肋脹滿氣刺[illegible]

不思飲食面黃口淡[illegible]中酒

蓽澄茄[illegible] 丁香皮[illegible] 高良姜[illegible] 厚朴[illegible]

京三稜[illegible] 陳橘皮[illegible] 甘草[illegible] 藿香子[illegible] 桂[illegible]

香附子[illegible] 桔梗[illegible] 白鹽[illegible] 阿魏[illegible]

右[illegible]研[illegible]同和勻每服二錢[illegible]入生姜二片水一小盞煎五七

分[illegible]服[illegible]方更入木香[illegible]如梧桐子大

桔梗丸 治脾胃氣虛[illegible]中脘[illegible]脇肋脹滿飲食不下

桔梗[illegible] 防風[illegible] 蔓荊根[illegible] 遠志[illegible] 半夏

鹿茸[illegible] 橘皮[illegible] 蕪荑 紫石英[illegible] 桂[illegible]

乾姜[illegible] 吳茱萸[illegible] 甘草[illegible]

右為末煉蜜丸梧桐子大每日[illegible]用米飲下二十丸

育神湯[illegible]

右[illegible] 丁香[illegible] 白朮[illegible] 木香[illegible]

當歸[illegible] 人參[illegible] 訶黎勒[illegible] 附子[illegible]

赤[illegible] 桂[illegible]

右[illegible]為末每服五錢水[illegible]入生姜半分棗[illegible]

空心食前溫服[illegible]

[illegible]消[illegible]

[illegible]脾丸 治[illegible]脾[illegible]脹[illegible]飲食不消時[illegible]下

益智[illegible] 吳茱萸[illegible] 前胡[illegible] 大[illegible] 甘遂[illegible]

桂心[illegible] 蓽澄茄[illegible] 白[illegible]

附子[illegible] 蓽澄茄[illegible]

右[illegible]為末[illegible]丸[illegible]服三[illegible]

厚朴散 治脾氣不足心腹脹滿[illegible]不思飲食[illegible]四肢少力

厚朴[illegible] 白豆蔻[illegible] 肉桂[illegible] 當歸[illegible] 人參[illegible]

丁香[illegible] 白朮 高良姜[illegible] 吳茱萸[illegible] 陳橘皮[illegible]

訶黎勒[illegible]

右為散每服三錢水一中盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不計時

溫服忌生冷油膩[illegible]

訶黎勒散 治脾胃氣不足四肢不和[illegible]飲食[illegible]

訶黎勒[illegible] 人參[illegible] 當歸[illegible] 白朮[illegible] 乾姜[illegible]

桂心[illegible] 草豆蔻[illegible] 甘草[illegible] 厚朴[illegible]

吳茱萸[illegible] 陳橘皮[illegible]

右為散每服三錢水一中盞入[illegible]棗三枚煎至六分去滓[illegible]熱服之

白豆蔻[illegible] 治脾[illegible]不足[illegible]胃[illegible]脘[illegible]食少無力水穀不消

或時自利

白豆蔻[illegible] 訶黎勒[illegible] 黃耆[illegible] 沉香[illegible]

附子[illegible] 白朮[illegible] 人參[illegible] 肉桂[illegible] 木香[illegible]

枳實[illegible] 厚朴[illegible]

右細羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服溫酒下三十丸空心

及晚食前服忌生冷[illegible]

[illegible]桂大丸 治脾[illegible]

桂[illegible] 檳榔[illegible] 白豆蔻[illegible] 青橘皮[illegible]

附子[illegible] 丁香[illegible] 木香[illegible]

[illegible]

甘草（炙）　胡椒

右為末，煉蜜丸梧子大，每服半丸至一丸，嚼破，米飲下，溫酒亦得。

沉香散治脾氣虛弱，飲食不美，心胸痞悶，傷物惡心，噫氣不下。

京三稜（煨剉）　白术　甘草（炙剉）　麥蘖（炒）

陳麴（炒）　高良薑　白豆蔻　青橘皮

陳橘皮（湯浸去白焙）

右搗羅為細散，每服二錢，入鹽少許，沸湯點服，空心。

人參湯治久患氣脹，上塞心胸，食物不化，腸中切痛不止。

人參　陳橘皮（湯浸去白焙）　半夏（湯洗）

枳殼（去瓤麩炒）　草豆蔻（去皮）　丁香　紫蘇

木香　甘草　赤茯苓

右剉如麻豆大，每服五錢，以水一盞半，入生薑、棗，煎取八分，去滓溫服。

人參湯治脾亂久虛，腸鳴泄瀉，四肢不舉，腹脹，及水病。

人參　石斛　白术　桂（去粗皮）　澤瀉

黃耆　五味子　陳橘皮　白茯苓

右件搗羅，每服三錢，以水一盞，生薑三片，棗一枚擘破，同煎至六分，食前去滓溫服。

理中散治脾氣虛弱，嘔逆，腹脹不思飲食。

乾薑　人參　白术　甘草　吳茱萸

檳榔　陳橘皮　草豆蔻

右搗羅為散，每服一錢，入生薑、棗，食前服。

白术丸治脾虛，腸鳴，泄瀉，脹滿。

白术　訶梨勒　厚朴　山芋

丁香　木香　甘草　白茯苓

青橘皮

右為末，煉蜜丸梧桐子大，每服二十丸至三十丸，煎粟米飲下，食前日三服。

草豆蔻散治脾氣虛，腹脇脹滿，不納飲食。

草豆蔻　陳橘皮　木香　桂　附子

白术　乾薑

甘草

右為散，每服一錢，水一中盞，生薑、棗，煎六分，不計時。

益智子散治脾氣虛冷，心腹脹滿，四肢[illegible]，少思飲食。

益智子　沉香　赤茯苓　枳殼

白术　檳榔　紫蘇子　陳橘皮

木香

右為散，每服三錢，水一中盞，煎六分，去滓，食前溫服。

檳榔散治脾氣虛，腹脹滿不能食。

檳榔　白术　草豆蔻　訶梨勒

丁香　人參　厚朴　桂心

陳橘皮

右為末，每服溫酒調下一錢，忌生冷油膩。

沉香散治脾氣不足，腹脇脹滿，四肢無力，少思飲食。

沉香　附子　訶梨勒　人參

白术　五味子　白茯苓　丁香　枳實

右為散，每服三錢，水一中盞，生薑半分，棗三枚，煎六分，去滓，食前溫服，忌生冷油膩。

茱萸丸治脾虛冷，腹痛泄瀉，不思飲食，腸鳴脹滿。

草豆蔻散治脾氣虛弱，積冷心腹脹，不思飲食。

草豆蔻　厚朴　檳榔　木香　陳麴

乾薑　陳橘皮

右搗羅為散，每服二錢，以水生薑少許，沸湯點下，食前服。

橘紅散治脾氣虛，宿寒留滯，胃受水穀不能磨化，心腹脹滿。

陳橘皮　陳麴　麥蘖

香人參 甘草 人參 草豆蔻
右㕮咀為細散，每服一錢，入姜棗，鹽少許，煎湯點服。
陳橘皮散
陳橘皮 明椒 桂心 附子
高良姜 甘草 厚朴 訶梨勒
右細剉為散，每服食前以[illegible]湯調下一錢，忌生冷[illegible]。
丁香湯 治脾虛臟腑[illegible]不消，[illegible]消化[illegible]。
人參 白茯苓 白木 訶梨勒 甘草
陳皮大腹 草豆蔻
右為散，每服一錢，以水一盞，煎七分，去滓溫服，[illegible]加[illegible]。
黑散子 治脾虛腹脹[illegible]。

人參 丁香皮 附子
天仙藤 白豆蔻 益智
右剉入瓶子內[illegible]為散，每服三錢，以水一小盞，入[illegible]煎六分，溫服，一日三[illegible]。
補脾湯 治脾[illegible]不思飲食，[illegible]口舌乾，四肢[illegible]。
見人[illegible]
滿[illegible] 大腹皮 乾姜 白木
甘草 桑根白皮 人參
右[illegible]每服三錢，以水一盞，入大棗一枚，煎至七分，去滓。
心[illegible]服一方[illegible]人參
人參散 治脾[illegible]心腹脹滿，不思飲食，[illegible]
人參 丁香 白木 草豆蔻
木香 甘草 枳殼
右為散，每服一錢，水一中盞，生姜、大棗三枚，煎六分，去滓，不計時候。

溫脾[illegible]生冷[illegible]
順氣散 治脾虛腹脹，不思飲食
厚朴 陳橘皮 白木
半夏 乾姜 甘草
右搗為散，每服三錢，以水一盞，入生姜五片，棗二枚，煎至七分。
分食丸
溫中散 治脾虛不能飲食，[illegible]虛腹脹滿，[illegible]不[illegible]
陳麴 草豆蔻 麥蘗 陳橘皮
甘草 乾姜
右搗羅為散，每服二錢，[illegible]湯點，空心服。
調中散 治脾胃不和，心腹脹滿[illegible]。
蘿蔔子 沉香
白木 草豆蔻
右為細散，入前[illegible]子末，[illegible]入白砂糖一錢，同研令勻，每服一錢，於石臼內[illegible]以末飲下，[illegible]入黃豆末一合，[illegible]分，和令勻，每服一錢，米飲下，不計時候服。
茯苓湯 治脾氣不實，手足浮腫，小便秘[illegible]急喘。
赤茯苓 澤瀉 香附子 大腹皮
乾姜 桑白皮
右件㕮咀，每服五錢，水一盞半，煎至七分，去滓溫服，不拘時候。
桃仁散 治脾弱下虛，氣不升降，水道不利，三焦不順，
目[illegible]明[illegible]腹脹，[illegible]
桃仁 大腹子 白木
赤茯苓 紫蘇葉 木香 甘草
右件為細末，每服二錢，[illegible]不拘時候。
姜[illegible]湯 治脾虛[illegible]脹[illegible]飲食不進[illegible]
白豆蔻 [illegible]子 縮砂仁 白姜 甘草
右㕮咀，每服二錢，水一盞半，煎八分，空心服，屢用取效。
○脾臟虛冷泄痢

論

[illegible]

方

厚朴散方 治脾臟虛冷不思飲食腹內疼痛大腸泄痢水穀不化

厚朴 人參 當歸 乾薑

白朮 乾木瓜 高良薑 訶黎勒

桂心 木香 陳橘皮 附子

右為散每服三錢水一中盞棗三枚煎六分去滓不計時稍熱服忌生冷油膩

木香丸方 治脾臟虛冷大腸泄痢腹痛米穀不化

木香 附子 赤石脂 吳茱萸

縮砂 訶黎勒 高良薑 陳橘皮

當歸 草豆蔻 白朮 厚朴

右搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服食前熱粥飲下三十丸忌生冷油膩

木香湯方 治脾臟虛冷大腸泄痢腹內虛脹疼痛四肢不和不思飲食

木香 當歸 人參 乾薑

附子 甘草 厚朴

蒼朮 吳茱萸 陳橘皮

右剉如麻豆每服三錢水一盞棗一枚煎七分食前稍熱服

溫脾湯 主脾氣不足水穀下痢腹痛食不消

半夏 乾薑 赤石脂 厚朴

桂心 當歸 芎藭 甘草

人參 附子

右切以水九升煮取三升分為三服忌海藻菘菜豬肉冷水羊肉餳生葱

白朮丸方 治脾臟虛冷泄痢腹痛四肢乏力

白朮 乾薑 桂心 人參

厚朴 陳橘皮 附子

縮砂 草豆蔻 當歸 訶黎勒

右為散每服三錢水一盞棗三枚煎六分去滓食前熱服

厚朴丸方 治脾臟虛冷食即腸鳴泄痢飲食不化或多泄痢

厚朴 乾薑 人參 白朮

吳茱萸 陳橘皮 桔梗

半夏 當歸 甘草

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服粥飲下三十丸不計時

丸 治脾臟虛冷大便青色及冷痢腹多疼

蓽撥 高良薑 肉豆蔻 縮砂

附子 白朮 訶黎勒

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸米飲下空心服

雞舌香散 治脾臟虛冷泄痢不止

雞舌香 鹿茸 附子 天雄 木香

白龍骨 鍾乳粉 陽起石 肉豆蔻

右搗研為散再同研勻每服二錢空心溫酒調下

白朮散 治氣虛久泄痢不思飲食

白朮 縮砂仁 訶黎勒皮 肉豆蔻

甘草 木香 人參 丁香 乾薑

右搗羅為散每服三錢米飲調下

阿膠散 治脾臟虛冷大腸泄痢腹痛食不消化

阿膠 艾葉 乾薑 赤石脂

當歸 厚朴 桂心 芎藭

附子

右為散每服食前粥飲調下二錢忌生冷油膩粘滑

厚朴散 治脾臟虛冷大腸泄痢腹內疼痛四肢漸瘦少力或

厚朴 [illegible] 蒼朮 [illegible] 訶子肉 [illegible]
當歸 [illegible] 乾姜 [illegible] 木香 [illegible] 縮砂 [illegible] 赤石脂 [illegible]
附子 [illegible]
右爲散每服[illegible]以[illegible]飲調下一錢
厚朴散治脾虛大便滑泄[illegible]飲食不消[illegible]
厚朴 [illegible] 附子 [illegible] 乾姜 [illegible]
[illegible]
呉茱萸 [illegible] 草豆蔲 [illegible] 陳橘皮 [illegible] 訶子皮 [illegible]
縮砂人 [illegible]
右爲散每服二錢以食前米飲調下
豈要丸治脾臟虛冷泄瀉日夜不止精神昏倦腹痛不思飲食[illegible]
附子 [illegible] 當歸 [illegible] 陳橘皮 [illegible] 乾姜 [illegible]
蜀椒 [illegible] 厚朴 [illegible] 硫黃 [illegible]
呉茱萸 [illegible]

右爲末用[illegible]研勻以米醋和作劑分爲兩處用白麪半斤裹上件
藥令勻如[illegible]灰火內燒令[illegible]麪黃[illegible]入臼內杵三五百下丸如
梧桐子大每服二十丸[illegible]米飲下一切[illegible]食不消[illegible]
鹽湯下空心服[illegible]
厚朴散治脾臟虛冷[illegible]不止及[illegible]食[illegible]一切冷[illegible]
厚朴 [illegible] 草豆蔲 [illegible] 乾姜 [illegible] 白朮 [illegible]
訶梨勒 [illegible] 五味子 甘草 [illegible] 陳橘皮 [illegible]
右搗散每服三錢[illegible]水一盞[illegible]
人參散治脾臟泄瀉不止
人參 白茯苓 [illegible] 甘草 [illegible]
乾姜 [illegible] 白朮 [illegible] 陳橘皮 [illegible]
右爲麤散每服[illegible]一盞[illegible]食前稍熱服
[illegible]治脾虛泄瀉[illegible]
訶梨勒 [illegible] 附子 [illegible] 陳橘皮 [illegible] 白朮 [illegible]
乾姜 [illegible] 米麴 [illegible]

右剉如麻豆大每服[illegible]
不計時候
[illegible]散治脾臟[illegible]
青橘皮 [illegible]
益智子 [illegible]
右剉如麻豆每服三錢以水一盞[illegible]
空食前去滓溫服
治脾泄不止[illegible]
訶黎勒皮 白豆蔲 陳橘皮 [illegible] 乾姜 [illegible] 丁香 [illegible]
木香 肉豆蔲 [illegible]
右爲散用猪肝一具去筋膜細切[illegible]
裹作餅子四箇每日[illegible]
木香丸下[illegible]
白朮湯治脾臟虛冷泄瀉[illegible]
白朮 附子 [illegible] 陳橘皮 [illegible] 人參 [illegible]

[illegible]
右剉如麻豆每服三錢[illegible]
訶黎勒散治脾[illegible]
訶黎勒 [illegible] 附子 [illegible]
呉茱萸 [illegible]
右爲散每服[illegible]食前[illegible]粥飲調下二錢
訶黎勒丸治脾臟[illegible]
訶黎勒 [illegible]
右爲末[illegible]丸如梧桐子大每服二十丸[illegible]
[illegible]
右爲末[illegible]
丸至二十丸

烏頭丸 治脾中虛冷，宿食不化，氣止泄瀉

烏頭 炮去皮臍 桂 去粗皮 縮砂仁 良薑 陳橘皮 去白

右為細末，用巴豆取肉，慢火煎，候及午後，巴豆如芝子色，

即出，令於水中浸兩日，再換水又浸一日，令如油新豆，上

離出，以研極細，巴豆霜一兩，入諸藥末五兩，同研千萬匝，旋旋

令勻，用陳米一升半為細末，水調成糊，和丸

如菉豆大，每服五七丸，空心米飲下。

赤石脂丸 治脾虛泄瀉大腸

赤石脂 肉豆蔻

右為末和勻，煮麵糊為丸，梧桐子大，每服三十丸，空心米飲下。

肉豆蔻丸 治脾虛泄瀉不止

肉豆蔻 附子

右為末，煮麵糊為丸，梧桐子大，每服十五丸，加至二十丸，陳米飲下。

又方 一方等分為末，陳米飲調下。

附子散 治脾臟虛冷泄痢及白痢

附子 木香

右為散，每服一錢，空心用陳米飲調下。

養脾丸 治脾胃虛冷，心腹脹滿，不進飲食

生薑 甘草

青橘皮 縮砂仁 木香 乾薑 肉桂

蓬莪朮 當歸

右件為細末，煉蜜為丸，每一兩作二十丸，每服一丸，生薑湯嚼下，空

心食前。

治久患脾泄，水穀不止

用益智五兩，搗末，以飯丸如梧桐子大，每日空心午飯前，用陳米飲

下三十丸，增至四十丸，久服去三尸，益神，甚妙。

神聖香黃散 治久患脾泄

以宣連一兩，生薑四兩，一處以慢火炒，令薑乾脆，色深，去薑，取連碾

末，每服二錢，已空心臘茶清下，甚者不過二服瘥。

豆蔻散 治脾胃氣虛，滑泄下痢

用黃雌雞一隻，治如食法，以炭火炙之，人鹽醋，又令炙熟，乾燥，以空腹食之。

治脾胃氣冷，嘔逆不下食，如絞痛

用猪肝一斤，研著胡椒、高良薑、陳橘皮末，以麪作餛飩，熟煮，

空腹喫之。

治脾胃虛下痢，日夜不止，腸滑不下食

用野鷄一隻，如食法，細研，胡椒、陳皮、鹽、醬作餛飩，熟煮，空心食之。

脾勞 附論

夫人脾勞者，由脾氣以益，脾旺則威於四季，是以聖人春夏養陽，秋冬養陰，以從其根本，知肝心為陽，脾肺腎為陰，逆其根則伐其本，傷四時者，萬物之終始也，飲食勞倦則傷脾，脾傷則善噫，面黃，舌本苦直，不得咽唾，脾勞之證也，宜補益脾氣，補王則愈脾矣。

方

猪肚丸 治脾勞，臟腑冷熱不調，食少，四肢無力，骨節痠疼

治食不消，心腹脹滿，不思飲食，面黃

猪肚 一具

鱉甲 京三稜

黃耆 乾薑 附子 木香

草豆蔻 枳殼 石斛 厚朴

當歸 白朮 牛膝 桔梗 柴胡

赤芍藥 蓬莪朮 訶梨勒皮 芎藭 神麴

陳橘皮 柴胡 桃仁

肉豆蔻 阿魏

右為末，入煎猪肚於中，慢火煮，候爛，可丸即丸梧桐子大，每服人參

湯或粥內下三十丸，空心及晚食前服。

補真丸 治脾勞四肢無力，不能飲食，心腹痞滿，或時下痢，虛羸，逍遙

及治勞疾

厚朴 人參

陳橘皮 鱉甲

石斛 丁香 巴戟天去心
當歸 萆薢 桂 五味子
續斷 山茱萸 杜仲 人參
附子 胡 白茯苓 沉香 茴香二兩
右為細末，煉蜜和丸如梧桐子大，空心米飲下二十丸
乾末 [illegible]
蓯蓉巴戟丸 治虛勞大便不調 [illegible] 飲食 [illegible] 面色萎黃
蓯蓉 補骨脂 肉豆蔻 巴戟 附子
白豆蔻 蓽撥 蘹香子 丁香 木香
硫黃 沉香 茱萸 桂 當歸
阿魏 [illegible] 檳榔
右為末，用煉蜜和丸如梧桐子大，每服空心用溫酒下十五丸
漸加至二十丸，小腸氣 [illegible] 婦人心痛 [illegible]
石斛 [illegible] 治 [illegible] 虛冷不思飲食 四肢無力 [illegible]
草 [illegible] 白茯苓 人參 鱉甲
阿膠 木香 陳橘皮 附子
吳茱萸 乾薑 [illegible]
京三棱 當歸 蒼朮三分 黃耆 檳榔
右為末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服空心粥飲下二十丸，飯食前再服
[illegible]
蓽澄茄丸 治虛勞 [illegible] 口苦 [illegible] 多唾清水 四肢羸瘦
治下 [illegible] 大腸 [illegible]
蓽澄茄 人參 木香 [illegible]
丁香 肉豆蔻 附子 [illegible]
香附子 白朮 草豆蔻
肉桂 蓽撥 半夏
右為末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服空心 [illegible]
食前粥飲下二十丸 [illegible] 三十丸
定 [illegible] 散 治虛勞 [illegible]
[illegible]

氣血二少 [illegible]
遠志 [illegible] 桂 [illegible]
[illegible] 白朮 [illegible] 紅豆
川椒 白朮 肉豆蔻
右為細末 [illegible] 三錢 [illegible]
[illegible]
均一 [illegible]
厚朴丸 治虛勞心腹 [illegible] 不能飲食
厚朴 [illegible] 神麴 [illegible] 當歸 [illegible] 枳殼
白茯苓 五味子 [illegible] 黃連 [illegible] 白茯苓
白石脂 乾薑 訶梨勒 [illegible]
人參 [illegible] 附子 [illegible]
右為末 煉蜜和丸 如梧桐子大 每服空心 [illegible] 下三十丸
牛 [illegible] 治虛勞 [illegible] 四肢不 [illegible] 色 [illegible]
羊腎 白羊 [illegible]
東 [illegible] 人參 甘草 生地黃
桂心 茯苓 乾薑 白朮
右 [illegible] 內五 [illegible] 中 [illegible] 可為丸如梧桐子 初服三十丸 加至四十
[illegible]
[illegible] 五物 [illegible]
[illegible] 大腸 [illegible] 四 [illegible]
[illegible]
當歸 [illegible] 石斛 [illegible] 肉桂
柴胡 人參 [illegible]
[illegible] 內豆蔻 [illegible]
右為散 [illegible]
散五錢 [illegible]
[illegible]
[illegible]

黄耆 四兩 覆盆子 [illegible] 白术 [illegible] 附子 [illegible]
石斛 [illegible] 肉蓯蓉 [illegible] 人參 [illegible] 熟地黄 [illegible]
肉桂 [illegible] 五味子 [illegible]
右為末煉蜜和丸梧桐子大每服空心[illegible]湯下二十丸
烏梅丸 治脾勞[illegible]
烏梅肉 [illegible] 枳[illegible] 丁香 [illegible]
肉蓯蓉 [illegible] 人參 [illegible] 知母 [illegible]
桂心 [illegible] 木香 [illegible] 藿香 [illegible]
右為末[illegible]丸如梧桐子大每服[illegible]下[illegible]
七傷散 治脾勞[illegible]
白术 [illegible] 人參 [illegible] 白茯苓 [illegible]
方[illegible] 桔梗 [illegible] 紫菀 [illegible] 白芷 [illegible]
右為末每服三錢以用猪腎一對去皮膜[illegible]入鹽一錢[illegible]
[illegible]
藥[illegible]猪腎內[illegible]以火內煨[illegible]
[illegible]方用[illegible]
半夏散 治脾勞[illegible]不[illegible]五臟[illegible]
白术 [illegible] 白茯苓 [illegible]
杏人 [illegible] 大腹皮 [illegible] 橘[illegible]
柴胡 [illegible]
右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗[illegible]枚煎六分去[illegible]
生乾地黄散 治脾勞[illegible]
生乾地黄 [illegible] 升麻 [illegible] 射干 [illegible]
赤芍藥 [illegible] 犀角 [illegible] 桔梗 [illegible] 梔子人 [illegible]
葳蕤 [illegible] 甘草 [illegible]
右為散每服四錢水一中盞煎六分去滓入[illegible]

服
白术散 治脾勞[illegible]
白术 [illegible] 白茯苓 [illegible] 桂心 [illegible] 厚朴 [illegible]
陳橘皮 [illegible] 草豆蔻 [illegible] 大腹皮 [illegible] 木香 [illegible]
吳茱萸 [illegible] 檳榔 [illegible] 人參 [illegible]
檳榔 [illegible]
右為散每服食前温酒調下二錢
訶黎勒丸 治脾勞胃氣不和[illegible]少無力宜服
檳榔 [illegible] 肉豆蔻 [illegible] 訶黎勒 [illegible] 縮砂 [illegible]
人參 [illegible] 乾薑 [illegible] 白茯苓 [illegible] 木香 [illegible] 白术 [illegible]
陳橘皮 [illegible]
右為末用白麵[illegible]丸如梧桐子大每服食前粥飲下二十丸
五香丸 治脾勞[illegible]
木香 [illegible] 丁香 [illegible] 藿香 [illegible] 乳香 [illegible] 沉香 [illegible]
肉豆蔻 [illegible] 甘草 [illegible] 麝香 [illegible]
[illegible]
[illegible] 一分 [illegible]
右除乳香外搗羅為末與乳香相和[illegible]煉蜜丸梧桐子大每服空心
又食後用温[illegible]飲下二十丸
前胡湯 治脾勞熱[illegible]
前胡 [illegible] 白术 [illegible] 赤茯苓 [illegible] 枳殼 [illegible] 細辛 [illegible]
旋覆花 [illegible] 常山 [illegible] 松蘿 [illegible] 龍膽 [illegible] 竹葉 [illegible]
杏人 [illegible]
右搗篩每服三錢以水[illegible]
人參散 治脾勞四肢[illegible]
人參 [illegible] 白茯苓 [illegible]
枳殼 [illegible] 桔梗 [illegible] 吳茱萸 [illegible]
陳橘皮 [illegible] 訶黎勒 [illegible] 木香 [illegible] 草豆蔻 [illegible]
右為散每服[illegible]錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎六分去滓[illegible]食[illegible]
丁香散 治脾勞[illegible]

丁香 木香 [illegible]

當歸 白茯苓 附子 [illegible] 桂心 人參

鱉甲 [illegible] 高良姜 [illegible]

右為散每服三錢以水一中盞入生姜半分煎至六分去滓食前溫服之

[illegible]

鱉甲散 治[illegible]心腹[illegible]不思飲食[illegible]

鱉甲 [illegible] 人參 [illegible] 赤芍藥 [illegible] 前胡 [illegible]

黃耆 [illegible] 赤茯苓 [illegible] 檳榔 [illegible] 白术 [illegible] 芎藭 [illegible]

大香 [illegible] 甘草 [illegible]

右為散每服四錢以水一中盞入生姜半分[illegible]去滓[illegible]

[illegible]

附子 [illegible] 白[illegible] [illegible] 白茯苓 [illegible] 陳橘皮 [illegible]

桂心 [illegible] 白术 [illegible] 吳茱萸 [illegible] 甘草 [illegible]

半子 [illegible]

右剉如麻豆每服三錢以水一盞入生姜[illegible]大[illegible]煎七分去滓溫服

[illegible]吐不食[illegible]痛泄瀉[illegible]

白术 人參 草果仁 [illegible]

[illegible] 橘皮 [illegible] 木香 [illegible] 甘草 [illegible]

右[illegible]每服四錢水一盞[illegible]生姜五[illegible]棗[illegible]煎[illegible]分去滓溫服[illegible]

生地黃[illegible]

生地黃汁 [illegible] 石膏 [illegible]

[illegible] 知子 [illegible] 葳蕤 [illegible] 甘草 [illegible]

右[illegible]生地黃汁[illegible]服二[illegible]

[illegible]

止[illegible]

[illegible]

竹葉 [illegible] 人參 [illegible]

右[illegible]

[illegible]

[illegible]散[illegible]

木香 [illegible] 乾[illegible] [illegible] 甘草 [illegible] 黃連 [illegible]

右為散每服三錢[illegible]服之

黃耆[illegible]

白石脂 [illegible] 甘草 [illegible] 大棗 [illegible] 石[illegible]

右[illegible]每服三錢水一中[illegible]煎[illegible]六分去滓溫服

小[illegible]散 [illegible]

黃[illegible] 川[illegible] [illegible] 枳子仁 [illegible]

桔梗 [illegible] 生地黃 [illegible] 石斛 [illegible] 甘草 [illegible]

右[illegible]每服四錢水一中[illegible]生姜五片煎[illegible]八分去滓溫服不拘時

[illegible]

前胡散 治[illegible]

前胡 [illegible] 白木 [illegible] 赤茯苓 [illegible]

細辛 [illegible] 旋覆花 [illegible] 杏仁 [illegible]

右為散每服三錢水一中盞入生姜半分煎六分去滓食前溫服

[illegible]

乾[illegible] 牛[illegible] 甘草 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

牛[illegible]

[illegible]

細和藥末[illegible]如梧桐子大每日空心鹽湯或溫酒下三十丸
厚朴丸治脾勞虛冷不思飲食四肢無力嘔逆脹滿
厚朴 [illegible] 桔梗 [illegible] 陳皮 附子
吳茱萸 [illegible] 京三稜
右為末醋煮麵糊丸如梧桐子大每服二十丸溫粥飲下食前服
羊腎丸治脾勞虛損腸滑泄痢多盜汗瘦弱虛羸少力不美飲食
羊腎 艾葉 肉蓯蓉
木香 肉豆蔻 丁香
右除羊腎外為細末入羊腎末研勻煮棗肉搜丸如梧桐子大每服
十五丸鹽湯下空心服
半夏湯治脾勞虛冷嘔逆不和五臟未安服藥不止
茯苓 白朮 杏仁 橘皮
藿香 半夏 人參
右剉散每服四錢水一盞半生薑七片棗兩枚煎七分去滓不拘時候
麥門冬湯治脾勞實熱口乾[illegible]四肢沉困
麥門冬 赤茯苓 芎藭
郁李仁 甘草
右為散每服五錢以水一盞半煎一盞去滓分溫二服空心服
消食膏治脾虛寒[illegible]數噫不下食[illegible]
豬肚一個 生薑 吳茱萸 白朮
右搗茱萸白朮等二味細羅入豬肚內[illegible]
湯一杯進方寸匕日再
茱萸湯治脾勞[illegible]嘔逆不止
吳茱萸 厚朴 陳橘皮
右為細末每服五錢以水一盞煎取八分去滓溫服[illegible]
[illegible]
又方用大麻子[illegible]
又方[illegible]
又方治脾勞[illegible]
乾地黃 桃人 [illegible]

右研勻以清酒童子小便各一盞[illegible]成膏丸如梧桐子大每服十五丸
食前溫酒下日三服
治一切男子女人脾受勞氣[illegible]食減少[illegible]
不調[illegible]精神不足宜服此方若人患[illegible]五臟五行相
傷[illegible]脾而[illegible]
為此方但一切虛勞[illegible]有五行相傳之理而忽有此候即
服此方若患[illegible]
藿香 黃橘皮 草豆蔻 人參
[illegible] 天[illegible] 芍藥 甘草 杷葉
朮[illegible]
右為末[illegible]丸如梧桐子大每服三十丸空心米湯下

穀勞 附論

大凡[illegible]其氣虛弱不能傳化則令人怠惰嗜臥肢體煩重腹滿善
饑而不能食食已則發穀氣不行使然也故為之穀勞

方

沉香湯治穀勞[illegible]食已便臥[illegible]消食
沉香 白豆蔻 人參 甘草
白茯苓 陳橘皮 木香 白朮
厚朴 半夏 陳皮 乾姜
右[illegible]每服[illegible]水一盞[illegible]煎七分去滓[illegible]空心食前服
京三稜湯治穀勞[illegible]四肢煩倦食已便臥
京三稜 陳皮 木香
肉豆蔻 乾姜 甘草 杏人
厚朴 [illegible] 檳榔
右[illegible]每服[illegible]錢水一盞煎至七分不拘時候去滓溫服之
木香湯治穀勞身重少力困
木香 陳橘皮 人參 陳麴 甘草
大棗 [illegible] 麥芽 [illegible]
右[illegible]每服三錢[illegible]八分去滓溫服不計時候

木香湯 治穀勞身重喜臥[illegible]

木香 人參 附子[illegible] 甘草[illegible] 白茯苓[illegible]

草豆蔻[illegible] 乾薑[illegible] 陳麯[illegible] 麥蘖[illegible]

右剉如麻豆每服一錢匕水一盞[illegible]煎至七分[illegible]不拘時候去滓溫服

沉香湯 治穀勞身重食已好臥[illegible]

沉香剉 白檳榔剉 乾薑[illegible] 甘草炙 人參

白茯苓[illegible] 肉豆蔻[illegible] 木香[illegible]

右件搗羅為散每服一錢匕水一盞[illegible]煎七分去滓[illegible]服

檳榔散 治穀勞身重[illegible]

檳榔 人參 白茯苓[illegible] 木香

陳橘皮[illegible] 五味子 甘草[illegible]

右搗羅為細散每服一錢匕沸湯點服不拘時

丁沉丸 治穀勞嗜臥肢怠[illegible]

沉香剉 陳橘皮[illegible] 訶黎勒[illegible]

木香 丁香[illegible] 肉豆蔻[illegible]

右為末煉蜜丸如梧桐子大米飲或生薑鹽湯嚼下一丸不拘時

豆蔻丸 治穀勞[illegible]食已[illegible]

白豆蔻[illegible] 枳殼[illegible] 陳橘皮[illegible]

訶黎勒[illegible] 桂[illegible] 當歸[illegible]

右為末用棗水煮[illegible]丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸生薑湯下不拘時

分氣丸 治穀勞嗜臥身體煩重

京三稜[illegible] 青橘皮[illegible]

胡椒[illegible]

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服二十丸陳橘皮湯下

日三服

脚痹 附論

論曰[illegible]五痹[illegible]脚痹[illegible]

[illegible]

論曰[illegible]熱氣上溢[illegible]

麥門冬煎 治脾癉[illegible]熱[illegible]湯

生麥門冬汁 生地黃汁[illegible] 蜜[illegible]

地骨皮[illegible] 黃芩 蘆根[illegible] 甘草[illegible]

犀角[illegible] 升麻[illegible] 石膏[illegible] 淡竹葉切 括樓根一兩

右除前三味外[illegible]水七升煎取三升去滓入前三味

再煎[illegible]每服一[illegible]不拘時

竹葉湯 治脾癉口甘咽乾煩渴

淡竹葉[illegible] 柴胡[illegible] 犀角[illegible] 芍藥[illegible]

黃芩[illegible] 大黃[illegible] 梔子仁[illegible]

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓下朴硝半錢溫服

知母湯 治脾癉身熱口甘咽乾煩渴

知母[illegible] 石膏[illegible] 升麻[illegible] 甘草炙[illegible]

竹葉[illegible] 白粳米一合 枇杷葉[illegible]

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎一盞去滓溫服

前胡湯 治脾癉口甜煩渴不止

前胡[illegible] 犀角[illegible] 赤茯苓[illegible] 桂[illegible] 蘆根[illegible]

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎[illegible]去滓溫服

茯苓湯 治脾癉口甘咽乾[illegible]

赤茯苓[illegible] 麥門冬[illegible] 半夏[illegible] 甘草[illegible]

人參[illegible] 黃芩[illegible] 桂[illegible]

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半[illegible]煎[illegible]去滓不拘時溫服

葛根湯 治脾癉面黃口甘煩渴不止

葛根[illegible] 麻黃[illegible] 竹葉[illegible] 甘草[illegible]

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓不拘時溫服

麥門冬湯 治脾癉[illegible]口乾煩渴

麥門冬[illegible] 竹葉 黃芩[illegible]

梔子仁[illegible] 石膏[illegible] 犀角[illegible]

右麄搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓入朴硝半錢匕食後溫服

赤芍藥湯 治脾癉飲熱渴口氣[illegible]不止

赤芍藥 生乾地黃 大黃 甘草 炙

右麄搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓食後溫服

三和飲子 治脾癉煩渴[illegible]

生薑 [illegible] 糯米 [illegible] 蜜 [illegible]

右[illegible]以水[illegible]一盞濾下不拘時

蘭草湯 治脾[illegible]甘中滿

蘭草 [illegible]以水三盞煎取一盞半去滓分溫三服不拘時

[illegible]治脾癉口甘內熱中滿[illegible]

肉極 附論

夫肉極者主脾也脾應肉肉與脾合若脾病則肉變色又曰至陰遇病為肌痺肌痺不已復感於邪內舍於脾[illegible]

[illegible]腠理開汗大泄[illegible]其[illegible]凡風氣藏於皮膚肉色則敗以[illegible]

[illegible]

大黃[illegible]

[illegible]

右為散每服四錢水二盞生薑[illegible]煎至七分去滓食前服

黃耆丸[illegible]

不嗜飲食

黃耆 [illegible] 巴戟 [illegible] 桂心 [illegible] 石斛 [illegible]

白茯苓 [illegible] 澤瀉 [illegible]

山茱萸 [illegible] 大棗 [illegible] 萆薢 [illegible]

細辛 [illegible] 白朮 [illegible]

右為末[illegible]和丸梧桐子大每服空心[illegible]溫酒下三十丸忌[illegible]

石南散 治[illegible]肉極[illegible]或不仁[illegible]四肢急痛[illegible]脣口[illegible]變色

石南 [illegible] 天雄 [illegible] 山藥 [illegible] 芍藥 [illegible] 桃仁 [illegible]

甘菊花 甘草 [illegible] 升麻 [illegible] 萎蕤 [illegible] 黃耆

辰砂 [illegible] 石膏 [illegible] 山茱萸 [illegible]

右為細末每服二大錢[illegible]溫酒調下一方[illegible]桃仁作桃花[illegible]

[illegible]

枸杞湯 治[illegible]氣所[illegible]不[illegible]

少坐卧不[illegible]

枸杞 黃耆 [illegible] 附子 [illegible] 芍藥 [illegible]

人參 [illegible] 芍藥 [illegible] 茯神 [illegible] 甘草 [illegible] 羌活 [illegible]

[illegible] 防風 [illegible] 半夏 [illegible]

右[illegible]服五錢[illegible]去滓溫服

[illegible]

獨活湯 治[illegible]

[illegible]

右為散每服四錢水一盞煎至七分去滓食後温服

半夏散 治肉極虛寒則四肢不能收引身痛不可以動動則咳嗽
脇滿留飲大便不利小腹切痛脇上有氣宜服

半夏 白朮 赤茯苓 人參
甘草 附子 陳橘皮
桂心 木香 大腹皮 訶梨勒皮
前胡

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前温服

茯苓散 治肉極虛寒四肢不安腰脚沉重四肢不舉脚弱疼
氣飲食無味

白茯苓 黃耆 牛膝 附子
人參 白芍藥 白朮 石斛 當歸
沈香 桂心 芎藭

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓食前温服

石斛散 治肉極虛寒津液大泄為癘風若下腫脚膝緩弱
宜服

石斛 牛膝 五加皮 白朮 山茱萸
天麻 甘草 桂心 附子 薏苡人
獨活 防風

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓食
前温服

防風散 治肉極虛肉痹皮膚不仁
防風 羌活 白茯苓 人參 乾薑
五加皮 甘草 當歸 桂心 芎藭
附子

右搗羅為散每服二錢以温酒調下空心食前温服

石南散 治肉極如蟲行皮膚宜服
石南 萆薢 黃耆 山茱萸 天雄
桃花 獨活 薏苡人 防風 川升麻

甘草

右為散每服以温酒調下二錢服之

又方 九物治肉極手足
厚朴

人參 附子 白朮
茯神 桂心 川椒
乾薑 麥門冬 甘草 細辛

右為末煉蜜和丸如梧桐子大食前以温酒下三十丸

薏苡仁散 治肉極淫淫如鼠走或麻痺不仁四
肢急痛

薏苡仁 川芎 桂心 防風
石膏 赤芍藥 杏仁 甘草

右㕮咀每服四錢水一盞入生薑五片煎至六分去滓温服不拘時候

半夏湯 治肉極虛寒四肢不可以動動則咳嗽脹滿
飲食不下

半夏 白朮 赤茯苓 人參 陳皮
附子 木香 桂心 大腹皮 甘草

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分去滓温服不拘時候

附子湯 治肉極汗出或麻不仁
麻黃 石膏 桂心 甘草
黃芩 防風 芍藥 杏人
芎藭

右㕮咀每服五錢水一盞半生薑三片
煎去滓空腹温服

人參丸 治肉極虛四肢不收下痢手足厥冷不嗜食
人參 附子 乾薑 遠志 麥門冬
蜀椒 桂心 甘草 細辛

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸食前米飲下

麻黃湯 出聖濟總錄 治肉苛 [illegible] 肌與 [illegible] 不仁 [illegible] 大如 [illegible]
[illegible] 風濕 [illegible] 止汗 [illegible]
麻黃 去節 枳實 防風 各一兩 細辛 去苗
[illegible] 附子 [illegible] 白朮 甘草 [illegible]
右剉如麻豆 每服五錢匕 水一盞半 煎至一盞 去滓 空心 日午 夜臥 再服
小風引湯 治肉極寒 肌肉變 舌痿 名曰惡風 腰脚疼弱
獨活 防風 茯苓 甘草 人參 各三兩
當歸 乾薑 各二兩 附子 一枚 大豆 二升 炒
右以水一斗 酒二升 煮取二升 去滓 分四服 日三夜一 忌豬肉冷水
[illegible]
[illegible]
半夏 [illegible] 附子 [illegible] 陳橘皮 [illegible] 赤茯苓 人參
甘草 [illegible] 桂 去粗皮
右件搗篩 每服五錢匕 水一盞半 入生薑半分 煎至一盞 去滓
分溫二服
半夏湯 [illegible] 治 [illegible] 安席不能動作 喘氣 [illegible] 加附子
半夏 麻黃 石膏 各八兩 杏仁 五兩 細辛
白前 七兩 射干 六兩 橘皮 各四兩
右㕮咀 水九升 煮取三升 分三服 下利 加芒硝三兩
越婢湯 治 [illegible] 大泄 [illegible]
麻黃 [illegible] 石膏 [illegible] 甘草 [illegible] 附子 [illegible]
右剉如麻豆 每服五錢匕 水一盞半 生薑 [illegible]
[illegible] 日午 夜臥 溫服 一方 有白朮 [illegible]

普濟方卷之九 [illegible] 利字 [illegible]

普濟方卷之十目錄
脾臟門 [illegible]
論
頌
脾臟門 脾胃俱實
脾胃俱虛 脾胃虛冷水穀不化
脾冷熱不和 脾氣虛冷
脾胃不和不能飲食 脾胃氣虛弱不能飲食
脾胃氣虛弱嘔吐不下食 脾胃氣虛弱肌體羸瘦
脾虛多 [illegible]
中 [illegible] 理脾胃 論 [illegible] 方 一百八方
[illegible] 八香 [illegible] 胃丸 和胃 [illegible] 大建脾丸
[illegible] 理脾散 中 [illegible] 散 木香分氣丸
大 [illegible] 香散 [illegible] 方 [illegible] 方 調脾丸
白朮 [illegible] 香散 [illegible] 丸 豆蔻橘紅散 和中益氣丸
[illegible] 丸 [illegible] 七香丸 木香 [illegible] 中 [illegible] 木香枳殼丸
丁香和胃丸 大七香丸 [illegible] 神丸 [illegible] 中 [illegible]
大 [illegible] 丸 [illegible] 茯苓分氣飲 [illegible] 食丸
[illegible] 方 [illegible] 食人物不化 [illegible]
[illegible] 七珍散 [illegible] 中散 香 [illegible]
[illegible] 氣不 [illegible] 下氣令人能食方
[illegible] 丸 [illegible] 丸 [illegible] 食丸
人 [illegible] 丸 [illegible] 丸 [illegible] 丸
沉香 [illegible] 飲食方 [illegible] 中丸 [illegible]
[illegible] 散 [illegible] 散 青木香丸
[illegible] 中 [illegible] 散 [illegible] 年草
加減 [illegible] 散 人 [illegible] 丸 [illegible] 中丸 [illegible] 中丸
[illegible] 散 [illegible] 丸 [illegible] 散 [illegible] 中丸

妙功[illegible]　[illegible]散　[illegible]　[illegible]丸
抽[illegible]丸　[illegible]　二神散
奪命四七散　[illegible]丸　五味[illegible]　[illegible]脾湯
參苓[illegible]　[illegible]　[illegible]胃氣　[illegible]
木[illegible]丸　建[illegible]　[illegible]散　[illegible]丸
六君子湯　[illegible]香平胃散　[illegible]散　[illegible]丸
[illegible]朴丸　[illegible]散　[illegible]散　人參訶子散
桂附丸　[illegible]丸　[illegible]散　[illegible]散
建脾丸　和中丸　[illegible]散　[illegible]胃散
沉香養脾丸　[illegible]散　[illegible]散　[illegible]湯
安胃丸　[illegible]中丸　沉香湯　進食散　[illegible]丸
拾珍散　[illegible]胃　[illegible]

○脾胃俱實

論一道　方一方

[illegible]方　[illegible]黃[illegible]湯　瀉黃散

[illegible]

○脾胃俱虛

論一道　方七十三方

千金人參[illegible]胃丸　參附大正氣散　[illegible]丸
人參補虛湯　木香[illegible]散　[illegible]木丸
參苓壯脾丸　[illegible]　[illegible]丸　參苓白朮散
思食調中丸　[illegible]丸　補脾胃瀉陰火升陽湯
[illegible]　[illegible]人參湯
升[illegible]湯　人參[illegible]　益[illegible]湯
[illegible]半夏白朮天麻湯　人參[illegible]湯
[illegible]湯　[illegible]湯　益胃湯
生薑[illegible]中湯　[illegible]　[illegible]丸　[illegible]丸
一[illegible]丸　[illegible]散　[illegible]補中湯　和中丸
暖胃丸　[illegible]理中丸　治脾胃[illegible]
蘇[illegible]丸　木香[illegible]散　加減思食丸
[illegible]脾胃[illegible]　[illegible]丸　四[illegible]丸　藿香安胃散

白朮六[illegible]湯　[illegible]　[illegible]脾胃氣虛食[illegible]不[illegible]
一方　[illegible]湯　[illegible]　[illegible]散　和中丸
[illegible]丸　[illegible]　[illegible]湯　[illegible]湯
六君子湯　[illegible]散　[illegible]散　[illegible]脾散
[illegible]丸　[illegible]朴丸　[illegible]丸　胃風湯
厚朴[illegible]湯　白茯苓[illegible]丸　[illegible]　[illegible]丸
[illegible]丸　[illegible]丸　參[illegible]湯　[illegible]智和中丸
[illegible]散

○脾胃虛冷水穀不化

論[illegible]道　方九十六方

[illegible]石丸　丁香丸　[illegible]香[illegible]丸　五香丸　[illegible]散
沉香[illegible]丸　[illegible]丸　溫脾丸　人參柴胡湯
金液丸　[illegible]香丸　附子[illegible]草[illegible]散　大[illegible]丸
建中湯　丁香[illegible]散　[illegible]脾丸　[illegible]丸　丁香散
溫中良薑丸　[illegible]金丸　[illegible]丸　[illegible]丸

[illegible]

人參散　白朮丸　和胃丸　大溫脾丸　草[illegible]丸
二薑丸　丁香散　丁香[illegible]丸　[illegible]氏建中丸　[illegible]
八味[illegible]丸　白朮散　[illegible]丸　[illegible]丸
熱水草[illegible]法　大[illegible]湯　人參[illegible]　白豆蔻丸
[illegible]香散　[illegible]脾丸　七[illegible]湯　[illegible]散　丹砂丸
木香枳實丸　小[illegible]香丸　[illegible]子　[illegible]神丸
[illegible]溫中丸　[illegible]湯　[illegible]丸　[illegible]丸
建脾散　[illegible]理中丸　[illegible]　[illegible]湯
大[illegible]丸　[illegible]丸　[illegible]散　木香丸　丁香丸
阿[illegible]丸　[illegible]丸　[illegible]丸　木香[illegible]枳朮丸
半夏湯　[illegible]散　[illegible]　[illegible]丸
[illegible]朴湯　治脾胃[illegible]　[illegible]　治[illegible]生冷[illegible]物
[illegible]散　[illegible]湯　[illegible]湯　木香調中丸
治脾[illegible]食不化　[illegible]　治脾胃虛冷
三[illegible]丸　[illegible]湯　[illegible]丸　[illegible]平胃散

厚朴丸　…湯　木香…丸　…棗合丸
中脘…　…　…　沖…丸
藿香散　理脾散　木香檳榔丸　沉香温脾湯
春明丁…　…

脾胃冷熱不和（論）（方）十八方

丁香阿魏丸　前胡湯　藿香湯　肉荳蔻丸
白术散　桔梗湯　人參丸　沉香荳蔻散　丁香散
神麴丸　訶黎勒丸　丁香湯　快活丸　和中丸
附朴丸　大腹皮湯　勝金丸　治脾冷不調

飲食勞倦（論）一道（方）三十九方

補中益氣湯　升陽益氣湯　寬中進食丸
調中益氣湯　…神丸　調氣防風湯　白朮附子湯
和中丸　橘皮枳朮丸　麴糵枳朮丸
木香和賞丸　枳香化滯丸　三黄枳朮丸
半夏…丸　草豆蔻丸　二黄枳朮丸
除濕益氣丸　上二黄丸　枳實導滯丸
枳…丸　…大…湯　內消丸　木香見睍丸
二陳…丸　…　益胃散
除濕…　蜜砂丹　木香人參生薑枳朮丸　交泰丸
導氣除燥湯　大枳殼丸　木香檳榔丸
人參開胃湯　枳朮丸　檳榔降氣湯
積聚丸　…　桂香丸　三稜丸　小橘皮煎丸
治飲食…　寬中理氣丸　三香枳朮丸
百勝丸　藿香…丸　…　至寶散
木香調中丸　…　烏梅木瓜散
麥糵散　丁香湯　…　和中丸
木香檳榔丸　枳朮丸　…　又方
生地黃丸　治中益氣…　…中湯

胸前喉…　…丸　…　…
生胃丸　…丸　快脾湯　…　生金湯

脾胃不和不能飲食（論）一道（方）五十六方

神仙快…丸　又方　十八味丁沉透膈湯
木瓜散　木香…散　大養湯　木香丸　紫蘇丸
沉香湯　木香丸　高良薑散　半夏散　均氣丸
小木丸　…　八味…散　七寶湯
沉香湯　丁脾丸　建中丸　和胃丸
厚朴湯　…荳蔻丸　温中丸　…荳蔻湯
小…丸　人參…散　…不香方　調中益氣湯　分氣紫蘇飲
沉香…散　…散　進食散　…理中湯
…湯　…湯　丁香大丸子　…　沉香養脾丸
白术茯苓丸　治胃氣不和飲食減少嘔噦脹悶…
助脾氣令人能食　…益脾胃　二香養胃圓

雙…湯　建脾散　白荳蔻散　…　香木散
長…散　草果飲子　建中丸　丁香五套圓
…香圓　谷神湯　建脾散　草豆蔻散　白豆蔻散
七傷散　崇土散　五膈散　厚朴湯　快脾散
和中散　四倍丸　中和丸　厚朴温中湯
四君子湯　安脾…進食益氣方　治脾胃不調
強中圓　養胃丹　…中湯　四炒健脾散
人參豆蔻湯　…散　加減理中湯
導引方　小木茯苓丹

脾胃氣虛弱不能飲食（論）一道（方）七十三方

木香丸　木香散　沉香…丸　黄耆湯
人參茯苓湯　藿香湯　桂香湯　白豆蔻散
厚朴散　紅豆蔻湯　黄耆湯　人參散　丁香散
白朮丸　白朮丸　治胃氣冷飲食則吐逆　助胃膏

山芋丸 厚朴湯 厚朴煎丸
又方 草豆蔻散 人參丸 白豆蔻散
人參散 良朴丸 人勝散 草豆蔻散又方
生薑煎 山芋丸 薑蜜汁 [illegible] 雞白湯
又方 治脾胃氣弱不能飲食
林人散 神麴丸 豆蔻散 進食散 厚朴煎散
薑朴丸 異功散 鶴突丸 治脾胃氣虛冷入口則吐出
治脾胃虛冷 燒脾散 補脾丸 大益脾丸
丁香丸 止脾丸 高良薑丸 肉豆蔻丸 快脾飲子
穀神丸 人參丸 消積一種煎 華澄茄丸
木香橘皮丸 茯苓半夏湯 白朮湯
麯蘖丸 脾良方 固真丸 養胃進食丸
草豆蔻散 治脾中虛冷不能飲食
建脾補不足之氣令人能食 又方

脾胃氣虛弱嘔吐不下食 論一道 方三十三方

生胃丸 建中散 華澄茄散 草豆蔻散 丁香丸
白朮藿香湯 白豆蔻湯 枳殼丸 治脾胃氣虛弱
白朮湯 華撥丸 白豆蔻丸 厚朴湯 華撥丸
白茯苓散 白朮散 枇杷葉湯 平胃丸 人參湯
蔥白湯 藿香湯 藿香厚朴湯 十三種丸
人參藿香湯 半夏散 人參丸 人參飲子
調中丸 丁香附子散 參香散 辛香散
五靈脂丸 治脾胃氣弱食不消化嘔逆反胃諸飲不下
寬中丸 人參藿香湯 神麴丸
治胃氣弱不下食至劫

脾胃氣虛弱肌體羸瘦 論一道 方十四方

白朮丸 草豆蔻散 訶梨勒散 丁香散 補益蓯蓉丸

人參散 木香丸 人參丁香散 黃芪散
訶子丸 人參湯 又方 溫中思食丸
陳橘皮丸 附子丸 人參丸 補真丸
白朮丸 椒紅丸 椒子丸 黃芪丸 平胃補真丸
建中丸 治脾胃虛冷

脾胃壅熱嘔噦 論一道 方十方

枇杷葉散 麥門冬散 竹茹大散 又方 蘆根飲子
蘆根散 人參飲子 蘆根散 治脾胃壅熱嘔噦不下食

普濟方卷之十目錄 終

普濟方卷之十

脾臟門

兼理脾胃（附論）

夫人身之脾胃屬土，以合[illegible]而為五臟之中[illegible]於四時之令，以土能合萬物，故[illegible]即有病之脉也[illegible]生之[illegible]不為[illegible]所傷[illegible]七情[illegible]和[illegible]失[illegible]為六淫七情相干[illegible]

[illegible]治脾胃[illegible]虛冷[illegible]

木香　丁香　沉香　紅豆蔻　大椒

官桂（去皮）　附子（炮去皮臍）　白茯苓（去皮）　白豆蔻（去皮）　肉豆蔻

川芎　蓽撥　蓽澄茄　縮砂仁　甘草

人參（去蘆頭）　白朮　訶子肉　陳皮（去白）　神麯（炒）

麥蘖（炒）　良薑　厚朴（薑製）　破故紙（炒）

右為細末，煉蜜和丸，每兩作六丸，[illegible]五味[illegible]合和[illegible]約四兩半，[illegible]四兩半，計九兩，分作五十四丸，每丸重錢六分，[illegible]服此藥一料，大補，如前法，每服一丸，細嚼[illegible]，或[illegible]湯送下，不拘時候。

[illegible]

[illegible]不[illegible]不思飲食[illegible]

乾姜（炮）　神麯　白茯苓　桂　甘草

[illegible]　人參　[illegible]　[illegible]　紅豆（去皮）

右為細末，煉蜜和丸[illegible]每服[illegible]下

和脾丸　治[illegible]飲食不[illegible]

[illegible]

甘草　陳皮　[illegible]　河子　[illegible]

右為細末[illegible]丸如[illegible]大，每服一十丸至三十丸，[illegible]水下，不計時候。

大建脾丸　[illegible]治中[illegible]積[illegible]心腹[illegible]飲食[illegible]少力[illegible]精神

[illegible]　白朮　甘草

肉豆蔻　乾姜（炮）　丁香　[illegible]　[illegible]

木香　[illegible]　白朮　參蘆

人參　白茯苓　白豆蔻　訶子

右為細末，煉蜜丸如[illegible]大，每服一丸，[illegible]米飲下，食前。

異香[illegible]　[illegible]大理脾胃，補[illegible]不[illegible]

[illegible]

[illegible]

青皮　大麥蘗　小半夏

右為細末[illegible]

[illegible]大黃[illegible]

[illegible]

中滿[illegible]

[illegible]

腰如杵及作痛而異於或氣短氣促而喘[illegible]

甘草白朮[illegible]腎丸一百五十

夜大便月之皆里熱之令大行氣攻不能言者加五味子麥門冬

心下有痰[illegible]食下[illegible]丸五七十丸

更當而[illegible]

寬中散[illegible]

青皮　陳皮　縮砂仁　茴香　桔梗

白芷　厚朴　木香　香附子　白朮

甘草　紅豆　良薑　麥蘗　乾薑一兩

右㕮咀每服三錢水一盞半薑一枚煎七分空心服

寬氣枳殼丸[illegible]理氣[illegible]理脾胃去脹滿及寬胸不進飲食不快

枳實　木通　青皮　陳皮　桑白皮

三稜　蓬朮　檳榔　蘿蔔子　神麯

黑牽牛　小茴香　木香　白牽牛

右為細末蘿蔔搗汁煮糊為丸如梧桐子大每服五十丸煎水[illegible]

時下

木香分氣丸[illegible]胸膈脹滿[illegible]咳

喘急[illegible]咽喉不利飲食不化[illegible]

木香　檳榔　青皮　陳皮　薑黃

玄胡　蓬莪朮　乾生薑　當歸　白朮

[illegible]

不化[illegible]

[illegible]

寬中[illegible]七分入鹽[illegible]生薑[illegible]

汁半[illegible]不思食或更[illegible]

[illegible]先[illegible]服中[illegible]如之一切[illegible]變成百病如上服

之不[illegible]時[illegible]能[illegible]功

不可[illegible]

[illegible]不和[illegible]飲食[illegible]

大黃　杏人　附子　當歸　乾薑

桂心　人參　細辛　[illegible]　茯苓

半夏　苦參　蜀椒　玄參三分

右件藥為末[illegible]丸如梧子大[illegible]服六七丸日三增至十丸忌豬羊肉冷水

錫生[illegible]

開氣[illegible]飲食大[illegible]脾

虛痞[illegible]

白朮　丁香　人參　木香　白茯苓

藿香　縮砂人　肉豆蔻　草豆蔻　甘草[illegible]兩

紅山藥 米文 煎文
右為細末每服 錢水 紅湯下 一方加白檀香
半兩
補脾丸 治中焦飲食不消 腹脹 人 老
黃芪 人參 甘草 當歸 白芍藥
桂心 白术 縮砂 茯苓 當歸
熟地黃 附子 炒
右件為末 和服如梧子大 每服 米飲下
治氣
白术丸香散 治 脾胃
人參 白茯苓 半夏曲 訶子
木香 白豆蔻 白术 乾山藥 炙甘草 各一錢
丁香 肉豆蔻
右為細末每服一大錢 水一盞 生薑 煎
七分 食前服

健脾丸 運脾胃 進飲食 助氣化 生食 中下氣 老少易 青
治 心 心腹 氣不順
人參 白术 乾薑 高良薑
縮砂仁 肉豆蔻 陳皮 桂枝
甘草 丁香 神麴
右為末 糊和丸 如梧桐子大 食前 米飲下五十丸至
七十丸
千金橘紅散 治 陰陽 和三焦 宿食
丁香 木香 白豆蔻仁 人參 厚朴
神麴 乾薑 半夏麴 橘紅 甘草
香附 白术
右㕮咀 每服三錢 水一盞 生薑三片 棗一枚 煎七分 溫服
和中益氣丸 治 脾胃不和 嘔吐
快氣 脾 中 虛 氣 不受 又
肉 中益氣 飲食

或大便不通 服之
木香 丁香 白豆蔻 荊三稜
白豆蔻仁 人參 桂 縮砂仁 青皮
陳皮
右為細末 白麵糊和丸 如梧桐子大 每服 十丸
生薑湯下
補脾丸 快氣進食 和胃 脹
丁皮 蓽澄茄 白豆蔻 甘草
縮砂仁 香附子 木香
甘松 丁香
右為末 用 和為丸 水 就
嚼一丸 搜拌 即法
丸 如梧桐子大 每服三十丸 湯下
丁香丸 治消食 和胃止嘔
木香 丁香 藿香 甘松

橘紅 縮砂仁 薏苡仁
大香附
右為末 研米糊丸 如菉豆大 每服三十四丸 薑湯下 一方用麴餅為丸
和丸
木香 治中 補脾胃 飲食
人參 白术 茯苓 甘草 半夏
枳殼 香附 砂仁 白豆蔻 木香
陳皮
右㕮咀 每服六錢 水一盞 生薑七片 棗一枚 同煎至
八分 去滓 溫服
木香枳殼丸 治 消食 快氣
木香 當歸
檳榔 枳殼 青皮 黃連
香附子
右為細末 水糊為丸 如梧桐子大 每服五十丸 食後 姜湯送下 若

有乘嘔吸白丸子 白丸子右丸〔[illegible]〕加減 利五七丸白湯〔[illegible]〕

丁香和胃丸 治脾胃〔[illegible]〕中〔[illegible]〕停〔[illegible]〕痰嘔吐惡心胸膈〔[illegible]〕

痛飲食無味 [illegible]

丁香 木香 [illegible] 肉豆蔻

白豆蔻仁 白茯苓 陳皮 白朮

人參 半夏

右為細末 生薑汁糊為丸 如梧桐子大 每服二十丸至五十丸 煎

生薑湯下 不拘時候

大七香丸 治脾胃不和 [illegible]

或傷風冷 [illegible] 中酒吐 [illegible] 服有效進食 [illegible]

啓脾丸 治 [illegible] 進飲食

人參 縮砂 香附子 三稜

白朮 青皮 陳皮 神麯

麥芽 [illegible]

右為末 [illegible] 丸如梧桐子大 每服二十丸 [illegible]

三稜丸 治脾胃一切疾不利

三稜 蓬朮 川芎 良姜

陳皮去白 草果仁 益智仁 甘草

神麯 麥蘖

右為細末每服二錢 食後鹽湯點服

大半夏丸 和脾胃進飲食 [illegible] 化痰 [illegible] 服

草豆蔻 青皮去白 陳皮去白 蓬莪朮 川丁皮

半夏 厚朴 赤茯苓 [illegible]

右為末 [illegible] 丸如梧桐子大 每服七十丸 [illegible] 下

不拘時候

白朮湯 治理脾和胃進飲食

白朮 厚朴 乾姜

人參 當歸 茯苓 甘草 桔梗

右㕮咀 每服 水一盞 棗二枚 煎八分 去滓溫服不拘時候

茯苓分氣飲 治脾胃不和 [illegible] 氣促喘

已、不快 [illegible]

五味子 桔梗 [illegible]

人參 甘草 草果仁 [illegible]

右㕮咀 每服 水一盞 [illegible] 七分 [illegible] 空心服

思食丸 治 [illegible]

烏梅肉 大麥蘖 神麯 乾木瓜 [illegible]

人參 茯苓 [illegible] 甘草

右為細末 煉蜜為丸 如梧桐子大 每服二十丸 [illegible] 不拘時

日三服 或作小丸 [illegible]

八珍湯 和血氣理脾胃

當歸 赤芍藥 川芎 熟地黃 人參

白茯苓 甘草 砂仁

右㕮咀 每服三錢 水一盞 薑七片 棗二枚 同煎空心服

[illegible] 丸 [illegible] 消食

烏梅 神麯 [illegible] 麥蘖 乾姜

京三稜 陳皮 蓬莪朮

右為細末 糊為丸 如梧桐子大 每服三五十丸 橘皮薑湯送下

治胃氣弱 則所食之物不能消 [illegible] 宿食 [illegible] 脹

木香 桂 青皮 陳皮 三稜

蓬莪朮 大麥蘖 檳榔

右為細末 [illegible] 丸如梧桐子大 每服三五十丸 食後生薑湯下

附方

木香三稜湯 [illegible] 治 [illegible] 心腹 [illegible] 亂吐

木香 神麯 陳皮 益智 [illegible] 三稜

甘草 蓬莪朮 [illegible]

右為細散每服一錢 鹽湯 [illegible] 空心 [illegible]

七珍散 [illegible] 開胃養氣益脾進食

人參 白朮 黃耆 山芋 茯苓

蒼朮 甘草

右為末每服二錢…加白鹽…服

令散 凡治此…

脾胃…服十日則飲食倍

安中散 治…脾疾反胃…酸…疼痛…

當歸…治婦人血氣攻刺痛

玄胡索 良薑 當歸 桂心 杜…

治… 甘草

右為細末每服…不拘時…

香附子散

草果 陳皮 良薑 甘草

白朮

右為粗末每服三錢水一盞薑三片棗一枚同煎至七分去滓食前

服不拘時 木香二錢

七香丸 治…化積聚消痞悶止嘔…

甘草 丁香皮

益智 香附子 砂仁

右細末湯浸蒸餅為丸如小豆大每服二十丸至三十丸細嚼…

右脾氣不足…五臟…水穀下令人能食

去白 乾薑 附子 人參

甘草 蜀椒

右件為細末丸如梧子大每服十五丸…不知增之…

人參調中湯

丁香 木香 白豆蔻 甘草 縮砂

麝香 人參

右為末每服…同煎…或入生薑鹽少許…服

丁香皮丸 治…中酒…治心腹痞悶…脾胃飲食…

化宿…

脇

脾

橘皮 木香 縮砂仁 檳榔 青皮

甘草

右為細末薑汁糊為丸如梧桐子大每服七十丸食後溫生薑湯下

快活丸 治…消…通…小便

丁香 肉桂 木香 乾薑

蒼朮

右為末…糊丸如小豆大每服五七丸食前…湯下

秘方思食丸

神麴 麥芽 甘草 乾薑 人參

烏梅

右為末煉蜜丸如彈子大每服十丸白湯下…人參

沉香…溫中…氣…

沉香 白豆蔻仁 木香 甘草 生龍腦

右為細末…每服…

益智 桂心

右粗散每服五錢水一盞煎至…去滓溫服…

清酒進食方

生薑 白朮 草果 縮砂 丁香

炒鹽

右為細末每服二錢…

枳實理中丸 治…中焦…痞…大治傷寒結胸…

心膈高起…

知母 白朮 人參 甘草 白茯苓

乾薑

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸細嚼化下空心日二三服
[illegible]不拘時候[illegible]
脾胃虛冷水穀不化似人參未如石勿食[illegible]心腹脹削不收
治痺[illegible] 出[illegible] 生薑 [illegible]
生地黃
右剉以水九升煮取三升去滓內蜜攪令調分爲八合日三
夜二忌如常法蒸肉大
建脾湯 治[illegible]大五脾[illegible]飲食[illegible]宜常
生薑 [illegible]
甘草炙 陳皮去白 神麴 麥蘗[illegible]
右爲細末白湯點服空心食前
丁香生胃散 治[illegible]中焦不和氣[illegible]不下[illegible]飲食[illegible]
常服養胃進飲食止嘔逆消痰
丁香 藿香葉 肉桂去皮 薑黃 甘草炙
右爲細末每服三錢水一盞生薑二片煎至七分去滓食前温服
一百九十七
養胃散 治[illegible]胃虛[illegible]不思飲食[illegible]補水臟
草豆蔻 甘草炙 厚朴去皮 陳皮去白 藿香 枇杷
右爲末每服一錢生薑三片棗二枚水一中盞同煎服食前一方
無[illegible]前服
書本[illegible]治[illegible]中[illegible]脹 丁香承消飲食治胃膈噎塞腸脹痛疼
心下堅痞[illegible]不思飲食及治小腹脹氣目脹
[illegible] 牽牛末 [illegible] 木香 [illegible]
[illegible]
右爲細末和丁香[illegible]丸如梧子大每服五十丸茶湯或水送下如
腸氣[illegible]作痛用[illegible]散送下五十丸[illegible]一二行即愈
用生料五苓散加燈心草二十莖煎水送下不拘時[illegible]
[illegible]
理中湯 治[illegible]理中[illegible]不和胃中寒[illegible]嘔吐[illegible]
食減[illegible]心腹滿[illegible]心腹[illegible]傷寒[illegible]內寒[illegible]
上吐下利心[illegible]手足逆冷傷寒[illegible]水穀不分腸內虛

叩[illegible]之[illegible]中[illegible]不[illegible]逆[illegible]
[illegible]人參 [illegible] 白朮 甘草[illegible]
大[illegible]每服[illegible]中[illegible]空心服〇傷胃吐血脹
如本方[illegible]血上行[illegible]加[illegible]理中[illegible]利陰陽
安定血脈用之特效〇作[illegible]加茯苓半夏等[illegible]去之〇渴理停
飲脾氣痛加[illegible]十粒〇以氣[illegible]去朮加桂
半兩[illegible]去朮[illegible]加桂以[illegible]〇小腸氣痛加桂枝
川楝子〇[illegible]加附子天[illegible]各四分之一〇霍亂後轉筋加
石膏〇若嘔吐[illegible]中[illegible]用[illegible]止用乾薑甘草等分能服
仍以[illegible]之〇[illegible]中[illegible]心腹滿脹
脯各[illegible]附子等分名[illegible]理中湯[illegible]本方中甘草
出用四分之[illegible]二錢入[illegible]服名[illegible]氣[illegible]入[illegible]
半兩名加[illegible]理中湯〇若[illegible]加茯苓陳皮等分名補中湯
若[illegible]不已[illegible]中[illegible]內加附子一兩若水穀不化食少[illegible]加[illegible]
十白廿
[illegible]名附子理中湯〇若霍亂心[illegible]先以[illegible]服
[illegible]今[illegible]若[illegible]吐下〇[illegible]作[illegible]逆冷於本方中
去朮加[illegible]附名四[illegible]若[illegible]加[illegible]名[illegible]理中湯
若[illegible]加茯苓一兩若[illegible]去白朮加附子一兩若[illegible]飲水
若[illegible]加朮半兩若[illegible]加乾薑半兩
理中丸 治[illegible]三[illegible]風[illegible]之邪
凡大病瘥後[illegible]中有[illegible]不止[illegible]人所[illegible]五內俱虛血脈未定
及瘥後[illegible]作[illegible]宜服之其[illegible]理中湯同[illegible]
理中湯正四[illegible]是也
右爲細末煉蜜爲丸每兩作十丸[illegible]食前[illegible]食亦可或
作小丸如梧子大[illegible]水送下〇本方去[illegible]作散加五味子[illegible]
等分〇[illegible]肺俱[illegible]作散不止加胡椒八分之一名胡椒理中丸
二方理脾[illegible]生金[illegible]
肺母[illegible]其[illegible]〇右心腹[illegible]
霍亂[illegible]一切沉寒痼冷加附子等分每一丸[illegible]名附子理中丸

梧

下鼓子[illegible]偏墜沖心方功

青州棗 生姜 厚朴一兩 甘草 [illegible]

右剉碎同用 以慢火炒至[illegible]地上出火毒三日 每服二錢 水

一盞煎七分 空心服

延年草 [illegible]和環吾人常服女人受氣 [illegible]脾胃 老人小兒皆可

服 服後每依我前散 [illegible]安神健脾 [illegible]所立 和之名延年草

上 [illegible] 白鹽 [illegible] 斯珀上 [illegible]香 四兩

青皮 [illegible] 甘草 [illegible]

右用 [illegible]水 [illegible]入 [illegible] 不住手攪 勿令著底 [illegible]收

不得 [illegible]取出 [illegible]令乾 不得有[illegible]氣 [illegible]動 [illegible]

一 [illegible]去其草 [illegible]香不用 [illegible]取青皮 如[illegible]生冷[illegible]果[illegible]之熟

取 [illegible]散 [illegible]每服一兩 [illegible]老人[illegible]

又名[illegible]立 以延年[illegible]之也

加減平胃散 治脾胃不和 不思飲食 心腹[illegible]脹滿 [illegible]口苦無

味 胸滿短氣 嘔噦惡心 噫氣吞酸 面色痿黃 肌体瘦弱 怠惰嗜臥 體重

節痛 常多自利 或發霍亂 及五噎八痞 膈氣反胃 並宜服 常服 調氣暖胃 消

太平惠民和劑局方卷之一 八 二十三

痰 除山嵐瘴氣

蒼朮 [illegible]

厚朴 [illegible]

陳皮 [illegible]

甘草 [illegible]

右為細末 每服二錢 水一盞 入生姜二片 乾棗二枚 同煎至七分 去

滓溫服 或去姜棗 帶熱服 空心食前 入鹽一捻 沸湯點服亦得 一方

以棗肉為丸 如小豆大 每服五十丸 溫生姜湯送下 空心食前 常服

調氣暖胃 化宿食 消痰飲 辟風寒冷濕四時非節之氣 一方加人參

茯苓 如小便赤澀 加白茯苓 澤瀉 如米穀不化 飲食多傷 加神麴 麥芽 如

胃中氣不快 心下痞氣 加枳實 木香 如脾胃困弱 不思飲食 加黃耆

人參 如[illegible]下痞[illegible] 加厚朴 甘草減半 如遇夏 則

加炒黃芩 如遇雨水濕潤時 加茯苓 澤瀉 如遇

有痰[illegible] 加半夏 陳皮 凡加時 除蒼朮 厚朴外

依例加之 如一服五錢 有痰 用半夏半錢 如嗽 飲食減少

脉弦細 加當歸 黃耆 如[illegible]大便[illegible]加大

黃 [illegible]錢 [illegible]桃仁[illegible]以[illegible]下 一方名 天下受拜平

胃散 一方加藿香 半夏 名[illegible]平胃散 治脾胃不和

吐瀉 [illegible]利 氣閉 腸[illegible]脹 [illegible]喘 [illegible]痞 不美飲食 常服溫

養脾[illegible]平和 [illegible]氣 [illegible]中 [illegible]皆[illegible]之 又[illegible]奇方 [illegible]陳皮

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

若[illegible]

太平惠民和劑局方卷之一 十四

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

右件爲末[illegible]加[illegible]散[illegible]大便秘結甚則欲上高
叫狀弁未得汗[illegible]日不大便加大黃[illegible]錢以取利一行[illegible]
治若手足[illegible]
飲食[illegible]加附子[illegible]各一[illegible]指頭大[illegible]
[illegible]一字[illegible]
其一胃虛腸滑虛寒不思飲食[illegible]
又論六腑[illegible]
止此爲[illegible]內虛加赤石脂[illegible]一丸服[illegible]
是山[illegible]加[illegible]

大養脾丸[illegible]
丁香 良薑 藿香葉 甘草
右爲末[illegible]丸如彈子大[illegible]服之
參苓[illegible]氣通血[illegible]
健脾[illegible]進食化水穀[illegible]
神曲[illegible] 麥蘖[illegible] 乾薑[illegible]
右爲細末[illegible]丸如梧子大每服四十五丸不拘時米飲熟水任下
又方加陳皮青皮各二兩用麪糊爲丸常服和胃[illegible]加白茯苓四兩
啟脾丸[illegible]一方加[illegible]縮砂五兩[illegible]一百丸
寬中丸[illegible]脾胃[illegible]中滿[illegible]心腹[illegible]痛不

快脾飲
神曲 麥蘖 乾薑 良薑 陳皮
枳殼 白豆蔻 丁香
右爲細末麪糊丸如梧子大每服五十丸[illegible]米飲熟水任下不拘時
服
四君子湯[illegible]治大人小兒脾胃不和補虛進食定[illegible]
白茯苓 人參 訶子 白朮四兩
右爲末每服一大錢水一盞薑三片棗一枚煎至六分去滓溫服如
早晨常服大效
厚朴丸[illegible]和脾胃補虛益氣治心腹疼痛胸膈脹滿腸鳴口
苦吞酸肢體倦怠飲食減少[illegible]惡心時作嘔吐大便不調或時泄瀉

川芎[illegible] 乾薑[illegible] 桂[illegible]
右爲細末水煮麪糊爲丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸食前
米飲下
茯苓[illegible]散[illegible]治脾胃不和[illegible]少食[illegible]惡心或霍亂[illegible]
止心腹刺痛腸鳴[illegible]水穀不化
草豆蔻[illegible] 生薑[illegible] 甘草[illegible]一兩
右件[illegible]銀器內用水[illegible]以慢火熬令水盡焙令乾杵
爲細末每服一錢用沸湯點服不計時候[illegible]常服調中
化[illegible]冷氣消飲食
厚朴
寬中丸治氣滯不快飲食不消胸膈[illegible]痰飲狀如傷寒頭疼胸
大腹[illegible] 青皮 [illegible]
右爲細末[illegible]丸如梧子大每服十丸薑湯下
三妙丹[illegible]治脾[illegible]
吳茱萸[illegible]
[illegible]
草果仁[illegible]
右爲細末[illegible]丸如梧桐子大每服六十丸空心薑湯下
白朮散[illegible]治四肢腫滿[illegible]小便不利大便走泄飲食減少
白朮 [illegible] 茯苓[illegible]
右爲末水煎[illegible]腹不[illegible]加[illegible]爲主如味見
腫因而[illegible]乃太陰[illegible]加[illegible]爲主桂枝佐之如積[illegible]
加[illegible]加黃[illegible]主 桂枝[illegible]
縮脾飲之
藿香丸[illegible]治[illegible]脾胃進食
藿香[illegible] 生薑[illegible]
右同搗令[illegible]
爲末糊丸如梧子大每服十丸[illegible]
食[illegible]三稜丸[illegible]治脾胃[illegible]
陳[illegible]
橘皮[illegible]

右為細末白麵糊丸如粟米大每服三四十丸姜湯下少甘草亦得
一方不用陳皮白朮四兩蒼朮陳米一升炒令黃色去鉄用炒
全紫色者用朮不用神炒米四兩入陳皮一兩香附少許神麴
糊丸如梧子大每服二十丸食後服小兒慢脾風只五丸甚
妙 一方食藥用巴豆者恐可服更休不可服揚 一方無巴
豆黑米炒蒼十糊為丸米飲下名六合丸
消違食中丸 [illegible]肖不能令飽害於中則氣收聚而壅遏不通是
為堅病
橘皮 四兩 白朮 二兩
右為細末用糊丸如梧子大食後用木香湯下三十丸
治脾積有熱
用升麻湯加黃連黃柏
(二)橘丸 養脾胃進飲食
青橘皮 [illegible] 陳皮 [illegible] 益智 [illegible]
丁香 [illegible] 三錢 木香 肉豆蔻 [illegible]
縮砂蜜 去皮 人參 各一兩 [illegible] 甘草 炙 各
右搗羅為散每服二錢入鹽少許沸湯點服空心食前
(奪命)抽刀散 治男子婦人脾胃積冷中焦不和心下虛痞腹中疼
痛胸膈逆滿噎塞不通食吐冷痰飲食不下噫氣吞酸口苦無味不思
飲食婦人久病血氣刺痛不可忍者男子或割空嚙心懷受風寒之邪
浮心痛積年大效
乾姜 [illegible] 良姜 [illegible]
糯米 [illegible]
右為細末每服二錢用鹽少許沸湯[illegible]服脾胃進飲食
紫大酥酒毒空心食前將息自調丸佳 一方以去殼巴豆炒斑蝥
去巴入內蔻服君子去殼不用巴豆炒只加炒斑蝥待黃或焦而
心腹痛大便秘者巴豆同炒研爛同抽刀散醋糊丸服二三錢大腑
通為度
守中金丸 治理中焦不和脾胃積冷心下虛痞腹中疼痛或飲酒過
多胸脇逆滿噎塞不思飲食又治傷寒時氣裹實外熱霍亂吐利心腹
絞痛手足不和身熱不渴腸鳴自利米穀不化又多痰飲吐瀉伏冷痰
飲食不下嘔酸吞酸口苦失味[illegible]
乾姜 炮 甘草 [illegible] 蒼朮 [illegible] 桔梗 [illegible]
右各等分為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸食前用湯嚼下又治
脾胃由進辭重飢餓而致[illegible]常服壯脾暖胃消痰多飲
潮三焦進美飲食辟風寒溫冷
[illegible]中[illegible]胸[illegible]咳嗽疾[illegible]
[illegible]心不思飲食
五味子 [illegible] 木[illegible] 茴香 [illegible] 甘草 [illegible]
[illegible]每服[illegible]為散服食前
[illegible]湯[illegible]脾胃不快宿[illegible]生水[illegible]可思飲食[illegible]
麻[illegible] 良姜 [illegible] 蒼朮 [illegible] 甘草 [illegible]
右件一同藥炒為細末每服一錢白湯點下常服快氣大解中
溫脾消飲食
(秦)健脾家二十四味養脾丸 治脾[illegible]令人寒熱[illegible]刺痛
腸鳴泄瀉嘔逆吞酸[illegible]不思飲食一切脾胃之疾並治之
丁香 木香 附子 炮去皮臍
陳皮 [illegible] 大腹皮 神麴 [illegible] 白朮 大棗 [illegible]
肉桂 [illegible] 草[illegible] 訶子 [illegible]
人參 [illegible] 茯苓 [illegible] 縮砂仁 [illegible] 草[illegible] 白附子 [illegible]
高良姜 [illegible] 紅豆 [illegible] 胡椒 [illegible] 蓽撥 甘草 炙
川姜 [illegible] 生姜 [illegible]
右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼[illegible]
調和胃氣 以錢壺煮於鍋中微火煮[illegible]生姜棗湯點
服
初六日[illegible]戴著[illegible]未退[illegible]氣[illegible]胃氣為本藥
中加[illegible]使邪氣不能傷也以益氣

補胃為主之劑

人參、五味子 … 當歸 … 和血 … 陳皮 … 益氣

和風 … 白芍 … 濕火 … 大用脾胃

徹天 升風木之氣 升麻 … 陽明之氣上升 … 白朮 紫

胡 … 引少陽之氣出於胃中 風行於天上 黃芪 … 陳皮

毛止自汗 … 元氣 半夏 … 風痰 益胃氣 進食 麥門冬

… 循 … 氣 … 肺氣 … 白朮 … 養胃氣

厚朴 胃和 … 服水二盞 煎至 …

白 以 … 作 … 服之 … 中益氣

易氣 秋 不能 … 正 … 而安 得 … 而安矣

厚朴丸 治脾虛 … 故脹 … 四肢 … 重 … 困少

方

厚朴 上薑汁制 大棗 附子

人參 訶子 白朮 白茯苓 肉豆蔻

木香

卷之一

右件前四味 … 鍋石器中以水一斗慢火熬乾 … 去皮核 四物

炙 … 人參等六味作細末和勻入少麵糊同棗和杵千下丸

如梧桐子大每服五十丸米飲送下食前

木香丸 治 … 進飲食快中脘

… 大麥糵 二兩 橘紅 … 白朮 … 白豆蔻仁

右為細末 … 蒸餅 … 為丸如梧桐子大每服三五十丸不拘時候濃

煎人參湯下日進三四服

建脾人參丸 治 … 脾胃 … 食全減

鍾乳粉 … 人參 石斛 … 大麥糵 乾生薑

陳橘皮 各半兩

右為細末水煮麵糊和丸如梧桐子大每服二十丸空心米飲下

厚朴湯 … 脾胃 … 心腹 … 食 … 大便秘澀

厚朴 … 陳橘皮 … 乾薑 … 附子一枚

右為細末 … 和丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲下

厚朴煎丸 … 健脾強中 … 大去 … 倍進飲食

厚朴 … 附子 …

甘草 …

右為細末生薑 … 丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸空心

米飲下

六君子湯 治脾胃 … 不思飲食 … 宜此服

枳殼 陳橘皮 人參 白朮 白茯苓

半夏 …

右各等分為粗末每服五錢水一盞加生薑三片同煎至一盞去

滓服不計時候

丁香平胃散 … 溫和脾胃 …

厚朴 白朮 甘草 陳皮 縮砂仁

丁香 …

右件為粗末每服三大錢水一盞生薑七片棗一枚同煎至八分去

服食前

胃愛散 … 治脾 … 中焦 … 上 … 或有 … 或有胸膈

卷之十

… 不思飲食

丁香一分 人參一兩 白朮 茯苓 甘草

肉豆蔻 … 藿香 乾薑 各半兩

右白朮二兩 … 為細末每服二大錢水一盞入生薑一片同煎至

七分 … 不 … 加丁香 … 四粒 … 七枚同煎七分通

口溫服空心食前

厚朴煎丸 … 中下氣 … 脾進食 … 補 …

飲食進 飲食既進 … 自盛矣

厚朴 …

乾薑 … 上 …

甘草 …

右同為末生薑 … 丸如梧桐子大每服五十丸米飲下

厚朴丸 … 脾胃 … 飲 … 大便不調

厚朴 … 木香 … 陳橘皮 …

檳榔 … 肉豆蔻 …

右為末[illegible]以生姜自然汁調煎作餅
和為丸如梧桐子大每服一十丸至二十丸生姜湯下食空服
紫蘇散 治[illegible]脾胃[illegible]多痰[illegible]膈中脘不和胃氣
紫蘇葉[illegible] 白朮[illegible] 白豆蔻[illegible]
青橘皮[illegible] 生姜[illegible] 縮砂仁[illegible] 甘草[illegible]
天雄[illegible]
右件九味同為細末每服一錢水一盞入生姜三片同煎至五分去滓
服日進三服
白豆蔻散 治[illegible]中益氣[illegible]脾[illegible]心胸[illegible]飲食上氣下令
宜服
白豆蔻[illegible] 肉豆蔻[illegible] 肉桂[illegible] 白朮[illegible]
青橘皮[illegible] 甘草[illegible] 厚朴[illegible]
右件七味同為末每服二錢水一盞入生姜[illegible]粟米少許棗一枚
同煎至七分去滓熱服之
人參訶子散 [illegible]胃氣進飲食
白豆蔻[illegible] 甘草[illegible] 茯苓[illegible] 人參[illegible] 訶子[illegible]
陳皮[illegible] [illegible]
右同為末每服二錢入生姜一塊水一盞同煎至七分溫服
桂附丸 [illegible]治脾胃進飲食
香附子 厚朴 陳皮 甘草 蓬莪朮
三棱 桂心 [illegible] 訶子[illegible]
右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸生姜一塊切開作孔安藥在
內合定濕紙裹慢火煨令香熟細嚼化下
養脾丸 [illegible]消痰化食進飲食
好草[illegible] 厚朴[illegible] 附子[illegible] [illegible]
川烏[illegible] 青州大棗[illegible]
右件入鍋內用水淹過[illegible]煮令水盡為度慢火炒乾不得令焦入
舶上茴香[illegible] 白朮[illegible] 白茯苓[illegible] 神曲[illegible]
右一處為末用神曲糊為丸如梧桐子大空心食前[illegible]下二十丸米飲下

[illegible]

平胃散 治[illegible]中[illegible]脾胃[illegible]止嘔[illegible]吐[illegible]四
肢[illegible]氣[illegible]諸病[illegible]大宜[illegible]之[illegible]常[illegible]有[illegible]不可具
述
蒼朮[illegible] 白朮[illegible]
厚朴[illegible] 橘皮[illegible]
生姜[illegible] 甘草[illegible]
右件依散修事了以[illegible]或細剉入藥在內以水浸約二三寸
許文武火煮乃令半不使入候煮藥[illegible]乾以文火焙燥羅為細末
每服二錢水一盞入生姜三片棗一枚同煎至八分服白水煎亦得
或為末[illegible]服[illegible]一服空心
[illegible]中化痰快脾胃真[illegible]去[illegible]三兩 老薑三兩
[illegible]湯丸[illegible]焙乾作麤末二兩六兩和作一兩用生姜十二
兩[illegible]每日[illegible]入藥
甘草[illegible] 當歸[illegible] 陳皮[illegible]
人參[illegible] 紫蘇葉[illegible]
右為麤末每服三大錢水一盞半入紫蘇十葉煎至六分去滓不拘時
候服
正脾散 治[illegible]飲食[illegible]
[illegible]氣[illegible]中[illegible]不可具[illegible]外[illegible]服[illegible]
[illegible]
紫蘇[illegible] 甘草[illegible] 南木香[illegible]
桂心[illegible] 草豆蔻[illegible] 益智仁[illegible]
陳橘皮[illegible] 荊三棱[illegible]
右為細末每服一大錢水一中盞棗二枚[illegible]同煎至七
分入鹽少許[illegible]大便[illegible]青木香
[illegible]快脾散[illegible]
[illegible]飲食
[illegible] 生姜[illegible]
右[illegible]味[illegible]入鍋內以猛火炒[illegible]出[illegible]每末一斤入[illegible]
姜四兩[illegible]四兩[illegible]為細末[illegible]如桐子大每服

三五十丸空心米飲下加附子二兩炮去皮臍

和中丸 [illegible]補胃進食

乾生薑　橘皮　人參　[illegible]　白朮　[illegible]

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧子大溫水送下

養脾散 [illegible]胃少有不和可常服

蒼朮 [illegible]

厚朴 [illegible]　甘草 [illegible]

右為細末每服一錢用燒鹽湯點七分盞服或用水一盞薑三片棗

一枚煎七分食前服或作散服

理脾胃散 [illegible]

陳橘皮　白朮　厚朴[illegible]一兩

右為散每服大錢水一盞入薑棗同煎至七分空心溫服

香蔘脾丸 [illegible]

人參　白朮　麵[illegible]　甘草 [illegible]　丁香

木香　肉豆蔻 [illegible]　縮砂 [illegible]　沉香一分

五百七十　十一

右為細末煉蜜為丸每兩作十丸每服一丸細嚼米飲下食前服化下亦得

和胃[illegible] [illegible]調理脾胃[illegible]下氣去痰[illegible]順氣除痰[illegible]

生也更不可缺也

丁香　乾薑　半夏[illegible]　沉香　枇杷葉[illegible]

肉豆蔻 [illegible]　甘草 [illegible]　白豆蔻仁　陳皮

縮砂仁 [illegible]　茯苓 [illegible]　白朮 [illegible]　檳榔 [illegible]

青皮 [illegible]　木香 [illegible]

右㕮咀每服三錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎至七分不拘時

候

運脾散 [illegible]

縮砂　蒼朮　人參　藿香　肉果

丁香　神麴 [illegible]　甘草 [illegible]

右件為細末非時以橘皮湯點之能中健胃消食

中和湯 [illegible]調和陰陽[illegible]散[illegible]養脾健胃快飲食消腫脹除止嘔

逆惡心

白朮 [illegible]　當歸[illegible]　厚朴　人參　甘草

茯苓 [illegible]

右為細末每服二錢水一盞入生薑三片煎至七分去滓食前溫服

安胃丸 [illegible]寒邪傷胃溫中補氣健胃進食

縮砂 [illegible]　陳皮二兩　木香 [illegible]　白朮 [illegible]　青皮二錢

白茯苓 [illegible]　大麥蘗 [illegible]

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧子大每服二十丸溫水送下食遠服

[illegible]

補中丸 [illegible]補脾虛調胃進飲食止瀉痢定痛

厚朴一兩　乾薑 [illegible]　白茯苓 [illegible]　陳皮 [illegible]　甘草一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一丸空心食前白湯化服亦可

[illegible]香[illegible] [illegible]脾胃[illegible]進飲食除嘔吐

沉香 [illegible]　甘草 [illegible]　檀香 [illegible]　肉豆蔻 [illegible]　縮砂仁 [illegible]

木香 [illegible]

五百七十二　十四

右件為細末入麝香研勻每服一錢入鹽少許沸湯點服

進食散 [illegible]治脾胃虛冷不思飲食及久病脾虛全不食

青皮　陳皮　甘草　肉桂　附子

草豆蔻　訶子　良薑　白姜

右㕮咀每服三錢生薑三片棗子一枚水一盞半煎至一盞空心一日三服

厚朴煎丸 [illegible]補脾腎進飲食溫養[illegible]保固精血孫兆[illegible]大補腎不如

[illegible]脾[illegible]

茴香 [illegible]　川椒 [illegible]　附子 [illegible]　益智仁 [illegible]

厚朴 [illegible]

乾薑 [illegible]

右末用生薑煮肥棗[illegible]一斤去皮取肉研為丸如梧桐子大每服五

十丸空心米飲下此藥溫中化痰除氣血進飲食化痰逆和有神效人

常服此藥久則補助脾氣[illegible]白濁白帶之類[illegible]男子婦人

皆可常服

捨參散 [illegible]治大病之後氣不復常[illegible]短氣神倦不樂口舌無味

茯苓一兩 白茯苓 黃芪 白扁豆 姜汁

山藥 縮砂仁 桔梗 五味子 甘草

右細末每服二錢水一盞姜三片棗一枚煎至七分食前服之

〔助氣丸〕[illegible]

用[illegible]

以[illegible]

[illegible]

脾胃俱實

夫右手關上脈浮而實者足太陰與陽明經俱實也病苦閉塞[illegible]

下[illegible]氣不通大便[illegible]時反泄利腹痛上衝肺肝[illegible]

多[illegible]汗不出[illegible]名曰脾胃俱實者也

〔瀉熱〕方

大黃 麻黃 黃芩 杏仁 赤茯苓

甘草 橘皮 芒硝 澤瀉

右㕮咀水九升煮三升去滓內大黃煮兩沸去滓下芒硝分三服

〔大黃瀉熱湯〕治[illegible]脾脈[illegible]大腹中熱切痛舌強腹脹[illegible]下

心注脾急痛

大黃 甘草 澤瀉 茯苓

黃芩 細辛 芒硝 橘皮

右㕮咀以水七升煮取三升去滓下大黃更煎兩沸去滓下芒硝分三服

〔瀉黃散〕治[illegible]脾胃壅實口內生瘡煩悶多渴頰痛心煩[illegible]口氣[illegible]不食

藿香葉七錢 石膏 縮砂仁 山梔子仁

甘草 防風

脾胃俱虛

[illegible]

夫右手關上脈浮而虛者足太陰與陽明經俱虛也[illegible]

[illegible]已名曰脾胃俱虛也

〔大[illegible]〕治[illegible]脾胃[illegible]飲食[illegible]

[illegible]

枳殼 神麴 陳皮 麥蘖 茴香

白姜 縮砂 肉豆蔻 三稜 茯苓

良姜 薏苡仁 益智 胡椒 木香

白扁豆 丁香 白朮 紅豆 蓽澄茄

山藥 苦梗 人參 甘草 蓬朮

右各等分為末[illegible]丸如梧子大每服[illegible]

下[illegible]飲食[illegible]

〔參附〕大正氣散 治男子婦人[illegible]飲食[illegible]

附子 人參 木香 藿香 縮砂仁

厚朴 白朮 白茯苓 益智仁 草果仁

丁香 陳皮 粉草 香附子 桂

烏藥 枳殼 青皮 黃耆

甘草 沉香

右為細末每服二錢水一盞[illegible]三片棗一枚[illegible]空心服

〔當歸丸〕[illegible]

便利無度

當歸 酸棗仁 乾姜 芎藭 熟地黃

天雄 地骨皮 茴香 大棗 [illegible]

木瓜 厚朴 [illegible] 桂心

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸加至四十丸日三服

[illegible]消[illegible] 治脾胃虛弱[illegible]心腹脹滿[illegible]

木香 [illegible] 良薑 乾薑 丁香

胡椒 陳皮 紅豆 草果仁 甘草

白豆蔻仁 青皮

右㕮咀每服二錢水一盞半薑三片棗一枚煎服

[illegible]丸 治脾胃[illegible]

[illegible]木香丸 治脾胃虛弱久有傷滯中滿痞塞腹脇脹痛下氣嘔

[illegible]吐痰水不思飲食或心腹引痛[illegible]

[illegible]血[illegible]黃瘦[illegible]

[illegible]婦人血氣不調小腹疼痛[illegible]

[illegible]服

已上二味同搗膠入硇砂膏

川楝子 山藥 檳榔 枳殼 茴香炒

附子 硇砂

右件同搗為末入前膏內和勻為丸如梧桐子大每服十五

丸生姜湯下婦人淡醋湯下不計時候[illegible]

中滿積聚化痰飲一方[illegible]下

參苓壯脾丸 治脾胃虛弱[illegible]胸膈痞悶[illegible]脹滿心腹刺痛[illegible]胃

吐食口苦吞酸胃滿短氣肢體怠惰面黃及中焦[illegible]不任攻擊臟

腑虛寒不受峻補或因病氣未復常[illegible]弱不能飲食及久病

泄痢腸胃虛滑並宜服之

人參 白朮 茯苓去皮 肉桂去皮 縮砂仁去皮

乾姜炮 胡椒 麥蘗 神麴 山藥

白扁豆炒

右等分為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼白湯下溫酒亦得空

心食前常服育神養氣和補脾胃進美飲食[illegible]

阿魏丸 治脾胃怯弱[illegible]食生冷[illegible]中[illegible]下能[illegible]化致脹滿

腹痛噁心不食或[illegible]宜主之

阿魏 官桂 蒼朮 [illegible]

青皮去白 [illegible] 白朮 百草霜 巴豆 神麴

乾姜

右為末和勻阿魏丸如菉豆大每服二十丸不拘時姜湯送下婦

人[illegible]下生姜[illegible]下

參苓白朮散 治脾胃虛弱飲食不進多困少力中滿痞噎心忪氣

喘嘔吐泄瀉及傷寒咳噫此藥中和不熱久服養氣育神醒脾悅色順

正辟邪

蓮子肉 薏苡仁 縮砂仁 桔梗

白扁豆 白茯苓 人參 甘草

白朮 山藥

右為細末每服二錢棗湯調下小兒量歲數加減

思食調中丸 治脾胃久弱三焦不調胃脘痞悶脾胃[illegible]

[illegible]治脾胃[illegible]氣逆不調或吐痰水

陳皮 麥蘗 半夏 陳皮 烏藥

檳榔 人參 木香 沉香 白朮

右為末[illegible]為丸如梧桐子大每服三十丸食前[illegible]米飲

下

壯脾丸 治脾胃虛弱氣不升降中滿痞塞心腹膨脹腸鳴泄瀉[illegible]

飲食

人參 白朮 青皮 神麴 麥蘗

陳皮 厚朴 縮砂仁 乾姜

甘草

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼米飲下食前

服

補脾胃瀉陰火升陽湯

羌活 升麻 柴胡 黃芩 人參

甘草 黃芩 黃連 石膏

右件㕮咀，每服秤三錢，水二盞，煎至一盞，去渣，大溫服，早飯後午飯前，間日服。服藥之時，宜減食，宜美食。服藥訖，忌語話一二時辰許，及酒、濕麵、大料物之類，及大濕熱之物，使助火邪而愈損元氣也。亦忌冷水及寒涼淡滲之物及諸果，恐陽氣不能生旺也。宜溫食及薄滋味，以助陽氣。大抵此法此藥，欲令陽氣升浮耳，若淡滲之味，皆為滋陰之味，為大禁也。雖然亦有從權而用之者，如見腎火旺及督任衝三脈盛，則用黃柏、知母，酒洗訖，火炒製加之，若分兩則臨病斟酌，不可久服，恐助陰氣而為害也。小便赤或澀，當利之，大便澀，當行之，此亦從權也，得利則勿再服。此雖立食禁法，若可食之物，一切禁之，則胃氣失所養也，亦當從權而食之，以滋胃也。

升陽益胃湯　治脾胃之虛，怠惰嗜臥，四肢不收，時值秋燥令行，濕熱少退，體重節痛，口乾舌乾，飲食無味，大便不調，小便頻數，不嗜食，食不消。兼見肺病，灑淅惡寒，慘慘不樂，面色惡而不和，乃陽氣不伸故也。當升陽益胃，名之曰升陽益胃湯。

羌活半兩　柴胡三錢　獨活半兩　白朮三錢　防風半兩（以其秋旺，故以辛溫瀉之）

人參一兩　炙甘草一兩　半夏一兩（湯洗）

黃耆二兩　黃連二分　橘皮四錢

茯苓三錢　澤瀉三錢　白芍藥半兩

右㕮咀，每服秤三錢，生薑五片，棗二枚，去核，水三盞，同煎至一盞，去渣，溫服，早飯午飯之間服之。禁忌如前。其藥漸加至五錢止。服藥後，如小便罷而病加增劇，是不宜利小便，當少去茯苓、澤瀉。若喜食，初一二日不可飽食，恐胃再傷，以藥力尚少，胃氣不得轉運升發也。須薄味之食或美食，助其藥力，益升浮之氣，而滋其胃氣也。慎不可淡食以損藥力，而助邪氣之降沉也。可以小役形體，使胃與藥得轉運升發，慎勿大勞役使復傷。若脾胃得安靜尤佳。若胃氣少覺強壯，少食果以助穀藥之力。經云：五穀為養，五果為助者也。

黃耆人參湯　夫脾胃虛弱，必上焦之氣不足，遇夏天氣熱盛，損傷元氣，怠惰嗜臥，四肢不收，精神不足，兩腳痿軟，遇早晚寒厥，日高之後，陽氣將旺，復熱如火，乃陰陽氣血俱不足，故或熱厥而陰虛，或寒厥而氣虛。口不知味，目中溜火，而視物䀮䀮無所見。小便頻數，大便難而結秘，胃脘當心而痛，兩脅痛或急縮，臍下周圍如繩束之急，甚則如刀刺，腹難舒伸，胸中閉塞，時顯嘔噦，或有痰嗽，口沃白沫，舌強，腰、背、胛眼皆痛，頭痛時作，食不下，或食入即飽，全不思食，自汗尤甚，若陰氣覆在皮毛之上，皆天氣之熱助本病也，乃庚大腸、辛肺金為熱所乘而作。當先救元氣，理治庚辛之不足。

人參（去蘆，五分）　炙甘草（二分）　白朮（五分）　黃耆（一錢）

神麯（炒，一分）　五味子（九箇）　蒼朮（泔浸，去皮，五分）

升麻（六分）　麥門冬（去心，二分）　當歸身（酒洗，二分）　黃柏（酒洗，以救水之源，一分）

右㕮咀，都作一服，水二盞，煎至一盞，去渣，稍熱服，食遠或空心服之。忌酒、濕麵、大料物之類，及過食冷物。○如心下痞悶，加黃連二分或三分。○如胃脘當心痛，減大寒藥，加草豆蔻仁五分。○如脅下痛或縮急，加柴胡二分或三分。○如頭痛，目中溜火，加黃連一分或二分，川芎三分。○如頭目不清利，上壅上熱，加蔓荊子三分，藁本二分，細辛

一分，川芎三分，生地黃二分。○如氣短，精神如夢寐之間，困乏無力，加五味子九箇。○如大便澀滯，隔一二日不見者，致食少，食不下，血少，血中伏火而不得潤也，加當歸身、生地黃各半錢，桃仁三枚，湯泡去皮尖，另研，麻子仁泥五分，如大便通行，所加之藥勿再服。○如大便又不快利，勿用別藥，少加大黃煨，半錢。○如不利者，非血結血秘而不通也，是熱則生風，其病人必顯風證，單血藥不可復加之，常服藥內但加羌活、防風各五分，二味㕮咀，以水四盞，煎至一盞，去渣，空心服之，其大便必大走也，一服便止。○如胸中氣壅滯，加青皮一分或二分，去白，倍之，去其邪氣，此病本元氣不足，惟當補元氣，不當瀉之。○如氣滯大甚，或補藥大過，或病人心有憂滯鬱結之事，更加木香二分或三分，白豆蔻仁二分，縮砂仁二分或三分，與正藥同煎服。○如腹痛不惡寒者，加白芍藥半錢，黃芩二分，卻減五味子。

升陽除濕防風湯　如大便閉塞，或裏急後重，數至圊而不能便，或少有血，慎勿利之，以舉其陽，則陰氣自降矣。

蒼朮四兩　防風二錢　白朮一錢　白茯苓一錢　白芍藥一錢

右㕮咀，除蒼朮另作片子，水一碗半，煮至二大盞，內諸藥，同煎至一大

盞，去渣，稍熱，空心食前。

又方 治脾胃久虛……大便泄，小便閉塞，以升陽風

[illegible]

羌活　獨活　柴胡　升麻各一　防風根截

甘草根梢

右㕮咀，作四服，水二盞，煎至一盞，去渣……

益氣……四肢不收……

[illegible]

中滿外經中之至劑

防風　生薑五分　蒼朮　茯苓　澤瀉二分

升麻二分

此藥能走經，除濕熱而不守，故不瀉本臟，補肺與脾胃本中氣之虛弱。

陳皮　青皮一分　人參　甘草　白朮一分

白芍藥二分

此藥行經而不走經……

五味子　麥門冬　人參　當歸一分

此藥去時令之熱……

右件剉如麻豆大，都作一服，水一盞，煎……空心服之。

……

陳皮　升麻　柴胡　[illegible]

右㕮咀，每服半兩，水二盞，煎至一盞，去渣，大溫，食前服。

……不能除……

……補元氣……甘溫……

升陽益氣……茯苓利小便……橘皮……

……中……胃氣……

……以上……

人參　當歸　甘草一錢

當歸身二分　黃芩

右㕮咀，分作二服，每服水二盞，煎至一盞，去渣，稍熱服。

升陽除濕湯　治脾胃虛弱，不思飲食，腸鳴腹痛，泄瀉無度，小便黃，四肢困弱。

甘草　升麻　柴胡

益智仁三分　當歸身　紅花

陳皮三分　升麻　柴胡

羌活　甘草　神麴　防風

澤瀉　大麥蘖麴

益智仁　半夏　生薑

右㕮咀，作一服，水三盞，煎至一盞，去渣，空心服。

益胃湯　治頭悶，勞動則微痛，不喜飲食，四肢怠惰，躁熱短氣，口不知味，腸鳴，大便微溏黃色，身體昏悶，口乾不喜食冷。

黃耆二分　甘草　黃芩　當歸梢　蒼朮

陳皮五分　升麻　柴胡　人參　白朮

半夏二分　益智仁

右㕮咀作一服水一大盞[illegible]煎[illegible]服食前宜飲食失節生
冷硬物過度一方用[illegible]
寬中和中湯[illegible]
柴胡[illegible] 蒼朮[illegible] 升麻二分 蒼朮[illegible]
黃芩[illegible] 當歸[illegible] 炙甘草一分
陳皮[illegible] 人參[illegible] 白朮[illegible]
右以咀水二盞生薑五片棗二枚煎至一盞去滓稍熱服之食前
養胃湯 治脾胃虛寒嘔逆惡心腹脇脹痛腸鳴泄瀉或外感寒
熱如瘧[illegible]不[illegible]泄[illegible]面目
虛浮不思飲食
藿香去梗 厚朴薑製 半夏[illegible] 茯苓各一兩 人參三分
白朮[illegible] 甘草[illegible] 草菓[illegible] 附子炮 陳皮[illegible]
右㕮咀每服四錢以水一盞半生薑五片棗子一枚烏梅半個煎服
之常服[illegible]下氣[illegible]
平胃散[illegible]治脾胃不和[illegible]心大[illegible]能[illegible]上[illegible]
[illegible]

衛生寶鑑 卷之[illegible]

少腸胱之氣水旺[illegible]手能令母實[illegible]肺金大腸[illegible]而[illegible]腎
此大腸而[illegible]也六腑以大腸為使[illegible]血脈分為之[illegible]元氣以經於外又
夫真大腸二氣[illegible]之[illegible]若寒風[illegible]陽明[illegible]中而[illegible]
不[illegible]自[illegible]目[illegible]不[illegible]腹中[illegible]寒水反[illegible]
食入反出[illegible]心[illegible]不[illegible]時而痛[illegible]不[illegible]人[illegible]多
而以[illegible]下[illegible]不[illegible]胃[illegible]中[illegible]不[illegible]而[illegible]
[illegible]之[illegible]不[illegible]日傷中[illegible]
[illegible]
便[illegible]而[illegible]此藥[illegible]大便[illegible]之藥也
草豆蔻[illegible] 甘草[illegible] 橘皮[illegible]
[illegible] 甘草[illegible] 甘草[illegible]
[illegible] 澤瀉[illegible]
[illegible] 神麯[illegible] 人參[illegible]
[illegible] 柴胡[illegible]
右為細末[illegible]一[illegible]丸如梧桐子大每

[illegible]丸[illegible]
[illegible]
神麯[illegible] 肉桂[illegible]
[illegible]
右為細末[illegible]丸如梧桐子大每服三五十丸米飲湯下食前稍空服
[illegible]加[illegible]一方用米
[illegible]
神麯丸 治[illegible]不[illegible]
[illegible]
[illegible]
右為細末[illegible]大服[illegible]四十九枚[illegible]為[illegible]去[illegible]
[illegible]丸如梧桐子大每服三十丸溫湯下
有人全不進食[illegible]不[illegible]此方服之[illegible]不可
全[illegible]是不[illegible]飲食[illegible]全
之中[illegible]不[illegible]大力[illegible]日[illegible]不[illegible]其可[illegible]子
[illegible]日[illegible]下十日[illegible]亦知此理

衛生寶鑑 卷之[illegible]

也
又方 以前方加木香[illegible]一兩名四神丸
又方 以前方加[illegible]一兩亦名四神丸
補脾散 治脾泄不止食積不消[illegible]大腸滑泄[illegible]腹痛[illegible]
[illegible]
肉豆蔻[illegible] 神麯[illegible] 茴香[illegible] 草菓[illegible]
厚朴[illegible] 乾薑[illegible] 陳皮[illegible] 木香[illegible] 甘草[illegible]
右為末[illegible]泄瀉[illegible]入[illegible]下[illegible]腸鳴[illegible]不和[illegible]不止[illegible]
[illegible]服[illegible]空心食前[illegible]
益胃補中湯
[illegible] 人參[illegible] 甘草[illegible] 白朮[illegible] 蒼朮[illegible]
[illegible] 澤瀉[illegible] 豬苓[illegible] 茯苓[illegible]
[illegible]
右㕮咀用水二盞煎至七分去渣大溫服下
和中丸 治脾胃[illegible]不和[illegible]氣[illegible]痰[illegible]甚頭

[illegible]服和中順氣升降

止嘔[illegible]

[illegible]人參　陳皮[illegible]丁香

白朮　白茯苓　半夏[illegible]木香

右為細末水煮麪糊和丸如梧桐子大每服五十丸生薑湯[illegible]

丁香[illegible]生薑[illegible]

附子[illegible]治脾胃虛弱[illegible]

米湯[illegible]腸鳴泄瀉食飲不化

白朮[illegible]川薑[illegible]縮砂仁[illegible]人參

神麴[illegible]白茯苓[illegible]甘草[illegible]

右為細末[illegible]每兩分作十丸[illegible]加半夏麴一兩

入鹽[illegible]右八味理中[illegible]宜若以湯[illegible]

者可無之[illegible]

和[illegible]湯[illegible]

[illegible]卷之十[illegible]

治脾胃[illegible]食則欲嘔[illegible]

[illegible]補之[illegible]

黃連一兩[illegible]白朮

香白芷[illegible]大棗二十枚[illegible]乾薑[illegible]附子

右㕮咀[illegible]一[illegible]取三服分四[illegible]

[illegible]

人參[illegible]橘紅[illegible]砂仁[illegible]紫蘇

乾薑[illegible]甘草[illegible]茯苓

右為細末煉蜜為丸每兩作五丸每服一丸[illegible]水下一丸

治中湯[illegible]治脾胃不和飲食[illegible]

脾[illegible]中[illegible]

服之[illegible]

人參[illegible]甘草[illegible]乾薑[illegible]白朮[illegible]青皮[illegible]陳皮

右各等分每服[illegible]錢水一盞半煎至一中盞去滓[illegible]服

[illegible]霍亂[illegible]

[illegible]

[illegible]能[illegible]

[illegible]不下反胃

[illegible]飲食不[illegible]

[illegible]木香[illegible]

乾薑[illegible]

右為細末水煮麪糊為丸如小豆大每服十五丸加至二十丸米飲

[illegible]不拘時候

加減思食丸[illegible]治脾胃俱虛不能[illegible]

[illegible]口苦無味[illegible]少氣又治胸中有寒飲食不下反胃翻

心[illegible]及病後新虛不勝穀氣[illegible]因病氣衰食不復常並宜服之

神麴[illegible]大麥蘗[illegible]烏梅[illegible]

白茯苓[illegible]甘草[illegible]乾木瓜[illegible]

右為細末煉蜜為丸[illegible]每服一丸細嚼白湯下不拘時候如渴

時嚼化一丸生津液進飲食

[illegible]卷之十[illegible]

治脾胃虛[illegible]

[illegible]人參[illegible]

[illegible]生薑[illegible]

[illegible]

[illegible]飲食不下反胃翻心

[illegible]宜服之

[illegible]乾薑[illegible]

右為末[illegible]為丸梧桐子大每服十五丸加至二十丸米飲下日進

二服不計時[illegible]

[illegible]丸[illegible]

[illegible]

[illegible]山藥[illegible]

[illegible]大半夏[illegible]

右為細末[illegible]如梧桐子大[illegible]分作二大[illegible]

[illegible]每服五七十丸空心[illegible]湯送下

養胃散 [illegible]脾胃虚弱不思飲食[illegible]

藿香　丁香　人参[illegible]　陳皮[illegible]

右為細末，每服一錢，水一盞，生姜三片，煎至七分，去滓，食前[illegible]

[illegible]不止，加[illegible] 治脾胃不和，心腹脹悶，脇肋脹滿，口苦無味，嘔噦惡心，不思飲食，面色痿黄，腸虚自利，肌體瘦弱，補氣翻胃

白术[illegible]　甘草[illegible]

右為細末，每服一錢，水一盞，煎至八分，[illegible]食前服[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]不拘多少，[illegible]

每服七十丸，食後米湯下

治脾胃氣虚，食即吐逆

[illegible]丸如梧桐子大，空心飲下五十丸，日五服，又主脾胃氣冷，嘔食

[illegible]丁香[illegible]

方 治心腹虚脹，手足厥冷，或飲食過度，或成宿食，兩脇脹滿，不食，先吐，或[illegible]

即世不足，宜服此方，乃脾胃家藥

[illegible]山藥　末，蜜丸如小豆大，一半銀石器內炒熟，一半生用，為末

調一錢，[illegible]其功

[illegible]脾胃虚寒，氣不升降，心腹刺痛[illegible]

[illegible]　陳皮　木香[illegible]　肉桂

丁香　人参[illegible]　當歸[illegible]

右[illegible]每服四錢，水一盞，[illegible]至七分，温服[illegible]

[illegible]脾胃虚寒，心腹[illegible]

厚朴[illegible]　縮砂[illegible]　甘草[illegible]　白茯苓[illegible]

右件散每服五錢，水二盞，生姜[illegible]，煎至一盞，去滓，食前温服

切今[illegible]人[illegible]不能[illegible]加[illegible]散，為末[illegible]散以安[illegible]

[illegible]以其[illegible]世之[illegible]

白术散[illegible]，[illegible]中病熱，飲水無力也

[illegible]

人参　白术　白茯苓　甘草[illegible]

藿香葉[illegible]　乾葛[illegible]

右為末，每服二錢，水一盞，煎至五分，温服，如飲水者多，煎與之，無時也，如[illegible]食，[illegible]加人参，服之。[illegible]乾姜[illegible]

和中丸 治脾胃[illegible]，宜常服，補胃進食

橘紅[illegible]　人参[illegible]　乾木瓜[illegible]

右為末，[illegible]丸如梧桐子大，每服五十丸，温水下，食前，[illegible]生姜一片，炙甘草三寸

[illegible]丸，[illegible]脾胃[illegible]

[illegible]

[illegible]　乾姜[illegible]　訶子[illegible]　肉豆蔻[illegible]

右七味為末，[illegible]去皮核，和為丸，如梧桐子大，每服三十丸，早晚食前用米飲下

金製香附丸 治脾胃虚弱

香附子[illegible]

神麯[illegible]　乾姜[illegible]

縮砂仁[illegible]　丁皮

右為細末，[illegible]為丸，如梧桐子大，每服五十丸，[illegible]

可下[illegible]

方可用[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]人服之又九十六[illegible]

小兒杜氏…其…

麴蘗丸 治脾胃虛弱，不思飲食，逆心

麥蘗一斤 神麴四兩 半夏二兩 甘草 茯苓一兩

陳皮一兩 生薑一斤 搗汁

右為細末，乾神麴糊…二五日，令氣味調和，方用…湯服，不拘

時。此方妙處全在陳皮，最令…氣…味方可

寬中湯 治脾胃…逆心腹脹痛

茴香四兩 高良薑一兩 胡椒 丁香一分 甘草四兩

白鹽二兩

右為細末，每服一錢，沸湯點服，不拘時

六君子湯 治脾虛胃弱生風

人參 白朮 茯苓 甘草 半夏

陂石子

右等分為末，水七分盞，入冬瓜子少許，同煎

參苓白朮散 治脾胃虛弱，飲食不進，勞傷…化…力…憂

乾薑丸

右以白礬製如櫻桃大，以新水浸過，入瓦鐵器子灰火中煨令泡和薑

末，如梧桐子大，每服三十丸，空心米飲下

水泛丸 治脾胃虛弱，食積不化，作水治則即愈

枳子

右以生薑自然汁…為細末，丸如梧桐子大，每服三五十丸，陳皮湯下

寬中丸 治脾胃虛弱，令人作疼，心痛

白朮 縮砂 官桂 高良薑

人參 甘草 草果 訶子 丁香

桔梗 神麴 陳橘皮

右為細末，每服一錢，鹽少許，沸湯點服

進食散 治脾胃虛…令食所傷，食臭不快

良薑 縮砂 陳皮 白朮 甘草

草果 京三稜 蓬莪朮

右為細末，每服二錢，入鹽點服，如加麥芽同煎…

健脾丸 治…食少…胸膈…精神疲乏

茯苓 人參 白朮

枳實 丁香 陳皮

右件為末，前件味為末，入…煉蜜為丸，如梧桐子大

每服三五十丸，生薑湯送下，食前服之，日進三服

大…丸 治…脾胃…大進飲食

厚朴 陳皮 乾薑 甘草 桂

縮砂仁 白朮

右為細末，水煮麵糊為丸，如梧桐子大，每服五六十丸，空心食前，白

湯下

…丸 正脾氣，益胃，四肢倦乏，面色萎黃，飲食減少，常服補氣

益脾，大壯臟腑，長肌肉，壯筋骨，令百病不生

陳皮 白麵

益智仁 青皮 青鹽 南木香

甘草 茴香 京三稜 蓬莪朮

右件為細末，同陳橘皮末，以水調作餅，…火上同炙…

入白麵…和為丸，如梧桐子大，每服三四十丸

…前…下

…丸 治脾胃久弱，…飲食

川芎 白朮 人參 白茯苓 五味子

訶子 …

右為細末，每服二錢…

參朮益中湯 治脾胃虛寒，心腹脹滿，及秋冬寒犯胃時作疼

[illegible] 草豆蔻仁 [illegible]

茯苓 [illegible] 木香 [illegible] 炙甘草 [illegible]

人大凡痰飲不能行,以加香竄之藥,從以辛熱,佐以苦甘,以淡

世之,故益胃散治之矣。

右為粗末,每服五錢,水二盞,[illegible] 煎,去滓,溫服,食前。

一切冷氣

白茯苓陳皮湯 治脾胃虛弱,[illegible] 脈俱弦,而指下虛,食少而已不

止,心下痞,胸中或嘔或吐,或痰氣乘之,令人 [illegible] 使不利,大便不調,精神短

少,飲食無味,此大忌不止,腹中常隱而急,[illegible]

白茯苓 陳皮 乾生薑 人參 [illegible]

一如嘔吐,或腹中急痛,加半夏 [illegible] 枳殼 [illegible]

右為末,煉蜜丸如彈子大,每服一丸,白湯化下,食空。

溫胃丸 治脾胃虛冷,噎塞,心腹痛,不快,大效。

吳茱萸 [illegible] 胡椒 [illegible] 蓽澄茄 [illegible] 厚朴 [illegible] 官桂 [illegible]

半夏 [illegible] 蓽撥 [illegible] 乾姜 [illegible]

右件八味,杵為細末,煉蜜丸如梧桐子大,每服三十丸,食前溫米飲送

下,日三服,甚效。

正脾散 治大病之後,脾氣虛弱,中滿腹脹,四肢虛浮,狀若水氣,

此藥主之。

蓬莪朮 香附子 茴香 陳橘皮 甘草

右等分為細末,每服二錢,煎燈心木瓜湯調下。

白豆蔻丸 [illegible] 補脾胃,寬胸膈,則胃虛滿。

白豆蔻仁 [illegible] 縮砂仁 [illegible] 人參 白朮 茯苓 [illegible]

丁香 白姜 [illegible] 粉草 麥蘖 [illegible] 良姜 [illegible]

右細末,煉蜜丸如彈子大,每服三丸,食前,陳米飲(湯)下。

烏附丸 [illegible] 補脾胃虛弱

大附子 [illegible] 川當歸 [illegible] 紅椒 [illegible] 白茯苓 [illegible] 七錢

右為細末,[illegible] 一處,用米醋糊和合末為丸如梧桐子大,每服五

十丸,空心鹽湯下,溫酒任下。

參朮丸 [illegible] 治脾胃虛弱,元氣不能營於心肺,四肢沉困,食後昏悶。

甘草一錢 人參半錢 炙甘草 [illegible] 升麻 [illegible] 柴胡各三分

陳橘皮二分 橘皮 [illegible] 青皮 [illegible] 神曲 [illegible] 蒼朮 [illegible] 當歸 [illegible] 分

右㕮咀,都作一服,水二大盞,煎法如常。

益智和中丸 秋季合

益智仁 [illegible] 黃耆 人參 [illegible] 炙甘草 [illegible] 麥門冬

麯末 當歸 [illegible] 乾生姜 橘皮 [illegible] 草豆蔻仁 [illegible]

縮砂仁 [illegible] 桂枝 桂花 [illegible] 大麥蘖 [illegible] 黃連 [illegible]

生地黃 [illegible] 姜黃 [illegible] 木香二分

右為極細末,湯浸蒸餅為丸,每服三二十丸,溫水送下,細嚼亦得。

豬肚散 治脾胃虛冷,補脾氣,進飲食,生精血。

附子 [illegible] 乾姜 [illegible] 陳橘皮 [illegible] 白甘草 [illegible] 肉桂 [illegible]

白茯苓 [illegible] 縮砂仁 茴香 [illegible]

肉豆蔻 [illegible] 高良姜 蓽撥 [illegible]

右件為細末,每服五錢,用豬肚一枚,去脂,水洗三五度,入藥在內,

更以 [illegible] 二錢同入豬肚內,以線縫定,用漬泉水煮令爛,每

[illegible]

[illegible] 作仲景治 [illegible] 之食

脾胃虛冷水穀不化(附論)

夫脾胃 [illegible] 調其飲食,適其寒溫,臟腑冒實,脾胃和平,則能推化水穀。

而脾胃 [illegible] 若食飲不節,寒溫失宜,致脾胃氣虛,令氣乘之,則不能腐化

水穀,而四肢身體無所稟受,令人噫氣生熱,嘔脹不收,壯熱增寒,頭痛

如瘧也。

礞石丸 治脾胃虛寒,[illegible] 不消,攻塊下痞,積聚癖塊,取虛積宜服。

礞石 [illegible] 乾姜 [illegible]

荊花 [illegible] 桂枝 [illegible] 蓬莪朮 [illegible] 檳榔 [illegible]

硇砂 [illegible] 木香 大黃 [illegible] 京三棱 [illegible]

黑牽牛 [illegible] 白豆蔻 [illegible] 巴豆 [illegible] 青橘皮 [illegible] 丁香

訶梨勒皮 胡椒 [illegible]

右除大黃、京三棱并研藥外,餘研為末,用醋三升,化硇砂於銀石器

人參[illegible]十丸[illegible]又加五七
也又入[illegible]丸又入大[illegible]丸又加五七
丸[illegible]如[illegible]麻子[illegible]黃米[illegible]五丸至七丸生薑湯[illegible]
[illegible]腹脹[illegible]婦人心痛醋湯下

丁香丸 治脾胃虛[illegible]不化
丁香　硇砂　木香　[illegible]
附子　[illegible]　蓬莪茂[illegible]　乾漆[illegible]
大黃[illegible]　[illegible]
檳榔[illegible]　青橘皮[illegible]
右除硇砂大黃巴豆外為末[illegible]以醋一升化硇砂
[illegible]入銀石器中[illegible]大煎之次下巴豆[illegible]次下大黃末
熬成膏[illegible]一千[illegible]丸如麻子大服三丸至五
丸[illegible]水下[illegible]量人虛實加減

[illegible]香丸 治[illegible]
乳香　沒藥　丹砂　木香　沉香
蓬莪茂[illegible]　檳榔[illegible]　[illegible]　阿魏[illegible]
硇砂[illegible]　狼毒[illegible]　乾漆[illegible]　青橘皮[illegible]
右除[illegible]外搗羅為末[illegible]入石器以[illegible]醋
一升[illegible]大[illegible]成膏子[illegible]丸如[illegible]豆大每服十五丸[illegible]水
下

五香丸 治[illegible]腹脹[illegible]
丁香　木香　沉香　母丁香　乳香
硇砂[illegible]　[illegible]豆蔻[illegible]　肉桂[illegible]　京三稜[illegible]
當歸[illegible]　陳橘皮[illegible]　檳榔[illegible]　蓬莪茂[illegible]
附子[illegible]　巴豆[illegible]
右件[illegible]乳香[illegible]味細研[illegible]
為末[illegible]硇砂巴豆[illegible]為丸如麻子大每服
五丸至七丸熟水下生薑湯亦得

寬[illegible]散 治[illegible]腹[illegible]水穀不消[illegible]
[illegible]　木香[illegible]　白豆蔻[illegible]　檳榔[illegible]
[illegible]　[illegible]　乾薑[illegible]
桂心[illegible]　[illegible]　[illegible]
陳橘皮[illegible]　甘草[illegible]
右件搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至
六分去滓食前稍熱服

沉香丸 治[illegible]腹脹[illegible]
沉香　丁香　木香
丹砂[illegible]　[illegible]豆蔻　檳榔[illegible]　安息香
青橘皮[illegible]　石菖蒲[illegible]　阿魏[illegible]
[illegible]　硇砂[illegible]　[illegible]　巴豆[illegible]
右除[illegible]外搗羅為末與研藥和勻[illegible]丸如[illegible]豆大
每服一丸食前臨臥溫生薑橘皮湯下更量[illegible]虛實大小加
減

青木香丸 治[illegible]
木香[illegible]　[illegible]　人參
附子[illegible]　[illegible]　桂[illegible]　白朮
檳榔[illegible]　甘草[illegible]　[illegible]　枳殼[illegible]
右為末[illegible]丸如梧桐子大[illegible]一十丸[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
當歸[illegible]　人參
[illegible]　茯苓[illegible]　細辛
[illegible]　桔梗　附子[illegible]　甘草[illegible]
右件[illegible]為散[illegible]
[illegible]加大黃二兩[illegible]

人參荳蔲湯 治脾胃不和宿食留滯[illegible]水穀日漸羸瘦

柴胡 人參 桔梗 白朮

赤茯苓 陳橘皮

五味子 當歸 細辛

大黃 半夏 厚朴

人參 桂 蓽澄茄

右件為散每服三錢水一盞入生薑半分大棗一枚煎取七分去滓

空心溫服日晚再服

金夜丸 治脾胃虛冷宿食不消心腹刺痛不思飲食

神麴 白朮 桂 青橘皮

陳橘皮 [illegible] 檳榔

丁香 甘草 砂仁

巴豆

右為末醋煮麵糊丸如綠豆大每服七丸至十丸食後米飲茶湯任下

[illegible]香丸 治脾胃虛宿食不消脇肋脹滿腹脇不利心腹引痛不思食

蘹香 沉香 人參 桂 白朮

白豆蔻 木香 丁香 赤茯苓

砂仁 甘草 丹砂 安息香

右搗研一十二味為末以安息香入蜜同煉丸雞頭大每服一丸細嚼空心生薑紫蘇陳橘皮湯下

附子曲香荳蔻散 治脾胃[illegible]不進飲食

白朮 官桂 附子 白芍藥 草豆蔻

良薑 茴香 厚朴 白茯苓

白豆蔻仁 檳榔 甘草

右㕮咀每服四錢水一盞生薑三片棗一箇煎至七分不拘時

大厚朴丸 治脾胃虛冷食已脹滿水穀不化

厚朴 白朮 東麴 陳橘皮

枳殼 麥蘗 人參 木香

丁香 甘草 縮砂 草豆蔻 檳榔

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼生薑湯下空心食前服

建中湯 治脾胃不和中脘氣滯[illegible]脇肋脹滿[illegible]不思飲食

青州棗 厚朴 乾薑 半夏

甘草 陳皮

已上六味用水二升煮令水盡焙乾

草豆蔻 人參 藿香 白茯苓

白朮

右為末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚同煎至六分去滓溫服食前

丁香煮散 治脾胃傷冷中脘痞悶[illegible]飲食不下[illegible]

治心腹大脹脇肋[illegible]

[illegible]

丁香 川芎 甘草 附子

陳皮 青皮 益智仁 良薑 紅豆

明[illegible]

右為細末每服三大錢水一盞半入生薑三片鹽少許煎七分去滓帶熱空心食前服專治脾虛即止一方無紅豆

嚴脾丸 治脾胃中冷停痰食不消化

大黃 麥蘗 乾薑 厚朴 附子

當歸 甘草 桂心 人參 枳實

右搗下篩煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸日三增至二十丸亦得食已服忌冷[illegible]

益智丸 治脾胃虛冷飲食不化[illegible]

溫中散 [illegible]

木香 附子 縮砂 桂 胡上茴香

蓽澄茄 青皮 陳皮 沉香 丁香

檳榔 雞舌香

右件為細末，以可煮麪糊為丸，如小羊子大，每服作十六丸，用生
薑……下……良久……保令
丁香散 治……有冷氣……不消化……四肢無力或
嘔吐逆
丁香 人參 甘草 半夏
藿香 陳橘皮 白朮 草豆蔻 二兩
縮砂 訶子 高良薑 三分
附子 一兩 炮裂
右件藥搗粗羅為散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分、棗三枚，煎
至六分，去滓，不計時候稍熱服之。忌生冷、油膩、黏滑、熱麪。
五味良薑丸 治脾胃……虛冷痰飲……氣壅不通，食即嘔吐，咽酸
……心中……食……留飲
……常服健脾胃，美飲食，辟痰……正氣
高良薑 乾薑 白朮 肉桂 甘草
右為細末，煉蜜為丸，每一兩作十二丸，每服一丸，細嚼，生薑橘皮
湯下。

鬱金丸 治脾胃虛冷，宿食不消，化積聚……及治一切氣不和，宜
人血氣虛……食……心食……
芫花 醋炒 大戟 甘遂 炒 蓬莪朮 煨 京三稜 煨
牽牛子 炒 乾漆 炒 青橘皮 去白 陳橘皮 去白
巴豆 …… 硇砂 …… 綠礬 ……
右除硇砂、巴豆外，……一升……一宿，取出，去生
薑，將十味……以硇砂……和丸，如綠豆大
大每服三丸……下，婦人血氣痛……下，水氣及氣腫并痢疾，生
薑湯下，一切氣不和，生薑湯下。
蘇合丸 治男子婦人氣血虛弱，久積陰冷，留滯不散，結聚成形，心腹
脹滿，或攻衝上連胸脇，或臍腹久虛，腸鳴冷痛，痛連臍下，腹痛腸
鳴，或久瀉純白，時下青黑，腸滑不禁，又治胃脘停痰，嘔吐吞酸，痞塞不
通，不思飲食，身體沉重，面色痿黃，或久患心脾痛，服之永除根本。

丁香 …… 人參 …… 白朮 ……
陳皮 …… 附子 …… 青皮 ……
肉豆蔻 …… 乾……
右為細末……為丸，如……大，每服一丸……
……用濕紙裹……火燒……頃，飯久
取出去紙……細研……分四服，老人
……服人……四肢無力，吐逆，食不
壯脾丸 ……脾胃……
消化，手足……
橘紅 …… 白豆蔻 …… 縮砂仁 麥蘖 炒
神麯 炒 橘紅 附子 炮 白朮 各二 木香
丁香 ……
右為細末，用猪肚……百……丸，如梧桐子大，每服五十丸，用米飲
下，不拘時候。
人參散 治脾胃虛冷，食不消化，腹脇氣脹，不思飲食，四肢少力
人參 …… 神麯 …… 白朮 三分 附子 ……
草豆蔻 …… 厚朴 …… 麥蘖 ……
乾薑 …… 甘草 …… 陳橘皮 ……
右件藥搗羅為散，每服三錢，以水一中盞，入棗三枚，煎至六分，去滓，不
計時候稍熱服。
白朮丸 治脾胃氣虛，冷氣攻，穀不化，腹脹或時泄，四肢逆冷
白朮 一兩 吳茱萸 …… 訶梨勒 ……
人參 …… 桔梗 …… 桂心 二分 附子 ……
乾薑 …… 細辛 …… 草豆蔻 一兩 甘草 ……
右件藥搗羅為末，煉蜜和搗三五百杵，丸如梧桐子大，每服以粥飲下二
十丸，空心及晚食前服。
和胃丸 治脾胃虛冷，食即嘔逆，水穀不化，或時泄利
厚朴 …… 乾薑 …… 當歸 …… 人參
檳榔 …… 陳橘皮 …… 白朮 …… 半夏 ……

桔梗一兩 甘草炙各半兩 訶梨勒煨三分

右為末，酒麵糊和丸，如梧桐子大，每服十五丸至二十丸，煎生薑棗湯下，米飲亦得，不拘時。

大益脾丸 治脾胃中冷，水穀不化，心腹妨脹，噫氣吞酸，不思飲食

麥櫱炒 神麴炒 甘草炙 桔梗 人參 乾薑炮各三[illegible]

桂心去皮 [illegible] 細辛 [illegible] 枳殼 [illegible] 吳茱萸

大麥櫱 [illegible]

右搗篩，煉蜜和丸，如梧桐子大，每服七丸，日加至十五丸，日三。忌生冷粘滑肉生菜。一方米飲為下，空心食前服。

草豆蔻散 治脾胃虛冷，腹中虛鳴，泄瀉不止

草豆蔻去皮一兩 高良薑三分 桂去粗皮 丁香

木香 五味子 白豆蔻去皮 陳橘皮湯浸去白焙

肉豆蔻去殼各 白朮一分

右為散，研勻，每服二錢，以生薑木瓜湯調下。

一醉丸 出聖惠 養脾溫胃，去食消痰，大治心脾疼，寬胃下氣，進美飲食，療一切冷物所傷，並皆治之。

乾薑一兩炮 良薑一兩 [illegible]

右等分為細末，麵糊為丸，如梧桐子大，每服十五丸至二十丸，食後橘皮湯下。姙娠婦人不宜服。

丁香散 出聖惠方 治脾胃虛冷，飲食不消，[illegible]無味，四肢少力

丁香半兩 桂心三分 白豆蔻去殼一兩 乾薑炮半兩

人參 [illegible] 甘草 [illegible] 陳橘皮 [illegible]

厚朴 [illegible] 白朮三分

右件藥搗羅為散，每服一錢，以水一中盞，入棗三枚，煎至六分，去滓，食前稍熱服。

丁香半夏丸 [illegible] 治脾胃[illegible]，令嘔吐痰水，噫悶吞酸

人參 丁香 木香 [illegible] 陳皮 [illegible]

藿香葉一兩 半夏 [illegible]

右為末，薑汁糊丸，如小豆大，每服四十丸，生薑湯下。

張氏建中丸 治脾胃[illegible]風[illegible] 經云食畢而下

頭之間[illegible] 建中[illegible]脈[illegible] 建脾養胃

育真固氣大[illegible]

桂心 胡椒 大附子 大川烏二枚 炮去皮臍

吳茱萸 乾薑炮 蓽撥[illegible]

右為細末，醋糊丸，如梧桐子大，每服四五十丸至百丸，空心食前米飲吞下。

人參丸 建脾益胃，去痰，進飲食

白朮炒 茯苓 半夏 [illegible] 神麴炒 麥櫱炒

乾薑炮 吳茱萸 [illegible] 人參一兩 木香一分 肉豆蔻 [illegible]

右為細末，煮棗肉丸，如梧桐子大，每服五十丸，[illegible]下，食前服。有名建中丸，前方專性[illegible]脾氣虛[illegible]者服，後宜[illegible]方平而和脾家納實者用之為妙。

[illegible]丸 治脾胃虛冷，[illegible]不思飲食，[illegible]

[illegible]胃[illegible]

厚朴 [illegible] 陳橘皮 [illegible] 訶梨勒 [illegible] 甘草 [illegible]

桂去粗皮 附子[illegible] 白茯苓 [illegible] 乾薑炮

右為細末，[illegible]丸如梧桐子大，每服三十丸，空心[illegible]食前溫酒或[illegible]下[illegible]

便二合，水二合，同煎至二合，和[illegible]一丸，並三十粒。一方醋糊為丸，[illegible]

胃丸

白朮散 治脾胃虛冷，水穀不化，食即腸鳴[illegible]不利

厚朴丸 [illegible]

厚朴 [illegible] 陳橘皮 [illegible] 草豆蔻 [illegible]

白朮一兩 縮砂 [illegible] 訶梨勒 [illegible] 桂心一兩 乾薑

右件藥搗羅為末，煉蜜和搗三二百杵，丸如梧桐子大，食前以粥飲下三十丸。

[illegible]三稜丸 治脾胃虛，[illegible]食不消，寬利胸膈，消化飲食

京三稜 蓬莪茂 [illegible]

檳榔 青橘皮 陳橘皮 [illegible] 木香 桂 [illegible]

右[illegible]

枳朮[illegible]飲[illegible]

烏梅肉一兩　草果　乾薑炮各一兩　赤茯苓二兩

甘草炙半兩

右㕮咀，每用半兩，水一盞半，煎至一盞，去滓，磨沉香少許，水調和通

意服之

大正脾湯 治脾氣虛冷，不思食，又嘔不消，腹脹，時苦下痢

黃芩　人參　芍藥　附子炮

甘草　乾薑　大黃　厚朴

右切，以水八升，煮取二升八合，分溫三服，日三夜一服，得下便止，不下

更復服之，以快為度

人參湯 治脾胃虛冷，心下痞滿，腹中雷鳴，不思食，面色萎黃

人參　白茯苓　白朮　陳橘皮

桂心　厚朴　半夏

甘草

右搗篩，每服三錢，水一盞，入生薑五片，煎至七分，去滓，空心溫服

白豆蔻丸 治脾胃虛冷，胃氣不和，飲食不消，心腹脹滿者

白豆蔻去皮　木香　乾薑炮　枳實去穰麩炒各一兩

半夏湯洗七遍薑汁浸　桂去粗皮　白朮

細辛去苗葉　訶梨勒皮一兩

右為末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服二十丸，以米飲下，空心

食前服

丁香散 治男子婦人脾胃不和，胸膈痞悶，中脘氣滯，宿食留飲

停積不消，胃腸脹滿，心脾刺痛，攻刺腹脇，有妨飲食，又治中滿吐逆，停

飲嘔吐，噫醋吞酸，並皆治之

香附子炒去毛　赤芍藥　天台烏藥　良薑

肉桂去粗皮　甘草炙

右為細末，每服二錢，入鹽少許，沸湯點服，不拘時候

養脾丸 治脾胃虛冷，心腹脹滿，胸膈痞悶，嘔逆惡心，噫

氣吞酸，泄瀉腸鳴，米穀不化，肢體倦怠，不思飲食

大麥糵炒　白茯苓去皮　人參　乾薑炮

縮砂去皮　白朮　甘草炙

右為末，煉蜜為丸，每兩作八丸，每服一丸，細嚼，生薑湯下，食前服此

滋養胃進食

大棗湯 治脾胃虛冷，腹脹，[…]不思食

水穀不消，不下飲食

厚朴去皮薑汁炙　乾薑炮

檳榔子炒　益智去皮　縮砂去皮

甘草炙一兩

右剉如麻豆大，每服一錢，水一盞，棗七枚，生薑[…]，煎至七分，去滓

溫服，空心食前

蠲痛散 治脾胃氣攻心疼者

蓬莪朮　乳香　木香　白茯苓

丁香　茴香　川山甲

右為細末，每服一錢，溫酒調下，空心服

丹砂丸 治[…]食不消，反胃，酒食[…]身黃腫，多年不差，及一切

丹砂　硇砂　青皮　雄黃

鶴虱　膩粉二錢　巴豆去皮心膜出油

右件六味細研，入巴豆霜和勻，入麵糊為丸如[…]大，每服三丸

至五丸，用水半盞，煎一沸，取出，臨臥溫水下，至天明[…]

驗，並不損人

木香枳實丸 治心腹滿，飲食不消化

木香二分　枳實去穰麩炒一分　白茯苓去黑皮

訶梨勒皮一兩　人參　大黃

郁李人

右為細末，煉蜜丸如梧桐子大，每服三十丸，空心溫水下

麝香丸 治脾胃不和，胃腸痞悶，飲食化遲

麝香研　丁香皮　木香　益智去皮

甘松　莎草根去毛　蓬莪朮

右除麝香外，搗細入麝香拌勻，以水浸炊餅心和丸，小豆大，每服

七丸至十丸，嚼破，白湯食後服。

木香餅子　治脾經虛冷，胃脘寒痰，吐逆惡心，腹脹，腸鳴，大腸下泄，心腹痞悶，不思飲食，常服進食消痰，寬膈，停寒，美飲食。

縮砂仁 一兩　檀香 四兩　白朮 半兩　丁香 四兩

蓬莪朮 一兩　木香 二兩

右為細末，用甘草煎膏為丸，每兩作二百五十丸，捏作餅子，每服一五餅，細嚼，生薑湯下，溫酒亦可，食前，不拘時。

磨積丸　治脾胃虛冷，氣久不消，中脘痞悶，全不思飲食，進飲食，磨水穀，進化。

人參 炒　陳麯 炒各一　烏梅肉 炒一　陳橘皮 去白

生薑 切焙　[illegible]

右為末，煉蜜丸如梧桐子大，每服二十丸，米飲下。

快脾丸　治脾胃積氣，化痰涎，吐逆，留飲，腸鳴，全進食，理脾寬[illegible]

正氣[illegible]

附子　乾薑　白朮　肉桂

炙甘草 各等分　良薑 一兩

右為細末，煉蜜為丸，每兩作十丸，每服一丸，細嚼，生薑橘皮湯下，米飲下亦可，食前。

溫胃丸　治脾胃虛冷，水穀不化，腹內疼痛，腸鳴腹脹，臟腑不調，及因冷物傷脾，吐瀉不止。

肉豆蔻 麵裹煨　桂 去粗皮　陳橘皮 湯浸去白

高良薑 一兩　甘草 炙　陳粟米

右六味搗羅為末，入粟米煮和丸[illegible]

又一[illegible]

食前。

磨滯丸　治脾胃氣不和，宿食不消，食已腹痛，[illegible]腸鳴，大便秘澀不調。

木香　青橘皮 湯浸去白　桂 去粗皮　吳茱萸 炒

硇砂　巴豆霜

白橘皮 四兩　右為末，以硇砂醋化，入麵糊丸如菉豆大，每服三丸，加至五丸，生薑湯下，食後，如大便不通，即加丸數。

消食丸　治一切宿食，氣不快，脾胃虛弱，不思飲食，腹脹[illegible]

新[illegible]又脾胃氣弱，不能消化，飲食停積[illegible]

[illegible]

乳食[illegible]

白豆蔻[illegible]

檳榔 一兩　木香 一兩

右為末，水煮麵糊丸如綠豆大，每服二十丸，米飲下，不拘時。

建脾散　治脾胃虛冷，水穀不化，不思飲食。

人參　白茯苓　黃耆　大棗　甘草

右為末，每服二錢，入鹽少許，沸湯點服，不拘時候。

溫中丸　治中焦不和，脾胃虛冷，心下虛痞，腹中疼痛，嘔吐痰飲，食不下，噫氣吞酸，口苦失味，全不思食，腸鳴[illegible]

和中散　[illegible]下

白朮　人參　乾薑　甘草　白豆蔻

右為細末，煉蜜為丸，每兩作十丸，每服一丸，食前用白湯化下。

服，如冷，加附子，大病新差，吐瀉不止，乃新產內虛[illegible]

可服[illegible]

新法半夏湯　治脾胃不和，中脘氣滯，宿寒留飲，停積不消，心腹刺痛，脇肋膨脹，吐痰水，噫氣吞酸，中滿吐逆，頭痛[illegible]嘈雜，不思飲食。

陳皮 去白　神麯　草果　半夏　乾薑

丁香　木香　白茯苓　甘草

右為細末，每服一錢，[illegible]

消食[illegible]

大[illegible]丸　治脾胃虛寒，宿食不消[illegible]

巴豆　大黃　五靈脂　青橘皮

硇砂

右為細末麪糊丸如菉豆大每服七丸食後温熟水下

棗肉丸 治脾胃虛冷嘔吐[illegible]不化

破故紙 炒 木香 各一兩 [illegible]

右為末煮棗肉丸如梧桐子大每服七十丸鹽湯下

半夏飲 治脾胃虛弱不思飲食嘔吐或水穀不化

半夏 湯洗 厚朴 [illegible] 人參

陳橘皮 [illegible] 白术 各一兩

右㕮咀每服三錢以水一盞半生薑五片棗二枚煎至八

分去滓温服

木香丸 治脾胃虛冷宿食不消留滯成塊心腹疼痛

木香 丹砂 研 蓬莪茂 煨 京三稜 煨 各一兩

巴豆 去皮心出油

右為末醋煮麪糊丸如菉豆大每服二丸至三丸食後臨臥生薑橘皮

湯下

丁香丸 治脾胃虛寒宿飲不消兩脇滿痛

出聖濟總錄

丁香 丁香皮 乾薑 陳橘皮 各一兩

巴豆霜 一分

右搗羅四味為末入巴豆霜研勻以麪糊丸如菉豆大每

服五丸至七丸食後温水下

硇砂丸 治脾胃虛冷宿食不消腹脹腸鳴通和五臟

硇砂 研 [illegible] 蕎香 [illegible] 丹砂 研 桃人 [illegible]

右研令勻以酒煮麪糊丸如梧桐子大每服二十丸温酒下不計時候

益智丸 治脾胃虛冷一切痛

中脘[illegible] 一服

半夏 [illegible] 白术 分 丁香 分

右為末生薑汁麪糊丸如梧桐子大每服十丸煎[illegible]湯下食前

丁附丸 治脾胃受寒[illegible]

空心服如腹痛[illegible]嘔吐不止

丁香 一兩 附子 炮 豆蔻 [illegible] 胡椒 各半兩

芳.

右為末蜜丸每服十五丸空心[illegible]湯下

木香乾薑枳术丸 [illegible]破除[illegible]消進飲食

木香 一分 乾薑 枳實 白术 一兩半

右為細末荷葉燒飯丸梧桐子大每服三五十丸温水下食前

半夏湯 治脾胃虛冷宿食不化嘔逆多痰

半夏 [illegible] 白扁豆 人參 枳殼 [illegible]

右㕮咀每服二錢以水一盞生薑三片棗一枚煎至七分

去滓温服

胡椒丸 治脾胃虛冷大腸泄飲食不化

胡椒 一兩 烏頭 [illegible] 乾薑 炮 赤石脂 各半兩

右為末麪糊丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸空心食前米

飲下

金朋丸 治[illegible]不和脾胃積冷心下虛痞腹中疼痛或飲食過

多胸膈噎塞不通嘔吐冷痰婦人血氣積聚疼痛

氣結[illegible]不安

出聖濟總錄

京三稜 [illegible] 青皮 蓬莪术 [illegible] 檳榔

雄黃 [illegible] 木香 各一兩 [illegible]

右為末水麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸生薑湯下不拘時

小三稜煎丸 治宿食不消心腹脹滿吐逆吞酸

京三稜 蓬莪茂 各四兩 芫花 一兩

右同入瓷瓶內用米醋五升浸滿封瓶口以炭火煨令乾取出芫花以餘二味

焙乾為末醋煮麪糊丸如梧桐子大

每服三丸至五丸生薑湯下婦人橘皮湯下

寧胃湯 治脾胃虛冷氣逆嘔吐不能下食

[illegible] 人參 陳橘皮 [illegible]

右㕮咀每服五錢以水一盞半同煎至八分去滓温服

治脾胃冷弱腹中積冷服藥不效者方

右以豬肚肉一斤[illegible]煮熟[illegible]切[illegible]一兩頓食

治食生冷難化 或寒時衣薄當風或夜食便臥不即消心腹煩痛脹

急或連日不化方

右件地令杵散，沖服……若充席向……即立愈也

吳茱萸散 治脾胃虛冷，水穀不化，心腹疼痛，四至無力，不思飲食

吳茱萸 當歸 乾薑 厚朴

陳橘皮 桂心 枳實 人參 甘草

麥蘗

右件藥搗篩為散，每服……以水一中盞，入棗三枚，煎至六分，去滓

食前稍熱服之

厚朴湯 治脾胃虛冷……腹脹……不思飲食

厚朴 ……

甘草 丁香 棗 丁香皮 ……

右為末，每服二錢，水一盞，生薑三片，棗二枚，煎至七分，熱服

常服溫中順氣，進飲食，每服一錢，沸湯點服，食前

胡椒理中丸 治脾胃虛寒，腹脹不利，心腹疼痛，嘔逆惡心，常服溫暖脾

胃，去寒順氣

紅豆

肉桂 胡椒 乾薑 桔梗

甘草

右為細末，每服一大錢，入鹽少許，沸湯點服，不拘時

快氣湯 大治脾胃虛冷，食飲減少，胸膈不快，嘔逆惡心，吞酸噫

口臭，……不思飲食，並宜服之

甘草 乾薑 粟米 桔梗

右炒……可搗，為細末，每服一錢，沸湯點服，食前

木香調中丸 治內飲食不消，致傷腸胃，心腹脹痛，臟腑泄瀉，米

穀不化

木香 青皮 陳皮 肉豆蔻 檳榔

三稜 訶子 草豆蔻仁

右為末，麵糊丸如梧桐子大，每服六十丸，食前溫米飲下

治脾臟傷冷，飲食不化，積聚成塊，頭面黃腫，氣力微小，赤小豆一升，水

六升，生薑三兩，吳茱萸半兩，不使碎，已上作一處，煮令熟，瀝水乾

揀先拙豆汁一兩……慢火焙令乾，即取豆……

心頭冷……空心……卻用先細搗……下……

生薑 牽牛 防風 吳茱萸

桔梗 細辛 黃橘皮 半夏

右細杵羅為末，每服四錢，入生薑三片，水一盞，煎……

空調下

脾氣虛弱，食後……在脾上，經二兩年不化，凡所食者……

不能……之人……有不化之物，實熱間……

物……

吳茱萸 官桂 草豆蔻 芫花 狼毒

蓬莪朮 半夏 牽牛

右先花……

右……半夏一味自作……

錢……末……

紅……不……

一錢

治脾臟虛冷，宿食不消……氣力……

方

厚朴 黃橘皮 枳殼 防風

吳茱萸 肉豆蔻 羌活 甘草

半夏

右細杵羅為末，每服二錢……

三黃丸

黃芩 黃連 大黃

右為……細末……

白湯下……

除濕……

半夏 ……

紅花

右……為細末，每服二錢，白湯調下

棗附丸 治脾氣虛弱，大腸冷滑，臟腑泄瀉，米穀不化，飲食無

朮之力煖氣暖脾壯氣

用附子之法也上氣作十兩不去皮以大棗二升作白湯內用

水煮大以煮半日令有所餘作不取水乾肉炙熟以炙日取

出附子去皮切作二片再同棗一處又煮半日取附子削去皮薄切

焙乾為末別煮棗肉爛研和丸梧桐子大每服五十丸漸加至一

百丸空心米飲下

大半夏平胃散 治大白胃虛寒飲病痰盛不思飲食人皆

宜服之

半夏 一兩 厚朴 陳皮 甘草

蒼朮

右㕮咀一處每服二錢水一盞生薑三片棗

一枚同煎六分去滓溫服食前日進三服

厚朴煎丸 治脾胃久積冷氣不思飲食三焦不調中脘虛痞胸膈

進食

厚朴 附子炮各一 陳皮 訶子 乾薑

枳殼 茯苓 甘草 一兩 肉荳蔻

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸如大段腸虛進不得

以水調共一盞同棗米二錢和下三十丸棗肉和丸尤佳

建脾散 治調中養氣消化宿食

草豆蔻 大麥蘖 陳橘皮

甘草

右為細末每服一錢白湯調下空心

木香枳殼丸 治脾胃虛弱飲食所傷又不消化或成泄瀉及氣

不快胸痞常服溫脾益胃有進食

荊三稜 蓬莪茂 黑牽牛 烏梅 青皮去白

橘紅各一兩 縮砂仁 肉桂 木香 丁香各一分

右細末醋糊為丸如梧桐子大每服三十丸食後臨臥熟水米飲

任下

棗合丸 治脾胃虛冷乾嘔惡心嘔吐痰涎全不思食十補五養

丁香 半兩 半夏麴 一兩 胡椒 二錢 乾薑 二錢炮 木香 二錢

右為細末空生十丸每服以米飲下

入參任以米飲

中黃丹散 治

時救及常用人飲公務勞役飲食失節

一行不喜飲食身體困其脈

治脾胃痞證加以飲食勞役飲食失節中氣難經曰飲食勞倦

易脹不足而陰有餘脹之喜脹大不及病大行令脾胃生氣不足腎水

必使本藥反來傷所不勝所勝之非甘辛大熱之藥不能

水穀之氣是專之所用以速散之方不有效者反之是以損而

其為也內經云寒淫於內治以辛熱以甘苦熱以溫寒水為君脾

下是者以甘溫之人參白朮甘草橘皮苦甘溫以補脾土胃氣不欲食

以生薑辛溫宣寒化胃厚朴辛溫厚腸胃白茯苓甘平助

附以

附子理中湯 治脾胃虛寒中氣腹脹滿腸鳴不化不思飲

食物諸言用藥當以

黑附子 炮去皮 乾薑 炮七分 草豆蔻

人參 五錢 白朮 炙甘草 陳皮 厚朴 一錢

白茯苓 白芍藥

右件剉如麻豆大每服五錢或至一兩水二大盞半生薑五片煎至

一盞三分去滓溫服食前

神麯補中丸 治脾胃虛寒飲食遲化胃弱痞悶腹滿脹痛口苦

無味怠惰嗜臥

右件同為細末別用神麯末三兩煮糊和丸如梧桐子大每服五十丸空心飲下食前

參苓散 治脾胃虛冷吐逆飲食不化氣不升降生

神麯 五兩炒 乾薑 川椒

木香白朮散 治脹

甘草 白芷 丁皮 厚朴 二兩

右㕮咀每服二錢生薑三片棗一枚水一盞煎至七分服之無時

理脾散 治脾胃虛冷不進飲食吐多

肉桂 良薑 陳皮 青皮 甘草炙各一兩
訶子五箇 草豆蔻一兩 川烏炮一兩
右㕮咀薑煎空心服不拘食前
木香橘皮丸 治脾胃虛弱飲食所傷久不消化或成泄瀉或氣
不升降常服益脾胃快氣進食
京三棱炮切 蓬莪朮炮切 烏藥 肉桂 橘皮 縮砂仁半兩
黑牽牛一兩炒
右件為細末麵糊為丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸食
後臥熟水咲飲送下
沉香益脾湯 治脾胃氣虛冷心腹疼痛嘔逆惡心腸鳴腹脹不
思飲食四肢倦怠或出嘔吐
沉香 丁香 木香 桂去麤皮 附子炮去皮
人參去蘆 川薑炮 白朮 甘草炙 白豆蔻仁
縮砂仁各等分
右件為細末每服二錢水一盞入生薑五片棗一枚同煎至七分去
[illegible]
滓熱服空心食前作麤末亦可
凡男子丈人脾虛腹脹食不消化用上黑錫丹 [illegible] 本草
以乾神三斤麴一斤 [illegible] 丸和服 [illegible] 米湯之下 [illegible] 數亦不
論 [illegible] 每日空腹服三五錢又服甚良

脾胃冷熱不和 附論

夫脾胃者 [illegible] 氣不足 [illegible] 脾胃俱虛冷熱之氣易為傷 [illegible] 脾胃受食腐之 [illegible] 化精 [illegible]
甚 [illegible] 受 [illegible] 食飲或冷或熱 [illegible] 不調使陰陽交 [illegible] 冷熱相搏 [illegible] 不
和也 方
沉香訶子丸 治脾胃冷熱氣不和食少脾胃中宿積
沉香 木香各三分 芍藥 當歸剉 蓬莪朮炮
陳橘皮去白 [illegible] 檳榔剉 吳茱萸 [illegible] 益智仁
桂去麤皮 白朮 附子炮去皮臍 乾薑炮 草豆蔻去皮各半兩
訶子 [illegible]
右搗羅十五味為細末用訶梨勒瓤和杵三二百下丸如梧桐子大

丹砂為衣生薑橘皮湯下五七丸 [illegible] 下
前胡湯 治脾胃冷熱氣不和平胃
前胡去蘆 人參 白茯苓 附子炮去皮臍 白朮
半夏 [illegible] 枇杷葉炙去毛 厚朴去麤皮生薑汁炙
訶子皮 肉豆蔻 陳橘皮去白 檳榔剉
紫菀 甘草炙各半兩
右剉如麻豆大每服三錢匕水一盞入生薑三片棗大一枚擘破同
煎至七分去滓不計時溫服
藿香湯 治脾胃冷熱氣不和胃腸虛鳴四肢無力虛逆不
思飲食
藿香葉半兩 訶子 [illegible] 陳橘皮去白 [illegible]
半夏 [illegible] 赤茯苓去黑皮 桂去麤皮 白朮三分 人參三分
草豆蔻去皮 枳實 [illegible] 高良薑一分 甘草炙 [illegible]
右麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分切棗三枚擘破煎至七
分去滓不計時候熱服忌生冷油膩黏滑
白豆蔻丸 治脾胃冷熱氣不和心腹疞痛嘔逆不欲飲食四肢少力
[illegible]
白豆蔻 [illegible] 藿香 [illegible] 白茯苓 [illegible] 桂心 [illegible]
白朮 [illegible] 半夏 [illegible] 人參 [illegible]
附子 [illegible] 陳橘皮 [illegible] 甘草 [illegible]
右件搗羅為末 [illegible] 和三二百杵丸如梧桐子大每服 [illegible] 不計時
候以生薑湯下二十丸 [illegible]
白朮散 治脾胃冷熱氣不和腹脹腹痛不思飲食
白朮一兩 草豆蔻去皮一兩 檳榔一兩 甘草炙 桂心三分
桔梗一兩 人參一兩 前胡三分 赤茯苓三分 枳實麩炒 [illegible]
訶梨勒一兩煨
右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去
滓不計時候溫服
桔梗丸 治脾胃冷熱氣不和白腸腹脹氣不能飲食
桔梗一兩 白朮一兩 檳榔一兩 甘草炙 桂心三分
乾薑炮 人參一兩 前胡去蘆 麥蘖炒 陳橘皮一兩去白
厚朴三兩去麤皮生薑汁炙 [illegible]

右件藥擣羅為末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大不計時候
以生薑棗湯下二十丸

人參丸 治脾胃冷熱氣不和脅肋不利[illegible]
人參 一兩 赤茯苓 一兩 桂心 一兩 乾薑 半兩 訶黎勒 一兩 煨用皮
川大黃 一兩 細辛 半兩 枳殼 半兩 麩炒微黃
赤芍藥 半兩 檳榔 半兩 甘草 [illegible]
右件藥擣羅為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大不計時候以
生薑湯下二十丸忌生冷油膩黏滑

草豆蔻散 治脾胃冷熱氣不和胃中氣滿不能下食四肢少力
草豆蔻 去皮 三分 赤茯苓 三分 甘草 [illegible] 人參 [illegible] 白朮 半兩
陳橘皮 [illegible] 桂心 一分 枳殼 [illegible]
半夏 [illegible] 厚朴 [illegible]
右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至
六分去滓不計時候稍熱服忌生冷油膩黏滑

丁香散 治脾胃冷熱氣不和心腹虛脹痰飲不思飲食四肢無力
丁香 [illegible] 乾薑 [illegible] 白朮 [illegible] 赤茯苓 [illegible] 人參 [illegible]
木香 [illegible] 草豆蔻 去皮 訶黎勒 [illegible] 甘草 [illegible]
右為細散不計時候煎生薑棗湯調下一錢忌生冷油膩黏滑

神麴丸 治脾胃冷熱氣不和心腹疼痛脅肋氣滿不思飲食四
肢無力
神麴 [illegible] 乾薑 [illegible] 檳榔 [illegible] 甘草 [illegible]
桂心 [illegible] 陳橘皮 [illegible] 附子 [illegible]
人參 [illegible] 當歸 [illegible]
右件藥搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時候以
生薑橘皮湯下二十丸

訶黎勒丸 治脾胃冷熱氣不和心腹痛不欲飲食
訶黎勒 [illegible] 白朮 [illegible] 木香 三分 甘草 [illegible]
陳橘皮 [illegible] 乾薑 [illegible] 芎藭 三分 當歸 [illegible]
縮砂 [illegible]
右件藥搗羅為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大不計時候以

溫粥湯下二十丸

匀氣湯 治脾胃冷熱氣不和止吐逆思飲食
厚朴 [illegible] 陳橘皮 [illegible] 白朮 [illegible] 甘草 [illegible]
丁香 一分 [illegible] 白茯苓 [illegible] 肉豆蔻 [illegible] 高良薑 [illegible]
右麁搗篩每服三錢已水一盞入生薑二片棗二枚煎至七分
去滓不計時溫服

快活丸 治脾胃冷熱相攻兩脅脹氣悶消痰進食
五味子 [illegible] 檳榔 [illegible] 京三稜 [illegible] 枳殼 [illegible]
縮砂 [illegible] 蓬莪朮 [illegible] 郁李人 [illegible] 青橘皮 [illegible]
右為細末用半夏一兩生薑三兩爛者研細為糊丸如菉豆大每服
十五丸至二十丸食後溫湯下

和中丸 治脾胃冷熱氣不和寬中脘
附子 [illegible] 甘草 [illegible] 木香 [illegible] 茴香子 [illegible] 乾薑 [illegible]
沉香 [illegible] 藿香葉 [illegible] 青橘皮 [illegible]
右為細末[illegible]丸如[illegible]大每服一丸用白湯化下食前服

調胃丸 治脾胃冷熱[illegible]
[illegible]
右用[illegible]
[illegible]

大腹皮散 治脾胃氣冷熱不和胃脘痞塞不下飲食宜服
大腹皮 [illegible] 檳榔 [illegible] 桑根白皮 [illegible] 訶黎勒皮 [illegible]
陳橘皮 [illegible] 赤茯苓 [illegible]
右麁搗篩每服三錢已水一盞入生薑半分切煎至七分去滓不
計時溫服

勝金丸 治脾胃冷熱氣不和不思飲食或腹痛疞刺
山梔子人 [illegible] 烏頭 [illegible]
右生搗羅為細末以酒糊丸如梧桐子大每服十五丸以生薑湯下

如小腸氣虛以[illegible]大則[illegible]
心腹冷不周[illegible]
以脈弦緊以散寒脈

飲食勞倦 附論

夫人之百病皆由喜怒不節飲食失宜寒溫不適勞役所傷以致中氣
有虧而五臟六腑之氣亦不足也由是而喜怒憂恐[illegible]外傷風寒
是天之邪氣感則傷人筋骨屈伸上及之風傷筋寒傷骨濕[illegible]
熱也飲食不節則胃病胃病[illegible]飲食勞倦則脾病脾主[illegible]
病則筋骨[illegible]血脈[illegible]是[illegible]脈之[illegible]為有餘之病當瀉不當補
其內傷飲食則水穀之氣食入則寒人六腑而[illegible]不傷之脾胃之[illegible]不
足[illegible]又[illegible]上[illegible]之[illegible]以[illegible]脾胃之[illegible]上
但[illegible]小[illegible]也[illegible]肺天之氣[illegible]以[illegible]一主[illegible]肺主氣[illegible]衛[illegible]身在
然[illegible]之[illegible]以傷[illegible]風寒[illegible]實[illegible]無[illegible]以[illegible]
心肺之本亦已為中氣不足之病當補不當瀉世俗往往將中氣不足
[illegible]作外感風寒有餘客邪之病不知其乃虛而重瀉其[illegible]使營
衛[illegible]不至於死不可不[illegible]外傷寒邪有其熱也翕翕[illegible]
於皮毛之上表虛[illegible]陽之[illegible]寒邪中之[illegible]陽[illegible]不[illegible]故發熱而
惡寒[illegible]明其[illegible]在外也[illegible]不足也[illegible]表下[illegible]
也則人一日一[illegible]傳[illegible]令[illegible]入[illegible]作[illegible]以傷飲
食勞倦所傷[illegible]其熱也蒸蒸而[illegible]上[illegible]而[illegible]多[illegible]
脾胃下[illegible]之[illegible]陰火上行[illegible]身[illegible]則[illegible]
在內也其惡寒也[illegible]見風見寒[illegible]居[illegible]日[illegible]便[illegible]有[illegible]
風寒[illegible]其表而[illegible]其所[illegible]則不見[illegible]表則[illegible]也[illegible]內傷[illegible]有
頭痛[illegible]外傷[illegible]內傷飲食[illegible]熱[illegible]
傷風寒則[illegible]汗出[illegible]內傷飲食勞倦之病手
心熱手背不熱病在內也外傷風寒則手背熱手心不熱病在外也
內傷飲食及勞役必口失五味之腹中不和[illegible]多[illegible]鼻中
清[illegible]而[illegible]外傷風寒必鼻塞氣不利而聲重[illegible]
少和[illegible]內經云鼻者肺之[illegible]外傷風寒則鼻為不利口者坤土

也飲食勞役所傷則口不知五味[illegible]食[illegible]寒[illegible]外
傷風寒則[illegible]所[illegible]亦知[illegible]又[illegible]邪氣助之使[illegible]氣
[illegible]以[illegible]言[illegible]重[illegible]故曰氣[illegible]有餘之病也
內傷飲食勞役[illegible]氣以氣上喘而不足蓋心肺之氣先損為熱
所傷[illegible]使四肢無力氣怯[illegible]不欲言[illegible]以不足之病
也內傷則[illegible]痛[illegible]外傷則頭痛[illegible]常[illegible]入裏
方罷內傷則心神之氣為脾之惡熱所乘脾主四肢必四肢沉[illegible]是
寒則[illegible]外傷[illegible]也外傷[illegible]陰寒邪所傷
[illegible]脈[illegible]其[illegible]外傷[illegible]寒
形也[illegible]痛是也外傷不惡食而不思食口知五味心氣和脾氣
[illegible]內傷不[illegible]食而[illegible]食口不知五味心氣也脾氣[illegible]外傷風
寒[illegible]內傷飲食[illegible]氣在血脈
中[illegible]勞役[illegible]傷之重者[illegible]肺[illegible]胃中元
氣[illegible]食而不[illegible]而不[illegible]胃[illegible]食而[illegible]胃
不能食[illegible]大食而[illegible]而四肢不舉[illegible]實而邪氣盛也又有
善食而瘦者胃伏火邪於氣分則能食脾虛則肌肉削即食[illegible]也[illegible]
謂多食而[illegible]之謂也夫飲食不節則胃病胃病則氣短精神少而
生大熱[illegible]火上行[illegible]胃病則脾無所稟受
脾為死陰不主時也故亦從而病焉形體勞役則脾病脾病則怠惰嗜臥
四肢不收大便泄瀉脾既病則胃不能獨行其津液故亦從而病焉大
抵脾胃虛弱陽氣不能生長是春夏之令不行五臟之氣不生脾病則
下流乘腎土[illegible]水則骨乏無力是為骨[illegible]令人骨髓空虛足不能履地
是陰氣重疊此陰盛陽虛之證[illegible]下[illegible]
[illegible]手[illegible]
其脈緩脾[illegible]若人[illegible]
其[illegible]有[illegible]之[illegible]陽氣衰弱不能生發不當於五臟中
則[illegible]之[illegible]胃中升[illegible]瀉[illegible]如[illegible]
之[illegible]胃[illegible]不收故大便泄[illegible]胃[illegible]自[illegible]四
肢發熱[illegible]大便[illegible]皮毛枯槁髮[illegible]中[illegible]而血氣
於[illegible]中[illegible]以本[illegible]中加之或其[illegible]氣虛弱[illegible]氣短脈

的之[illegible]使如滿[illegible]以桂枝一味加之
[illegible]中[illegible]中脘以表[illegible]者是加
[illegible]加[illegible]脇肋[illegible]甘草腹中實[illegible]或
氣[illegible]不[illegible]者[illegible]中氣不利者加
[illegible]加[illegible]
中[illegible]非腹脹[illegible]不[illegible]如[illegible]氣短促或不足者
加人參[illegible]中[illegible]
中寒[illegible]諸藏[illegible]中[illegible]不可[illegible]中[illegible]甘草白芍
[illegible]也[illegible]也[illegible]化[illegible]法也
頭痛無發熱[illegible]惡寒或腹中覺實加桂[illegible]
[illegible]加白朮[illegible]不利加茯苓[illegible]之氣
或[illegible]加茯苓[illegible]腹不能[illegible]
[illegible]加[illegible]小便[illegible]者加[illegible]上[illegible]加
之是[illegible]日[illegible]也不[illegible]小便[illegible]不[illegible]加[illegible]
世[illegible]使[illegible]者[illegible]五苓散[illegible]小便不
[illegible]

書[illegible]卷之十　六[illegible]

而無惡寒表不得有桂不[illegible]而小便自利者見氣血瘀用炒青
皮[illegible]中[illegible]不利而[illegible]加澤瀉枳殼[illegible]不利者六一
散中加木通[illegible]心[illegible]香[illegible]方中[illegible]但腹脹者加
厚朴[illegible]不須加橘皮[illegible]青皮[illegible]小便[illegible]者四君子湯
中去茯苓加黃[illegible]腹中氣不[illegible]者更加甘草一半腹中刺痛
或[illegible]痛[illegible]急者[illegible]者是也或[illegible]而大便不得者
皆血虛也[illegible]則[illegible]血[illegible]而[illegible]頭痛者
加川芎[illegible]頭痛加細辛[illegible]陰[illegible]痛也[illegible]下痛加[illegible]
調理脾胃[illegible]此五[illegible]中加[illegible]二[illegible]各[illegible]加
[illegible]不[illegible]然[illegible]不能使人[illegible]有[illegible]至[illegible]三[illegible]
為脾胃氣虛[illegible]之所致也[illegible]其方[illegible]不[illegible]問[illegible]
是以[illegible]皆[illegible]中[illegible]脾胃不足之[illegible]陽氣不足陰氣
有餘[illegible]不足[illegible]脾[illegible]脾胃不足不同餘
藏無定體故也[illegible]肝腎有餘不足[illegible]隨益脾胃之藥為切
經言至而不至是為不及[illegible]所生受病[illegible]所不勝乘之也至而不

思平

至[illegible]者[illegible]心與小腸[illegible]脾胃[illegible]中[illegible]大而
然其病[illegible]口乾[illegible]益心生[illegible]小腸主
熱[illegible]土[illegible]相合故煩燥[illegible]腹者脾胃也大乘之故
[illegible]腹發熱也飲食不節勞役所傷[illegible]血所生病主口中
津液不行故口乾咽乾病人自以為[illegible]者以五苓散[illegible]而
反加[illegible]補其[illegible]於心與小腸[illegible]
以補脾胃[illegible]也甘[illegible]之[illegible]以[illegible]為
之臣佐以甘辛[illegible]心[illegible]以[illegible]金[illegible]金虛則以
[illegible]以甘[illegible]於脾胃中[illegible]心[illegible]是[illegible]也所
勝[illegible]能[illegible]木也肝木[illegible]大之勢[illegible]所[illegible]
而妄行也故脾胃先受之或身[illegible]而風
熱[illegible]不[illegible]也或[illegible]中或目[illegible]而生
內障者[illegible]主[illegible]心主[illegible]又云肝主
血[illegible]於目[illegible]心[illegible]肝木
大[illegible]也或生[illegible]或[illegible]或

書[illegible]卷之十　六[illegible]

為之土[illegible]肺[illegible]得生[illegible]中也所
生受病[illegible]肺[illegible]大[illegible]之[illegible]之氣[illegible]
主[illegible]五藏之氣[illegible]不足而陽[illegible]不行也[illegible]
[illegible]也所不勝[illegible]水[illegible]而反來[illegible]入心為汗入肝為泣
入肺為[illegible]入脾為[illegible]為水出[illegible]也[illegible]下元土虛[illegible]
水[illegible]三[illegible]而[illegible]附[illegible]
也下行[illegible]足不[illegible]下[illegible]
為[illegible]肺[illegible]也夫脾胃不足皆為血
病是陽氣不足陰氣有餘故九竅不通[illegible]
天和[illegible]則上[illegible]而陽道不行[illegible]氣也夫陰
氣[illegible]也[illegible]知[illegible]於土[illegible]則[illegible]
分[illegible]所立方中[illegible]甘溫[illegible]甘[illegible]大[illegible]
非[illegible]以人[illegible]使引[illegible]
所[illegible]之道[illegible]而[illegible]
[illegible]用辛甘

函本拔其升生之氣使太陰重而傷也所以令足太陰經云食入于胃散精于肝淫氣于筋食氣入于胃濁氣歸心淫精于脈脈氣流經經氣歸于肺肺朝百脈輸精于皮毛毛脈合精行氣于腑且飲食入胃先行陽道而陽氣升浮也浮者陽氣散滿皮毛升者充塞頭頂則九竅通利也若飲食不節損其胃氣不能克化散于肝歸于心溢于肺食入則昏冒欲睡得臥則食在一邊氣暫得舒是知升發之氣不行者此也飲入于胃遊溢精氣上輸于脾脾氣散精上歸于肺病人飲入胃遽覺至臍下便欲小便由精氣不輸于脾不歸于肺則心火上攻使口燥咽乾是陰氣大盛其理甚易知也況脾胃病則當臍有動氣按之牢若痛若有是者乃脾胃虛無是則非也

脾胃不足是火不能生土而反抗拒此至而不至是為不及也

白朮 君　人參 臣　甘草 佐　芍藥 佐　黃連 使

黃耆 臣　桑白皮 佐

諸風藥皆是風能勝濕也諸甘溫藥亦可

心火亢盛乘於脾胃之位亦至而不至是為不及也

芍藥 佐　石膏 佐　黃連 君　知母 佐　黃柏 臣

甘草 使　生地黃 臣　黃芩 佐

肝木妄行胸脅痛口苦舌乾往來寒熱而嘔多怒四肢滿閉淋溲便難轉筋腹中急痛此所不勝乘之也

羌活 佐　防風 臣　升麻 使　柴胡 君　獨活 佐

芍藥 臣　甘草 臣　白朮 佐　茯苓 佐　豬苓

澤瀉 使　肉桂 臣　藁本　川芎　細辛

蔓荊子　白芷　石膏　黃柏 佐　知母

滑石

肺金受邪由脾胃虛弱不能生肺乃所生受病也故咳嗽氣短氣上皮毛不能禦寒精神少而渴情慘慘而不樂皆陽氣不足陰氣有餘是體有餘而用不足也

人參 君　白朮 佐　白芍藥 佐　橘皮 臣　青皮 以破滯氣

黃耆 臣　桂枝 佐　桔梗 引用　桑白皮 佐　甘草 諸酸之劑皆可

木香 佐　檳榔　五味子 佐　此三味除客氣

腎水反來侮土所勝者妄行也作涎及清涕唾多溺多而惡寒者是也土火復之及三脈為邪則足不任身足下痛不能踐地骨乏無力喜睡兩丸多冷時作陰陰而痛或妄見鬼狀腰脊背胛皆痛

白朮 臣　蒼朮 佐　川烏頭 臣

乾薑 君　肉桂 少許　茯苓 使

附子 使　豬苓 佐　澤瀉 使

夫飲食入胃陽氣上行津液與氣入于心貫于肺充實皮毛散于百脈脾稟氣于胃而澆灌四旁榮養氣血者也今飲食損胃勞倦傷脾脾胃虛則火邪乘之而生大熱當先于心分補脾之源蓋土生于火兼于脾胃中瀉火之亢甚是先治其本後治其標也且濕熱相合陽氣日以虛陽氣虛則不能上升而脾胃之氣下流并于腎肝是有秋冬而無春夏春主升夏主浮在人則肝心應之弱則陰氣盛故陽氣不得經營經云陽本根于陰惟瀉陰中之火味薄風藥升發以伸陽氣則陰氣不病陽氣生矣假令不能食而肌肉削乃本病也其右關脈緩弱本脈也而本部本證脈中兼見弦脈或見四肢滿閉淋溲便難轉筋一二證此肝之脾胃病也當於本經藥中加風藥以瀉之本部本證脈中兼見洪大或見肌熱煩熱面赤而不能食肌肉消一二證此心之脾胃病也當于本經藥中加瀉心火之藥本部本證脈中兼見浮澀或見氣短氣上喘咳痰盛皮澀一二證此肺之脾胃病也當於本經藥中兼瀉肺之體及補氣之藥本部本證脈中兼見沉細或見善恐欠之證此腎之脾胃病也當於本經藥中加瀉腎水之浮及瀉陰火伏熾之藥經云病有逆從治有反正除四反治不須論之所有陰陽逆從之類不從標本從乎中也假如時在長夏於長夏之令中立方謂正當主氣衰而客氣旺之時也後之處方者當從此法加時令藥名曰補脾胃瀉陰火升陽湯之顯方在脾胃[illegible]後經云有毒無毒所治為主主病者為君佐君者為臣應臣者為使一法力大者為君凡藥之所用皆以氣味為主補瀉在味隨時換氣氣薄者為陽中之陰氣厚者為陽中之陽味薄者為陰中之陽味厚者為陰中之陰辛甘淡中熱者為陽中之陽辛甘淡中寒者為陽中之陰酸

[illegible]之氣各為虛中之實[illegible]熱者為虛中之實夫辛甘發散[illegible]
者[illegible]乃[illegible]之實[illegible]地之氣[illegible]也[illegible]乃氣之宣[illegible]
陽也[illegible]成[illegible]之機[illegible]之內質本無有一藥之中[illegible]
理性具[illegible]主對[illegible]是而能[illegible]實麻黃葛根柴胡桂枝[illegible]
[illegible]寒表實[illegible]黃連黃芩黃柏梔子之[illegible]
類為[illegible]之不可令[illegible]
[illegible]
主之武[illegible]人參加[illegible]石膏[illegible]
天方中[illegible]身大熱而[illegible]不可用五苓散[illegible]
[illegible]加[illegible]
[illegible]
五味子人參[illegible]加五味子人參[illegible]
[illegible]
大腸[illegible]肺金[illegible]

食[illegible]用[illegible]不可用石
[illegible]病[illegible]脉數不足者[illegible]
風如[illegible]而[illegible]脉[illegible]
[illegible]

過食冷物如心下痞悶加黃連二分或三分如胃脘當心痛減大寒藥加草豆蔻仁五分如脅下痛或縮急加柴胡二分或三分如頭痛目中溜火加黃連二分或三分川芎三分如頭痛目不清利上壅上熱加蔓荊子川芎以上各三分藁本生地黃以上各二分細辛一分如氣短精神如夢寐之間困乏無力加五味子九個如大便澀滯隔一二日不見者致食少食不下血少血中伏火而不得潤也加當歸身生地黃麻子仁泥以上各五分桃仁三枚湯泡去皮尖另研如大便通行所加之藥勿再服如大便又不快利勿用別藥少加大黃煨五分如不利者非血結血秘而不通也是熱則生風其病人必顯風證單血藥不可復加之止常服黃耆人參湯藥只用羌活防風以上各五分二味㕮咀以水四盞煎至一盞去渣空心服之其大便必大走也一服便止如胸中氣滯加青皮二分并去白橘皮倍之去其邪氣此病本元氣不足惟當補元氣不當瀉之如氣滯太甚或補藥大過或病人心下有憂滯鬱結之事更加木香縮砂仁以上各二分或三分白豆蔻仁二分與正藥同煎如腹痛不惡寒者加白芍藥五分黃芩二分卻減五味子

○脾胃虛弱遇六七月間河漲霖雨諸物皆潤人汗沾衣身重短氣甚則四肢痿軟行步不正腳欹眼黑欲倒此腎水與膀胱俱竭之狀也當急救之滋肺氣以補水之上源又使庚大腸不受邪熱不令汗大泄也汗泄甚則亡津液亡津液則七神無所依經云津液相成神乃自生津者庚大腸所主三伏之義為庚金受囚也若亡津液汗大泄濕令亢甚則清肅之氣甚燥金受囚風木無可以制故風濕相搏骨節煩疼一身盡痛亢則害承乃制是也孫思邈云五月常服五味子是瀉丙火補庚大腸益五臟之元氣壬膀胱之寒已絕於巳癸腎水已絕於午今更逢濕旺助熱為邪西方北方之寒清絕矣聖人立法夏月宜補者補天元真氣非補熱火也令人夏食寒是也為熱傷元氣以人參麥門冬五味子生脈脈者元氣也人參之甘補元氣瀉熱火也麥門冬之苦寒補水之源而清肅燥金也五味子之酸以瀉火補庚大腸與肺金也當此之時無病之人亦或有二證或避暑熱納涼於深堂大廈得之者名曰中暑其病必頭痛惡寒身形拘急肢節疼痛而煩心肌膚大熱無汗為房室之陰寒所遏使周身陽氣不得伸越世多以大順散主之是也若行人或農夫於日中勞役得之者名曰中熱其病必苦頭痛發躁熱惡熱捫之肌膚大熱必大渴引飲汗大泄無氣以動乃為天熱外傷肺氣蒼朮白虎湯主之潔古云動而得之為中熱靜而得之為中暑中暑者陰證當發散也中熱者陽證為熱傷元氣非形體受病也若虛損脾胃有宿疾之人遇此天暑將理失所違時伐化必困乏無力懶語氣短氣弱氣促似喘非喘骨乏無力其形如夢寐朦朦如煙霧中不知身所有也必大汗泄若風犯汗眼皮膚必搐項筋皮枯毛焦身體皆重肢節時有煩疼或一身盡痛或渴或不渴或小便黃澀此風濕相搏也頭痛或頭重上熱壅盛口鼻氣短氣促身心煩亂有不生之意情思慘悽此陰勝陽之極也病甚則傳腎肝為痿厥厥者四肢如在火中為熱厥四肢寒冷者為寒厥寒厥則腹中有寒熱厥則腹中有熱為脾主四肢故也若肌肉濡漬痹而不仁傳為肉痿證證中皆有肺疾用藥之人當以此調之氣上衝胸皆厥證也痿者四肢痿軟而無力也其心煩冤不止厥者氣逆也甚則大逆故曰厥逆其厥痿多相須也於前已立黃耆人參五味子麥門冬湯中每服加白茯苓二分澤瀉四分豬苓白朮各一分如小便快利不黃澀者只加澤瀉二分與二朮上下分消其濕如行步不正腳膝痿弱兩足欹側者已中痿邪加酒洗黃柏知母三分或五分令二足湧出氣力矣如汗大泄者津脫也急止之加五味子六枚炒黃柏五分炒知母三分不令妨其食當以意斟酌若妨食則止候食進則再服三里氣街以三棱針出血若汗不減不止者於三里穴下三寸上廉穴出血禁酒濕麵夫痿者濕熱乘腎肝也當急去之不然則下焦元氣竭盡而成軟癱必腰下不能動心煩冤而不止也若身重減氣不短小便如常及濕熱之令退時或所增之病氣退者不用五味子澤瀉茯苓豬苓黃柏知母蒼朮白朮之藥只依本病中證候加減常服藥亦須用酒黃柏二分或三分如更時令清燥之氣大行卻加辛溫瀉之若濕氣勝風證不退眩暈麻木不已除風濕羌活湯主之

夫脈弦洪緩而沉按之中之下得時一澀其證四肢滿閉肢節煩疼難以屈伸身體沉重煩心不安忽肥忽瘦四肢懶倦口失滋味腹難舒伸大小便清利而數或上飲下便或大便澀滯不行一二日一見夏月飧泄米穀不化或便後見血見白膿胸滿短氣膈咽不通或痰嗽稠粘口中沃沫食入反出耳鳴耳聾目中流火視物昏花胬肉紅絲熱壅頭目不得安臥嗜臥無力不思飲食調中益氣湯主之

熱傷氣故也。痿論云：有所遠行勞倦，逢大熱而渴，渴則陽氣內
伐，內伐則熱舍於腎，腎者水藏也，今水不能勝火，則骨枯而髓虛，足不任身，
發為骨痿。故下經曰：骨痿者，生於大熱也。此濕熱成痿，令人骨乏無力，故治痿獨取
於陽明。時當長夏，濕熱大勝，蒸蒸而熾，人感之多四肢困倦，精神短少，
懶於動作，胸滿氣促，肢節沉疼，或氣高而喘，身熱而煩，心下膨痞，小便
黃而數，大便溏而頻，或痢出黃如糜，或如泔色，或渴或不渴，不思飲食，
自汗體重，或汗少者，血先病而氣不病也。其脈中得洪緩，若濕氣相搏，必
加之以遲，遲病雖互換少差，其天暑濕令則一也。宜以清燥之劑治之。
云陽氣者衛外而為固也，炅則氣泄，今暑邪干衛，故身熱自汗，以黃耆
甘溫補之為君，人參、橘皮、當歸、甘草甘微溫，補中益氣為臣，蒼朮、白朮、
澤瀉滲利而除濕，升麻、葛根甘苦平，善解肌熱，又以風勝濕也。濕勝則
食不消而作痞滿，故炒麴甘辛，青皮辛溫，消食快氣，腎惡燥，急食辛以
潤之，故以黃蘗苦辛寒，借甘味瀉熱補水，虛者滋其化源，以人參、五味
子、麥門冬酸甘微寒，救天暑之傷於庚金為佐，名曰清暑益氣湯。此病
由飲食勞倦損其脾胃，乘天暑而病作也。但藥中犯澤瀉、豬苓、茯苓、
燈草、通草、木通淡滲利小便之類，皆從時令之旺氣，以瀉脾胃之客邪，
而補金水之不及也。此正方已是從權而立之，若於無時病濕熱脾旺
之證，或小便已數，腎肝不受邪者誤用之，必大瀉真陰，竭絕腎水，先損
兩目也。心火乘脾，乃血受火邪，而不能升發陽氣，伏於地中，地者人之
脾也，必用當歸和血，少用黃蘗以益真陰。脾胃不足之證，須少用升麻，
乃足陽明、太陰引經之藥也，使行陽道，自脾胃中右遷，少陽行春令，生
萬化之根蒂也。更少加柴胡，使諸經右遷，生發陰陽之氣，以滋春之和
氣也。脾虛緣心火亢甚而乘其土也，其次肺氣受邪，為熱所傷，必須用
黃耆最多，甘草次之，人參又次之，三者皆甘溫之陽藥也。脾始虛，肺氣
先絕，故用黃耆之甘溫，以益皮毛之氣，而閉腠理，不令自汗而損其元
氣也。上喘氣短懶語，須用人參以補之。心火乘脾，須用炙甘草以瀉火
熱，而補脾胃中元氣，甘草最少，恐滋滿也。若脾胃之急痛并脾胃大虛，
腹中急縮，腹皮急縮者，却宜多用之，急者緩之。若從權，必加升麻以引之，恐左遷之
邪堅盛，卒不肯退，反行陰道，故使引之以行陽道，若中滿者去甘草，咳甚
者去人參，如口乾嗌乾者，加葛根，以人參補之，為能生陰血。

也[illegible]則心氣
下[illegible]朱砂安神
丸[illegible]心下痞[illegible]以橘皮
之[illegible]甘辛為用也，長夏濕土客邪大旺，可從權加蒼
朮、白朮、澤瀉，上下分消其濕熱之氣也。濕氣大勝，主食不消化，故食減，不
知穀味，加炒麴以消之，復加五味子、麥門冬、人參瀉火，益肺氣，助秋損
也。此三伏中長夏正旺之時藥也[illegible]天
便不過[illegible]若[illegible]大安者
秋之[illegible]不降也
借用大寒之氣於甘藥中，故曰甘寒瀉熱[illegible]
入[illegible]故用
升[illegible]不
[illegible]經
不行則口[illegible]其
本[illegible]其

茱萸大熱大辛苦之味，以瀉陰寒之氣[illegible]冬十一月
[illegible]皮益智草豆蔻[illegible]丸
腎丸者黃蘗知母[illegible]加肉桂三味是也[illegible]丸[illegible]各
之八十丸，空心[illegible]食壓之[illegible]不令胃中[illegible]
心如食少不飢，加炒麴[illegible]食不下[illegible]脈弦四
肢[illegible]心下痞[illegible]柴胡[illegible]逆者是[illegible]脈
逆也，加黃蘗三分，黃連一分[illegible]如大便[illegible]加黃連
飢[illegible]加大黃當歸[illegible]心下痛
脈加五味子、白芍藥[illegible]天寒以加乾薑[illegible]中桂[illegible]如心下痞中
寒者加附子、黃連，如心下痞逆者加黃連、生薑、橘皮[illegible]各[illegible]月加黃
連[illegible]丁香[illegible]如口乾嗌乾加五味子、葛根，如[illegible]痛者[illegible]
加柴胡[illegible]青皮人[illegible]如頭
痛有[illegible]二分[illegible]一分
如頭[illegible]不足加當歸身[illegible]加[illegible]五味子[illegible]
白仁[illegible]如食不下[illegible]胃中[illegible]加青皮[illegible]三味

如見大小便秘結加益智仁[illegible]如夏月加黃連秋月加藿香不下更加[illegible]神麴之類以人參加白豆蔻仁如春三月食不下亦用青皮人參炙甘草更加風藥以退其寒鬱宜上如初春猶寒更少加辛熱以補春氣之不足以為風藥之佐益智草豆蔻皆可也如腹脹者是風動之證以風藥佐之如腹痛兼見者[illegible]加[illegible]如天寒加木香青皮陳皮[illegible]上氣而不行宜破滯氣[illegible]去青皮陳皮更以加木香[illegible]冬月加吳茱萸人參鬱塞則以[illegible]寸口脈弦數[illegible]乃胸中大寒也若加之古白[illegible]乃用[illegible]胃中有寒加[illegible]治之天氣炎熱兩腿痛者加黃柏[illegible]之脈[illegible]胃之不和[illegible]只服補中益氣湯一二服得微汗則已[illegible]腳膝痿弱[illegible]乃胃中[illegible]濕熱以[illegible]不食更須黃芩[illegible]白天胃口上痛[illegible]加益智仁○如以氣不足以[illegible]服正藥二三服氣短促者為閉上焦[illegible]引陽氣上伸加[illegible]

火升麻柴胡又之黃耆[illegible]○飲食勞倦所傷[illegible]甘草人參白朮[illegible]以加升麻柴胡[illegible]可以通天地之氣也又經云氣傷胃[illegible]之傷[illegible]以升麻柴胡[illegible]之[illegible]上升而[illegible]○內傷飲食[illegible]雲行雨施[illegible]生發之氣也人之元氣胃皆在飲食入胃乃則五穀[illegible]于華蓋布著于五臟以胃之元氣生發之功也飲食一傷[illegible]氣盛穀氣[illegible]一藥之[illegible]下咽利之[illegible]之物已去藥未盡化病去之後脾胃[illegible]則精氣[illegible]促人命可不戒哉且如[illegible]可[illegible]以白朮之甘溫補脾胃其苦除胃中之濕熱是先補其虛[illegible]化之[illegible]以其[illegible]心下痞悶消化胃中所傷則不能即去且以[illegible]白朮協力[illegible]令脾胃厚實不至內傷若以辛熱之物[illegible]之類下之大便下時所傷物皆已去然有傷元氣也[illegible]傷氣是謂此也凡人大熱氣而[illegible]而四肢不收[illegible]不可[illegible]

○如[illegible]大熱則[illegible]以不忍食[illegible]飲食無形之氣傷之則[illegible]小便行[illegible]之物所傷之[illegible]有餘[illegible]主之[illegible]枳朮[illegible]之類是也[illegible]以香附[illegible]使[illegible]飲食[illegible]不合[illegible]春以三部也○假令[illegible]不[illegible]飲食[illegible]去桂五苓散○假令傷穀物一分生冷物一分用[illegible]丸二停[illegible]木香[illegible]合而服之傷生冷二分穀物一分用[illegible]合而服之○假令夏月傷生冷當用[illegible]丸[illegible]加三黃丸[illegible]不可[illegible]故加[illegible]時令[illegible]傷穀物只用三黃以三黃[illegible]藥也○假令冬月傷[illegible]三黃[illegible]加[illegible]引用[illegible]

[illegible]中益氣上[illegible]脾胃虛弱飲食勞倦內傷不足之病○古之至人窮於陰陽之化究乎生死之際所著內經悉言人以胃氣為本人受水穀之氣以生所謂清氣營氣運氣衛氣春升之氣皆胃氣之別稱也夫胃為水穀之海飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五臟陰陽揆度以為常也若飲食失節寒溫不適則脾胃乃傷喜怒憂恐損耗元氣既脾胃氣衰元氣不足而心火獨盛心火者陰火也起於下焦其系係於心心不主令相火代之相火下焦包絡之火元氣之賊也火與元氣不兩立一勝則一負脾胃氣虛則下流於腎陰火得以乘其土位故脾胃之證始得之則氣高而喘身熱而煩其脈洪大而頭痛或渴不止其皮膚不任風寒而生寒熱蓋陰火上衝則氣高喘而煩熱為頭痛為渴而脈洪脾胃之氣下流使穀氣不得升浮是春生之令不行則無陽以護其榮衛則不任風寒乃生寒熱此皆脾胃之氣不足所致也然而與外感風寒所得之證頗同而實異內傷脾胃乃傷其氣外感風寒乃傷其形傷其外為有餘有餘者瀉之傷其內為不足不足者補之內傷不足之病苟誤認作外感有餘之病而反瀉之則虛其虛也實實虛虛如此死者醫殺之耳然則奈何惟當以辛甘溫之劑補其中而

升其陽甘寒以瀉其火則愈矣經曰勞者溫之損者溫之蓋溫能除大熱大忌苦
寒之藥[illegible]今立[illegible]主之

黃芪[illegible]　人參去蘆有嗽去之
[illegible]當歸身[illegible]　炙甘草[illegible]
[illegible]　橘皮[illegible]

右件㕮咀都作一服水二盞煎至一盞去柤大溫服[illegible]加白芍藥[illegible]
夫脾胃虛者因飲食勞倦心火亢甚而乘其土位其
次肺氣受邪須用黃芪最多甘草人參次之脾胃一虛肺氣先絕故用
黃芪以益皮毛而閉腠理不令自汗損其元氣上喘氣短人參以補之
心火乘脾須炙甘草之甘以瀉火熱而補脾胃中元氣若脾胃急痛
并大虛腹中急縮者宜多用之[illegible]胃中清氣在下必加升麻柴
胡以引之引黃芪甘草上升能補衛氣之散解以實其表也又緩帶脈之縮急二
味苦平味之薄者陰中之陽引清氣上升也[illegible]人參甘草[illegible]
氣亂於胸中為清濁相干用去白橘皮以理之又能助陽氣上升以散滯氣助諸甘辛為用[illegible]

脾胃氣虛不能升浮為陰火傷其生發之氣榮血大虧榮氣不營陰火
熾盛是血中伏火日漸煎熬血氣日減心包與心主血血減則心無所養
致使心亂而煩病名曰悗[illegible]悗者心惑而煩悶不安也故加辛甘微溫之
劑生陽氣陽生則陰長或曰甘溫何能生血曰仲景之法血虛以人參補
之陽旺則能生陰血更加當歸和血又宜少加黃蘗以救腎水能瀉陰中
之伏火如煩猶不止少加生地黃補腎水水旺而心火自降如氣浮心
亂以朱砂安神丸鎮固之則愈

朱砂[illegible]　黃連[illegible]　當歸[illegible]
炙甘草五錢半　生地黃二[illegible]

右件除朱砂外四味[illegible]為[illegible]如黍米大以
朱砂為衣每服一十五丸津唾嚥之食後[illegible]以苦寒瀉之以
黃連之苦寒去心煩除濕熱為君以甘草生地黃之甘寒瀉火補氣滋
生陰血為臣以當歸補其血不足朱砂納浮溜之火而安神明也

○四時用藥加減法○[illegible]
分消其濕熱之氣濕熱乘人[illegible]故食[illegible]不知[illegible]

則加五味子麥門冬加人參瀉火益肺氣助秋損也在三伏中為聖
藥[illegible]名曰[illegible]迎
逆[illegible]曰[illegible]逆
氣何也[illegible]中[illegible]夏月
加青皮陳皮益智黃柏散陰火之上逆或以消痞滋腎丸各七八
十丸則愈冬月加益智草豆蔻仁[illegible]之味以為陰寒之氣則食不
下[illegible]中有寒宜[illegible]
[illegible]加青皮陳皮及木香[illegible]為[illegible]
[illegible]以加黃芩黃連[illegible]白豆蔻仁
如秋[illegible]更少加[illegible]之劑以補肺氣之不足為風寒之[illegible]
[illegible]秋涼亦加[illegible]
[illegible]各三分若夏月[illegible]肺中伏火者去人參
防[illegible]陽[illegible]之[illegible]洪大者
是熱壅[illegible]甘草[illegible]無力者
也加蒼朮[illegible]人參白茯苓五味子[illegible]加當歸身木

香天門冬黃[illegible]
[illegible]乃木[illegible]三二分[illegible]
如[illegible]身有刺痛者血澀不足加當歸身[illegible]
柴胡甘草人參[illegible]中氣上逆者[illegible]也加黃蘗三分黃連二分
以[illegible]白茯[illegible]口上[illegible]也加益智仁如火氣不[illegible]
臍下[illegible]二三服[illegible]上[illegible]
則愈多加羌活獨活升麻柴胡藁本[illegible]之[illegible]者倍之[illegible]而服
者表[illegible]也只服[illegible]二服[illegible]而[illegible]
伏火上[illegible]也加黃蘗生地黃各三分[illegible]行步之力或[illegible]
腎[illegible]伏熱以加黃蘗[illegible]空心服如不愈更加[illegible]則愈使
腳膝中氣力弱出矢[illegible]而[illegible]
便難而心下[illegible]加黃連柴胡甘草大便[illegible]心下[illegible]加黃連枳實
少加大黃當歸身心下痞[illegible]者加白芍藥黃連心下痞[illegible]
乘[illegible]以[illegible]加天寒少加乾薑[illegible]心下痞[illegible]加附子黃
連心下痞加黃連生薑橘皮冬月加黃連木香[illegible]食而

下焦加黃柏半錢，脈實三分，胃中氣滯加去白青皮，通擁食[illegible]
脈洪大面赤者，加黃芩、桔梗、甘草，目黃頰頤腫，頭痛，肩背臂
分徵痛，面赤，加以大熱以[illegible]，防風、甘草、藁本以通其經血，加黃
芩、黃連，有其腫，人參、黃芪益元氣而瀉火邪，如脈緊面白善嚏
或色惡，寒者寒也，亦羌活等四味中加之，當瀉足太陽也，不用
寒藥。小便遺失，肺金虛也，宜安臥養氣，以黃芪、人參之類
補之，不愈是有熱也，加黃柏、生地黃，切禁勞役，臥而多驚，小
便淋溲者，邪在少陽厥陰，亦宜太陽經所加之藥，更添柴胡半錢，
如淋加澤瀉半錢，此下焦風寒合病也，腎肝之病同一治，爲俱在
下焦，非風藥行經則不可，乃受客邪之且熱也，宜升舉發散以
除之。頭痛加蔓荊子半分，痛甚加川芎二分，頂痛腦痛加藁本三
分，苦頭痛加細辛二分，諸頭痛並用此四味足矣，[illegible]下[illegible]
加氣加黃芪三分，不已，[illegible]大寒也，其寒從[illegible]變中來，加肉桂三分。
偏頭[illegible]因[illegible]火也，[illegible]寒[illegible]之[illegible]也，加[illegible]以[illegible]丸主之
[illegible]身有疼痛，身重者濕也，以五苓散主之，如風濕相搏，一身

盡痛，加羌活、防風各半錢，升麻、柴胡各半錢，藁本、蒼朮各一錢，若[illegible]以
藥爲風藥也，[illegible]另作一服與之
通氣防風湯[illegible] 台[illegible]肩背痛不可回顧者，此手太陽氣鬱而不行，
以風藥散之，脊痛項強，腰似折，項似拔者，此足太陽經不通行，以
羌活勝濕湯主之
羌活 獨活各一錢 藁本 防風 甘草炙各五分
川芎 蔓荊子三分
右㕮咀，都作一服，水二盞，煎至一盞，去渣，食後溫服。如身重腰沉沉然，
經中有寒濕也，更加酒洗漢防己五分，輕者附子五分，重者川烏五分。
[illegible]不[illegible]加黃芩[illegible]中[illegible]，[illegible]寒，而[illegible]者，[illegible]中[illegible]如[illegible]
細者理中[illegible]之[illegible]，[illegible]腹氣[illegible]，加[illegible]益智[illegible]道之[illegible]
胃[illegible]而[illegible]者胃虛之極也，[illegible]以草豆蔻丸主之[illegible]
脾胃[illegible]
白朮附子湯[illegible] 台脾胃之[illegible]則[illegible]中[illegible]則[illegible]中[illegible]生[illegible]
上[illegible]寒[illegible]中[illegible]水反來[illegible]所[illegible]亡[illegible]行也[illegible]中[illegible]

項痛作[illegible]有[illegible]多[illegible]足下痛不能任身，履如骨之無力，喜睡，兩丸
多冷，陰陰作痛，或妄見鬼狀，夢亡人，腰背胛眼腰脊皆痛，而不渴
不瀉，不[illegible]不[illegible]，[illegible]則[illegible]血[illegible]，[illegible]則脈不通，
故其脈盛大，以[illegible]中[illegible]以此藥主之
白朮 附子[illegible] 蒼朮 陳皮 [illegible]朴[illegible]製
半夏[illegible] 茯苓 [illegible]豬苓[illegible]
[illegible]
[illegible]
右件剉如麻豆大，每服五錢，水二盞，生薑三片，煎至一盞，去渣，食前
溫服之，[illegible]病人[illegible]貴加[illegible]多[illegible]
[illegible]中[illegible]以[illegible]云飲食[illegible]所傷[illegible]必[illegible]高[illegible]
[illegible]不[illegible]者以[illegible]火言[illegible]飲[illegible]大[illegible]故也[illegible]甘之[illegible]以[illegible]元氣[illegible]
大也[illegible]人[illegible]父[illegible]則不[illegible]頭[illegible]大作[illegible]
服[illegible]不[illegible]服[illegible]不可[illegible]寒涼[illegible]經云[illegible]者
[illegible]以[illegible]元氣[illegible]心火[illegible]其[illegible]心火[illegible]於皮
[illegible]之位[illegible]下[illegible]上行[illegible]以[illegible]上[illegible]爲[illegible]宜用此方

黃芪[illegible] 甘草[illegible]
人參[illegible]
白芍藥[illegible] 葛根[illegible]
當歸身[illegible] 橘皮[illegible]
升麻[illegible] 柴胡[illegible]
黃柏[illegible] 黃芩[illegible]
生甘草[illegible] 紅花一分
右㕮咀，作一服，水二大盞，煎至一盞，加[illegible]水[illegible]大[illegible]去渣，食遠
稍熱服[illegible]不二服[illegible]自[illegible]主[illegible]中[illegible]白芍藥
中[illegible]甘草三分[illegible]寒[illegible]加去皮中桂一分[illegible]二分桂心是也[illegible]
熱[illegible]而[illegible]二四[illegible]甘草二味更加主黃芩一分[illegible]
二分[illegible]熱也[illegible]天[illegible]是熱而[illegible]加[illegible]甘草黃芩中
[illegible]加桂一分[illegible]天氣[illegible]以其味[illegible]而[illegible]
[illegible]也[illegible]加[illegible]之大[illegible]氣加益智二分或三分
或加半夏半錢，生薑三片[illegible]藥[illegible]加蔓荊子二分[illegible]
加川芎二分[illegible]痛更加藁本，根二分或半錢，若頭痛更加

細辛二分，諸頭痛並用此四味足矣。若頭上有熱，則此不能治，別有清空膏主之。此一法中痛者，加熟地黃半錢，其痛乃止。如不止，則大寒也，更加肉桂去皮二分或三分。胃中氣滯，加青皮一分，壅滯者去之，氣短少氣者去之。身有疼痛若濕，若身重亦濕，加去桂五苓散一分。或濕相搏，一身盡痛，加羌活半錢，防風半錢，升麻一錢，蒼朮半錢，藁本根半錢，勿用五苓。正服元氣虛，加當歸一錢。閉澀不大便，煎正藥成，先用調玄明粉半錢或一錢。久病痰嗽者，去人參。冬月加不去節麻黃半錢，如春寒者亦加，如春月天溫加佛耳草二分，款冬花一分。加麻黃，若初病之人，痰嗽不去人參。久病肺中伏火者，去人參。夏月得病，加五味子去子七八個，去心麥門冬二分或一分。如舌上有白胎者，是胃中有寒，勿用之。夏月更加人參二分，五味子、麥門冬等分。如病人能食，心下痞，加黃連一分。如不能食，心下痞，勿加黃連。依方服藥，下痢或脇下急，加柴胡三分，甚加半錢。此上治病中，始因諸甘藥，若傳至寒中，胃脘咽不已，胃脘當而痛。

若依前用甘溫之劑，則殺人矣。

升陽順氣湯 治飲食不節，勞役所傷，腹脇滿閉，短氣，遇春口淡無味，遇夏雖熱猶寒，飢常如飽，不喜食冷物。

升麻一錢 柴胡一錢 黃耆一兩 半夏一錢 人參三錢
陳皮一錢 甘草半錢 草豆蔻一錢 神麴一錢 當歸身一錢
黃柏半錢

右㕮咀，每服三錢，水二大盞，薑五片，煎至一盞，去滓，空心溫服。

寬中進食丸 滋形氣，喜飲食。

草豆蔻五錢 縮砂仁一錢半 半夏七錢 大麥蘖炒，一兩半
枳實麩炒，四錢 神麴炒，一兩 甘草炙 生薑二錢 陳皮二錢半
木香一錢 白朮二錢 白茯苓去皮 豬苓去黑皮，一錢半 澤瀉二錢
人參二錢 青皮一分 檳榔各四錢

右為末，湯浸蒸餅為丸，如梧桐子大，每服三十丸，米飲湯下，空心服。
方用檳榔二錢半。

和中丸 治病久虛弱，厭厭不能食，而臟腑或秘或溏，此胃氣虛弱也，當服和中丸，助胃氣，進飲食。

人參 白朮一錢 乾生薑一錢 陳皮一錢
枳實炒 木香二錢 炙甘草三錢 檳榔四分

右為末，湯浸蒸餅為丸，如梧桐子大，每服三十丸至五十丸，溫水空心服，一月用之，其胃乃下。

橘皮枳朮丸 治老幼元氣虛弱，飲食不消，或臟腑不調，心下痞悶不快。

橘皮四兩 枳實麩炒，一兩 白朮二兩

右為末，荷葉燒飯為丸，如梧桐子大，每服五十丸，溫水下，食遠服。內傷用藥所貴，人以胃氣為本，蓋人以水穀為本，故人絕水穀則死。平也，此蓋胃氣，人之元氣，少陽甲膽也，甲膽風也，生化萬物之根蒂，少陽三焦人之元氣也，二經同主，故飲食入胃，營氣上行，即是少陽元氣，其生發也，胃氣、穀氣、元氣、甲膽上升之氣，一也，異名，雖多，止是胃氣上升者也。荷葉之味乃生青象風木，它食藥氣之化，胃氣何由不上升，引藥如此，飲合食畫之，用舊來之。

麴蘖枳朮丸 治為人所勉勸強食之，致心腹滿悶不快。

神麴炒，一兩 麥蘖麵炒，一兩 枳實麩炒，去穰，一兩 白朮二兩

右為細末，荷葉燒飯為丸，如梧桐子大，每服五十丸，溫水食遠下。

木香枳實丸 出東垣 破滯氣，消飲食，開胃進食。

木香一兩 枳實麩炒，去穰，一兩 白朮二兩

右為細末，荷葉燒飯為丸，如梧桐子大，每服五十丸，溫水食遠下。

木香化滯湯 出東垣 治因憂氣鬱結中脘，腹皮底微痛，心下痞滿，不思飲食，食之不散，常常痞悶。

柴胡四錢 木香一錢 橘皮一錢 甘草炙，五兩 半夏一兩
當歸梢二錢 紅花五分 草豆蔻仁五分 枳實麩炒，一錢

右為粗末，每服五錢，水二大盞，生薑五片，煎至一盞，去滓，稍熱食遠服。忌酒濕麵。

半夏枳朮丸 出東垣 治因冷食內傷，心腹痞滿，痰不止。

半夏湯洗七次，二兩 乾生薑一兩 枳實麩炒，二兩 白朮二兩

右為細末，荷葉燒飯為丸，如綠豆大，每服五十丸，白湯下，如以湯

又蒸餅爲丸如□□大每服不拘□□加至五七十丸白湯下

[illegible]

丁香爛飯丸　又治飲食所傷卒心胃痛

丁香一錢　丁香皮三錢　甘草　八　甘松　各　縮砂仁　三錢

益智仁三錢　三稜炮一錢　廣茂炮一錢　香附子五錢　木香一錢

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如菉豆大每服三十丸白湯送下細嚼亦

可不拘時候

草豆蔻丸　治秋冬傷寒冷物胃脘當心而痛上支兩脅咽膈不通

草豆蔻　麪裹煨去皮　神麯　炒黃　黃芩

枳實　麩炒　麥糵麯　炒　白朮一兩　半夏

陳皮一錢　青皮二錢　乾生薑二錢　鹽　半錢

右爲末湯浸蒸餅丸如菉豆大一倍每服五十丸白湯下量所傷多

少加減服之如冬月別作一藥不用黃芩歲火不及又傷冷物加益

智是其君也然有熱物傷者從權以寒藥治之隨時之宜不可不知

三黃枳朮丸　治傷肉食濕麪辛辣味厚之物填塞悶亂不快

黃芩二兩　黃連酒浸　大黃　神麯　炒

白朮一兩　陳皮一兩　枳實　麩炒五錢

右爲末湯浸蒸餅丸如菉豆大一倍每服五十丸白湯下量所傷加

減服

除濕益氣丸　治傷濕麪心腹滿悶肢體沉重

枳實　麩炒黃　白朮一兩　蘿蔔子　炒熟去穢氣半兩

神麯　炒黃一兩　黃芩　生用一兩　紅花　三分

右爲末荷葉燒飯丸如梧桐子大每服五十丸白湯下量所傷多

少加減服之

上二黃丸　治傷熱食痞悶兀兀欲吐煩亂不安

黃芩二兩　黃連　去鬚酒浸一兩　升麻　二錢　柴胡　一錢

甘草　枳實　麩炒

右爲末湯浸蒸餅丸如菉豆大每服五七十丸白湯下量所傷加減服之

枳實導滯丸　治傷濕熱之物不得施化而作痞滿悶亂不安

茯苓　去皮　黃芩　去腐　白朮　黃連　各三錢　澤瀉　二錢

枳實　麩炒　神麯　炒各五錢　大黃一兩

右爲末湯浸蒸餅丸如梧桐子大每服五十丸至七十丸白水下食遠

量所傷加減服更衣止後服

枳實梔子大黃湯　治大病瘥後傷食勞復

枳實　一箇麩炒　梔子　三枚半　豉　一兩二錢半

右清漿水二盞空煎退八分內枳實梔子煮取八分下豉再煮五

六沸去滓溫服覆令汗出若有宿食內大黃如薄棋子大五六

枚同煎食膏粱之物過多煩悶亂者亦宜服

白朮丸　治傷豆粉濕麪油膩之物

白朮一兩　半夏　湯洗七次一兩　陳皮　七錢　神麯　炒一兩

枳實　麩炒一兩　黃芩　半兩　白礬　枯三分

右爲末湯浸蒸餅丸如菉豆大一倍每服五十丸白湯下量傷加減

素食多用乾薑故加黃芩以瀉之

木香見睍丸　治傷生冷硬物心腹滿悶疼痛

神麯　炒一兩　荊三棱　煨一兩

巴豆霜　五分　木香　二錢　香附子　炒半兩

石三棱　去皮煨　草豆蔻仁　麪裹煨　半兩

升麻　三錢　柴胡　三錢

右爲末湯浸蒸餅丸如菉豆大一倍每服二十丸白湯下量所傷加

減服之一方無草豆蔻仁

三棱消積丸　治傷生冷硬物不能消化心腹滿悶痛不快

荊三棱　炮　廣茂　炒　青皮　丁皮

益智　各三錢　炒麯　七錢　茴香　炒　巴豆　和皮米炒焦去米　陳皮　各五錢

右爲末醋打麪糊丸如梧桐子大每服十丸至二十丸溫生薑湯下食

前量虛實加減服如更衣止後服一方無茴香加川練子名消積

消積香丸

神應丸　治因一切冷水及潼乳酪水所傷腹痛腸鳴米穀不化

巴豆　杏仁　乾薑　百草霜　各半兩

丁香　一錢　木香　二錢　黃蠟　一兩

右先將黃蠟用好醋煮去滓秤巴豆杏仁同炒黑煙盡研如泥

將黃蠟再上火春夏入油半錢秋冬入小油八錢溶開入杏仁

巴豆兒以下痰或不可服者有寒大熱不可服亦依此法半細服累效旋
丸用米服二三十丸空心食前日三服如脉或弦利乃虛
氣勝也以上本散平胃散加炒麵相合而服之名曰對金飲子
益胃散 治脾胃虛冷多致胃虛滿胃脹痛
白荳蔻仁 八　甘草 一錢　茯苓 七錢　乾生薑 五錢　縮砂仁
甘草 錢　黃芪 錢　陳皮 七錢　益智仁 錢　厚朴 二錢
人參 錢
右為細末每服三錢水一盞煎至七分溫服食前一方有溫胆丸亦得
如脉弦急寒腹痛乃中弱也以仲景小建中湯加黃芪錢人參亦妙
微加芍藥建而用之如為甚者以木散為服倍之四胃散寬心丹參
後絕者胃中虛之至極食呼為心痛與草荳蔻丸二三十丸若痛損
作胃中元氣虛甚則消理二三日不得食飲當令思慾細嚼細嚥補
以不食一二日自知矣若食欲劇弟以錢頂百畢不得食食後不得
如飲食時口氣不得損食氣亦久是生令硬物果木之類及蔬林
熟食頁足長建免致後患一名為胃脾中湯

十書卷之十　八七

人參導氣丸 治傷胃氣痞半夏及一切食積
半夏 湯洗七次　麥芽子 炒　甘草 錢　神麴 炒兩
乾生薑 一錢　紅花 一錢　茯苓 七錢
右為細末每服三錢白湯調下食前
大霜砂丸 治飲食所傷一切積氣或痢赤白不定春亦暫湯下白
痢甘草湯下赤白甘草湯下消食所傷又果品白湯下並食後就臥
典服之方 攻積丸
硇砂　砂　巴豆　良薑 半兩
右先將硇砂外用石器內熬入巴豆在內等合黑研出不用只將
細研入前三味丸七丸小兒量
積老人虛弱皆可服者以黃丹代硇砂亦
號本事方名消積用巴豆散不同其積滿虛甚故
大木香人參生薑枳朮丸 開胃進食破積滿消寒飲
木香 錢　人參 一錢　乾生薑　枳實　白朮
橘皮 一錢

右為細末荷葉燒飯丸如桐子大每服二五十丸白湯送下食前一
方加炒麴一兩名木香枳朮丸
人參丸 治脾胃虛弱香氣進飲食和中利氣寬胸中除虛痞噎
臥以服不效見用飲後
厚朴　人參　知母
柴胡　人參　白茯苓　黃連
肉桂　白茯苓　皂角　澤瀉
縮砂仁　小椒　乾薑　川烏頭
白朮　吳茱萸　巴豆霜 五分
右除巴豆霜另入外同為極細末煉蜜為丸如梧子大每服三五
十丸白湯送下虛實加減一方無吳茱萸
導氣除燥湯 治飲食勞倦而小便閉塞不通乃血澁致氣
不通而竅澁也
知母　黃柏　滑石 二錢　茯苓 二錢
右為細末每服半兩水三盞煎至一盞去滓稍熱空心服不拘時

十書卷之十　八八

大枳殼丸 治一切酒食所傷胃痞腸痛嘔吐心腹疼痛
食不消痰逆嘔吐噫醋吞酸飲食遲化並宜服之
枳殼 麩炒　茯苓 去皮　白朮　半夏 湯洗
人參　木香　青皮　陳皮　京三稜 煨
檳榔　蓬莪朮 煨　神麴 炒　麥蘗 炒各一兩
乾生薑 半兩　牽牛 炒　大黃 各二兩
右為細末生薑汁麵糊為丸桐子大每服一百丸生薑湯下食後
木香檳榔丸 治食傷太陰
木香　檳榔　青皮　陳皮　廣茂 煨
黃連　枳殼　黃柏　大黃 各二兩
香附子 炒　牽牛 各四兩
右為細末水丸如梧子大每服三十丸食後生薑湯下
人參開胃湯 助胃進食
人參　白朮　藿香　橘紅　縮砂仁
木香　厚朴　麥蘗 炒　神麴 炒　甘草 炙

伏苓　蓮子肉　蒼朮　上是細末

右剉散每三錢薑四片煎服

枳朮丸 治痞消痰強胃食不良嘴情久服令人不傷易老改丸子

白与朮下不降宇胸膈痞悶消食強胃

枳實麩炒黃　白朮一兩

右為細末荷葉裹燒飯為丸或蒸餅丸亦得如梧子大每服

二三十丸米飲送下食後服一方白湯下五十丸

按傳降氣湯 治脾胃不和飲食過度致傷脾胃濁氣不散

胃氣上逆以此湯服腹脹痞滿不升降上熱下寒上熱則頭目昏

咳嗽喉乾逆痰實塞逆胃膈不快飲食無味下虛則腰腿冷痛

大便閉澀或泄瀉腰腳無力若治此藥則脾氣壯強腸鳴不

利治以藥則上氣壅熱口舌生瘡腳氣上攻又利不差並宜先進此藥

然後却以所生藥治之其効尤速

桑白皮炒　枳殼麩炒　甘草炒　陳皮炒

五加皮　骨碎補　地骨皮炒黃

桔梗炒黃　訶子煨去核　草菓仁炒　半夏

右吸咀依前服每服三錢紫蘇三葉薑三片水一盞煎至七分去滓食後溫服痰嗽加

半夏麴心肺虛加人參茯苓上膈熱加黃芩下部虛加咽痛少

許多用生薑煎婦人血虛加當歸寒痛腹痛樂衛過剂三錢

消化痰涎和五臟

塞積丸 消食破滯氣

積聚　木香　人參各二錢　橘皮二錢　炙甘草一錢

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸無時

人諸胃湯 治因飲食勞倦所傷腹脹滿悶短氣遇春則

無味雖熱而惡寒常如飽不喜食冷物

黃芪一兩　半夏二錢　人參三錢　草豆蔻一錢　黃蘗半錢

麴　陳皮　生薑　升麻　柴胡一錢

甘草　當歸身

右吸咀每服三錢水二大盞煎至一盞去滓溫服食前

木香丸 治大人小兒過食雜食果腹脹氣急

肉桂一兩　麝香一錢

右為末飯為丸如菉豆大大人十五丸小兒七丸不拘時飯湯下

三稜丸 治同前

三稜　莪朮　青皮　陳皮

右等分為末麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸薑湯下不拘時

小補皮煎丸 治消食化氣宜常用之

三稜　莪朮各等分　青皮去白　陳皮各等分　神麴炒

麥蘗炒各等分

右為末醋糊為丸如梧桐子大每服五十丸米飲下

治健食後臥得散勞耗令人四肢沉重嘿嘿欲臥食畢輒甚方

右用大麥蘗一升椒一兩並炒乾薑三兩搗末服方寸匕日三四服

寬中理氣丸 治腹胃不和寬中理氣可宜常服

枳實　檳榔　青木香　丁皮　神麴

蒼朮　香附子　萬桔梗　加香薑擣半斤

右為細末水糊為丸每服三十丸加至五十丸溫水生薑湯任下不拘時

三香神朮丸 能化五中痰滯消積氣快胸膈止嘔逆酸氣塞

食消食化氣開胃進食飲食無味婦人血氣

瘀瘕痃癖凡人吃此藥大宜服之

香附子　蒼朮　升麻　藿香

良薑　枳實　枳殼　青皮　甘草

廣茂　三稜　檳榔　神麴　陳皮

益智仁　公三稜　石三稜　麴蘗　半夏麴

乾薑　黃連　木香各一錢　蜜丸

右為細末藥籠水打麵糊為丸如桐子大每服五十丸食後

百錫丸 治中酒吐逆心下痞吞酸水吐惡寒氣不解申但因

所傷者宜服之百藥可以作也

乾葛　黃連　枳實　青皮　陳皮　神麴

麥蘗　白丸　三稜　莪朮　益智仁　檳榔

牽牛末　木香一兩　杏仁　蘿蔔子　加葛花

右為細末，同研為丸如梧桐子大，每服五七十丸，白水任意下

[illegible]枳朮丸[illegible]治宿食不消，胸膈痞悶[illegible]功效

[illegible]因飲食所傷，脾胃不和，並宜服之

厚朴六兩　枳實一兩　當歸二兩　人參一兩　藿香一兩

檳榔一兩　木香　甘草炙各半兩　陳皮二兩

右為細末，水糊為丸如梧桐子大，每服五十丸，白水送下

[illegible]

[illegible]

[illegible]

三稜散[illegible]

[illegible]

[illegible]

木香　陳皮去白　青皮去白　肉豆蔻麪裹煨　檳榔

三稜炮　草豆蔻仁[illegible]

右為末，麵糊丸如梧桐子大，每服六十丸，食前米飲下

清暑益氣湯　治長夏暑熱胃困，長夏五六月大熱蒸迫，人多困倦

胃弱短氣，[illegible]而[illegible]，大便或泄不實，或如白湯，或渴

或不思飲食，或氣短不能言，小便多而黃赤，以清暑益氣之劑主之

黃耆[illegible]　人參半錢　甘草炙三分　白朮五分

蒼朮一錢　陳皮五分　黃柏[illegible]　神麴[illegible]

升麻一錢　葛根[illegible]　當歸身[illegible]　[illegible]　五味子九箇

麥門冬[illegible]　青皮[illegible]

右㕮咀，作一服，水二大盞，煎至一盞，去柤，溫服，食遠服。此病因飲食失

節，勞倦所傷，損而脾胃作也

[illegible]之內，或食生冷，或

[illegible]飲食過度[illegible]

下利[illegible]血[illegible]大便下血[illegible]

皆當[illegible]之

[illegible]

右為細末，每服二錢，[illegible]下，或烏梅湯[illegible]

參朮散　治[illegible]

大麥糵[illegible]　乾薑[illegible]

右為末，服方寸匕，日三服

丁香爛飯丸　[illegible]消酒[illegible]寬中健胃

丁香半兩　胡椒一兩　縮砂仁[illegible]　乾生薑[illegible]　鹽一兩

甘草一兩

右同為細末，每服一錢，不拘時，白湯點下

消飲食過度飽[illegible]

以上[illegible]之法

和中丸　治[illegible]補胃進食

乾薑二錢　乾生薑[illegible]　炙甘草一錢　陳皮一錢　人參一錢

白朮一錢　益智仁一錢

右件為末，用湯浸蒸餅為丸如梧桐子大，每服三五十丸，白湯食前下

木香檳榔丸　[illegible]消食破滯氣

木香　檳榔各三錢　青皮五錢　陳皮　[illegible]

枳實各七錢　白朮　厚朴五錢[illegible]

右件為末，湯浸蒸餅為丸如梧桐子大，每服五七十丸，溫水食後下

扶胃丸[illegible]開胃進食

白朮[illegible]　茯苓[illegible]　橘皮[illegible]　[illegible]四錢　大麥糵[illegible]炒

炙甘草　肉桂[illegible]　藿香[illegible]　半夏一錢　紅豆一錢

乾生薑[illegible]　訶子皮[illegible]　烏梅肉[illegible]　乾薑一錢

右為細末，荷葉裹燒飯為丸如梧桐子大，每服三五十丸，白湯送下

黃耆湯[illegible]血[illegible]血虛發熱之象

黃耆一兩　當歸身[illegible]　[illegible]

木香[illegible]

右㕮咀，每服二五錢，水二大盞，煎至一盞，去滓，溫服，食遠服之

又方[illegible]上攻頭目，[illegible]發熱，用黃耆當歸湯

當歸身[illegible]　黃耆[illegible]

右㕮咀，以二大盞，煎至一盞，去滓溫服

□□□丸（□□□□□□）治□□人面無□，過食，嗜臥，肢體困倦。
蒼朮　橘紅　炒麯（各□□）　□黃　□□（□□□）
右為末，□□□□為丸，如桐子大，每服五十丸，白湯下，食遠。
溫中益氣治驗（出衛生寶鑑）
中書左丞相史公，年六十有七，至元丁卯九月間，因內傷自利數行，覺肢體沉重，不思飲食，嗜臥懶言語，舌不知味，腹中疼痛，頭亦痛而噁心。醫以通聖散大作劑料服之，覆以厚衣，遂大汗出，前證不除而反增劇。易數醫，四月餘不愈。予以□召至燕，命治之。診其脈得沉細而微，□不欲食，食則嘔吐，和□不眠，帶於升降，口舌乾燥，頭目昏眩，肢體困倦，足胻冷，以不欲起。丞相素不飲酒，肢體本瘦，又因內傷自利，復發汗，是重竭其陽，胃愈虛，不能滋榮周身百脈，故使然也。非甘辛大熱之劑，則不能溫養其氣。經云：脾欲緩，急食甘以緩之。又脾不足者，以甘補之。以黃芪、人參之甘，補脾緩中，故以為君。形不足者，溫之以氣，以當歸辛溫，和血潤燥；木香辛溫，升降滯氣；生薑、益智、草豆蔻仁辛甘大熱，以蕩中寒，理其正氣；白朮、炙甘草、橘皮甘苦溫，乃厚腸胃，□□□濕，知中神麴辛熱，導滯消食，故以為佐使。喫□兩服，前證減半。服之□，嗜上飲食進，慎□三日，前證悉去。左右曰：前證雖去，九日不大便，何以治之？曰：丞相年高氣衰，元□利，且平脾胃不足，慎勿□事，□不得也。宜散以寒涼有毒之劑下之。仲景云：大發汗後，小便數，大便堅，不可用承氣湯，可用蜜煎導之。須史去燥屎二十餘塊，遂覺腹中空，又上下氣調，又以前藥服之，喜飲食，但□傷則以脾補□之丸，有尊之□月，方得平復。丞相曰：病既去矣，當服何藥，須防其後？予謂不然。□言：調節飲食，不可服藥，如用刑民，有罪則刑之，身有疾則藥之，無罪妄刑，是謂虐民，無疾妄藥，反傷正氣。傳有之曰：見當則服，可合之，可也。丞相悅而然之。
參朮調中湯（出衛生寶鑑）治內傷自利，脘腹痛，肢體困倦，不喜飲食，食則□嗜臥，□□□□，舌不知五味，頭目昏眩。
黃芪（□□）　□□（□錢）　當歸身　厚朴　木香
草豆蔻仁　白朮　炙甘草　橘皮
益智　炒麯（已上各□錢）

右件剉如麻豆大，每服一兩，水二盞，生薑三片，煎至一盞，去滓，食前溫服。
傷藥服四肢倦，行立難，食以過多，胃味減，飲食減者是也，宜用後方。
（出普濟方）□□方
大黃（□□□以十四枚）　橘紅（一兩）　木香（分）
右為末，生蜜丸如梧桐子大，薑湯下三十丸，食後，又二服，未效加之，利即勿再服後方。
桂（半兩）　檳榔（一錢）　黑牽牛（四兩生取末□□一兩）
右為末，蜜湯調一錢，以利為度。
□關湯（出普濟方）治中焦痰逆。
白豆蔻仁　縮砂仁（各一兩）　丁香（二兩）　甘草（炙三兩）　白鹽（三兩炒）
右除丁香外，俱以鹽炒，以一合半入瓶，□底下丁香，又以半盞□頂上一宿，取出為細末，每服一錢，沸湯點下。
中和湯（出□□方）治胃□快膈，消痰助胃。
生薑（四兩去皮）　草果子（去皮）　甘草（七錢半炙）　半夏（湯洗三錢半）
白鹽（一兩炒）
右件為細末，入鹽和勻，每服二錢，沸湯點服。
青金湯（出普濟方）治酒食所傷，及嘔逆惡心，頭目昏暈，神志不爽。
縮砂仁（一兩）　□香（半兩）　白豆蔻仁（二兩）　甘草（一半炒一半生）
右件為細末，每一錢，沸湯點下。
生胃丸（出普濟方）治酒食所傷，胃膈不快，不思飲食。
良薑　白薑（各四兩炮）　丁香　胡椒
右細末，麵糊丸如梧桐子大，每服百十丸，米飲陳皮湯下。
如意丸（出普濟方）治脾胃虛冷，飲食過伏，心腹刺痛，噫氣吞酸，嘔吐脹滿，胸膈痞悶，四肢倦怠，不喜飲食。
草果　木香　破故紙（炒各一兩）
附子（二枚炮□□）（巴豆□□去心出油不用）（□□□□）
右件同為細末，麵糊為丸，如黃豆大，每服五丸至七丸，木香湯下，不拘時候。
快膈湯（出普濟方）治飲食過多，胸膈不快，噫吐甚者。

朱砂　丁香皮（四兩）　鹽（半斤）　甘草（六兩加大良薑）

右以葱鈸一枚先入鹽炒數攵下薑後薑稍乾焙攵下甘草炒色赤

攻下丁皮同炒不得焦紫色為度衆取入新瓶密封不得透

氣三日後搗為細末每以沸湯點一錢一名紫薑湯直是候大

效氣味香妙

解鹽湯（出十便良方）治飲食過傷脾胃不進不思飲食

胡椒　桂心　丁香（各分）　檀香（一錢）　藿香（各半兩）

甘草（炙二兩）　白鹽（四兩炒）

右為末每服一錢沸湯點服不拘時

脾胃不和不能飲食（附論）

夫內經言穀氣通於脾蓋虛則能受也脾胃之氣合則飲食甘

若其氣不和則腹內虛滿不能飲食治宜調其飲食進其方劑

病可已

方

神仙快活丸治婦人男子脾胃不和氣不升降腹脹腸鳴反胃嘔食噫氣吐瀉

心不思飲食心腹痞悶水氣不消心痛氣痛酒食所傷小兒疳疾

桂花（三兩）　木香　丁香　青皮　陳皮（各分）

官桂（二分）　蓬莪朮　肉果（一分）　砂仁（各）　良薑

白果　白芷　甘松（各分）　廣茂皮（各分）　檀香（一分）

木香（一分）　茯苓（各分）　香附子（各分）　麝香（一兩）　益智（六分）

大殺（一兩）　紅豆（二兩）　藿香（一兩）

右為細末甘草膏子為丸捻作丁香餅子

又方

蒼朮（四兩）　牽牛（六錢）　京三稜（一錢）　蓬莪朮（一錢）　良薑

息十斤

右為細末白麪糊為丸如桔子大每服半丸先嚼餅子一筒後將藥

隨湯嚼下

丁沉透膈湯（出和劑方）治脾胃不和中寒上氣脅肋脹滿心腹疼痛

痰逆惡心或時嘔吐飲食減少十膈五噎痞塞不通噫氣吞酸口苦失味

白朮（二兩）　香附子（炒）　人參　縮砂仁（各一兩）　丁香（炙）

麥糵　肉豆蔻（煨）　白豆蔻　木香　青皮（各四兩）

甘草（炙一兩半）　半夏（二兩湯洗七次）　藿香　草果（去皮）　厚朴（去皮薑汁炙）

神麴（炒）　草果仁（各二錢半）　沉香　陳皮（各半）

右㕮咀每服四錢水一大盞薑三片棗一枚煎至八分去滓熱服一方

加茯苓去肉豆蔻

木香散溫脾胃和氣消食

乾木瓜（一兩）　益智（去皮）　桂（去皮）　草豆蔻（去皮）　紅豆蔻（去皮）

乾薑（炮）　高良薑　陳橘皮（去白）　茴香　厚朴（去粗皮薑汁炙）

甘草（炙）　麥糵（炒）　陳麴（炒）　生薑（四兩）

丁香（一兩）　鹽（一斤）　丁香

右件藥十四味為散研細入生薑自然汁拌勻以瓷器盛每服二

錢以沸湯點服

木香養脾散（出聖濟總錄）治脾胃不和不能飲食心腹痞悶口苦無味

傷氣調順中焦

木香　人參　白茯苓（去皮）　半夏（湯洗七次）　陳皮

京三稜（炮）　甘草（炙銼）　桂（去皮）　乾薑（炮）

枳殼（去瓤麩炒）　甘草（炙銼）　陳橘皮（去白）　檳榔（銼）

草豆蔻（去皮）　荊三稜（煨銼）

右㕮咀每服二錢水一盞生薑三片煎七分去滓不拘時候

大腹湯治脾胃不和不能飲食

大腹（銼）　赤茯苓（去皮）　厚朴（去粗皮薑汁炙）　人參　木香（一兩）

肉豆蔻（去殼）　乾薑（炮）　白茯苓（去黑皮）

青橘皮（湯去白炒）　桂（去粗皮）　枳殼　大麥糵（炒）

半夏（湯洗去滑焙各一兩）　京三稜（炮銼）

右㕮咀每服二錢水一盞生薑三片棗二枚擘破同煎至六分去滓

稍熱食前服

木香丸（出和劑方）治脾胃不實嘔噦惡心上氣吐逆益美食

官桂　乾薑（炮）　木香（分）　大黃　蓬莪朮

芫花（醋炒）　枳殼（去瓤）　陳皮（去白）　半夏（一兩）　牽牛（半斤炒）

茴香炒 巴豆七粒
右為末，為丸如小豆大，每服二三十丸，鹽水送下。
紫蘇丸 治脾胃不和，痰壅噎塞，胸腹脹痛，心胃痛，困倦，臟上[illegible]
紫蘇葉 桂心 赤茯苓 縮砂仁 甘草
沉香 人參 桔梗 青橘皮
陳橘皮 胡椒
右為末，煉蜜和丸，如彈子大，每服一丸，以生薑鹽湯嚼下。
沉香湯 治脾胃氣不和，心腹疼痛，不能飲食。
沉香 厚朴 桂 [illegible]
白朮 青橘皮 桔梗 五味子
訶子 乾薑 甘草
右搗羅為散，每服二錢，以水一盞，入生薑三片，同煎至六分，去滓，稍熱服。
食前服。
木香丸 治脾胃不和，腹脇脹滿，時有疼痛，不思飲食。
木香一兩 桂心一兩 芍藥一兩 茴香一兩 訶子[illegible]
川大黃 檳榔一兩 乾薑 郁李仁二兩
牽牛子二兩 香橘皮一兩
右為末，煉蜜和丸，五百杵，丸如梧桐子大，每服空心以生薑橘皮湯
下二十丸。
高良薑散 治脾胃不和，飲食減少，腹中虛鳴。
高良薑 陳橘皮 麥糵 肉豆蔻
乾薑 厚朴 五味子 甘草
白朮 吳茱萸
右搗羅為細散，每服二錢，以陳米飲調下。
半夏飲 治脾胃不和，不能飲食，食已即吐逆。
半夏 乾薑 [illegible] 青橘子
陳橘皮 紅豆蔻 木香 草豆蔻
右㕮咀，每服一錢半，以水一盞，煎至七分，去滓，稍熱服，不拘時。
[illegible]
[illegible]泉丸 治脾胃不和，心腹[illegible]，不能飲食，[illegible]吞酸，頭目
昏眩。
牡丹皮 當歸 木香 京三稜
半夏 青橘皮
茯苓 檳榔
右為末，煉蜜和丸，如梧桐子大，每服十五丸，空心食前，生薑
湯送下。
白朮丸 治脾胃不和，不能飲食。
白朮 厚朴 蒼朮 莪朮
青橘皮 附子 甘草 乾薑
右為末，煉蜜和丸，如雞頭實大，每服一丸，空心米飲嚼下。
進食湯 治脾胃不和，不思飲食，虛冷嘔逆。
八味[illegible]散 治脾胃氣虛，不能飲食。
厚朴 [illegible] 吳茱萸
人參 桂 黃芪 陳橘皮
草[illegible]
右搗羅為散，每服二錢，以水一盞，入生薑三片，棗一枚，擘破，
同煎至六分，去滓，空心服。
七寶湯 治脾胃不和，進中[illegible]，胃逆氣冷，不能飲食。
草豆蔻 白茯苓 人參 大腹皮
訶梨勒 半夏 甘草
右搗篩，每服三錢，以水一盞，入生薑三片，大棗二枚，擘破，
同煎至七分，去滓溫服。
沉香湯 治脾胃氣不和，[illegible]滿，不能飲食。
沉香 [illegible]香子 青橘皮 胡椒 蓽澄茄
檳榔 陳橘皮
右粗搗篩，每服三錢，以[illegible]蔥白三寸，擘破，入白[illegible]量[illegible]
[illegible]煎至七分，去滓[illegible]
丁香丸 和脾胃，寬胸膈，消痰，進飲食。
石蓮子 舶上硫黃 白丁香 丁香
木香 使君子 陳皮

右用三棱一兩炮用巴豆五粒同炒三棱色黃為度去巴豆不
用可用藥為細末用糯米煮糊為丸如梧桐子大每服四
十丸空心米飲送下小兒如黍米大每服一百丸見黃為效

見中丸 治脾胃不和不能飲食
白术 厚朴 木香 訶梨勒
肉豆蔻 芎藭
右為末煮棗肉和丸如梧桐子大空心米飲送下三十丸

草豆蔻湯 治脾胃氣冷熱不和進食和氣
草豆蔻 人參 陳橘皮 厚朴
甘草 桂
右為麄末每服三錢匕水一盞入生薑三片同煎至六分去滓
食前溫服

和胃丸 治脾胃冷熱不和不能飲食胸膈痞悶痰嗽吐逆又治氣痢
甘草 高良薑 藿香葉 桂 丁香皮
右為末煉蜜和丸如彈子大每服一丸嚼細生薑湯下空心服

厚朴湯 治脾胃不和化痰氣調中進食又治心下急痛
厚朴 陳橘皮
白术 烏藥 甘草
右搗篩每服二錢匕水一盞入生薑三片大棗二枚擘破同
煎至七分去滓溫服

白豆蔻丸 治脾胃不和不能飲食
白豆蔻 白术 乾薑
右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸生薑湯下空心食前

調中丸 治脾胃不和可嗜噫醋吞酸痞悶不思飲食頭昏
睏小便不利胃脘痞悶腸脇脹
赤茯苓 豬苓 陳皮 白术
澤瀉 黃芩 大黃 桂 枳殼 桔梗
葛根 木通 半夏 滑石 甲
右為細末水煮麵糊為丸如梧桐子大每服三五十丸溫水
送下不拘時候

調中益氣湯 治夫脈弦洪緩而沉按之中之下得時一涩其證四肢
滿悶肢節煩疼難以屈伸身體沉重煩心不安怠惰嗜臥四
肢不收復雖飲食無味大小便清利而數或上飲下便或大便泄瀉不行
一二日一見夏月飧泄米穀不化或便後見血見白膿胸滿短氣膈
咽不通或痰嗽稠粘口中沃沫食入反出耳鳴耳聾目中流火視物
昏花胬肉紅絲熱壅頭目不得安臥嗜臥無力不思飲食
升麻 黃耆 甘草 蒼术
木香 柴胡
人參 橘皮
右件剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去滓帶熱服宿食消盡服
之寧心絕思藥必神效蓋病在四肢血脈空腹在旦是也如時顯熱燥是
下元陰火蒸蒸發也加真生地黃二分黃柏三分如大便虛坐不得或大便了而不
了腹常逼迫血虛血澀也加當歸身如身體沉重雖小便數多亦加茯
苓二分蒼术一錢澤瀉五分黃柏三分時時暫用從權而祛濕也不可常用兼
足太陰已病其脈亦數於手心中皆胃氣不足而生濕熱胃氣不能上行者
宜生薑三片有脾胃生薑生地黃二分以製手足之煩躁非寒
夏不能冷以足太陽經邪所作也一方作足太陰經也已上各另服
黃耆 炙甘草 柴胡 人參 蒼术
橘皮 黃柏
升麻
右件剉如麻豆大依前煎服如冬月加黃柏二分生地黃二分如無
已上證只服一劑如腹中痛加白芍藥三分腹中痛尤宜服如
惡熱而渴或腹痛者更加芍藥半錢生黃芩二分如惡寒腹中痛加中
桂三分去黃芩謂之桂枝芍藥湯亦如之如冬月
腹痛不可用芍藥蓋大寒之藥也只加乾薑三分或加半夏五七
分以生薑少許製之如秋冬之月胃脈四道為衝脈所逆脇下太陽
脈二道而反上行病名曰厥逆其證氣上衝咽不得息而喘息有音
不得卧加吳茱萸半錢或一錢湯洗去苦觀厥氣多少而用之
於前藥中作一服服之如夏月有此證為大熱也此病隨四時為寒熱
溫涼也宜以酒黃連酒黃柏酒知母各等分右為細末

為丸如梧子大每服一百丸或二百丸白湯送下空心不令胃中停
留以美飲食壓之治飲食勞倦損傷之病此營勞七損證也常
宜以甘溫平之甘多辛少是其治也
小獨聖丸 治脾胃不和飲食多傷心腹刺痛嘈雜噁心吞酸
乾噫惡食臭腹脹滿不思飲食
巴豆 硇砂 肉桂 半夏
丁皮 烏梅去核 乾薑 當歸 三稜
右為細末入巴豆研勻以米煮麪糊為丸如麻子大每服三丸至五
丸用溫水下食後服常服化滯氣利胸膈及進消食
人參煮散 治脾胃不和中脘氣滯心腹脹痛不已飲食減少
飲停積不消或因飲冷過度內傷脾氣嘔吐惡逆寒熱往來或時汗出
又治腸胃冷濕泄瀉注下水穀不分腹中雷鳴脇肋虛滿[illegible]
咳四肢逆冷
人參 青皮 甘草 乾薑 芍藥一斤
三稜 丁香皮六兩 茯苓去皮 蒼术去皮
右為末每服二錢水一盞生薑五片棗三箇同煎至七分食前空心
溫服
脾不磨方
脾虛不磨食心胃 腹滿脹氣不化物 但將五膈散三服
可進尋常小理中
傷脾方
病後傷脾胃滿 老人能食氣必壅 更須可食順心氣
草果 中前一枚
右病[illegible]傷脾[illegible]令人[illegible]脹[illegible]中氣[illegible]
[illegible]大麥[illegible]分去實[illegible]
分氣紫蘇飲 治男子婦人脾胃不和胸膈噎塞腹脇疼痛
促喘急心下脹悶飲食可思嘔逆不止
五味子 桑白皮 陳皮 桔梗 草果仁
大腹皮 甘草 茯苓
右㕮咀為麤末秤[illegible]入紫蘇[illegible]

[illegible]每服四錢水一大盞薑錢三片入鹽少許同煎至七分去滓
空心食前常服和胃進食
沉香磨脾散 治脾胃虛寒心腹脹滿嘔逆噁心不思飲食或
吐痰水
沉香 人參 丁香 藿香葉 檀香
甘草 木香 白豆蔻 縮砂 白术
肉桂 烏藥
右㕮咀每服二錢水一盞薑二片鹽一捻煎八分空服 方有半夏
無白术
蟠葱散 治男子婦人脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹連脇肋痛
膀胱小腸腎氣[illegible]及婦人血氣攻刺癥瘕塊硬帶下
赤白[illegible]
宜服之
延胡索 蒼术 甘草 茯苓 蓬术
三稜 青皮 丁皮 縮砂 檳榔
肉桂 乾薑
右為末每服二錢水一盞連根葱白一莖煎至七分空心食前稍熱
服之
進食散 治脾胃虛寒不思飲食或因憂思[illegible]
沖和之氣[illegible]全不進食[illegible]大便溏泄
半夏 肉豆蔻 草果仁 高良薑 麥蘗
附子 丁香 [illegible] 陳皮 人參
青皮 甘草
右㕮咀每服四錢水[illegible]棗子一枚煎至七分去滓溫服
不拘時
治理中湯 [illegible]脾胃不和中寒上衝胸脇逆滿心腹疼痛飲食[illegible]
痰逆嘔吐[illegible]
水穀[illegible]腸胃冷[illegible]水穀不分腹中雷鳴[illegible]
足厥冷[illegible]

蒼朮 生薑 甘草 鹽

右剉碎同頓令一處焙乾碾為末每服一錢沸湯點空心服

棗湯 出御藥院方 治脾胃不和乾嘔惡心腹脇脹滿不美飲食

棗 去核 一斤 生薑 甘草

右件同用瓷器內以布蓋覆一宿焙乾碾為末每服一錢入鹽少許沸湯點服常服建脾胃順氣進食

三倍湯 出御藥院方 治脾胃不和胸膈悶痞飲食不化嘔逆惡心或當臍痛吐心腹刺痛腸鳴泄瀉水穀不分

草豆蔻 甘草 生薑

鹽

右件又入瓷器內淹一宿焙乾為末每服二錢不拘時候

丁香大丸子 出楊氏家藏方 和脾養胃進食降氣快膈

人參 去蘆 丁香 木香 白豆蔻仁 甘草 炙

陳橘皮 乾薑 炮 蓮黃 縮砂仁 神麯 炒

麥糵 炒 蓽澄茄 紫蘇葉 一兩

右件為細末煉蜜為丸每一兩作一十丸每服一丸熱湯化下食前服

丸香養脾丸 出楊氏家藏方 益脾養胃助氣温中進飲食壯津液性和平不燥但是脾胃虛弱鞠疾悉宜服之

丸香 半兩 木香 半兩 縮砂仁 一兩 丁香 白朮

肉豆蔻 人參 甘草 炙 乾薑

右件為細末煉蜜為丸每一兩作十丸每服一丸或二丸細嚼熱水下不拘時候

白朮茯苓丸 治脾胃不和胸膈痞悶心腹脹滿乾嘔噫酸飲食不化腸鳴泄瀉手足厥冷嘔逆痰涎頭目昏運

白朮 赤茯苓 去皮 乾薑 炮 肉桂 去皮 半夏

枳實 肉豆蔻 人參

右為細末用神麴糊為丸如梧桐子大每服五十丸生薑湯下不拘時候

治胃氣不和飲食減少腹脇脹多驗世

船上茴香 [illegible]

右細末 [illegible] 為丸如梧桐子大每服 [illegible] 心米湯下四十丸

助脾氣令人能食

又方 [illegible] 飲之 [illegible] 人 [illegible]

進心 [illegible] 脾胃 [illegible] 紫蘇 [illegible] 飲食

一香養胃丸 [illegible] 治脾胃 [illegible] 心下 [illegible] 不思飲食嘔吐痰逆噫氣吞酸 [illegible] 脾胃 [illegible]

丁香 木香 陳橘皮 [illegible]

甘草 [illegible] 縮砂仁 [illegible]

青橘皮 乾薑 肉豆蔻 [illegible]

右件為細末煉蜜為丸每一兩作十丸每服一丸 [illegible] 細嚼熱 [illegible]

雙棗湯 [illegible] 治脾胃不和胸膈不快飲食減少升降氣滯脹滿 [illegible] 惡心宜服之

香附子 [illegible] 青橘皮 [illegible] 甘草

右件為細末每服二錢棗二枚水一盞煎至七分或入鹽湯點亦得

建脾散 [illegible] 治脾不和心腹痛 [illegible] 心

陳橘皮 [illegible] 高良薑 乾薑 [illegible]

右件為細末每服二錢水一盞生薑三片棗二枚同煎至八分熱服

不拘時候

白豆蔻散 [illegible] 和中 [illegible] 不能 [illegible] 心不思飲

食

丸香 [illegible] 白豆蔻 [illegible] 甘草 [illegible]

木香 人參 白朮 白茯苓

丁香 [illegible]

右件為細末每服一錢 [illegible] 片 [illegible] 七分熱服

又方 [illegible]

丹素 [illegible] 和脾胃進飲食 [illegible] 嘔吐 [illegible]

乾生薑 [illegible] 人參 [illegible]

右件爲細末每服一錢生薑一片[illegible]作片子同棗煎[illegible]不用生
薑只將棗去皮核同和[illegible]丸如梧桐子大每服一百丸[illegible]米
飲送下[illegible]空心食前

香木散[illegible]
木香 人參 白术 [illegible] 草豆蔻仁
陳橘皮 [illegible] 縮砂仁 [illegible] 細辛
神麴 [illegible]
右件爲細末每服三錢水一盞生薑三片[illegible]同煎至七分服
空心

[illegible]散 [illegible] 和胃[illegible]心下[illegible]飲食
草豆蔻仁 白术 白茯苓 [illegible] 高良薑 [illegible]
白豆蔻仁 人參 半夏麴 [illegible] 陳橘皮 [illegible]
木香 [illegible] 丁香
右件爲麤末每服四錢水一盞半烏梅一枚煎至一盞去滓空心食前溫服

[illegible]散 溫脾養胃[illegible]消飲生津[illegible]飲食
下卷 [illegible] 百五
草豆蔻子仁 烏梅肉 黃芪 [illegible] 赤茯苓 [illegible]
陳橘皮 草果 [illegible] 桂 [illegible] 人參 [illegible]
右件各等分每服四錢水一盞半生薑三片同煎至一盞去滓
溫服不拘時候

健中丸 [illegible] 健脾溫胃去停痰進飲食
草豆蔻 [illegible] 白茯苓 [illegible] 吳茱萸 [illegible]
白术 [illegible] 神麴 [illegible] 小麥蘖 [illegible] 乾薑 [illegible]
[illegible] 人參 [illegible] 木香
右件爲細末煎棗肉爲丸如梧桐子大每服十丸至二十丸[illegible]食前

丁香[illegible]丸 [illegible] 嘔吐 [illegible] 進食消痰
丁香 木香 [illegible] 胡椒 [illegible]
半夏 [illegible]
右件爲細末生薑自然汁[illegible]和丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸
[illegible]不拘時候

[illegible]丸 [illegible] 大[illegible]不[illegible]
[illegible]

[illegible]和大[illegible]
[illegible]
[illegible]脾[illegible]上[illegible]和中[illegible]
[illegible]補[illegible]進食[illegible]
[illegible] 附子 [illegible] 陽起石 [illegible] 川烏 [illegible]
丁香 [illegible] 肉豆蔻 [illegible] [illegible]茯苓 [illegible]
鹿茸 [illegible] 川芎 [illegible] 鍾乳粉 [illegible]
右爲細末[illegible]
[illegible]子大每服七十丸空心食[illegible]

快中湯 [illegible] 健脾進食
枳[illegible] [illegible] 粉草 [illegible] 縮砂仁
白术 [illegible]
右爲細末鹽點服

健脾散 [illegible] 消食化氣[illegible]進食[illegible]
下卷 [illegible] 百六
生薑 [illegible] 神麴 [illegible] 麥蘖 [illegible] 陳皮 [illegible]
草果仁 [illegible]
右爲末[illegible]

草豆蔻散 [illegible] 脾胃氣不和霍亂吐瀉[illegible]
一切冷氣
乾薑 [illegible] 白术 [illegible] 甘草 [illegible]
陳橘皮 [illegible] 草豆蔻 [illegible] 草果 [illegible]
右爲八味[illegible]
[illegible]

肉豆蔻散 [illegible] 脾胃[illegible]
白豆蔻 [illegible]
橘皮 [illegible] [illegible]桂
右件六味作爲末每服一錢水一中盞[illegible]
[illegible]去皮核細切[illegible]
入水[illegible]

七傷散 食未進食
人參 白朮 黃芪 白茯苓
乾長 甘草
右爲細末每服二錢水一盞煎至七分如大故不思飲食
白扁豆 小米用
得重之後用此調脾胃一日服十日外飲食倍常
益土散 治脾土虛背小無味嘔吐瀉腹痛腹脹有泄瀉
香宜服之
白朮 丁香 人參
乾薑 草果
縮砂 甘草
右爲細末每服二錢米湯調服日空心二服或用伏龍肝煎湯服
此方係 有效
五補散 五臟虛補不服脾土實而飲食自進病愈下主藥而
平傳平備下藥

醫方 卷之中 下之

製厚朴 陳皮 前胡 丁香皮 益智仁
縮砂仁 神麴 甘草炙 乾薑 桔梗
肉桂 木香
右爲細末薑湯調下一日三服或用薑三片煎少許煎服亦得
香朴湯 治脾胃不和不思飲食
生薑 棗肉
陳皮 縮砂仁 乾薑 草菓仁
甘草 白朮 訶子 肉桂
右爲麤末每服加陳皮水一盞煎空心服三服入
許學士 平胃 和中進飲食
養脾散
甘草 草菓子 生薑
右四味生薑切作片同煎
細末每服二錢
和中散 健脾進飲食健四肢

人參 白茯苓 白朮 甘草
白扁豆 蓮肉 藿香葉
縮砂仁 半夏 木香
右爲細末每服二大錢水一盞薑五片棗一枚去核同煎至七分稍熱
服不計時候
倍朮丸 治脾胃虛寒嘔吐泄瀉除心腹痛進飲食
人參 甘草 乾薑 白朮
右爲末煉蜜丸如梧桐子大空心食前米飲下三百丸
和中丸 治脾胃不和宿食不消心腹脹滿
良薑 烏梅肉 白茯苓 甘草 蒼朮
乾薑 神麴 小麥蘖 前胡
右爲細末煉蜜丸如彈子大每服一丸米湯嚼下
香建中湯 和脾胃進飲食
厚朴 半夏 京棗 甘草 丁香
生薑
右件爲麤末每服二錢生薑三片棗一枚水一盞
半煎至七分去滓溫服不計時
君子湯 治大人小兒脾胃不和中脘停飲大病之後宜服此
藥 性味甘温扶脾土常服宜食甘草
人參 茯苓 白朮 甘草
右㕮咀每服四錢水一盞生薑三片棗一枚煎至六分去滓不以時候服
一方加桔梗 名 切痰 宜病後調理
加官桂 名 一方去甘草
加枳殼 名 一方去人參
去 加 大宜服之
分各加味四柱散
脾泄 小便
用 一方加黃芪
肉下 百 病後調理
細末服 佳此方 服 煎服

醫方 卷之中 下之

安脾散 進食益氣方 [illegible] 八

陳橘皮 人參 [illegible] 丁香 肉豆蔻 甘草

枇杷葉 [illegible] 藿香 各一

右細剉爲末每服一錢水一盞煎取八分空心頓服

治脾胃不和中焦逆滿 [illegible] 氣不宣飲食無味多困少力 [illegible]

藿香 枇杷葉 [illegible] 木香 青橘皮 甘橘皮

甘草 桔梗 [illegible] 半夏 茯苓 各一

右細剉爲末每服一錢水 [illegible] 食前服

治中丸 [illegible] 溫中和氣消食益脾胃進飲食

白朮 [illegible] 茯苓 [illegible] 陳皮 [illegible] 乾薑 炮 良薑 炒

青皮 [illegible]

右等分爲細末湯浸蒸餅和丸如梧桐子大每服三五十丸 [illegible]

養胃丹 [illegible] 全不思食中脘停寒嘔逆惡心腹痛泄瀉

胸膈痞悶嘔噦 [illegible] 中 [illegible] 痰飲思食

[illegible] 丁香 [illegible]

丁香 一兩 白豆蔻 [illegible] 人參 三分 甘草 [illegible]

乾薑 [illegible] 半夏 [illegible]

右件爲細末煉蜜爲丸每兩作十丸每服一丸 [illegible] 化下空心食前

服之 [illegible] 可 [illegible] 不以多少 [illegible] 乾嘔

[illegible] 爲丸 [illegible] 作 [illegible] 丸用 [illegible]

[illegible] 治脾 [illegible] 四肢無力大便 [illegible] 小便

數或大便 [illegible] 飲食 [illegible] 作 [illegible] 之當以和

中 [illegible] 丸

大棗 [illegible] 甘草 [illegible]

右 [illegible] 水二大盞生薑三片大棗一 [illegible] 煎至一大盞去

滓溫服食前 [illegible] 利爲妙

以健脾散 [illegible] 進食 [illegible]

人參 白朮 [illegible] 乾薑 [illegible] 甘草 [illegible]

[illegible]

右爲細末入鹽 [illegible]

人參豆蔻湯 [illegible] 不思飲食

白豆蔻 [illegible] 縮砂 [illegible] 人參 白朮 甘草 [illegible] 一

川芎 [illegible] 山藥 二兩 縮砂 [illegible] 二分

右爲細末每服二錢水一盞鹽一 [illegible] 生薑三片棗一枚煎至六分去滓

或和滓溫 [illegible] 服入鹽點亦得不計時候

參苓散 [illegible] 治脾胃不 [illegible] 飲食 [illegible]

大麥芽 [illegible] 兩 甘草 [illegible] 兩

右爲細末每服二錢水一盞煎 [illegible] 七分去滓溫服非時

[illegible] 治脾胃不和三焦 [illegible] 嘔吐

[illegible] 無味 [illegible] 飲酒過傷全不思食常服 [illegible]

大益脾丹

白朮 人參 乾薑 炮 各一 青皮 陳皮 各半兩

甘草 [illegible] 兩

右爲細末每服一錢沸湯點服不以時

[illegible] 去大含 [illegible] 不知 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 左右 [illegible] 前後 [illegible] 手如是 [illegible]

[illegible] 身心 [illegible]

白朮散 治 [illegible] 胃氣虛弱 [illegible] 有痰惡心吐是風邪

脾胃之間當先實其脾 [illegible]

白朮 [illegible] 炒麯 [illegible] 麥芽 [illegible]

右 [illegible] 每服 [illegible] 水二大盞入生薑五片煎如常法

脾胃氣虛弱不能飲食 附論

夫脾胃者 [illegible]

[illegible]

木香丸 治脾胃氣虛 [illegible] 進飲食

木香 [illegible] 縮砂 [illegible] 青橘皮 [illegible]

紅豆 [illegible] 蓬莪朮 [illegible] 高良薑 [illegible] 丁香 [illegible]

陳橘皮 桔梗 益智
五味子 桂心 前胡 川芎
右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服十五丸加至二十丸生薑湯
下如湯水多許服亦得
木香散治脾胃氣虛不思飲食精神少快上氣頭眩身心昏悶口
舌乾燥四肢無力
木香 人參 白茯苓 當歸 白芍藥
桂心 麥門冬 遠志 五味子 京三稜
白朮 訶梨勒 厚朴
陳橘皮
右件藥搗羅爲散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至
六分去滓不計時候溫服忌生冷油膩
沉香陳麯丸治脾胃氣虛食少無力
沉香 陳麯 檳榔 半夏
陳橘皮 人參 木香 草豆蔻 訶梨勒皮

太平聖惠方卷之十 丁十一

厚朴 白朮 丁香 草豆蔻
右爲末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸米飲下空心食前服之
藿香散治脾胃氣虛弱四肢少力肌體羸瘦不欲飲食
藿香 甘草 厚朴 乾薑
桂 白朮 熟乾地黃 人參 當歸
白茯苓 附子 陳橘皮
右藥搗羅每服五錢以水一盞半入生薑三片棗二枚擘破同煎至
八分去滓溫服不計時候一方忌生冷油膩大肉
人參茯苓湯治脾胃氣弱不思飲食日漸黃瘦
人參 白茯苓 益智 桔梗 前胡
旋覆花 木香 甘草 枇杷葉 前胡
陳橘皮 大腹皮
右藥搗篩每服五錢以水二盞入生薑三片棗二枚擘破同煎至一
盞去滓空心夜臥各一服
藿香散補脾胃止吐逆利胸膈治心腹刺痛進飲食

藿香 白茯苓 青橘皮 細辛
益智 縮砂 甘草 陳橘皮
人參 木香 白芷
右藥搗篩每服三錢水一盞入生薑木瓜各一片同煎至六分去滓稍
熱服不拘時候
丁香散治脾胃虛弱并婦人脾血久冷
桂 高良薑 草豆蔻 甘草 白朮
縮砂仁 厚朴 生薑 棗肉
青橘皮 訶梨勒
右搗羅爲散每服二錢匕入鹽少許沸湯點空心服此藥兼治腹痛
及冷氣心腹痛或不得吐瀉只是血脾氣弱將理不可知
豆蔻散治脾胃氣虛弱不能飲食
白豆蔻仁 桂 木香 人參
京三稜 陳橘皮 丈麥蘗 乾薑 甘草
右搗羅爲細散每服二錢匕入生薑三片鹽少許用沸湯點服食前

太平聖惠方卷之十 丁十二

厚朴散治脾胃氣虛弱不能飲食食後腹脹四肢不和
厚朴 人參 桂心 白朮
陳橘皮 甘草 半夏
丁香 紅豆蔻
右件藥搗篩爲散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至
六分去滓不計時候稍熱服忌生冷油膩黏滑
紅豆蔻散治脾胃氣虛弱不能飲食食即妨悶四肢少力疲痛
紅豆蔻 白朮 桂
當歸 厚朴 訶梨勒 陳橘皮 黃耆 人參
右藥搗篩每服二錢以水一盞入生薑半分棗二枚擘破同煎至
六分去滓不計時候稍熱服忌生冷油膩黏滑
藿香湯治脾胃氣虛弱進食
藿香 七枚 人參 白茯苓 白朮
陳橘皮 桔梗 厚朴
桂

右麁搗篩每服五錢匕水一盞共入生薑三片棗二枚擘破同煎至
八分去滓溫服空心
人參散 治脾胃氣虛弱不思飲食背心常冷四肢不和
人參 白朮 厚朴 高良薑
川烏頭 桂心
右件藥搗篩爲散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎至六分去滓
不計時候稍熱服
沉香散 治脾胃氣虛弱不能食飲即嘔心腹脹痛
沉香 人參 陳橘皮 紅豆蔻
白朮 桂心
右件藥搗羅爲散每服二錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎
至六分去滓不計時候稍熱服
白朮丸 治脾胃氣虛弱不能飲食肌膚瘦瘁面色萎黃
白朮 陳麯 陳橘皮 人參
蓽撥 乾薑
右羅爲末煉蜜和丸如梧桐子大每服以粥飲下三十丸不計時候

[illegible]

白朮丸 治脾胃虛冷心腹疼吐水不多能食少心力劣
白朮 乾薑 人參 厚朴 桂心
細辛 茯苓 當歸 茯神 枳實
五味子 附子 吳茱萸 遠志 旋覆花
澤瀉
右搗篩蜜和爲丸如梧子大每服二十丸日再服加至三十五丸忌
桃李雀肉大酢生葱菜羹豬肉冷水
主胃氣虛冷食則吐逆從朝至夜不得食食入腹則脹氣滿急大便出
飯粒如故帶臟氣而[illegible]方
吳茱萸 白朮 人參 乾薑 甘草
五味子 麴末 麥蘖末 厚朴
桂心
右搗篩爲散空腹煮生薑湯服方寸匕日二服漸加至二匕忌生
葱桃李雀肉酢滑冷物

[illegible]大[illegible]脾虛[illegible]惡心吐逆不思飲食泄瀉等疾
人參 丁香 甘草 白茯苓 白朮
木香 肉豆蔻 山藥 白豆蔻
縮砂
右爲細末煉蜜丸如彈子大食前白湯下一丸小兒尤宜服一方無
白豆蔻
延年人參飲 主虛客熱不能食惡心
人參 麥門冬 橘皮 白朮 厚朴
茯苓 生薑 甘草
右切以水八升分爲三服日三忌海藻菘菜桃李雀肉
厚朴湯 療不能食腹內冷氣
厚朴 白朮 人參 茯苓 生薑
橘皮
右件切以水四升煮取一升二合分爲三服忌食桃李雀肉酢物
[illegible]煎丸 [illegible]補胃不知補脾脾胃氣壯則能飲食飲食既進能生
榮衛榮衛既壯滋養骨髓保[illegible]精血是以[illegible]有[illegible]損不足補之以味行不
足補之以氣此藥大補[illegible]化痰進飲食
神麯 厚朴 川薑 附子 川椒
舶上茴香
右件厚朴等爲細末用棗肉爲丸如棗肉不合却用麵清糊少許
丸如梧桐子大每服五六十丸空心米湯下以[illegible]千百粒後丸此
藥溫中降氣化痰進食健胃速効一方有破故紙無川椒
又方
麴 麥蘖 豉 杏仁
右件爲末令勻搗篩丸如彈大服一粒後稍增之
又方
薑 茱萸
鹽
右以搗篩和如彈丸日三服一方無鹽爲末服

又方
白朮 四兩
右爲散食後溫水調下方寸匕服三十九日三服久久可加至三兩
若患腹痛加當歸一兩羸弱加甘草二兩痢者加厚朴以麴末法蜜
陰後心下停水消渴利之
草豆蔲散 治脾虛冷不思飲食
草豆蔲 一兩 青橘皮 半兩 高良薑 訶梨勒皮 半兩
白朮 半兩 甘草 炙
右搗羅爲散每服二錢匕食前米飲調下日三
參丸 治脾胃虛弱不能飲食心腹刺痛腹脹
人參 白朮 甘草 炙 山芋 各一兩
附子
右爲末煉蜜和丸如梧子大每服一丸水一盞入棗二枚擘破同煎
至六分溫服或嚼破用棗湯下不計時
白豆蔲散 治脾胃氣虛弱不進飲食
醫方類聚卷之一百 十五
白豆蔲仁 白朮 陳橘皮
甘草 炙
右搗羅爲散每服二錢匕入鹽少許沸湯點服食前
人參散 治脾胃氣弱不進飲食
人參 白茯苓 去皮 山芋 白朮 各一兩 甘草 炙
右搗羅爲散每服三錢匕水一盞入生薑三片棗二枚擘破同煎至七
分去滓食前溫服如見嘔逆未疾乳食不進者用藥末一錢匕水一中盞
入生薑棗同煎至四分去滓放溫時時與二服
烏朮丸 治脾胃虛弱及積冷氣飲食減少腹內諸疾久服補脾
暖壯氣進食去濕
草烏頭 蒼朮 陳橘皮 甘草 黑豆
右五味用水一石煮乾爲度去却橘皮黑豆甘草只取草烏頭蒼朮
二味日乾爲細末酒煮麪糊丸如梧桐子大焙乾取
每服空心晚食前溫酒或鹽湯下三十丸
[illegible]勝散 治脾氣虛弱不思飲食

白朮 甘草 乾薑
右搗羅爲散每服二錢匕入鹽少許沸湯點服不拘時候
草豆蔲散 治脾胃氣弱不能飲食
草豆蔲 高良薑 半夏
右件藥剉如麻豆以水一中盞煎取六分入生薑汁及白麪
四兩和作餺飥以肉汁內煮令熟空腹食之
生薑散 治脾胃虛弱不能飲食
生薑 白麪 人參 末
右件藥用銀鍋子以新汲水令熟以慢火煎成膏每服不計時候
山芋丸 治脾胃虛弱不進飲食
山芋 白朮 人參
右爲細末煮白麪糊爲丸如小豆大每服三十丸空心食前米飲下
腎氣散 治脾胃氣弱不能飲食及飲食不消
生薑 生地黃
右以慢火煎如稀餳每服半匙溫酒化服空心晚食前各一
醫方類聚卷之一百 十六
千金豆蔲散 治脾胃氣虛不思飲食吐逆
調中丸 治脾胃虛弱不進飲食
草豆蔲 生薑
右先入鍋內搗大棗取肉去皮核同爲細末每服一匙入鹽少許
兩乾薑四兩同爲細末麪糊丸如梧桐子大每服三五
十丸空心米飲下加附子二兩炮去皮臍
藍白 治脾胃中虛冷不能飲食久病不食羸瘦四肢沉重百病因此而生
藍白 枳實 大棗 陳皮
右以水七升煮取五升內諸藥煮取二升半分三服差止
又方
豉心 蘗米 麪 乾薑
右搗篩以蜜丸如梧子大食後服之方寸匕
又方
麴 麥蘗 杏人
右搗篩爲末以蜜和丸如梧子大一枚漸增之食後服
大黃 芍藥 芒硝

右以蜜三斤於銅器中[illegible]可丸如梧子大每服七丸至十丸日再服

治脾胃氣微不能下食五內中冷時微下痢

乾薑[illegible] [illegible]

[illegible]二十丸日二服漸加至三十

[illegible]

[illegible]或不服食穀不消皆可

[illegible]

右搗篩食[illegible]飲服[illegible]

[illegible]

陳橘皮[illegible] 白朮[illegible] 白豆蔻[illegible]

右為末煉蜜和搗可丸如梧桐子大不計時以粥飲下三十丸忌生冷

豆蔻丸 治脾胃虛冷腹脹[illegible]逆不思飲食腸鳴乃痛大便滑泄

人參 木香[illegible] 乾木瓜[illegible] 訶黎勒皮[illegible]

肉豆蔻[illegible] 白朮 高良薑 陳橘皮[illegible]

木香 甘草[illegible] 白茯苓[illegible]

右搗羅為散每服三錢水一盞煎至七分去滓食前服空腹日二服

進食散 治脾胃虛冷不思飲食及久病人脾虛全不食者只一二服便能食

青橘皮[illegible] 陳橘皮[illegible] 高良薑[illegible] 肉桂[illegible] 甘草[illegible]

草豆蔻[illegible] 川烏頭[illegible] 訶子[illegible]

右為細末每服二錢水一大盞生薑五片煎至七分食前服

厚朴煎散 治脾胃虛冷腸滑泄瀉腹多脹滿嘔逆不思飲食羸瘦

厚朴[illegible] 高良薑 白朮 乾木瓜[illegible]

人參 白茯苓[illegible] 肉豆蔻[illegible]

甘草[illegible] 乾薑[illegible] 草豆蔻[illegible]

右件藥為散每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服空腹日三

[illegible]丸 治脾胃虛冷中寒腹痛不進飲食及心腹痛

吳茱萸[illegible] 陳皮[illegible] 青鹽[illegible]

大棗[illegible] 生薑[illegible]

右以水二升[illegible]大棗令[illegible]焙乾為細末別用

棗肉丸如梧桐子大每服五十丸空心食前

異功散 治脾胃虛冷腸鳴腹痛自利不思飲食

人參 茯苓 白朮 甘草[illegible] 陳皮[illegible]

右為散每服五錢水二大盞生薑三片棗二枚同煎至一[illegible]去滓食前

溫服[illegible]

[illegible] 治脾胃氣弱不能飲食倦怠無力

用神麴[illegible]細切[illegible]作[illegible]之為[illegible]麴乾薑[illegible]羅橘皮

治脾胃虛冷不入口即吐出

用羊肉半斤去脂膜作生以蒜薤五味調和空腹食

治脾胃虛冷不下食積久羸弱成瘵者

用溫州白乾薑一物漿水煮令透心潤濕取出焙乾搗篩陳倉米煮

粥飲丸如梧桐子大每服三五十丸為使任用其效

[illegible]脾散 治脾胃虛弱久患積冷心氣脾痛冷痰翻胃

吐逆惡心不思飲食及婦人血氣攻刺腹脇撮痛服之

[illegible] 乾薑[illegible] 良薑[illegible] 甘草[illegible]

右為末每服六錢[illegible]一盞白鹽點[illegible]不拘時

補脾丸 治脾[illegible]中[illegible]不[illegible]一挽痛泄痢不時不思飲食

[illegible]瘦[illegible]肉[illegible]

丁香 人參 胡椒 木香 茴香[illegible]

肉桂[illegible] 乾薑[illegible] 附子[illegible] 縮砂仁[illegible]

神麴[illegible] 大麥蘗[illegible] 木瓜[illegible] 甘草[illegible] 烏梅[illegible]

白朮[illegible]

右件為細末煉蜜為丸每一兩作十丸每服十丸細嚼米飲送下食前

丁香脾丸 治脾胃久虛，不進飲食，胸膈痞悶，腹脇脹滿，嘔吐不止，倦怠嗜臥，及大病之後，氣血虛羸，宜服之。
人參 白朮 附子 蓽撥 紅豆
胡椒 訶子 縮砂仁 白豆蔻 肉豆蔻
白茯苓 丁香 乾薑 肉桂
甘草 厚朴
右件為細末，煉蜜為丸，每一兩作一十丸，每服一丸，白湯化下，或水
一盞煎至七分，空心食前服。
沉香丸 治脾胃虛弱，食久不化，胸膈痞悶，腹脇脹滿，噫醋吞酸，惡心嘔逆，四肢倦怠，心腹疼痛，飲食減少，世為無度，大能補益脾胃，脹
氣，消穀為最。壹性熟飲食易傷，最宜服之。
沉香 木香 青橘皮 草豆蔻 川椒
肉桂 白豆蔻仁 縮砂仁 香附子 白朮
陳橘皮 乾薑 高良薑 小蓽澄茄
半夏 京三稜 蓬莪朮 厚朴
吳茱萸
右件為細末，用神麯末一斤，生薑汁作糊為丸，如梧桐子大，每服五
十丸，生薑湯下，不拘時候。
壯脾丸 治脾胃久弱，中焦停飲，腹內虛鳴，或多泄痢，心腹脹滿，飲
食不入，精神昏倦，臥不安，並宜服之。
丁香 附子 訶子肉 蓽撥
白朮 白茯苓 肉豆蔻 人參
乾薑 蓽澄茄 烏頭 陳橘皮 沉香
麥糵 神麯
熟艾 縮砂仁 甘草
右件為細末，棗肉為丸，如梧桐子大，每服五十丸，空心食前，米飲
送下。
高良薑丸 治脾胃虛弱，中脘停飲，心腹作痛，世不思飲食
高良薑 乾薑 肉桂 人參 白朮
甘草 丁香 蓽澄茄 縮砂仁

肉豆蔻
右件為細末，煉蜜為丸，每兩作十丸，每服一丸，生薑湯化下，食
前。
消穀丸 治脾胃氣弱，飲食多傷，心腹痞悶，不思飲食
肉豆蔻 檳榔 神麯 青橘皮
京三稜 陳橘皮 麥糵 木香
右件為細末，用麪煮糊為丸，如梧桐子大，每服五十丸，橘皮湯下
食後。
快脾飲子 治脾胃虛，中脘停寒，不進飲食，四肢無力
草果仁 人參 白朮 陳橘皮
半夏 厚朴 甘草 烏梅肉
縮砂仁 附子
右件㕮咀，每服五錢，水一盞半，生薑十片，大棗二枚，煎至八分，去滓，
溫服，食前。
養神丸 治脾胃氣弱，飲食不消，胸膈痞悶，嘔逆惡心，脇肋脹滿，
及腹痛泄利，不思飲食，氣衰。
神麯 麥糵 陳橘皮 縮砂仁
丁香皮 甘草
右件為細末，煮麪糊為丸，如梧桐子大，每服五十丸，溫米飲送下，不
拘時候。
人參散 治脾胃虛弱，不思飲食，肢體倦怠
人參 白朮 大麥糵 陳橘皮 五味子
白茯苓 黃耆 附子 木香 肉桂
甘草
右件為麄末，每服五錢，水一盞，生薑五片，棗二枚，煎至一盞，去滓，
食前溫服。
消積丸 治脾胃虛弱，飲食過傷，五積六聚，氣塊疼痛
沉香 檳榔 京三稜 蓬莪朮
烏梅肉
右除京三稜、蓬莪朮二味外，用陳醋一升，將二味煮乾，為末，入丸

下右等分爲細末一兩用肥皂十五枚去皮心膜細研以竹瀝
瓷盞文武火熬成膏與前件藥末一兩再研勻搜和爲丸如桐子
大每服十丸溫酒或薑湯下食後
蓽澄茄丸 治脾虛胃弱氣滯不行心腹疼痛飲食不消腸虛脹
不思飲食面色萎黃臟腑滑泄不計年
蓽澄茄 白豆蔻仁 人參 青皮 甘草
丁香 木香 縮砂仁 肉豆蔻
安息香
右件除安息香外並爲細末以入煉蜜并安息香和丸每一兩作一十
五丸每服一丸細嚼橘皮湯或木香湯下食前
木香橘皮丸 治脾胃虛弱飲食所傷久不消化或吐或瀉氣不
升降常服消痰和脾進食
木香 丁香 陳橘皮 青橘皮 白茯苓
京三稜 蓬莪朮 烏梅 官桂 縮砂仁
右件爲細末醋煮麪糊爲丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸食
後用熟水或米飲任下
茯苓半夏湯 治胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐風邪羈絆於脾胃
之間當先實其脾胃
白朮 茯苓 半夏 炒麴 大麥蘖
陳皮 天麻
右件㕮咀每服半兩水二大盞生薑五片煎至一盞去滓稍熱服食
前
白朮湯 治胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐此是風邪羈絆於脾胃之間
當先實其脾胃
白朮 白茯苓 半夏 炒麴
大麥蘖
右㕮咀每服半兩水二盞入生薑五片同煎至一盞去滓稍熱服之
麴蘖丸 治脾胃虛弱不能食心腹脹滿食少多傷思惡心急
寒痞悶口淡無味舌乾咽燥或心下疼痛煩渴喜飲食已則吐腸鳴飧泄
常服益脾暖胃消穀進食

小麥蘖 神麴 烏梅 乾薑
右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服一丸細嚼米飲下不以時一方有
甘草半兩
脾寒證狀是脾虛 [illegible] 分搗作半圓子以爲散爲水爲丸病必
除脹服之病皆由脾胃虛寒其唯因中虛冷或時膨脹最是也可用
楊氏家藏方有服丸法用木香 [illegible] 加丁香五粒
分兩米爲丸每服十粒煎嚼橘皮湯下空心食前服之
固真脾腎丸 治脾元不足飲食無味臟腑滑泄腸鳴腰痛
肉豆蔻 蒼朮 良薑 茴香 破故紙
胡盧巴 乾薑
右爲末糯米糊丸如梧桐子大米飲下三十丸
參苓進食丸 治脾胃虛弱心腹脹滿面色萎黃肌肉消瘦怠惰嗜
臥全不思飲食常服和脾胃進美飲食消痰逆寬中益氣
人參 甘草 白茯苓 白朮 神麴
厚朴 陳皮 大麥蘖
蒼朮
右件九味爲細末水煮麪糊和丸如梧桐子大每服三十丸至五十
丸食前溫生薑湯送下或粥飲下亦得
草豆蔻散 治脾寒後脾胃不和痰逆不思飲食四肢虛麻
草豆蔻 桂心 藿香 白朮 人參
良薑 半夏 甘草 陳橘皮
右件搗篩爲散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去
滓不計時候稍熱服
生地黃煎 治腹中虛冷不能飲食食輒不消羸瘦致之四肢尫弱百疾因此牙
生地黃十斤搗絞取汁 好麴二斤以日曬乾更和以汁盡止未食
後服半合日三稍增至三合
建脾 [illegible] 脾胃不足之氣令人能食
以汲搗 [illegible] 五味煮取十 [illegible]
又方

右件㕮咀，每服……水一大盞……去滓熱……

……

……服之……再服，其驗甚速。

脾胃氣虛弱嘔吐不下食（附論）

夫脾為倉廩之官，胃為水穀之海。胃主司納，脾主運化，穀食入胃，其氣……若脾胃有傷，則不能化穀……故令嘔吐而不下食，宜去宜調補之。

方

……治脾胃不足，虛多嘔逆，不思飲食……為主，蓋而……脾實……

天南星　粟米　丁香　木香

神麴　麥糵　陳皮　防風

白朮　谷糵　砂仁　白豆蔻仁　青皮

半夏麴　人參　沉香　甘草　三棱

右為細末，水浸蒸餅為丸，如梧桐子大，每服七十丸，溫生薑湯送下，不拘時候。一方無三棱，各生用。

〔丁〕中散　治脾胃氣虛弱，嘔吐不下食，脹膈痞悶，積聚不消。

白朮　白豆蔻　人參　白朮　乾薑

桂　高良薑　丹參　大腹皮　檳榔

吳茱萸　陳橘皮　厚朴

桔梗　乾木瓜　炙……　草豆蔻

右各等分，搗羅為末，每服二錢，以生薑湯調下。

〔蓽〕澄茄散　治脾胃虛冷，不思飲食，胸中氣滿，四肢不和，食即嘔吐。

蓽澄茄　白豆蔻　丁香　沉香　木香

高良薑　桂心　白朮　人參　乾薑

陳橘皮

訶梨勒

右件搗羅為散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，棗三枚，煎至六分，去滓，不計時候溫服。

〔草〕豆蔻散　治脾胃氣虛弱，嘔吐不下食，腹脹少力，面無顏色。

草豆蔻　半夏　肉桂　人參

木香　前胡　高良薑　白茯苓　附子

陳橘皮　厚朴　白朮

甘草

右件藥搗篩為散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，棗三枚，煎至六分，去滓，不計時候稍熱服。

〔丁〕香散　治脾胃氣虛弱，食即嘔吐，四肢不和，心腹妨悶。

丁香　訶梨勒　附子

藿香　草豆蔻　蓽撥　陳橘皮

人參　白茯苓　桂心　白朮　甘草

高良薑

右件藥搗羅為末，煉蜜和搗三二百杵，丸如梧桐子大，不計時候以……

〔白〕朮藿香湯　治脾胃氣虛，嘔吐不下食。

白朮　藿香　丁香　人參

半夏　陳橘皮　厚朴

甘草　枇杷葉　前胡

右件藥搗篩，每服三錢，以水一盞，入生薑三片，同煎至七分，去滓，空心食前服，日三。

〔白〕豆蔻湯　治脾胃氣虛弱，嘔吐不下食。

白豆蔻　人參　白朮　厚朴

陳橘皮　藿香　白茯苓

丁香　甘草　白檀香　乾薑

右藥搗篩，每服三錢，以水一盞，入生薑三片，大棗二枚擘破，煎至七分，去滓，稍熱服。

橘皮丸 治脾胃冷氣痰飲不消下氣寬中
枳殼 麥門冬 白朮 人參
茯苓 厚朴 陳橘皮
枳殼 乾薑 甘草 桂
右爲末煉蜜和丸如梧桐子大空心溫酒下十五丸加至二十丸
治脾胃氣虛弱嘔吐不下食四肢無力宜服此方
人參 白朮 五味子 厚朴
黃耆 桂心 甘草 半夏
白茯苓 陳橘皮
右件藥搗篩爲散每服三錢以水一中盞入生姜半分棗二枚
煎至六分去滓不計時候稍熱服
白朮散 治脾胃氣弱留飲停積飲食不化嘔吐不止
白朮 附子 陳橘皮 人參
桂 芍藥 枇杷葉 白茅根 蘆根
枳殼

右剉如麻豆每服三錢以水一盞煎至七分去滓不計時候溫服之
草豆蔻丸 治脾胃虛冷嘔逆心腹脹滿面色青黃
白豆蔻丸 治脾胃氣虛弱胸膈氣滯嘔逆不下食
白豆蔻 乾薑 枳實
半夏 訶梨勒 木香 桂
白朮 細辛
右爲末以酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服二十丸不計時候溫米
飲下 一方用此厚朴爲下
厚朴湯
厚朴 人參 陳皮 甘草
右爲散每服三錢用水一盞半生姜十五片煎至六分去滓下前丸藥
蓽撥丸 治脾胃氣虛弱嘔逆痰飲或時嘔吐不能飲食
蓽撥 胡椒 檳榔 訶梨勒
白茯苓 肉桂 人參 乾薑
陳橘皮

右件藥搗羅爲末煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以
生姜湯下二十丸忌生冷
白茯苓散 治脾胃氣虛致心中痰飲不欲飲食
茯苓 陳橘皮 人參 白朮
五味子 草豆蔻 半夏 甘草
右件藥搗篩爲散每服三錢以水一中盞入生姜半分棗三枚煎
至六分去滓不計時候稍熱服
白朮散 治脾胃虛弱嘔吐不能食四肢少力心腹妨悶
白朮 人參 枳殼 桂心
陳橘皮 厚朴 訶梨勒
白豆蔻
右件藥搗羅爲麤散每服三錢水一中盞入生姜半分棗三枚煎至
六分去滓不計時候稍熱服
枇杷葉散 治脾胃氣虛嘔逆不下食止逆進食
枇杷葉 厚朴 前胡
白朮 人參 陳橘皮
半夏
右爲搗篩每服三錢以水一盞入生姜五片煎至六分去滓食後溫服
半夏丸 治脾胃氣虛嘔吐不下食進食消痰
半夏 肉豆蔻 檳榔 青橘皮
丁香 木香 丁香 麝香
右爲末蒸餅和丸如梧桐子大以丹砂爲衣陰乾每服
生姜湯下三五丸
人參湯 治脾胃氣逆嘔吐不止心下痞悶
人參 半夏 甘草 白茅根
白茯苓 竹茹 陳橘皮 麥門冬
右搗篩每服五錢以水一盞半生姜五片煎至八分去滓溫服之
藿香湯 治脾胃氣弱不能飲食
藿香 粳米 大棗 陳橘皮
枳實 生姜

右件並細剉，以水一大盞半，煎至八分，去滓，不計時候稍熱分為
二服
藿香湯 治脾胃氣虛弱，嘔吐不下食
藿香葉 厚朴 青橘皮
甘草 [illegible] 乾薑 [illegible] 棗
右件擣篩為散，每服三錢，以水一盞，入生薑一片，棗一枚，擘破，同煎至七分
去滓，食前溫服
藿香半夏湯 治脾胃氣虛弱，嘔吐不下食
半夏 青木香 草豆蔻 甘草
陳橘皮 白茯苓 人參
右件藥擣篩，每服三錢，以水一盞，入生薑三片，大棗二枚，擘破，同煎至七
分，去滓，不計時候
京三稜丸 治脾胃氣虛弱，嘔吐不下食
京三稜 [illegible] 藿香 [illegible] 陳橘皮
[illegible] 人參 [illegible]
右為末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服十五丸，食前用生薑湯送下
人參半夏湯 治脾胃氣虛，嘔逆不下食
人參 白朮 丁香 枇杷葉
[illegible] 甘草
右為粗散，每服三錢，以水一盞，入粳米一合，同煎至七分，溫服
半夏散 治脾胃氣虛弱，見食嘔出
半夏 紅豆蔻 茅香花 人參
陳橘皮 白朮
右件擣羅為散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，棗三枚
煎至六分，去滓，不計時候稍熱服
人參 [illegible] 治脾胃氣虛弱 [illegible]
人參散子 治脾胃氣虛弱，食即嘔止
人參 甘草 陳橘皮 雞白
生薑

右件藥細剉，以水一大盞，煎取[illegible]，去滓，不計時候，稍熱分為
二服
調中丸 治脾胃[illegible]
青皮 紅皮 大黃 [illegible]
右為細末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服二十丸，溫水下，空心食前服
丁香附子散 治脾胃虛[illegible]
附子 丁香 生薑
右用附子[illegible]，以丁香[illegible]，將生薑[illegible]，用文武火煨
[illegible]，又用文武[illegible]
[illegible]，焙乾，擣為細末，每服一錢
米湯一盞調下，日進三服
參香散 治脾胃氣虛弱，嘔吐不下食
人參 丁香
右等分，擣羅為散，每服二錢，空心煎木瓜湯調下
辛香散 治脾胃虛弱，嘔逆痰飲，食不下
細辛 丁香
右擣羅為細末，每服二錢，[illegible]，不拘時候服
五靈脂丸 治[illegible]吐逆，粥飲不可下者，可以應用[illegible]
用五靈脂不拘多少為末，狗膽汁和丸如雞頭實大，每服一丸，煎熱
生薑酒化下，[illegible]
[illegible]
[illegible]
右脾胃氣弱，食不消化，嘔逆反胃[illegible]
用粟米半升，杵細，水和丸如梧桐子大[illegible]
強中丸 治脾胃[illegible]
神麴 陳皮 青皮 麥蘖 乾薑
半夏
右為細末，麵糊丸如梧子大，每服四五十丸，薑湯下
縮砂二兩

人參散 治胃虛冷 男子婦人脾胃虛弱 嘔吐痰涎 飲食不下 手足
逆冷 心腹痛 胸膈痞悶 心欲吐不吐 欲瀉不瀉 微熱煩燥 悶亂不安 或霍亂
諸疾 冰漿粥藥入口便吐 服之立效 久病反胃服百日安 此藥溫脾胃 化
痰飲 消宿食 止吐瀉

藿葉 人參 半夏

右為粗末 入人參各合勻 每服三錢 水一盞半 生薑十片 煎至一盞 去
滓 通口服 孕婦忌

神麴丸 治陰陽不和 脾胃弱虛 氣不升降 嘔吐泄瀉 脇肋刺
痛 心腹脹滿

治胃氣弱不下食 [illegible]
用薑合煎 為末食之

脾胃氣虛弱肌體羸瘦 附論

夫水穀入於胃 化為血氣 外榮形體 內充臟腑 脾胃氣弱 [illegible] 若脾胃虛弱 [illegible] 故肌肉不生而羸瘦也

白朮丸 治脾胃氣久弱 不思飲食 肌體羸瘦 少力 [illegible]

白朮一兩 檳榔 訶黎勒 枳殼
木香 附子 白芷 白豆蔻
桂心 丁香 當歸 乾薑 縮砂
黃耆 人參 白茯苓 厚朴

右為細末 煉蜜和搗三二百杵 丸如梧桐子大 每服不計時 以溫酒下
三十丸 忌生冷 油膩 [illegible]

草豆蔻散 治脾胃氣久虛 四肢無力 臟腑虛損 不欲飲食 日加
羸瘦 體重[illegible]

草豆蔻 青橘皮 人參 桂心
附子 白茯苓 白朮 當歸
枳實 厚朴 芎藭
柴胡 桔梗 白芍藥 黃耆

右件藥搗羅為散 每服三錢 水一中盞 入生薑半分 棗三枚 煎至
六分 去滓 不計時候 稍熱服之 忌生冷 油膩 濕麵 粘食 大料

訶梨勒散 治脾胃氣久虛 腹脇脹滿 肌體羸瘦 少力 大便
不調 或加氣促 喫食減

訶梨勒 木香 鱉甲 川大黃
當歸 牛膝 桔梗 肉桂 乾薑
桃仁 陳橘皮 甘草
白朮 枳殼 白芍藥

右件藥搗篩為散 每服三錢 以水一中盞 入生薑半分 煎至六分 去滓
食前溫服 忌生冷 油膩 大肉 莧菜

丁香散 治脾胃氣虛 肌體羸瘦 四肢少力 [illegible]
飲食

丁香 高良薑 厚朴 草豆蔻
白朮 人參 黃耆 白茯苓 肉桂
附子 訶梨勒 陳橘皮 半夏
枳殼 甘草

右件藥搗篩為散 每服三錢 以水一中盞 入生薑半分 棗三枚 煎至
六分 去滓 不計時候溫服

補益黃耆丸 治脾胃氣虛 肌體羸瘦 四肢少力 飲食減少

黃耆 白茯苓 桂心 白朮
麥門冬 當歸 五味子 石斛 人參
附子 陳橘皮 熟乾地黃
牛膝 菟絲子

右件藥搗羅為末 煉蜜和搗三二百杵 丸如梧桐子大 每服不
計時候 以薑棗湯下三十丸 忌生冷 油膩 牛肉

人參散 治脾胃氣久弱 肌體羸瘦 或加勞氣 大腸不調 有時
嘔逆 不思飲食 四肢少力

人參 柴胡 白茯苓 厚朴
白朮 桔梗 陳橘皮 五味子
黃耆 當歸 檳榔 甘草 桂心

已上件藥搗羅為散每服一錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至
六分去滓不計時候溫服
□砂丸 治脾胃氣虛脹滿氣痛
丸香 附子 半夏
蓽澄茄 木香 白朮
桃仁 檳榔 胡椒 陳皮
右除硇砂外搗羅為末將硇砂以醋 阿魏 同研
取硇砂和上件藥丸如梧桐子大每服空心以溫酒下
一十九
人參丁香散 治大人小兒嘔吐不已粥飲湯藥不下凡嘔吐之病
皆由三焦不調脾胃虛弱冷熱失和邪正相干清濁不分陰陽錯亂
停痰留飲□□□脾胃痞□□逆□□服□□□嘔飲□
水□□□□□飲食□□□氣□□大人□□病□中□□
使□□食氣□嘔吐□□不□四□用□不□□□□又

合久病□脾□□□□全不入食並宜服之
白芍藥 當歸 丁香 丁皮 山藥各四兩
肉桂去皮 蓬莪朮 人參去蘆 乾薑炮 茯苓去皮
香附子炒 白朮 甘草炙各四兩
右㕮咀每服五錢水一盞生薑三片煎七分空心溫服小兒二歲可服
半錢水五分生薑一片同煎四分以下溫服更宜□□□散加減與
之常服和脾胃進飲食
黃耆人參散 治脾胃氣虛弱肌體羸瘦飲食減少□去虛傍□心作
黃耆 人參 白茯苓 葛根 厚朴
白□ 訶梨勒 木香
甘草 半夏 乾薑一分
右件搗末每服二錢水一盞入生薑一片棗二枚煎至七分不以早
晚溫服
肉豆蔻丸 治脾胃虛弱肌體羸瘦
肉豆蔻一分 訶梨勒 吳茱萸湯洗焙乾炒

防風 厚朴 芎藭 蒼朮
縮砂仁 桔梗 石斛
右件搗羅為末同拌以煉蜜丸如梧桐子大空心米飲下
三十九
人參白朮散 治脾胃氣虛弱肌體羸瘦
人參 半夏 草豆蔻 大腹皮
前胡 陳橘皮 桂 芍藥
白茯苓 當歸
右各等分為散每服三錢水 煎入生薑半分棗二枚
煎至八分去滓稍熱服不計時候
思食丸 治脾胃氣虛弱不思飲食肌體羸瘦
人參 白朮 五味子
附子 陳橘皮
當歸 桂心 木香 甘草
右件藥搗羅為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎
至六分去滓不計時候溫服

調中思食丸 治脾胃氣虛弱肌體羸瘦
陳麴 陳橘皮 人參 麥蘖
鐘乳粉 檳榔 白朮 半夏 枳殼
右搗篩為末入鐘乳粉研勻煉蜜為丸如梧桐子大每服二十
丸溫米飲下食前服
陳橘皮丸 治脾胃虛弱面黃肌瘦□□脾疼□□□□□□□
痛
陳橘皮 丁香 乾薑
桂 附子 蓽撥 當歸
京三稜 厚朴
右九味搗羅為細末用陳橘皮煮和丸如梧桐子大每服二十
丸溫酒下不飲陳米飲下亦得空心食前服
附子丸 治脾胃虛弱肌體羸瘦不能飲食食不消化
附子 桂心 厚朴
甘草 當歸 小麥麴

膍

川椒[illegible]

右件爲細末，用棗肉和搗二三百杵，丸如梧桐子大，每服不計時候，以薑棗湯下二十丸。忌生冷油膩[illegible]。

人參丸 治脾胃氣虛弱，肌體羸瘦。

人參 白朮 山芋 [illegible] 陳倉米

甘草 [illegible]

右爲細末，煉蜜丸如櫻桃子大，米飲嚼下，一日二服。

山芋丸 治脾胃氣虛弱，肌體羸瘦，補不足，進飲食。

山芋 五味子 黃耆 白朮 人參

右爲細末，煉蜜爲丸如梧桐子大，每服二十丸至三十丸，溫米飲下，食前服。

厚朴丸 治脾胃氣虛弱，面黃肌瘦，小便頻數，腸腹疼痛，不能飲食。

沉香 檳香子 厚朴 附子 蜀椒

右除椒紅、沉香、檳香子外，二味用漿水六升煮盡，三兩生薑三兩切作片子，同於銀鍋中，更令水盡，煮乾，入椒紅、沉香、檳香子搗羅爲細末，以水浸炊餅和丸如梧桐子大，每服三十丸，空心溫酒下。

蜀椒丸 治脾胃氣虛，致多困倦，面黃口淡，不思飲食。

蜀椒 [illegible] 厚朴 [illegible] 附子 [illegible]

鹽花 [illegible]

右以水[illegible]於銀石器內，以文武火熬，候水盡，焙乾，同杵爲末，煉棗肉和[illegible]，丸如梧桐子大，每服二十丸至三十丸，溫酒下，空心服。如大腸滑泄，生薑米飲下。

椒朴丸 治脾胃虛冷，不思飲食，或[illegible]瀉，[illegible]或肌體瘦，[illegible]但吐利[illegible]應脾虛[illegible]可服。

蜀椒 [illegible] 厚朴 [illegible] 茴香子 [illegible] 青鹽 [illegible]

右以水二升，與人參乾焙，搗羅爲末，煮糊丸如梧桐子大，每服三四十丸，空心鹽米飲下。病深者日二服。諸方[illegible]椒朴丸，加附子者有，加乾薑之類者，皆不快，惟此方精妙，與病相宜，如神。其勿增他藥。[illegible]中[illegible]病脾泄[illegible]不能起，全不嗜食，其爲本道轉運使日，道[illegible]之，郎[illegible]傳此方，服十許日

漸安。自前常服此，至今[illegible]飲人食，面色紅潤，年六十餘，日行數十里，腳力如少年。凡藥之中病，實不在多，[illegible]不上面自有奇功，多由胃虛化藥，却致不驗，此即可以爲是也。方出[illegible]

[illegible]不能起，令不食，服之[illegible]

棗附丸 治脾胃氣虛，不以服[illegible]，肌體瘦，小腹膨脹，大便頻數，全不思飲食。

陳粟米 [illegible] 附子 [illegible]

右以[illegible]入粟米令[illegible]取附子[illegible]，別取粟米[illegible]，煮附子者粟米[illegible]和丸如梧桐子大，每服三十丸至五十丸，陳粟米飲下，空心食前。

羊肉補真丸 [illegible] 治脾胃久虛，[illegible]精神昏[illegible]，肌體羸瘦，全不入食。

[illegible] 當歸 白朮 神麴 丁香

茴香 肉豆蔻 縮砂仁 乾薑 肉桂

蒼朮 [illegible]

右件爲細末，次入羊肉末，搗令勻，[illegible]炊餅爲丸如梧桐子大，每服三十丸至五十丸，以米飲下，不拘時候。

建胃丸 [illegible] 治脾胃之虛，心腹虛脹，脇肋膨脹，[illegible]飲食不消，嘔逆[illegible]，四肢[illegible]，全不思食。

丁香 甘草 肉豆蔻 細辛 附子

吳茱萸 肉桂 乾薑

厚朴 [illegible]

右件爲細末，[illegible]如梧桐子大，每服五十丸，米飲下，空心食前。

治脾胃腸疾 以邪[illegible]和胃[illegible]之

脾胃虛熱嘔噦 附論

大抵脾氣[illegible]胃中有熱，[illegible]則胃[illegible]，[illegible]食[illegible]，[illegible]之人，[illegible]胃之中[illegible]，不和，[illegible]嘔噦也。

枇杷葉散 治脾胃氣虛痰涎嘔逆不食即吐
枇杷葉 木通 前胡 人參
麥門冬 麻人 半兩 赤茯苓 陳橘皮
右件藥搗篩爲散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去
滓不計時候服
麥門冬散 治脾胃壅熱嘔噦不下食飲食即吐
麥門冬 赤茯苓 人參 半夏
陳橘皮 茅根 甘草 前胡
枇杷葉
右件藥搗篩爲散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去
滓不計時候溫服
陳橘皮散 治脾胃壅熱嘔噦煩悶不下食
陳橘皮 羚羊角屑 麥門冬
人參 紫蘇莖葉
右件藥搗篩爲散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去
滓不計時候溫服
又方
陳橘皮 人參 蘆根
麥門冬 枇杷葉
右件藥細剉和勻每服半兩以水一大盞入生薑半分煎至六分去
滓不計時候分溫二服
蘆根飲子 治脾胃積熱胸膈煩熱嘔噦不下食
蘆根 麥門冬 人參 黃耆 竹茹
陳橘皮
右件藥細剉和勻每服一兩以水一大盞半入生薑半兩煎至一盞
去滓入蜜 不計時候分溫三服
茅香散 治脾胃壅熱嘔噦煩悶不止
茅香花 蘆根 麥門冬 赤茯苓 甘草

枇杷葉
右件藥搗篩爲散每服三錢以水一中盞入生薑一分竹茹一分煎
至五分去滓不計時候服
人參散 治脾胃虛熱嘔噦不能飲食
人參 前胡 甘草 粟米
右件藥細剉和勻以水二大盞煎至一盞去滓不計時候分
溫服
蘆根散 治脾胃虛熱嘔噦不能下食心神煩悶
蘆根 人參 甘草 麥門冬 赤茯苓
右件藥搗篩爲散每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去
滓入生地黃汁半合更煎一兩沸不計時候溫服
治脾胃虛熱不下食心胸煩悶
糯米 生薑
右件藥相和研濾取汁入蜜 不計時候分為三服

普濟方卷之十

考校官長史劉
對方醫
寫
刊 李

普濟方卷之[illegible]十六目錄

大腸腑門 論九道 類九道 方[illegible]百[illegible]首

總論 一道

大腸實 [illegible] 大腸虛 腸風下血 大便不禁 脫肛 [illegible] 肛門有蟲 [illegible] 肛門赤痛

大腸實 論一道

茯苓麻黃湯 羚羊角散 生薑泄腸湯 檳榔丸 [illegible]湯

大黃丸 赤茯苓散 [illegible]散 人參湯 檳榔湯

[illegible] 大腸皮散 大腸湯 神功丸

治腸痛 [illegible] 馬白湯

大腸虛 論一道 方二十八方

[illegible] 人參丸 [illegible]

[illegible]散 防風丸 [illegible]丸 [illegible]湯

[illegible] 茱萸丹 [illegible]丸 [illegible]丸

大建中湯 丸至丸 [illegible] [illegible]湯

腸風下血 論一道 方一百七十六方

黃耆湯 乾地黃[illegible] 五香散 [illegible]散 白花蛇丸

[illegible]去熱和血湯 [illegible] [illegible] [illegible]丸

黃耆丸 [illegible]丸 黃耆散 [illegible]散 烏玉丹

神丹 [illegible]丸 黃耆丸 [illegible]散

攪刺散 當歸和血散 加減四物湯 烏雞丸 腸風黑散

[illegible] [illegible]散 [illegible]青散 側柏葉散

槐角丸 [illegible] [illegible] 臟毒[illegible]

王屑丸 [illegible]丸 一切[illegible] [illegible]子湯 [illegible]皮散

地榆散 [illegible]下血 [illegible]散 木賊散

腸[illegible] 防[illegible]散 [illegible] 槐[illegible]丸 黃連散

玉壺丸 [illegible]散 防風[illegible] 木香丸 [illegible]腸丸

吳茱萸散 [illegible]丸 生地黃散 [illegible]散 [illegible]

五物散 黑丸 [illegible]散 [illegible]散 人安散

牛[illegible]散 治大腸[illegible] [illegible] [illegible]散

[illegible] [illegible] [illegible]丸 [illegible] [illegible] 治腸風下血

[illegible] 治[illegible] [illegible]散 [illegible] 治便血

[illegible] [illegible]丸 [illegible]散 [illegible]散 治便血

[illegible] [illegible]丸 [illegible]散 金散 [illegible]

神應丸 黃芩散 [illegible]丸 木賊散 [illegible]

防風散 [illegible] [illegible]散 治腸風下血 下上服

[illegible]散 [illegible]年腸風下血 [illegible]散 [illegible]丸 五[illegible]丸

治丈夫婦人血痢 駐金丸 香梅丸 三神丸

治腸風久而下臟血日數十[illegible]

[illegible]便血 [illegible] [illegible] [illegible]

治腸風下血及肛門出 [illegible] [illegible] 治臟毒下血 二[illegible]

治腸風[illegible] [illegible] [illegible]血 治便血 黃連散

黃芩丸 [illegible]丸 [illegible] [illegible]丸 [illegible]丸

[illegible]散 龍[illegible]散 [illegible] [illegible]

內補散 治大腸風毒下血不止 又方 [illegible]

[illegible]腸風一血 [illegible]不定 又方 [illegible]

又方 又方 [illegible] [illegible]

又方 治大便下血 [illegible] [illegible]

治腸風及臟毒下血 [illegible] [illegible] [illegible]

治臟毒下血 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]散

地榆湯 [illegible]丸 治臟毒下血 又方 [illegible]

治[illegible] [illegible] 治腸風下血 治便紅如傾水

神應丸 [illegible]丸 [illegible] 槐花散 治臟毒[illegible]大腸

[illegible]腸風下血不止
治腸風[illegible] 槐花散 蒲黃方
治下血[illegible] 二聖丸 治遠年日近腸風下血不止
治腸風下血
六便紅 [illegible]丸 治[illegible]收斂
治腸風臟毒下血不止 烏金散 治[illegible]下血
順氣[illegible]散 榜艾散 柳枝散 [illegible]散
槐花散 [illegible]散 烏梅丸
[illegible]毒[illegible]大腸[illegible]
治腸風下血[illegible] 治腸風下血不止[illegible]冷痛
又方 [illegible]
大[illegible]下血 又方 [illegible]利血不[illegible]
[illegible]
[illegible]
又方 治腸[illegible] 治腸風[illegible] 烏梅丸

[illegible]散 [illegible] 治腸風瀉血并臟毒及痔疾
[illegible]散 治腸風一切下血 [illegible]飲 治臟毒下血久遠不差者
又方 又方 治腸風 治下血久不差
治腸風 [illegible]散 治下血 治腸風 治[illegible]腸風下血
治腸風下血及臟毒下血 又方 治便血 [illegible]散
[illegible]散 又方 [illegible]散 治[illegible]便血 又方五 治便紅
又方五分 治腸風下血[illegible] 木[illegible]散 治[illegible]毒便血
[illegible]散 黃龍丸 治腸風[illegible]瀉血
茄蒂灰散 負君前 [illegible] 治下血不止
治瀉血不止 [illegible] 治男子臟毒下血
法製香附方 治[illegible]前後血 治腸風 治多酒傷風瀉血
治腸風下血[illegible] 如神丸 [illegible]散 保安丸
烏金散 [illegible]功方 茄子酒 又方 蛇黃散
又方 治腸風[illegible]大便前血 [illegible]丸
大[illegible]勝[illegible] 茶[illegible]湯 [illegible]散 蝟皮散 地黃煎丸

桂[illegible] [illegible] [illegible]神散
石[illegible]丸 [illegible] [illegible]子湯
[illegible]丸 [illegible] 金[illegible]丸 [illegible] 又方
治大腸[illegible]
六腸風[illegible]
治腸風臟毒[illegible] 龍骨[illegible]子 治腸風下血
治便血 [illegible]
治臟毒[illegible]
[illegible]
四神散 如聖散 柏葉散 當歸丸 治虛老人[illegible]
二聖散 如聖散 鹿茸丸 芎藭丸
人參散 [illegible] 地榆散 蝟皮散

治虛勞熱[illegible]暴下便血 治腸風下血 桃花散 皂角散
理大腸一切下血 [illegible]補胃湯 益智和中湯 烏梅肉丸
治下血[illegible] 黑玉丹 治下血 平胃地榆湯
治腎虛下血 治腸風臟毒便血等疾 雙聖丸 槐花散
黃連[illegible]散 伏龍肝湯 治下血不絕 治腸風下血不止
治卒下血及[illegible]出血 治卒下血 [illegible]下血不止 治下血
治大下血 [illegible] 治下血[illegible] 治[illegible]下血
治臟毒下血[illegible] 治腸風[illegible]

○大小便不通

方八十七[illegible]

朱[illegible]湯 [illegible]散 治大小便難[illegible]
茯苓丸 [illegible] [illegible]
白术散 [illegible] 治大小便[illegible]
大黃散 [illegible] 牛蒡散 治大小便不通
五苓散 車前子湯 [illegible]湯 [illegible]湯 治大小便不通

大黃散 撩擦去 一名川芎湯 治諸大小便不通
黃連散 芒硝湯 菟花丸 治大小便不通
又方 治大小便關格不通 治大小便秘結
治大小便難中有小蟲 治大小便難 冬葵根汁方
治大小便關格不通 又方 治大小便關格不通 又方
催車散 治卒關格大小便並不通支滿欲死 冬麻子方 髮灰散
牽金沙散 土馬鬃湯 豬脂酒方 治大小便關格閉塞
治卒大小便不通 又方 鐵腳丸 名一捻金
治大小便閉不通壯脹上衝心悶絕 治大人小兒大小便不利
治大小便不通 又方 又方
治老人虛大小便不通 又方蜜兌 治關格大小便不通
治卒關格大小便不通 又方 貼臍膏 甘遂散
治大小便不通 又方 木香丸 治男女大小便不通
檳榔散 神佑導水丸 神保解毒丸 大黃散
治關格脹滿大小便不通 療大人小兒腹中諸疾積滯

醫方類聚卷之一百二十五

輕粉散 通心散 主大小腸並不通 治大小腸風熱
治大小便秘腹中結熱 關中下熱氣
治大小便不通閉節 一方 治宿食便秘而喘
治小便不通 治小便不通...而悶

大便秘澁不通

論一道 法一道 方一百九十一方

通聖散子 京三稜丸 蒸黃湯 搜風順腸丸
大黃丸 大五柔丸 三黃丸 潤腸湯 麻人丸
大黃散子 勻氣丸 枳殼湯 宣通木香散 牽牛子丸
五柔丸 檳榔丸 皂子丸 檳榔丸 牽牛子丸
小腸局 六合散 神功五八丸
潤腸丸 寧肺散 七聖丸 七宣丸 通幽湯
潤腸丸 枳殼丸 感應丸 潤腸丸
木香檳榔丸 治關格人便不通 大戟丸 麻人丸
檳榔散 檳榔丸 檳榔丸 ...中丸

木香丸 檳榔丸 芒硝丸 巴豆散 潤腸丸
治大便不通腹時急 木香逐氣丸 枳殼散 大黃丸
麻人丸 治大便不通脾腹痞悶 麻人丸 木香丸
入麻人丸 治大便不通 治大便難 ...丸 四磨湯
潤腸湯 南木香丸 寬氣湯 ... 蕭用丸
小通氣散 承氣 ... 丹 什麻湯 ...散
濟中丸 半夏丸 大黃湯 枳殼丸
治五實病大腸難 治人便不通...不上奔心腹
牽牛子丸 治大便難 鐵盒仙丸 牛黃通格丸
治大便閉不通 鐵脂膏丸 牽牛子丸 ...人丸
大腹湯 三人丸 摩臍方 腸結方
治卒大便不通氣熱結或風秘又婦人產後
消腸丹 豬膽導方 枳殼丸 治大便卒不通澁結 穿腸丸
療上氣大便秘澁 治大便不通 治大便難 又方四方
治大便秘塞不通 紫蘇麻人粥 牛黃散 ...提金散

醫方類聚卷之一百二十五 一

治大便不通 息白散 黃芩湯 寄急法 治大便不通
治人有腸結之患 提金散 潤腸備?丸
牽牛散 大豆豉方 牛黃散 荊芥散 商陸煮豆湯
麝香散 獨...丸 皂莢散 大黃丸
治肛門腫熱閉塞 大黃芒硝丸 ...蜜煎導法
治人便...不通 又方 ...朴硝附子湯
治人便不通 又方 ...不通 又方
治大便難 又方 ...丸 蜜煎方
治產人並老弱人虛秘 ...治大便...不通
治大便不通氣秘大秘 ...
治大便秘澁不通 ...
治大便不通 去...
治天行熱病大便...
竹子散 土瓜根方 ...散 ...
段半夏散 ...丸 ...丸 大黃飲 二聖湯

揀金丸　[illegible]　治腸[illegible]　黃連阿膠丸
升陽[illegible]　小茴香散　防風丸　柏皮丸
三和散　金液丹　止血散　和血益氣丸湯
化積[illegible]大腸方　人參丸　神功丸　五人丸
通秘散　木香丸　麻仁丸　通腸丸　四順飲子
開腸丸　治大便不通　治大便不通十日至一月　又方
神曹湯　茴香丸　麻仁丸　麻子仁丸
治大腸[illegible]　導引法

大便不禁

論　方七方
陳曳丸　牧陽丸　龍骨湯　地榆丸　訶子湯
石榴皮湯　厚朴五[illegible]湯　訶梨勒丸　橘連丸　石硫黃湯
大理中丸

脫肛

論一道　方七十九方
縮肝散　金鳳膏　鱉甲丸　治脫肛　香腸丸
香荊散　縮砂湯　治大腸虛冷大便後脫肛洞出
治大腸風冷脫肛兼腰痛　治脫肛不差　治脫肛瀉血不止
蟬蛻散　壁土散　又方　治脫肛　蛇床散
治大人小兒脫肛不收　治大人小兒腸頭出
又方　荊芥散　香薷丸[illegible]　治脫肛
治久痢脫肛　治赤白痢脫肛　治大腸虛冷脫肛
治脫肛瀉血不止　治脫肛[illegible]　治脫肛不收
治腸頭挺出　治脫肛門帶出　治肛門腸出　治脫肛腸出熱痛
治腸頭脫出轉久不可入收　治肛腸墜不入　木賊散
治脫肛　又方　又方　治痔漏脫肛
治大腸脫肛　人參湯　治脫肛痔瘡等　猬皮散
磁石散　蜣螂散　傑十丹　石斛方　文蛤散
療大人小兒[illegible]　肛[illegible]　治脫肛　又方
治大腸[illegible]　[illegible]　治下部脫肛　黃狗散
治腸頭肛出　猬皮散　治脫肛　治脫肛出糞門三五寸者
治大腸風冷下血不止　治脫肛不收　又方　又方
治脫肛腸出　治平大便脫肛　釣腸丸
加味磨角散　柯石丹　赤石脂散　卷柏散
地榆芍藥湯　龍骨丸　黑聖散　訶子皮散　治腸頭出
治脫肛　治子腸脫肛　治脫肛　治肛頭出　治脫肛

肛門有蟲痒

論一道　方三方
赤腹丸　又方　又方

肛門赤痛

論一道　方十一方
樗樹散　牛蒡子散　大黃散　治大腸風痛[illegible]肛門
又方　治穀道赤痛又痒方　又方　治肛門腫痛
又方　地榆散　三黃丸

普濟方卷之十六目錄　畢

普濟方卷之十六

大腸腑門

總論

夫大腸腑者，主肺也。鼻柱中央，是其候也。肺合氣於大腸，大腸者，為行道傳瀉之腑也，號監倉掾，重二斤十二兩，長一丈二尺，廣六寸，當臍右回疊積還反十二曲，貯水穀一斗二升，主十二時，定血脈，和利精神。右手關前寸口陽絕者，無大腸脈也，苦少氣，心下有水氣，立秋節即欬，刺手太陰，治陰在魚際間。右手關前寸口陽實者，大腸實也，苦腸中切痛，如錐刀所刺，無休息時，刺手陽明，治陽在手腕中，瀉之。大腸病者，腸中切痛而鳴濯濯，冬日重感於寒則泄，當臍而痛，不能久立，與胃同候，取巨虛上廉、三里。○大腸脹者，腸鳴而痛，濯濯，冬日重感於寒，則飧泄不化。大腸有寒，鶩溏；有熱，便腸垢。大腸有宿食，寒慄發熱，有時如瘧狀。○腸前受病，大腸欬不已，欬則遺失。厥氣客於大腸，則夢田野。肺應皮，皮厚者大腸厚，皮薄者大腸薄，皮緩腹裹大者大腸緩而長，皮急者大腸急而短，皮滑者大腸直，皮肉不相離者大腸結。○扁鵲云：手太陰與陽明為表裏，大腸若病實則傷熱，熱則脹滿不通，口為生瘡，食下入腸，腸實而胃虛，食下胃實而腸虛，所以畜而不瀉也。實者虛者寒下來去，虛則傷寒，寒則腸中雷鳴，泄青白之利，而發於氣水，根在大腸。○大腸絕不治，何以知之？泄利無度，利絕則死。……逆或嘔噦，或喘欬引氣……夜虛邪之氣客腑，虛則陰邪所傷，則為寒；熱邪所傷，則燥結秘澀。

大腸實

論

夫右手寸口氣口以前脈陽實者，手陽明經也，病苦腸滿，善喘欬，面赤身熱，喉咽中核狀，名曰大腸實熱也。大熱者得溫行……之所也。其氣滿……

實熱生瘡，傳為下利，腸中痛如錐刀所刺，或生鼠乳痔，腫痛，癰疽，大便不通，腹脇脹滿，肩背重痛，上氣喘滿，皆大腸氣實之證也。○夫大腸實則生熱，熱則腸結，脹滿，善氣喘欬，身面熱，喉中噎噎如有物，或下痢膿血，不通，此是大腸實熱之候也。

茯苓麻黃湯 治大腸實熱，令人氣喘……

白茯苓 麻黃 黃芩 大青

桂心 細辛 杏人 石膏

丹參 五味子 陳橘皮 甘草 貝母

芎藭 枳實

右為散，每服三錢，水一盞，生薑半分，去滓溫服。

羚羊角散 治大腸實熱，心神煩悶，口舌生瘡

羚羊角 甘竹茹 川升麻 川大黃

黃芩 梔子人 柴胡 杏人

玄參 木通 赤茯苓 甘草

右為散，每服三錢，水一中盞，煎至六分，去滓，入生地黃汁一合，更煎一二沸，……溫服。

生薑泄腸湯 治大腸實，腹脹不通，口為生瘡

生薑 橘皮 青竹茹 黃芩 梔子人

白朮 桂心 茯苓 芒硝 生地黃

大棗

右㕮咀，以水七升，煮取三升，去滓，下芒硝，分二服。

檳榔丸 治大腸實熱，氣壅，心腹脹滿，大便秘澀

檳榔 大黃 麻子人 羌活

牽牛 杏人 白芷 黃芩 人參

右為末，煉蜜丸如梧桐子大，每服三十丸，……

利膈丸

杏人湯 治大腸實熱，大便不通，氣喘欬，咽喉……

杏人 甘草 黃芩

麥門冬 細辛 五味子 赤芍藥 大黃

右㕮咀，每服三錢，水一盞，煎六分，去滓，食前溫服。

大黃丸 治大腸壯熱，腹滿，□□，□痛，便難，腹脹，口舌乾燥

大黃 枳殼 芍藥

木通 柴胡 □□ 梔子仁 川芒硝

右為末，煉蜜和丸，如梧桐子大，每服二十丸，食後臨臥熟水下，加至四十丸

青林散 治大腸實熱，腹痛，目眩，驚狂，性急，肚脹，滿悶

赤茯苓 麥門冬 梔子仁 大黃 羌活

川芎 杏仁 丹參 石膏

右咬咀，每二錢，水一盞，煎六分，去滓，食前溫服，以利為度

分別散 治大腸實熱，氣壅不通，心腹脹滿，發熱

柴胡 赤芍藥 梔子仁 知母 杏仁

黃芩 防己 大黃 甘草

右咬咀，每服三錢，水一中盞，煎至六分，去滓，食前溫服

大青湯 治大腸熱，腸中切痛，或生鼠乳，大便不通

大青 麻黃 石膏 芒硝 黃藥

生乾地黃 枳殼 赤茯苓

右咬咀，每服二錢，水一盞，生入竹葉十片，煎八分，去滓，溫服，日三

陳皮湯 治大腸熱，腸痛，手中熱

陳皮 三兩 白朮 一兩 甘草

桂心 石膏 杏仁

右咬咀，每服三錢，水一盞半，入生薑一片，蔥白四寸，煎八分，去滓，

空心服，日一

治大腸□□肺臟壅塞，□□□□，喘引飲也，宜白茯

紫菀茸 杏仁 竹茹 前胡 石膏

葶藶 甘草

右咬咀，每服五錢，水一盞，煎七分，去滓，食前服

大腹皮散 治大腸實熱，腸脹不通，氣上衝，口內生瘡

大腹皮 柴胡 訶梨勒皮 枳殼

川大黃 朴硝 羚羊角 甘草

右咬咀，每服一錢，水一中盞，煎至六分，去滓，食前溫服

大腹皮散 治大腸實熱，腹脹不通，上衝口內生瘡

大腹皮 大黃 木香 訶梨勒皮 枳殼

芍藥 人

右咬咀，每服三錢，更入朴硝一錢，水一盞半，煎至八分，去滓，溫服

神功丸 治氣壅大腸，風氣大便不通

治腸□□

烏白散 治大腸實熱，腹脹不通，秘澀，喘不能久立

判大豆 □□□

陳皮 竹葉 黃芩 梔子仁 黃柏皮

茯苓 芒硝 生地黃

右為散，每服四錢，□□□□，空心服

大腸虛

論

夫右手寸口氣口以前脈陽虛者，手陽明經也，病苦胸中喘，腸鳴，虛渴，唇口乾，目急，善驚，泄白，名曰大腸虛冷也。其候胸中喘，腸鳴，虛渴，唇乾，目急，善驚，泄白，乃大腸虛冷也。蓋大腸者，傳導之官，變化出焉，其脈則令虛弱，不能自固，而成諸疾，診其脈右手氣口以前脈陽虛者是也。大腸虛冷，咳嗽，氣短，少腹中痛

款冬花 桂心 五味子 乾薑 芎藭

甘草 附子 桔梗 蘇子 蜀椒

百部 乾棗

右為末，煉蜜和丸，如梧桐子大，每服三十丸，食前米飲下，加至四十丸，日再

草豆蔻散 治大腸虛冷，腸鳴，腹痛，不思飲食

草豆蔻 陳橘皮 高良薑 桂心

丁香 木香 白朮 當歸 肉豆蔻

訶黎勒 甘草

右為末，每服二錢，食前以薑棗湯調下。
木香丸 治大腸虛冷切痛，食不消化。
木香 白朮 桂心 吳茱萸 高良薑
訶梨勒 附子 厚朴
肉豆蔻 甘草 乾薑
右為末，用神麴末煮作糊，丸梧桐子大，食前薑棗湯下十丸。
治白痢[illegible]大腸[illegible]
[illegible]大腸俞[illegible]
右㕮咀，每服五錢，水一盞半，煎至七分，去滓，食前服。
吳茱萸散 治大腸虛冷，腸鳴腹痛，食不消化。
五味子 肉豆蔻 草果 甘草
白朮 人參 乾薑 白茯苓
吳茱萸 肉豆蔻 乾薑 甘草
陳橘皮 高良薑 縮砂 神麴
白朮

右為末，每服一錢，食前粥飲調下。
訶梨勒散 治大腸虛冷，腸鳴泄瀉，腹脇氣痛，飲食不化。
訶梨勒 附子 陳橘皮
當歸 肉豆蔻 桔梗 木香
吳茱萸 甘草
右㕮咀，每服三錢，水一中盞，入生薑半分，棗三枚，煎至六分，去滓，食前稍熱服。
防風丸 治大腸氣虛，又因傷風冷，大腸中下血。
防風 萆薢 黃耆 木香 五味子
續斷 陳橘皮 白礬
右為末，煉蜜丸梧桐子大，空心粥飲下三十丸。
訶梨勒丸 治大腸虛冷，腸鳴泄瀉，腹脇氣滿，食不化。
訶梨勒 附子 肉豆蔻 木香 吳茱萸
龍骨 白茯苓 蓽撥
右為末，煉蜜丸梧桐子大，每服七十丸，空心米飲下。
黃連補腸湯 治大腸虛冷，痢下青白，腸中雷鳴相逐。

黃連 茯苓 芎藭 地榆
伏龍肝
右以水七升，煮取二升半，去滓，下伏龍肝末，分二服。
附子散 治大腸虛冷，腹滿痛。
附子 人參 白朮 甘草
桂心 甘草
右㕮咀，每服三錢，水一盞，棗三枚，煎至六分，去滓，食前溫服。
茱萸丸 治大腸虛冷，飲食減少，時發泄瀉。
吳茱萸 訶梨勒皮 丁香 草豆蔻
芎藭 防風 石硫黃
右為末，煉蜜丸梧桐子大，空心溫水下三十丸。
黃連湯 治大腸虛冷，痢下白膿，腸內虛鳴相逐。
黃連 硝石 赤石脂 白茯苓 乾薑
芍藥
右㕮咀，每服五錢，水一盞半，煎至八分，去滓，溫服，日二服。

訶黎勒丸 治大腸虛冷，腸鳴，腹中虛鳴。
柴胡 枳殼 白朮 白茯苓
丹參 黃耆
右為末，煉蜜丸梧桐子大，空腹粥飲下三十丸，日三服。
朴附丸 治大腸虛冷，便利不思飲食，腸鳴腹痛。
厚朴 附子 甘草 乾薑
右為末，用棗肉丸梧桐子大，每服五十丸，食前鹽米飲下。
大建中湯 治大腸虛。
乾薑 芍藥 甘草 桂
右㕮咀，每服一錢，水二盞，生薑三片，飴糖一匙，煎七分，去滓，空腹溫服，日三。
乳豆丸 治大腸虛寒，滑泄不止。
鍾乳粉一兩 肉豆蔻
右為末，煮棗肉丸梧桐子大，每服七十丸，空心食前米飲送下。
治大腸虛冷

用鯉魚煑食，尤能補益

胃風湯 治大腸虛冷，利下瘀血，腸中攪痛，大便不禁，小便赤[illegible]
氣元肴不能多食，[illegible]當歸[illegible]
人參 白术 茯苓 川芎 當歸 白芍 官桂 [illegible]如[illegible] 粟米 [illegible]
右為散，每服[illegible]入粟米百餘粒，[illegible]空心服

腸風下血（附論）

夫腸風臟毒下血者，皆由飲食不節，房室勞損，坐卧濕地，生冷
或喜怒，或飲酒過度，或勞役傷氣，風邪今通，氣血[illegible]因熱蘊
便血，性[illegible]散，積熱[illegible]，滲入腸胃，故大便下血，清而色鮮者腸風
也，濁而色黯者臟毒也，肛門射如血線者蟲痔也，又有陰氣不勝，血
隨氣降而下血者，下虛也。下血之脈，脈多弦大而芤者，[illegible]
者亦血也。治療之法，風則散之，熱則清之，[illegible]，治法
合其[illegible]不[illegible]者矣。○大便下血，或清或濁，或鮮或黑，或在便前，或在
便後，或與糞俱出，[illegible]並不[illegible]，[illegible]停在腸胃，[illegible]不通者

[illegible]故曰便血，方書以鮮血為腸風，濁血為臟毒，主為腸痔
受病之初，血因大腸有熱，血結於下，或因下虛而臟腑無[illegible]血
得以[illegible]及其久，則成痼疾矣，亦有所感觸而發之，如[illegible]則
為痔，血[illegible]風，勞則為痛，[illegible]濕發則為豆汁，血色亦因而轉，不可拘
以一途，人之為[illegible]一身，性氣[illegible]血，血為營，氣為衛，[illegible]行於脈中，衛
行脈外，故[illegible]主血，肝藏之，而脾為之統，[illegible]氣，則血諸，若因
七情[illegible]所傷，外[illegible]則血[illegible]，[illegible]天度，皆能令人
下血，若風入腸胃者，其[illegible]下血必在[illegible]，[illegible]名[illegible]血，停積大腸
者，其[illegible]色[illegible]，又名[illegible]，[illegible]下血無痛楚，
若其[illegible]下[illegible]則臟[illegible]不[illegible]，[illegible]和[illegible]
下血如豆汁，[illegible]時[illegible]絕者，下血○
治法大要[illegible]，[illegible]者[illegible]不換金正氣
散，風邪[illegible]傷其[illegible]熱[illegible]，[illegible]，則[illegible]多用
涼[illegible]如[illegible]敗[illegible]中[illegible]凡[illegible]之熱[illegible]
然風其[illegible]陰[illegible]不得[illegible]，凡則用理中[illegible]理中湯

感[illegible]而作血之[illegible]，[illegible]之要[illegible]一[illegible]人[illegible]血之上[illegible]熱
[illegible]加茯苓[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
主血[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
調也，主氣[illegible]天，論曰[illegible]臟腑因而大[illegible]，腸胃為痔，[illegible]
者，血隨氣[illegible]失，及入于腸胃之間，乃前[illegible]血也，若身[illegible]則為[illegible]血
身[illegible]者，可[illegible]也，[illegible]血易[illegible]之一二，[illegible]
皮[illegible]黃連[illegible]，[illegible]元散，[illegible]下五[illegible]，甚[illegible]

食汁中飲，服之則愈矣。○[illegible]下血不止者，由人氣血[illegible]弱，[illegible]
臟虛，或飲食勞傷，或素[illegible]邪，蘊蓄在臟腑，至於大腸，大腸既
虛，下血致[illegible]色[illegible]四肢為[illegible]，[illegible]諸醫不差，或因[illegible]腸風
下血。○[illegible]經[illegible]結陰者，便血一升，再結二升，三結三升，邪在五臟，則陰
[illegible]不和，血留之，結陰之[illegible]，[illegible]下[illegible]行，血無所
棄，[illegible]腸，因而便血也

方

黃耆湯 治腸風下血
黃耆 [illegible] 白[illegible] 小[illegible] 黍耳 乾地黃
當歸 [illegible] 白芷 [illegible] 草豆蔻 [illegible] 芍藥
赤石脂 天雄 龍骨 黃芩 [illegible] 紅藍花
[illegible]勒皮 [illegible] 厚朴 [illegible]
右㕮咀，每五錢，水一盞半，煎[illegible]，食前[illegible]，服日二
[illegible]大便下血，[illegible]多年，[illegible]

乾地黃[illegible]
熟乾地黃 赤石脂 [illegible] 延胡索 牡蠣 桔梗

黄耆 龍骨 桃仁 當歸 黄連 白芷
地榆 木香 紅藍花 桂 乾薑
黄芩
右㕮咀每服五錢水一盞半煎八分去滓溫服無時
五香散 治腸風氣滯流注下部致生腫結牢引臟腑不和時發疼痛經久下血太多並宜之
沉香 黄耆 枳殼 熟乾地黄
麝香 乳香 木香 藿香 檳榔
當歸 白茯苓 白蒺藜 川大黄 白芍藥
卷柏 烏賊魚骨
右為末每服二錢食前粥飲調下
斷紅丸 治腸風痔疾失血過多重之虛羸困不欲飲食
續斷 熟乾地黄 人參 附子
當歸 芍藥 黄耆 白芍藥 桂心
麥門冬 白茯苓 乾薑 五味子 白芷

甘草
右㕮咀每服水一盞棗二枚煎六分去滓溫服日三四服
白花蛇丸 治腸風下血日夜不絕疼痛至甚
白花蛇 杏仁 黄耆
胡蘆子 人參 鱉甲 附子
當歸 皂莢刺 刺蝟皮 亂髮 肉桂
右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸食前人參湯下
升麻去熱 治腸風下血 下其血 有力而速 四
散 腹中大作痛乃為腸風痔瘻所作也
當去濕毒和血 是其
生地黄 牡丹皮 生甘草 黄耆
當歸身 熟乾地黄 蒼术 秦艽 肉桂
橘皮 升麻 白芍藥
右㕮咀作一服水四盞煎一盞去滓稍熱服
白术丸 治腸風痔疾失血 食無味

白术 石斛 續斷 人參 黄耆
熟乾地黄 人參 肉蓯蓉 白茯苓
桂心 甘草
右㕮咀每服五錢水一中盞生薑半分棗二枚煎至六分去滓溫服
內補黄耆湯 治腸風痔疾下血太多虛羸無力
黄耆 柏子仁 枳殼 白芍藥 烏蛇肉
鹿茸 附子 續斷 當歸 沉香
檳榔
右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸溫酒下
黄耆丸 治腸風痔漏
槐花 令大便下血不止
熟乾地黄 黄耆 牛蒡子 蒲黄
當歸 附子 艾葉 白蒺藜 阿膠
枳殼
右為末煉蜜丸梧桐子大每服空心及晚食前粥飲下二十丸

黄芩散 治腸風痔疾失血後虛極四肢黄瘦心忡虛煩少得眠臥不能飲食
黄耆 熟乾地黄 人參 柴胡 白茯苓
酸棗仁 麥門冬 枸杞子 防風 白术
甘草
右㕮咀每服四錢水一中盞生薑半分棗二枚煎至六分去滓溫服
卷柏散 治腸風痔疾下血不止
卷柏 熟乾地黄 黄耆 白术
甘草 烏賊魚骨 枳殼 當歸 乾薑
右㕮咀每服三錢水一中盞煎至六分去滓溫服日三四服
烏玉丹 治腸風痔瘻痛不可忍
神丹 治腸風痔
蝟皮丸 治大腸風熱下血不止
蝟皮 枳殼 黄芩 桑木耳
地榆 當歸 烏賊魚骨 槐子

右五味為末煉蜜丸如梧桐子大每服七十丸空心米飲下。

茴香丸 治腸風

黃耆 白茯苓 枳子 艾葉

鹿眼皮 檳榔 檀香子

龜甲

右搗羅為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服二十丸食前粥飲下

黃連當歸散 治腸風下血

黃連 雞冠花 川芎 大黃 烏梅

甘草 枳殼 荊芥

右為末每服二大錢溫水調服食前

槐角散 治腸胃不調脹滿下血

蒼朮 厚朴 陳皮 當歸 枳殼

烏梅肉 槐角 甘草

右㕮咀每服五錢水一盞煎服

當歸和血散 治腸澼下血濕毒下血

槐花 青皮 當歸身 升麻 熟地黃 白朮 川芎

右為末每服二三錢清米飲調下食前忌酒麵生冷物

加減四物湯 治腸風下血不止

側柏葉 生地黃 當歸 川芎

荊芥穗 槐花 甘草 枳殼

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑三片烏梅少許煎七分去滓空心服

又一方加防風烏梅

烏鷄丸 治大腸風

烏鷄 熟地黃 白芍藥

當歸 甘草 川烏 肉桂

右為末丸如梧桐子大每服三十丸

腸風黑散 治腸風下血

敗棕 頭髮 木賊 槐角

枳殼 甘草 烏梅肉

右為末每服二錢陳米飲或熱調下

槐皮膏 止痔痛出血

槐皮 熏陸 辛夷 甘草 白芷

巴豆七枚 桃子十四枚 桃人十枚

右以豬脂半斤煎之上下去滓

內補散 治腸風下血不止痔瘻

滑黃 白石脂 當歸

白芷 黃芪

右㕮咀每服三錢水一中盞煎六分去滓溫服日三四服

內補黃芪散 治腸風下血不止面色萎黃氣力全少

黃耆 鹿角膠 白芍藥 當歸

芎藭 甘草 附子

右㕮咀每服四錢水一中盞入薑一分煎至六分去滓食前溫服

側柏葉散 治大腸風熱下血不止

側柏葉 棕櫚皮 附子 防風

槐花 羌活 當歸 白朮

右為末每服二錢食前米飲調下

鹿茸丸 治腸風久虛腸風痔瘻下血太多面色萎黃日漸羸瘦

鹿茸 附子 續斷 側柏葉 黃耆

厚朴 當歸

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸食前粥飲下一方用白

腸風黑散 治榮衛氣虛風邪冷氣進襲臟腑之間或食生冷或啖炙煿或飲酒過度積熱腸間致使腸胃虛弱糟粕不聚大便鮮血或肛門有核出或久患酒痢人使頭痛並皆療之

荊芥 枳殼 亂髮 槐花

槐角 甘草 猬皮

右件入瓷瓶內封存性出火氣同甘草枳殼為末每服二錢水一盞煎七分空心溫服酒調下亦得

結陰丹 治腸風下血及臟毒下血諸大便下血疾

枳殼 威靈仙 黃耆 椿根白皮 陳皮去白

何首烏 荊芥穗 各等分

右爲末，酒糊丸少許，丸如梧桐子大，每服五十丸至七十丸，食前[illegible]米飲下，不用[illegible]，以醋炒[illegible]陳米飲煎湯下。

治腸風臟毒解酒毒

黃連 防風 檳榔 荊芥 烏梅

側柏葉 炒 枳殼 各等分

右爲末，麵糊丸，每服三五十丸，空心米湯下。

玉骨丸 治腸風瀉血久不止

樗根白皮 苦楝根 椿根白皮 [illegible]

入蘭葉 [illegible] 威靈仙 一兩 [illegible]

右爲末，滴水丸如梧子大，每服三十丸，[illegible]下。

[illegible]

子 苦[illegible]下血，[illegible]

[illegible]

槐角丸 治腸風瀉血脫肛

槐角 一兩 防風 地榆 當歸 枳殼

木賊 伏神 各半兩

右爲末，酒糊丸如梧子大，每服二十丸，米飲下。

七妙散 治腸風

枳殼 椿根皮 黃芪 天麻 白芨

豬牙皂角 各半兩 赤石脂 一兩

右爲末，每服一錢，溫酒調下，空心臨臥服。

六君子湯 治便血不止，脾胃虛弱，飲食不進，手足[illegible]

人參 白朮 白茯苓 當歸 黃耆

白扁豆 甘草 各一兩

右爲末，每服三錢，米飲調，日進三服。

橘皮散 治腸風下血久不差，面色萎黃

橘皮 蒲黃 乾薑 各三兩

黃牛角 枳殼 赤石脂 各一兩

牡蠣

右爲末，每服二錢，食前粥飲調下。

地榆散 治大便下血久不止

地榆 赤芍藥 生乾地黃 茜根 龍骨

黃芩 各一兩

右㕮咀，每服三錢，水一盞，煎六分，去滓，食前溫服。

治腸風臟毒下血

川芎 枳殼 側柏葉 陳槐子 芍藥

百草霜 各一兩

右剉[illegible]，每服一錢，空心溫酒調下，日午[illegible]湯下。

地榆散 治腸風臟毒下血

地榆 黃連 茜根 黃芩 茯神 各半

槐子 一分

右㕮咀，每服三錢，[illegible]同煎服，又方[illegible]皮湯下。

木賊散 治腸風下血

木賊 枳殼 槐角 茯苓

荊芥 各半兩

右爲末，每服二錢，濃煎棗湯調下。

腸風方

香附子 枳殼 當歸 川芎 各一兩 槐花 炒

甘草 炙 各半分

右㕮咀，每服三錢，新汲水一盞，生薑三片，煎七分，食前服。

防風散[illegible]治因食熱物[illegible]感風[illegible]留滯腸胃以致榮
衛之氣[illegible]而下
羌活　荊芥　防風　枳殼　黃芩[illegible]
訶子[illegible]
右㕮咀白水煎空心溫服忌食炙熱之物
涼血地黃湯[illegible]治[illegible]如飲食不節起居不時陰受之則入
五臟入五臟則䐜滿閉塞下為飧泄久為腸澼大腸[illegible]
作風邪也[illegible]
澼之病甚效
熟地黃　青皮[illegible]　槐子[illegible]　當歸[illegible]　知母[illegible]
黃柏[illegible]
右㕮咀作一服水一盞煎七分去滓溫服如小便赤脇下悶或大便
秘後重[illegible]
後重又不去者當下之如有傳變隨証加減
槐角丸治腸風下血先血後糞[illegible]

黃連散[illegible]治腸風下血疼痛不止
黃連[illegible]　[illegible]花[illegible]　甘草[illegible]　川大黃[illegible]
甘草[illegible]
右為細末每服一錢溫米飲調下日三服不計時[illegible]
玉屑丸治腸風瀉血久不止
青礬[illegible]　[illegible]
[illegible]　枳殼[illegible]　明礬[illegible]　茯苓[illegible]
槐角[illegible]
右將前青[illegible]為末入前[illegible]為丸如梧桐子大每服[illegible]丸腸風
前木賊湯下痔疾前[illegible]湯下常[illegible]米飲下空心日三服
琥珀散治腸風及一切血疾[illegible]下血不止
琥珀[illegible]　鹿角[illegible]　槐花　枳殼[illegible]
白芷[illegible]
右將琥珀外[illegible]為散入琥珀研令勻每服二錢
米飲調下空心食前各一服

防風飲治腸風瀉血
防風[illegible]　黃連[illegible]　續斷　甘草[illegible]　大麻
人參[illegible]
右為末[illegible]每服三錢[illegible]以溫米飲下
木香丸治腸風不問年深日近
木香　白芷　乾薑[illegible]　阿膠[illegible]　當歸[illegible]
蒲黃[illegible]
右各別搗以蜜[illegible]小便一升煎阿膠三十沸後下木香[illegible]
後又下乾薑當歸[illegible]和丸梧桐子大每服
五丸至十丸空心溫酒下
釣腸丸治腸風瀉血不止痔瘻
附子[illegible]　石硫黃[illegible]　鷄冠花[illegible]　鱉甲[illegible]
皂莢[illegible]　猬皮[illegible]
右為末[illegible]為丸梧桐子大每服[illegible]丸空心槐花湯下日二服
[illegible]皮散治積年腸風瀉血飲食不進肌體黃瘦
[illegible]皮[illegible]　乾薑[illegible]　甘草[illegible]　鷄冠花[illegible]
附子[illegible]
右為末每服二錢食前枳殼湯下
附子丸治積年腸風瀉血面色萎黃
附子[illegible]　皂莢[illegible]　當歸[illegible]　乾薑[illegible]　杏人[illegible]
右為末[illegible]丸梧桐子大每服[illegible]丸食前以溫米飲下
生地黃散治大便下血皆因心肺積熱所致並大腸
生乾地黃　黃芩　赤芍藥　黃連[illegible]　蒲黃
地骨皮[illegible]
右㕮咀每服五錢水一大盞入竹茹[illegible]煎五分去滓頻溫服
黃芩散治大腸積熱下血不止日夜度數無恒
黃芩　[illegible]　黃連[illegible]　生乾地黃　地榆[illegible]
犀角屑[illegible]
右㕮咀每服三錢水一中盞入青竹茹半鷄子大煎至六分去滓食前溫服

治大便下血

茅根　連翹　枳殼　山梔子　[illegible]

右爲末每服二錢米飲調下

五物散　治腸風下血

貫仲　槐花　地榆　黃連　甘草各等分

右爲末每服二錢米飲調下

黑虎丸　治腸風累經大効

白礬　鷄冠花　[illegible]　陳橘皮

五靈脂

右爲末分一半末用[illegible]一半大蒜成膏和一半末爲丸梧

桐子大每服三十丸空心陳米飲下

牛黃散　治腸風下血痔漏不止

牛黃一合　[illegible]　附子　乳香

右以四味爲末同牛黃[illegible]用炭六斤[illegible]

度取出研爲散空心溫酒調一錢服

側柏散　治腸風臟血等

側柏葉　[illegible]　甘草

枳殼　槐花

右爲末每服二錢[illegible]調下日三服

大安散　治腸風瀉血

礬石　當歸　乳香

右用大[illegible]

並泥[illegible]

心米飲調下[illegible]

牛膝散　治腸風下血

牛膝　[illegible]　[illegible]

黃[illegible]

右爲末每服二錢[illegible]調下

治大腸風虛下血

何首烏　附子　白礬　[illegible]

右爲末每服二錢食前米飲調下

[illegible]散　治腸風下血

[illegible]　枳殼　木賊　當歸　[illegible]

右爲末每服一錢食前米飲調下

治積年腸風瀉血百藥無効

[illegible]　[illegible]　[illegible]　乾薑

右爲末每服一錢食前溫粥飲調下

止血散　治腸風下血或在便前或在便後或在便前皆其血近胃

血也在便後者[illegible]其血遠也

[illegible]　[illegible]　[illegible]　槐花

右爲末每服二錢清米飲下[illegible]

槐花散　治腸風臟毒下血

[illegible]　[illegible]

右爲末每服一錢溫酒調空心下

治腸風下血

槐花　[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]各等分

厚朴丸　治積年下血

厚朴　[illegible]　[illegible]

右爲末[illegible]丸梧桐子大每服三十丸空心米飲下

治腸風[illegible]

何首烏　[illegible]　雄黃　[illegible]黃

右爲末用[illegible]丸梧桐子大每服[illegible]丸空心溫酒下

治腸風臟毒

黃連　黃芩　地榆　[illegible]

右爲末[illegible]丸梧桐子大[illegible]

治腸風下血

[illegible]　[illegible]　香附

右爲末食前米飲調下二錢

[illegible]丸　治臟毒便血疼痛[illegible]

黄連　烏梅　苦參　槐花[illegible]
右為末丸梧子大每服十丸米飲下[illegible]
麝香散　治腸風大小便出血[illegible]婦人[illegible]
蝟皮[illegible]　貫衆[illegible]
右為末每服[illegible]入麝香[illegible]米飲[illegible]下[illegible]
後服[illegible]
一味存性研末飲下
治便血
枳殼[illegible]　側柏葉[illegible]
香附[illegible]　艾[illegible]
右用末飯為丸空心飲湯下
治便血
槐花[illegible]　水紅花[illegible]　川芎[illegible]
右為末空心新汲水調下
酒蒸黄連丸　治酒[illegible]便紅臟毒[illegible]
腸風臟毒方　男子婦人皆可服之
黄連[illegible]　枳殼[illegible]
木香[illegible]
[illegible]
黒灰散[illegible]治五種腸風[illegible]
有血[illegible]大腸不收[illegible]
烏聖散　治腸風下血
槐花白皮[illegible]　枳殼　防風[illegible]
右為末每服一錢白湯調服
四金散　治腸風
貫仲　荊芥穗　白礬[illegible]　猪牙皂角[illegible]各一兩
右同[illegible]為末每服一錢米飲調下空心食前
三服
槐角散　治腸風
槐角[illegible]　防風[illegible]　枳殼[illegible]　黄芩[illegible]

右為末每服一錢茶清調下
神應丸　治腸風[illegible]下不[illegible]
水牛角[illegible]　皂莢[illegible]　槐花[illegible]
右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸空心熱酒下
枳實丸　治腸風
枳實[illegible]　皂莢[illegible]　大黄[illegible]
右為末糊丸梧桐子大每服三十丸[illegible]空心食前服
礬石丸　治腸風下血久不止[illegible]
白礬[illegible]　附子[illegible]　乾姜[illegible]
右為末用河水煮麵糊丸梧桐子大每服[illegible]空心食前服
木賊散　治腸風下血多年不差[illegible]
烏梅丸　治腸風
烏梅肉[illegible]
右為末醋煮麵糊丸梧桐子大空心米飲下五十丸不[illegible]
防風散　治腸風
防風[illegible]　黄芩[illegible]　甘草[illegible]　人參[illegible]
右為末每服二錢食前米飲調下
黄芩飲　治大腸風熱下血不止
黄芩[illegible]　當歸[illegible]
右㕮咀每服二錢水一盞煎七分[illegible]
[illegible]散　治大腸風毒下血不止心神煩[illegible]
[illegible]　防風[illegible]
右為末每服半錢食前溫酒調下
治腸風下血不止肚痛日[illegible]
枯礬[illegible]　槐花[illegible]
右[illegible]作一劑[illegible]
牛角腮散　治積年腸風或發或歇不止
牛角腮[illegible]　猬皮[illegible]
右為末每服一錢食前溫酒調下
治積年腸風下血[illegible]

蜜陀僧 白礬 各半 桃子人 皂角
右件蜜陀僧研入礬研子內燒令通赤候冷取出為末入桃子
消灰稠煉研令勻和末飯丸如梧桐子大每服十五丸食前用溫飲下
蘇蘇丸 治腸風下血不止面色萎黃肢體焦悴
蘇蘇 黃耆 附子 乾薑
右剉搗為散入蘇蘇內以蓋之蓋子用泥固濟
火燒通赤煙盡為度候冷取出重研令細以粳飯和丸如梧桐子大每服
十五丸食前當香湯下
五倍丸
五倍子 槐花 百藥煎
右搗羅為末滴水為丸如小豆大每服二十丸空心米飲下日三服
一方無百藥煎
治丈夫腸風婦人血崩並入大腸出血
豆蔻 橄欖 黑豆

右為末每服二錢藿飲調下空心服
聚金丸 治腸胃積熱或因酒毒大便下血腹中熱痛作渴
脈數之證
黃連 黃芩 防風
右為末煮麵糊丸如梧桐子大每服五十丸米泔浸枳殼水下不拘時
冬月宜入大黃一兩
香梅丸 治腸風臟毒下血
烏梅 白芷 百藥煎
右為末米糊丸如梧桐子大每服七十丸空心用米飲下
二神金烏丸 治大便下血
香附 側柏 棕櫚
右燒存性為末每服二錢用米湯調下空心服法研飯丸如梧子大每
服一百粒米飲下
治腸風久而下脈遲日數十度者
枳殼 槐花 皂角

右為末煉蜜丸如梧桐子大和可得三百丸每服三十丸食前米飲下酒
亦得 忌[illegible]一料則安
治腸風臟毒一方
生乾地黃 熟乾地黃 五味子
右為末煉蜜丸如梧子大每服五七十丸酒或米飲下因心氣下血人可
用以香附煎湯服最驗此病更十七年不效服此一服而愈之
乃淫氣[illegible]連[illegible]紅花
治酒毒便血經年不差者
槐子 白礬
右為末每服二錢溫酒調下
治大便下血
棕櫚 枳殼
右為末醋糊丸如梧桐子大空心米飲下四十丸
治腸風下血或肛門出
臭椿根 樗根

右用烏梅甘草半水半酒煎空心服
治臟毒下血
側柏葉 槐花 棕櫚
右為末每服一錢溫酒調服
三[illegible]丸 治便血
天麻[illegible]
右燒灰存性為末調服
治腸風痛
荊芥
右為末
治[illegible]風血痢
以側柏葉[illegible]槐花[illegible]為末調服
治便血
蒲黃 荷葉 大蘿蔔
右將荷葉大蘿蔔[illegible]湯調下空心服

黃連飲 治腸風下血如痢腹中疼痛面色萎黃

黃連 [illegible] 當歸 [illegible] 甘草 炙 [illegible]

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服之

黃芩散 治腸風行步艱難

黃芩 [illegible] 枳殼 [illegible] 威靈仙 [illegible]

右為末以小豆大每服三十丸至五十丸用溫水下並不拘時

小柏丸 治腸風下血

烏梅 [illegible] 白礬 [illegible] 荊芥 [illegible]

右件煅石研細為末煉蜜丸如梧桐子大每服七丸米飲下

神效散 治腸風下血全不入食

當歸 [illegible] 見日 [illegible] 黑豆 [illegible] 槐花二兩

右件 [illegible] 石器 [illegible] 大 [illegible]

蜜炙 [illegible] 面 [illegible] 日食 [illegible] 各一服

敗肉 [illegible] 用重 [illegible] 得 [illegible] 食

大效丸 治腸風瀉血

大 [illegible] 白礬 [illegible] 當歸 [illegible]

右用不灰木 [illegible] 一兩剉 [illegible] 大 [illegible] 并 [illegible]

子每以用 [illegible] 子五 [illegible] 七 [illegible] 以 [illegible] 一合和 [illegible] 用 [illegible]

[illegible] 打 [illegible] 為末取一半為散

日以 [illegible] 為丸 [illegible] 子大每日空心 [illegible] 大蒜 [illegible] 下半 [illegible]

小 [illegible] 大 [illegible] 下十丸服 [illegible] 足 [illegible] 得三五箇

[illegible] 末 [illegible]

獨 [illegible] 丸 [illegible]

獨活散 [illegible] 中 [illegible] 生薑 [illegible]

右以薑汁入 [illegible] 中 [illegible] 為 [illegible] 入獨 [illegible] 末 [illegible] 手 [illegible]

子大每服四十九以 [illegible] 下空心臨卧服

榮 [illegible] 散 治腸風下血 [illegible] 不可忍

[illegible] 荊芥 [illegible]

右為末每服一錢 [illegible] 大 [illegible]

龍 [illegible] 散 治腸風寫血

伏龍肝 [illegible]

右 [illegible] 每服二錢 [illegible] 米飲調 [illegible]

治腸風痔疾大便下血 [illegible]

苦楝皮 [illegible] 苦參 [illegible]

右 [illegible] 燒存性 [illegible] 灰十 [illegible] 之 [illegible]

治腸風下血疼痛不止 [illegible]

直人頭 [illegible] 荊芥 [illegible] 皂莢 [illegible]

右為末每服 [illegible] 食前粥飲調下

內補散 治大腸風毒下血不止

[illegible] 側柏 [illegible]

右 [illegible] 末每服二錢食前粥飲調下

治大腸風毒下血不止 [illegible]

枸杞子 [illegible] 槐子 [illegible]

右為末每服二錢食前粥飲調下

又方 [illegible]

[illegible] 何首烏 [illegible] 各一兩

右為末每服一錢食前粥飲調下

又方 [illegible]

槐 [illegible] 燒灰 [illegible] 各一兩

右為末每服一錢食前粥飲調下

又方 [illegible]

牛角鰓 [illegible] 兩

右併燒為末 [illegible] 每服二錢食前粥飲調下

又方 [illegible]

牛角鰓 [illegible]

右每一隻牛角鰓 [illegible] 一塊 [illegible] 封 [illegible] 下 [illegible] 用 [illegible] 火 [illegible]

令熟研為散入 [illegible] 和 [illegible] 研為

散每服 [illegible] 二錢 [illegible] 每服 [illegible]

服

治腸風下血 [illegible] 不定

荊芥穗 薄荷 枳殼 [illegible]

右爲末每服二錢食前粥飲調下

又方 出聖惠方

皂莢 [illegible] 枳殼 [illegible] 白礬 [illegible]

右件藥入瓶子內以鹽泥固濟[illegible]

服二錢食前粥飲調下

神效方 出聖惠方 治腸風積年下血不止

黃牛[illegible] 白礬 [illegible] 枳殼 [illegible]

右以物並枳殼[illegible]通[illegible]取出細

爲末每服一錢食前溫酒調下

治腸風積年下血不止 出聖惠方

野狸頭 一枚 [illegible] 附子 [illegible]

右件藥入瓶內以鹽泥固濟[illegible]取出爲末每服

二錢食前粥飲調下

又方 出聖惠方

皂莢 [illegible] 枳殼 [illegible] 烏龍肝 [illegible]

右爲末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸食前粥飲下

又方 出聖惠方

槐耳 [illegible] 皂莢 [illegible]

右用末[illegible]

丸如梧桐子大每服十丸空心及晚食前以粥飲送下

治腸風下血疼痛 出聖惠方

密蒙[illegible] 荊芥 木香 各一兩

右爲末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸食前米飲下

治積年腸風下血面色萎黃下部腫痛 出聖惠方

綠礬 [illegible] 釜底墨 烏賊魚骨 [illegible]

右爲末棗肉丸梧桐子大每服二十丸食前煎艾湯送下

又方 出聖惠方

皂莢 [illegible] 當歸 [illegible]

右爲末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸食前粥飲下

治大便下血不止 出聖惠方

生乾地黃 [illegible] 阿膠 [illegible] 白朮 [illegible]

右爲末每服[illegible]食前[illegible]服

治腸風下血 出本事方

五倍子 白礬 [illegible]

右爲末[illegible]丸[illegible]每服[illegible]空心飲下

治腸風下血 [illegible]

牽牛 [illegible] 牙皂 [illegible]

右米泔[illegible]每

服七丸空心溫酒下[illegible]

治腸風及熱毒下血或因食熱物發動 出本事方

常[illegible]每日服五丸飲送下

[illegible]

方 爲末每服一錢新汲水調下

當歸赤小豆散 [illegible] 治先便而後血謂之遠血又治大腸[illegible]

[illegible] 當歸 一兩

右爲末漿水服方寸匕日三四服

治臟毒下血 [illegible] 地榆 [illegible]

右爲末每服二錢[illegible]

治便血及臟毒下血經年不瘥 [illegible]

槐花 五倍子 [illegible]

右爲末糊丸梧桐子大每服五十丸米飲下食前

荊芥散 [illegible] 治腸風下血

荊芥穗 縮砂仁 [illegible]

右爲末每服三大錢用糯米飲調下[illegible]

地榆[illegible] 治下血遠年不差 [illegible] 卷柏 [illegible]

[illegible] 水一碗[illegible]

茱萸丸 [illegible] 治腸風下血二三十年者

烏心黃連　吳茱萸

右新瓦上炒，候茱萸焦黑色，去茱萸，只用黃連為末，每服[illegible]
心温酒下。一二服未效，亦得。又方黃連、茱萸為末，糊丸梧桐子大，每服五
十丸，米飲下，日二服。更以胃風湯同加木香下。一方名剪血丸，用木
香一兩，同上分，空心米飲下。[illegible]

治臟毒下血

猪胆子　鯽魚

右以猪胆[illegible]入魚腹內，文武火煨，令煙盡，取出，入麝香少許，為末，酒調下。

又方　治臟毒下血，久遠不差者。

黃連　木香

右為末，[illegible]湯調下。

治酒毒下血多至升斗者。唐州衛[illegible]云，徐侯居[illegible]，[illegible]下血[illegible]，服[illegible]，加槐花二兩，如常法，服[illegible]久之不應，[illegible]後得此方，效。

黃連

[illegible]

每以豬臟[illegible]合，入米文武火煮爛，取出搗肚，並黃連研[illegible]，丸梧桐子大，每服五十丸，米飲湯下。

治腸風下血

豬臟　槐花

右將槐花[illegible]入豬臟內，[illegible]火煮，焙乾，切片，[illegible]鉢內研，爛丸彈子大，日乾，每服一丸，空心食前，[illegible]酒送下。

治便紅如傾水

羊屎葉根　生白酒　汁

右將羊屎葉根[illegible]
[illegible]能[illegible]，以[illegible]下，同[illegible]下血如[illegible]水，全行[illegible]不能起，店主[illegible]用

羊[illegible]

神應丸　治積年便紅

大黃　[illegible]　生地

[illegible]

[illegible]連丸　[illegible]腸風[illegible]毒

[illegible]

右用[illegible]丸，和黃連末，丸梧桐子大，每服三十丸，陳米飲下。

黃連　[illegible]

[illegible]

槐花散

右為末，每服[illegible]

治臟毒[illegible]

[illegible]

右為末，丸梧桐子大，[illegible]心[illegible]下

枳殼散　[illegible]

[illegible]

右為末，每服二錢，空心，槐花煎湯調下。

治腸風下血

[illegible]

以[illegible]指[illegible]食不過十頓，差。或將[illegible]燒灰酒調下。

治下鮮血

以茄子[illegible]燒灰，水和一錢匕服，量其大小多少服之。

治積年久病腸風下血不止

[illegible]　附子

右以棗[illegible]丸梧桐子大，空心生地黃[illegible]，米飲下，亦可每服三
十丸。[illegible]
下血[illegible]

治腸風臟毒

一兩茱萸，半兩連，二味同炒，不同研。
[illegible]荊芥[illegible]湯下，[illegible]用連。

究原方 治痔疾下血等證
大蒜
右丸如梧子大每服二十丸前香菜少下不拘時 方出馮氏選發
精抄空心用陳米飲下五十丸午時再服百丸以痛安而止可以永除
根本無所忌 宜州彭知録大效亦云世無甚妙其方所用大蒜先
蒸丸次然後和藥可以今蓋水送下痛止即效 昔朱鄒元欣云先
于黃及佳子採提刑皆服之數十年之久更不復作
猪臟丸 治大人小兒大便下血日久多食易飢腹不痛裏不急名
曰腸風 先用海螵蛸炙黃去皮白用為末以木賊草煎湯調下
服之三日後效
黃連 嫩猪臟
右以黃連末入猪臟內兩頭紮定煮十分爛研細入杵為丸如梧子大每服
三五十丸米飲下
魚方 治腸風血痔及下痢膿血積年不差血色鮮
大活鯽魚 白礬
右用鯽魚去腸入白礬用厚紙裹先燒存性為末
為末每服二錢米飲調下
治下血二十年者
地榆 鼠尾草
右水二升煮取半升頓服不斷水漬屋塵飲一小盃投之不過重作乃愈
二黃丸 治腸風下血
黃芩 黃連
右為末煉蜜丸梧子大每服三十丸米飲下
治遠年腸風下血不止
枳殼 羊脛炭
右和用米飲一中盞調下空心服之如人行五里再服當日見效
治腸風痔下血 忌油膩毒物等
牛黃一兩
右同為末每服用水一盞煎三五沸溫服

治腸風下血方
枳實 黃耆
右為末米飲調下五十丸
治便紅
荊芥 百草霜
右為末糊丸米飲下
阿膠丸 治腸風下血
阿膠 刺猬皮 地榆
訶子肉 黃耆 赤石脂 枳殼 龍骨
忌食 槐角
右為末煉蜜丸梧子大每服三十丸米飲空心食前服
治臟毒
生地黃汁一碗 白芒硝
右相和溫服即止
治腸風臟毒下血不止
棕櫚炭
右為末每服二錢米飲調下
烏金散 治腸風下血
猪牙皂角 胡桃
右和勻燒存性研細
即出每服二錢入麝香少許溫酒或米飲調下
食前服
治腸風下血
椿根白皮 赤小豆
右為末每服一錢
胡荽子散 治腸風下血不止
胡荽子 補骨脂
右為末每服二錢米飲調下食前服
棕艾散 治腸風下血

棕櫚灰 熟艾 各一兩

右用黑鷄子兩箇同研作丸別炮附子去皮臍為末每服用水

一盞附子末一錢煎數沸放溫調前藥二錢空心食前服一方不用

附子用鷄子一個以酒服

神効散 治腸風

槐角 皂莢子 各一

右用穀藥同炒令香熟去槐角為末每服二錢煎陳粟米飲調下

空心食前服

荊芥散 治腸風

荊芥 去莖 枳殼 去穰麩炒各一兩

右為末每服一錢不炒一錢半生入鹽米末一錢煎為熟服不計時

猬皮散 治腸風下血不止

猬皮 [illegible] 鼠頭 [illegible]

右為末每服一錢煎皂莢子湯調下米飲亦得

槐角散 治腸風下血

槐花 炒 荊芥穗 各等分

右為末每服二錢米飲調下血甚者一兩服効草使槐花亦好

食前服之一方用酒調服

四仙散 治腸風痛甚不瘥

枳殼 槐花 [illegible]

右剉碎入木鍋一處炒乾再炒黃為末以生鷄子清和作小餅

入炙乾再為末每服二錢空心陳米飲調下仍後更一服

香木丸 治腸風下血

白朮 [illegible] 乾地黃 [illegible]

右相和硬為丸少許煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸空心

粥飲下加至二十九

紫灰散 治腸風瀉血

故紙 [illegible] 枳殼 [illegible]

右為末每服二錢入膚白少許同陳米飲調下食前服

治便血

黑豆 一合 粉草 [illegible]

右水一碗半煎至八分作二服調鷄子清不拘多少空心服之

治腸風下血風氣攻注大腸疼痛

鯽魚 [illegible] 硫黃末 一兩

右將魚不去鱗腸腹去腸入硫黃在內用濕紙裹五七重又以泥

厚封候乾以大火燒令通赤取出於土坑內出火毒半日細研為末

每服食前以溫酒調下一錢

治腸風下血久不止大腸虛冷

附子 [illegible] 白礬 [illegible]

右為末每服二錢食前粥飲調下

治大腸風熱下血不止

薄荷 一握 麥門冬 一兩

右為末不計時候米飲服

又方

蒼耳子 [illegible] 甘草 [illegible]

右為末每服二錢水一盞煎至七分食前溫服

又方

槐耳 [illegible] 乾柿 一兩

右為末每服一錢食前溫酒調下

又方

附子 [illegible] 生薑 [illegible]

右以水一大盞煎至五分去滓食前溫服

又方

棕櫚皮 [illegible] 栝樓 一兩燒灰

右為末每服二錢食前粥飲下

治腸風下血歇不定

[illegible] 豬子 [illegible]

[illegible]以大火燒令通赤取出放冷細研用稀米飯和丸梧桐子

大每服二十丸食前粥飲下

治腸風下血不止下部令痛[illegible]

谷蘆[illegible]英[illegible]

右為末軟飯丸梧桐子大每服三十丸食前粥飲下

治大腸風毒下血方[illegible]

蝟皮一枚 皂莢[illegible]

右為末棗米飯丸梧桐子大每服十五丸食前粥飲下

又方[illegible]

白礬[illegible] 乾薑[illegible]

右為末每服半錢食前粥飲下

又方[illegible]

[illegible] 蟬殼[illegible]

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸食前溫米飲下

又方[illegible]

皂莢[illegible] 白羊[illegible]

右先搗皂莢為末後以烏梅肉搗令熟丸梧桐子大每服二十丸食前溫

水下

治腸風積年下血[illegible]

右為末每服一錢食前溫粥飲調下

[illegible] 側柏葉[illegible]

右為末每服二錢食前以米飲湯調下

曼白丸 治腸毒下血及腸風

用椿根白皮[illegible]為細末[illegible]丸梧桐子大

每服三十丸[illegible]下[illegible]

散下[illegible]

治腸風及臟毒下血不止[illegible]

[illegible]

[illegible]

右為末煉蜜丸梧桐子大每服一十五丸食前粥飲下

治腸風下血[illegible]

用[illegible]為末每服二錢[illegible]下

治腸風下血[illegible]

用小薊[illegible]為末每服三錢[illegible]日一服

一方[illegible]

又方[illegible]

用荊芥花不以多少[illegible]為末每服二錢[illegible]調下

又方

用[illegible]枯礬三兩[illegible]為末每服三錢米飲空心調下

治腸風

用[illegible]不拘多少[illegible]空心服[illegible]一名

天羅[illegible]皆[illegible]

治腸風下血[illegible]

用[illegible]不拘多少[illegible]為末[illegible]去大腸[illegible]

烏梅丸 治大便下血[illegible]

烏梅三兩[illegible]為末[illegible]丸梧桐子大每服七十丸空心

食前用米飲[illegible]下

一方[illegible]為末每服二錢空心米飲[illegible]

一方為末[illegible]

[illegible]

[illegible]散 治腸風臟毒[illegible]

用乾柿燒灰存性為末每服二錢米飲調下[illegible]

之事有應效[illegible]

故所以[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

濕

用此不老的艾最妙[illegible]春骨[illegible]隨上灸七壯或年深更
於雅胃瘀[illegible]寸灸如上數[illegible]又[illegible]兒留向為嚴
[illegible]之留飲新其瘦瘠問之[illegible]臟毒依咒半月自
分父死得一藥服之至今無苦問何藥[illegible]言每三[illegible]只這
草乎上有之乃是乾柿燒灰飲下二服本草云柿治腸解熱毒
治腸血後有病者[illegible]之[illegible]腸解為痔曹茂[illegible]通利之子
年下餘歲[illegible]若此凡治腸風解如地榆之類過服無効閒
書見此方用之一服而愈是乾柿燒灰者[illegible]合肥同官觀
說者[illegible]

禹月湯 [illegible]治便血及臟毒下血經年瘦者
用[illegible]被[illegible]每服三錢水一盞煎七分[illegible]或作丸子
服並可[illegible]人[illegible]功一方為末空心温酒調下或米飲
[illegible]

治腸風瀉血[illegible]
用蒼[illegible]每服五六十丸米飲吞下一方
煎服一方為末飯飲下

胡[illegible]散 治[illegible]腸風失血
用胡[illegible]一兩[illegible]為妙用[illegible]煎去[illegible]空心服一方[illegible]
末米飲調下

治[illegible]
用[illegible]以多[illegible]每[illegible]
用合[illegible]
以生[illegible]為末空心[illegible]調下二服

治臟毒下血久遠不差者
用大蒜一枚[illegible]
[illegible]
又方 [illegible]用烏梅[illegible]
又方 治[illegible]臟毒下血久遠不差者
用茶[illegible]研細入[illegible]香少許空心糯米飲調下

治腸風 [illegible]一方
用蜜炙[illegible]
治下血久不差 [illegible]方
用地榆[illegible]為末[illegible]每服二十丸米飲
下日二服 一方[illegible]
治腸風 [illegible]散[illegible]
用香[illegible]為末米飲調下神效
治下血 [illegible]方
用[illegible]乾為末每服 二錢米飲調下
治腸風 [illegible]方
用[illegible]葉[illegible]每服二錢[illegible]飲調下[illegible]
[illegible]
治酒毒腸風[illegible]
用大田螺五箇[illegible]燒[illegible]為度為末
作一服[illegible]調下
治腸風下血及酒毒下血 [illegible]方
用山[illegible]為末[illegible]米飲下
又方 [illegible]方
用梔子[illegible]每服[illegible]煎至八分服之[illegible]
加[illegible]服立止
治便血 [illegible]方
用荊[illegible]為末每服二錢米飲調下[illegible]
不調[illegible]
絲瓜散 治[illegible]
用乾絲瓜一枚連皮燒作灰存性[illegible]為末酒調
二錢空心[illegible]
經効散 治腸風[illegible]
用[illegible]為末每服二錢空心米飲調下[illegible]
四十丸空心米飲下一方二兩[illegible]

又方 大黃各[illegible]為末每服二錢[illegible]

用白鷄冠花炒存性為末每服一兩[illegible]飲調下二錢

槐花散 治婦人大便血腹痛

用槐花二兩荊芥各等分為末每服二三錢溫酒調下三服 方用

陳艾葉煎湯飲服亦以槐白皮煎汁服

治囊後解[illegible]

用艾葉煎取生薑汁合服一服艾葉煎湯服

又方

用[illegible]末水調[illegible]

又方

用黃背花浸酒服

又方

用桑白皮[illegible]煮服為末調[illegible]

又方

用黃[illegible]為末水調服

又方

用白鷄冠花并子炒煎服

[illegible]

用[illegible]當歸[illegible]立愈

又方

用[illegible]根煎[illegible]服

又方

用棕櫚[illegible]為末[illegible]調下

又方

用枯礬[illegible]燒灰存性為末調服

又方

用[illegible]根知[illegible]煎服

又方

用[illegible]為末[illegible]調服[illegible]百病

治腸風下血不止

用枳殼燒灰存性不以多少為末用[illegible]三錢空心服入麝香少許

木賊散 治男女腸風及痔下血

用[illegible]山梔子[illegible]去皮[illegible]

[illegible]

外[illegible]一升[illegible]服一[illegible]服

治腸風便血[illegible]

用[illegible]空心[illegible]二錢

[illegible]

用[illegible]

[illegible]

用[illegible]

[illegible]

茶[illegible]

治腸風痔漏[illegible]

用[illegible]

[illegible]灰散 治腸風下血久不止

用[illegible]

黃芩[illegible]

用[illegible]

[illegible]

止[illegible]

[illegible]

[illegible]

治臟毒下血

用[illegible]

治卒下血不止

用龍骨一兩[illegible]水五升煮取二升半分為五服

治溺血不止

用木賊草十二分以水一升八合煎八合去滓空心溫分二服如人
行五里又服
治久患腸風痔疾常服勿令斷服之及一月諸疾皆愈[illegible]
風痔漏一二十年不差面色萎黃飲食無味及患腸癖[illegible]
婦人月候不止及諸般痔疾[illegible]月候[illegible]赤白[illegible]
年不差虛羸腸痔諸疾皆主之白礬石龍骨先制去土各四兩空心服
一歲以上[illegible]若內溢水漿服[illegible]丸大者一兩以三服大小
以此為準[illegible]一服若[illegible]
[illegible]

治腸風[illegible]
用[illegible]燒出火毒二錢用[illegible]一丸細嚼米飲[illegible]下
治男子臟毒下血
用冰室水飲任意飲之
法製木香湯方 治諸下血
用大黃連杵去毛皮以童子小便浸一日夜日乾[illegible]又用[illegible]
右為末每服二錢米飲調下治冷熱用以艾葉為湯調下一方
右為末煉蜜為丸梧桐子大每服四五十丸米飲下
治腸風[illegible]用石榴皮[illegible]茄子為末[illegible]下
治腸風[illegible]以大藕[illegible]一斤研末糯米糊丸一斤為末服[illegible]為細末調[illegible]
用鹿角[illegible]春
下
治多年腸風瀉血及脫肛血里急[illegible]紅線石[illegible]
用好黃連三兩多年日乾分為三分一分生用一分炒作末[illegible]入東來一
兩和[illegible]以水浸蒸餅為丸梧桐子大每服五十丸空心溫酒米飲下一服立效如[illegible]
米來炒[illegible]黃連為末[illegible]去[illegible]之二服[illegible]一服即方治血[illegible]
又一方[illegible]乾末道[illegible]下
治腸風下血疼痛不止[illegible]

用[illegible]東[illegible]切片[illegible]半[illegible]可[illegible]用
灰小白一[illegible]之[illegible]以[illegible]之[illegible]
血神丸 治腸風下血不止
用[illegible]月[illegible]日[illegible]出[illegible]不以多少用[illegible]
[illegible]細[illegible]二兩入[illegible]一兩
[illegible]梧桐子大[illegible]二十丸[illegible]以水
[illegible]同[illegible]子大[illegible]五七[illegible]出[illegible]
[illegible]不[illegible]日[illegible]見日[illegible]血[illegible]不
[illegible]依法[illegible]
椿黃散 治腸風瀉血
用[illegible]一半生用一半燒[illegible]為末[illegible]一錢[illegible]
[illegible]下不拘時
保應丸 治腸風臟毒血痢來不止
用[illegible]白[illegible]各[illegible]用石灰[illegible]為末[illegible]梧桐子大
每服二十丸[illegible]食前服
[illegible]金散 治腸風瀉血
用木賊不拘多少[illegible]使用[illegible]合之[illegible]為末
每服一錢[illegible]調下空心服
又血方 治[illegible]血不止
用巴豆一枚去殼[illegible]一小[illegible]內巴豆一枚[illegible]子[illegible]
定[illegible]以[illegible]熟去殼并巴豆一味[illegible]雞子[illegible]
去不得[illegible]生[illegible]人以作二服
治子酒 治久患腸風瀉血
用茄子種大者三枚先將一枚[illegible]大內[illegible]
子[illegible]以無灰酒一升半夾之[illegible]以[illegible]封[illegible]三[illegible]茄子[illegible]酒
空心分服如是更作不過三度瘥
又方
用黑豆小者三升[illegible]去皮[illegible]為末[illegible]梧桐子大每服三
十丸空心[illegible]米飲下
蛇黃散 治腸風下血不止及脫肛腫痛

用蛇黃兩顆煅醋淬七遍研細每服一錢陳米飲送下

又方

用牡蠣大者一枚煅醋淬七遍細研每服三錢陳米飲調下日再服

治腸風痔漏大便出血

用枳殼根皮搗羅爲細末每服一錢日三服煎黃汁當飲之效

方用枳實根皮

救聖枳殼丸 治五種腸風瀉血似痢

枳殼 [illegible] 威靈仙 [illegible] 陳橘皮 [illegible] 生乾地黃 [illegible]

黃耆 [illegible] 附子 [illegible] 當歸 [illegible] 羌活 [illegible]

白蒺藜 [illegible] 人參 [illegible] 羌活 [illegible] 地骨皮 [illegible]

何首烏 [illegible]

右爲末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸空心溫粥米飲下

大効檳金丸 治結陰便血及腸風不止

[illegible]

硫黃 [illegible] 草 [illegible] 丁香 [illegible]

巴戟天 [illegible] 桔梗 [illegible] 肉蓯蓉 [illegible]

海桐皮 [illegible] 白茯苓 [illegible]

甘草 [illegible] 人參 [illegible] 丁香 [illegible] 肉豆蔻 [illegible]

附子 [illegible]

右除羊肉外並爲末以羊肉[illegible]丸梧桐子大每服二十丸空心溫酒下加至三十丸

紫參湯 治便血

紫參 茜根 赤芍藥 阿膠 [illegible] 蒲黃

青竹茹 [illegible] 黃芩 [illegible] 雞蘇葉 小薊根 [illegible]

右㕮咀每服三錢水一盞入生薑一片[illegible]至七分去滓

食後溫服

地榆散 治結陰便血

地榆 [illegible] 黃耳 [illegible] 甘草 [illegible] 赤芍藥 [illegible]

乾地黃 伏龍肝 [illegible] 艾葉 [illegible] 當歸 [illegible]

右爲細末每服二錢米飲調下食後臨臥服日三

柏皮散 治大便下血 [illegible]

地黃[illegible]丸 治結陰便血

生地黃 [illegible] 小薊 [illegible] 地榆根 [illegible]

阿膠 [illegible] 側柏 [illegible]

右除上三味外搗爲末入[illegible]丸如彈子大每服一丸水一盞煎至六分

[illegible]

桂[illegible] 治結陰便血至三二升者[illegible]

桂 [illegible] 赤芍藥 [illegible] 當歸 [illegible] 黃芩 [illegible]

甘草 [illegible]

右㕮咀每服三錢水一盞入竹茹彈子大同煎七分去滓空心溫服

服小二服

烏龍丸 治大便下血腹內痛不可忍

[illegible] 伏龍肝 [illegible] 白芷 [illegible]

右爲末煉[illegible]丸梧桐子大陰乾每服三十丸煎生薑艾葉湯下空心

食前服

神應[illegible]丸 治便血無度

阿膠 [illegible] 當歸 [illegible] 白芍藥 [illegible]

右爲末煉蜜丸梧桐子大空心米飲下三十丸加至五十丸

阿膠芍藥湯 治便血如小豆汁

阿膠 [illegible] 赤芍藥 [illegible] 當歸 [illegible] 甘草 [illegible]

右㕮咀每服水一盞半入竹葉二〇片煎八分去滓溫服

黑神散 治久下血

蒼朮 [illegible] 烏賊 [illegible] 皂莢 [illegible] 黃連 [illegible]

右[illegible]炭火燒[illegible]爲末每服二錢入[illegible]一錢[illegible]

[illegible]調下

石榴散 治結陰瀉血不止

[illegible]石榴皮 陳橘皮 [illegible] 甘草 [illegible] 乾薑 [illegible]

右搗羅爲末每服二錢米飲調下日三服

芍藥[illegible] 治特便血

赤芍藥一兩 [illegible] 甘草[illegible]
右㕮咀 每服三錢 水一盞 入生薑三片 煎至七分 去滓 溫服
立効散 治大便下血
罌粟殼 甘草三錢 山梔子人[illegible]
右㕮咀 每服五錢 水三盞 [illegible] 空心 二十[illegible]
每煎一盞 去滓 分二服
地榆散 治結陰下血不止 腹痛不已
地榆四兩 甘草[illegible]
右㕮咀 每服五錢 水三盞 入縮砂仁四七枚 煎至一盞半 去滓 溫服
二服
槐角子丸 治結陰下血 腹痛
槐角子[illegible]
[illegible]
右 每服三錢 水一盞 入 [illegible] 至八分 去滓 [illegible]
[illegible]丸 治結陰便血不止 疼痛無時
[illegible]
右為末 煉蜜丸 如梧桐子大 每服三十丸 溫酒 [illegible] 下 空心食前
三服
[illegible] 治下血 結陰
用 [illegible] 一兩 搗研 令細 [illegible] 去 [illegible] 為末 [illegible] 梧桐子大 每服九丸 [illegible] 下 五六服 [illegible] 三日可斷根
金屑丸 治便血 一切血 並治結陰
用 [illegible] 不 [illegible] 入 [illegible] 一兩半 [illegible]
[illegible]
[illegible] 梧桐子 每服三丸 煎 [illegible] 下
便血 [illegible] 三服 [illegible]
金虎丸 治結陰便血
用 [illegible] 一兩 去皮 [illegible] 為末 為丸 [illegible] 大 每服七
[illegible]
治大腸風毒 瀉血不止
用 [illegible] 子三枚 [illegible] 服 [illegible]

[illegible] 為末 每服 [illegible] 食前 [illegible] 下一錢
治腸風臟毒 瀉血不止
用五倍子 [illegible] 半 [illegible] 一半 [illegible] 不 [illegible] 為末 [illegible]
[illegible] 梧桐子大 每服二十丸 [illegible] 下
又方
用 [illegible] 二兩 為末 每服一錢 食前 [illegible] 飲 [illegible] 下
治腸風瀉血不止 [illegible]
用川烏頭一兩 去皮臍 生用 [illegible] 每服三錢 水一中盞 入生薑半分
煎至一百 [illegible] 煎至五分 去滓 食前溫服
治熱毒下血 或因 [illegible] 發動 [illegible]
用生 [illegible] 根二斤 [illegible] 一升 [illegible] 汁一升 相和服
槐實膏子 治臟毒便血不止
[illegible] 入 [illegible] 子清 [illegible]
[illegible] 食前 [illegible]
治 [illegible] 下血 [illegible]
[illegible]
用 [illegible] 下 [illegible] 服五錢 [illegible]
治腸風 [illegible]
用 [illegible] 散 [illegible] 下 [illegible] 丸 或紅丸子 [illegible]
治臟毒 [illegible]
用 [illegible] 丸 [illegible] 三 [illegible] 丸 [illegible] 大 [illegible]
治 [illegible] 下血 [illegible]
用 [illegible] 四君子 [illegible] 服 [illegible] 前 [illegible]
治便血
用 [illegible] 湯 加 [illegible] 服
治臟 [illegible] 大腸不 [illegible] 下血 [illegible]
用 [illegible] 二 [illegible] 下
治腸風 [illegible]
用 [illegible] 風散 [illegible] 丸 [illegible]
治毒臟便血不 [illegible] 後事
用紅丸子小理中丸三枝 [illegible] 丸 [illegible] 丸 [illegible] 空心服 [illegible]

漸加至一百丸，每日二服，三日立效。

治因熱出浴，即投水中，致人腸風便血，諸藥不効。

用[illegible]服五苓散便知。

治腸風

周明莫子和生菜熱餅果食甚多。

黃芩湯　凡血但大便而下，不[illegible]，食不節，飽不時，

傷此者，衝任不調，或強其大便，氣無從出，[illegible]滲於腸，則血矣。

宗筋弛緩，從門入於大腸，[illegible]脈虛弱則氣閉，凡不服者，

底痢，故先便而後血，血在其上，[illegible]血而後便者，其血從所下不當，

所腸[illegible]，剛作血之者，宜[illegible]

烏荊丸　治腸風下血，諸風相搏，每服二十丸，用枳殼散送下。

槐蓋湯　食前任下

聖金丸　治腸風下血，積血不止，及臟毒或無故便血。

用百藥煎三兩，一兩生，一兩炒存性，爲末，丸梧桐子大，每

服七十丸，米飲空心服。一方用粉糊丸，亦可。一方爲細末，每服二

錢，米飲調下。

四季使梧飲　治腸風臟毒，下血不止。

[illegible]兩燒存性，[illegible]亦燒存性，枳殼[illegible]爲末，每服二錢，

飲調下。一斤，亦可。炒爲末，每服二錢，枳殼湯食前下。

烏頭丸　治腸風久年不瘥。

用草烏頭去皮尖，切四片，豆大，炒令[illegible]，不[illegible]，[illegible]

入自然汁和丸，如梧桐子大，每服空心米飲下十四丸，不過兩服。

如神

敗毒散　治臟毒下血，臟腑疼痛，[illegible]後重。

槐花（炒）　白礬（[illegible]）

右爲細末，每服烏梅一箇，茶一錢，水一盞，煎至六分，去滓，溫服。

側柏散　治腸風臟毒，酒痢下血不止。

嫩柏葉（九蒸九曬）　陳槐花（炒）

右爲末，煉蜜丸，如梧桐子大，每服四五十丸，空心溫酒下。

槐香丸　治臟毒腸風下血。

槐花（炒）　黃連　木香

白礬

右爲末，用烏梅十箇，醋[illegible]一處，[illegible]研成膏，同前藥搗勻爲丸，如

梧桐子大，入少黃梅醋和丸，每服十五丸至二十丸，多血痢[illegible]

不止，以地榆三錢煎湯下，空心食前，或[illegible]後[illegible]

連進三服，每日兩日一服。

如聖丸　治腸風臟毒，下血不止，日久羸瘦。

大蒜　地榆

右爲末，大蒜同研，令勻，入[illegible]少許，搗令得所，丸如梧桐子大，每服

三十丸，米飲下，空心服，如[illegible]，取大眼桐皮，去黃取白，

煎湯下。

血餘散　治腸[illegible]血，[illegible]一服效。

血餘（燒存性）　雞冠花根　柏葉（各一兩）

右爲末，臨臥溫酒調下二錢，來晨再一服，立效。

治人飲酒過多，[illegible]血，[illegible]腸胃[illegible]，大便血如腸風者。

[illegible]丸

[illegible]　川烏　大附子

右爲末，糊丸，如梧桐子大，每服七十丸，艾湯下，末散，溫湯亦得。

空心食前

雲母地黃丸　治男子婦人腸胃氣虛，下血不止，[illegible]

併及氣血衰弱，皮膚枯燥，肢體倦瘦，飲食不思，[illegible]血虛風[illegible]

丸空服之

當歸　熟地黃

川芎　枸杞　黃芩

右爲末，煉蜜丸，如梧桐子大，每服三十丸，空心鹽湯或溫酒下，至五十丸。

茶芎湯散　治腸風下血。

茶芎（一兩）　棕櫚（燒）　白梅

右件爲末，和勻，米飲調下二錢，空心服。

細風散　治下血甚不可救者。

[illegible]　槐花

右為末每服二錢飲調服神效

黃耆散 出聖惠方 治痔血

黃耆二兩 甘草 兩 枳實 [illegible] 青木香 [illegible]

右為細末每服二錢食前米飲調下

蒲黃散 出聖惠方 治腸風下血

蒲黃 [illegible] 木耳 [illegible]

右為細末每服三錢食前米飲下

地黃丸 出聖惠方

地黃二兩 [illegible] 黃連 半兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服三十丸米飲下

香丹 [illegible] 治腸毒下血

杏仁 [illegible] 蝟皮 一兩

右二味以中熬搗令可以丸如丸每服空心米飲下三二十丸 [illegible]

服甚不效者服之如神大效人每服血止 [illegible]

再服亦不過數服

通神散 [illegible] 治腸血三代者救散子

[illegible] 仁 [illegible]

右細末米飲調服大效經驗

豬肚丸 [illegible] 療大便後出血

白礬 [illegible] 附子 [illegible]

右前藥末以如梧桐子大每服十丸至二十丸日二三 豬腸 [illegible]

五倍子 [illegible]

蓮子散 [illegible] 治腸風臟毒下血不止

旱蓮子

右用上料為末以 [illegible] 每服二錢米飲調下食前服

人參散 [illegible] 治腸風臟毒

人參 白茯苓 黃耆 甘草 五味子

右等分為細末每服二大錢白湯調下每日四五服 [illegible]

有此疾者服之不至力之不至 [illegible] 多多為佳

以為效

附子當歸丸 [illegible] 治腸風冷在腸胃下血手足冷而脈微小

當歸 [illegible] 白芍藥 附子 [illegible] 白朮 各一兩

右為末醋煮麵糊丸如梧桐子大飲下五十丸食前服

鳳眼草散 [illegible] 治腸風下血

鳳眼草 [illegible] 椿白皮 [illegible]

蛤粉

右為末細末每服二錢溫白湯調下米飲亦可空心食前服

地榆散 [illegible] 治腸風下血不止

地榆 [illegible] 附子 [illegible] 赤芍藥 [illegible] 橡斗 各一兩

右為細末每服二錢溫酒調下米飲亦得空心食前

蝟皮散 [illegible] 治腸 [illegible] 下血

白刺蝟皮 [illegible] 木賊 [illegible]

右為細末每服二錢 [illegible] 溫酒調下空心食前

立聖散 [illegible] 治年深日久腸風下血或如雞肝日夜無度全不入食

[illegible] 者 [illegible] 血

黃 [illegible]

右為末細每服一錢濃煎荊芥湯調下空心食前

枳殼散 [illegible] 治腸風下血過多

枳殼 [illegible]

右剉細 [illegible] 入瓶子內 [illegible] 燒為細末每服一錢入臘茶

一錢白湯點服食前

如聖散 [illegible] 治年深日久江腸風下血諸般痔漏

臘月野狸一枚 [illegible]

豬牙皂角二兩 [illegible]

[illegible]

右研細令 [illegible] 每服二錢 [illegible] 溫酒調下空心食前

鹿茸丸 [illegible] 治虛老人陽氣虛脫血不能存 [illegible] 大腸

鹿茸 [illegible] 熟地黃 [illegible] 附子 [illegible] 五倍子 [illegible]

山藥 肉蓯蓉 杜仲

右為末，蜜丸梧桐子大，每服二三十丸，空心鹽湯溫酒下。

芍藥丸 治腸風下血

芍藥 白雞冠花 側柏

右等分取青蒿根汁煮丸，米飲下三十丸，空心服。

四神丸 治一切大便下血

香白芷 枳殼 川百藥煎 白礬

右等分為末，糊丸，每服五十丸，空心米飲下，熱水亦可。

聖散 治腸風下血等疾

草薢 貫衆

右等分為細末，每服二錢，空心鹽酒調下。

槐葉散 治便血

槐花 柏葉 川芎 荊芥 蔓荊子

右等分為末，乳香末米飲下，每服二錢。

神效丸 治酒毒下血

當歸 芍藥 槐花

右等分為細末，青蒿汁為丸，米飲送下三十丸，空心服。

治高年老人便血

大艾葉 鹿茸 當歸 烏梅肉 白礬

右為末，醋糊丸梧子大，空心服，神效，米飲送下二十丸。

治生臥血不止下便血

用蒲黃同當歸為丸，米飲下三十丸，空心服。

治腸風下血

橘皮 子

右件為末，每服二錢，蓋酒調下，如人下血，可以服一盞，趁之日服

極效

趙散 治下血又血痢

槐花 青州棗 乾薑

右等分燒存性為末，陳米飲調二錢

皂角散 治五種腸風瀉血下痢，外痔，後有血號內痔，大腸不收號脫肛，穀道四面有努肉如奶號舉痔，有孔號瘻，並皆治之

黃牛角 蛇蛻一條 豬牙皂角

穿山甲

右四味同入瓷瓶內，黃泥封固，候乾，先以小火燒令煙出，方用大火煅令通紅為度，取出攤冷，研細為末，患者先用胡桃肉一箇，分作四分，取一分，臨臥時研細如糊，溫酒調下，便睡，先引蟲出，至五更再溫酒調下藥末二錢，至辰時見效，一服取下惡物，永除根。

治大腸一切下血

取絲瓜黑豆糯米小兒者是下，以多少淡以皂角湯煎

如米為丸，大每服米飲水送服，甚效

節菴云去四下，如腸中作痛，名曰濕毒腸

升麻 羌活 獨活

葛根 肉桂 牡丹皮 防風 柴胡

白芍藥 當歸身 黃芪 甘草 熟地黃 生地黃

右吹咀，如麻豆大，分作二服，每服水二大盞，煎至一盞，去滓稍熱服

食前

益胃升陽

右三部脈中

升麻

益智仁

柴胡 牡丹皮 桂枝

右為麤末，都作一服，水二大盞，煎至一盞，去滓溫服，一服

烏梅丸 治腸風下血

效

直殭蠶一兩炒[illegible]
右爲末每[illegible]大每服[illegible]三服
治下血不禁如刺㽲痛[illegible]
用樗白皮[illegible]不止[illegible]
黑牽牛[illegible]治腸風[illegible]不止
刺蝟皮[illegible]豬懸蹄[illegible]酒九[illegible]亂髮[illegible]
敗棕[illegible]苦楝根[illegible]槐角[illegible]
右剉碎用[illegible]研爲細末入乳香二錢麝香[illegible]研和
令勻用酒打麵糊丸梧桐子大每服二十丸細嚼胡桃一枚空心
人溫酒送下[illegible]
治下血[illegible]
[illegible]不[illegible]木朮飲[illegible]
[illegible]服[illegible]可[illegible]人致[illegible]不欲食[illegible]三兩[illegible]
時服[illegible]見血[illegible]
是血皆[illegible]之前[illegible]

下[illegible]以[illegible]不[illegible]細而[illegible]以平
胃地榆湯主之
平胃地榆湯
蒼木一錢　白朮半錢　陳皮半錢　白茯苓[illegible]
乾薑[illegible]　當歸[illegible]　甘草[illegible]　地榆[illegible]
人參三分　白芍藥[illegible]　益智仁[illegible]　葛根[illegible]
黑附子[illegible]
右件都作一服水一盞半生薑三片棗二枚同煎至一盞去滓食前溫
服[illegible]中[illegible]服[illegible]三七[illegible]
元[illegible]
三里二七[illegible]
言[illegible]
治腸風下血[illegible]
鹿茸[illegible]　烏梅[illegible]　杜仲[illegible]
右為細末[illegible]丸[illegible]

治腸風臟毒便血[illegible]
右用[illegible]錢[illegible]
兩片合定[illegible]
末醋糊爲丸[illegible]大每服一十丸[illegible]下
疾亦可用[illegible]
雙聖丸[illegible]治男子婦人[illegible]
右為細末[illegible]丸[illegible]梧桐子大
每服三四十丸空心飯飲下
槐花散治腸風臟毒下血
槐花[illegible]　柏葉[illegible]　荊芥穗[illegible]　枳殼[illegible]各等分
右[illegible]細末[illegible]飲調下二錢空心食前服
治[illegible]角散治下血如小豆汁者
[illegible]角[illegible]
右水五升煮取三升去滓內膠一挺更煮三沸去滓分二服
伏龍肝湯[illegible]治先便後血謂之遠血兼治吐血

伏龍肝[illegible]　甘草[illegible]　白朮　阿膠
乾地黃[illegible]
右[illegible]剉散每服五錢水一盞煎七分去滓空腹溫服一法有附子炮
入可用三兩
治下血不止
用大古錢四百以酒三升煮取二升分三服亦可皮半兩
治腸風下血不止
用[illegible]肝燒爲末飲一錢匕
治卒下血及痔瘡出血不止[illegible]
以衣中故綿絮一握煮汁溫服之
治卒下血[illegible]
用[illegible]根皮煮服之
主下血不止[illegible]
以柿木皮[illegible]末米飲和二錢匕服之不以上[illegible]下[illegible]兩
服可止

水

治[illegible]出外[illegible]

[illegible]

治大下血出不止[illegible]

用[illegible]細末[illegible]錢[illegible]多者大

相宜

療腸風瀉血[illegible]

[illegible]

治下血[illegible]

[illegible]

治腸下血[illegible]

取鯽魚[illegible]治血食[illegible]切作段[illegible]入[illegible]

合之[illegible]最大佳

治其每下血[illegible]痔者及大腸風[illegible]飲酒過度[illegible]

日不瘥[illegible]

[illegible]

右為末每服二錢空心溫酒調下不飲酒溫米飲下忌[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

療腸[illegible]

或有人[illegible]服人[illegible]前病[illegible]

一服[illegible]

治腸風瀉血

用蝟皮[illegible]

[illegible]

下牝去牡死

人小便不通

夫胃為大小腸膀胱之倉廩[illegible]之傳也[illegible]曰器能化糟粕轉味而

入出者也[illegible]水穀之[illegible]衛之根[illegible]大小腸膀胱得以受化皆

當[illegible]之本是以小腸受盛之官水穀初未分也及其化物歸於膀胱

而為溺得於大腸而為糟粕必已氣化則能出矣[illegible]不平寒

熱相搏或氣有[illegible]而不通[illegible]氣虛[illegible]

陽不和之病也治此者不當以寒熱為法[illegible]反傷知

氣耗其津液若閉格不通三焦約病專以榮衛之[illegible]乳後便難與夫

老者秘澀之病人以津液不足止可滑以利之劑[illegible]

則糟粕不通其氣必不可不知○關格大便不通謂之內[illegible]小便

不通謂之外格[illegible]不通為關格也由陰陽氣不和榮衛不通故也

陰氣大盛陽氣不得相營[illegible]陽氣大盛陰氣不得營之曰[illegible]

陽[illegible]則[illegible]陰陽之氣[illegible]結腹內脹[illegible]氣不行於

大小腸故關格而大小便不通也又風邪在三焦三焦約者則小腸痛

內閉大小便不通日不得前後而手足寒者為三陰俱逆三日死也診

其脈來[illegible]滑[illegible]不得大小便也○大小便難者由冷熱不調大

小腸有遊氣[illegible]於腸胃[illegible]不得通[illegible]故大小便難也

診其[illegible]脈滑而浮大[illegible]其人若[illegible]腸痛[illegible]不能[illegible]

中風大便不[illegible]也

承氣湯 治[illegible]關格大小不通

吳茱萸[illegible] 大黃[illegible] 當歸[illegible] 桂[illegible]

澤瀉[illegible] 甘草[illegible] 芍藥各二兩 人參 細辛[illegible]

桃白皮[illegible] 芒硝[illegible]一兩 雄黃三分

真珠末[illegible]

右件一十一味[illegible]每服三錢水一盞煎七分去粗下[illegible]黃真珠末

一字[illegible]空心服之[illegible]方下丸[illegible]

三十丸生薑橘皮湯下[illegible]

木香散 治下焦熱大小便不通[illegible]

木香 黃芩[illegible] 木通[illegible] 陳橘皮[illegible]

冬葵子[illegible] 檳榔 赤茯苓[illegible]

右㕮咀每服五錢水一盞半煎八分去滓溫服

治大小便難腹肚脹滿氣[illegible]
荊芥　芎藭　前胡　當歸[illegible]　桂心各一兩
檳榔[illegible]　川大黃[illegible]　甘草[illegible]　郁李仁[illegible]
右爲末煉蜜和丸梧子大每服二十丸[illegible]溫水下
茯苓丸　治大小便不通
赤茯苓[illegible]　前胡[illegible]　枳殼[illegible]　白术
人參[illegible]　大麻仁[illegible]　大黃[illegible]
右爲末煉蜜和丸梧子大每服二十丸空心前湯下[illegible]
大黃湯[illegible]
大黃[illegible]　前胡[illegible]　半夏[illegible]　人參[illegible]
甘草[illegible]　赤茯苓[illegible]　木香　檳榔[illegible]
右㕮咀每服五錢水一盞半生薑五片煎八分去滓溫服
赤芍藥丸　治大小便不通腹脹悶
赤芍藥　桂心　羌活[illegible]　川大黃[illegible]
郁李仁[illegible]　川芎[illegible]　檳榔各一兩　大麻仁二兩

右爲末煉蜜丸梧子大每服三十丸空心溫水下
芍藥湯　治大小便不通心腹滿悶不能可過
赤芍藥　桑白皮[illegible]　瞿麥穗　大黃[illegible]
滑石[illegible]　防葵[illegible]　麻子仁[illegible]
右㕮咀每服四錢水一盞半煎[illegible]去滓[illegible]芒硝末[illegible]
牽牛子丸　治下焦結熱[illegible]小便不利
黑牽牛[illegible]　芍藥[illegible]　桔梗[illegible]　木通[illegible]
桑白皮[illegible]
陳橘皮[illegible]
右爲末煉蜜和丸梧桐子大每服十丸十五丸加至二十丸茶酒
任下
白术散　治大小便[illegible]
白术　牽牛子[illegible]　木通[illegible]　川大黃[illegible]
檳榔　川朴硝[illegible]　陳橘皮[illegible]

右㕮咀每服四錢水一盞煎至六分去滓空腹溫服
滑石湯　治大便小便俱不通
滑石[illegible]　葶藶[illegible]　車前子[illegible]　天門冬[illegible]
萹蓄子[illegible]
右㕮咀每服五錢水一盞半煎一盞去滓食前溫服日三
治大小便氣壅不利脹滿關格不通
木通[illegible]　川朴硝　郁李仁[illegible]　車前子[illegible]
黃芩　瞿麥花[illegible]
右㕮咀每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服
大黃散　治關格不通妨悶大小便秘澀
大黃[illegible]　桂[illegible]　冬葵子[illegible]　滑石[illegible]
川朴硝[illegible]
右先[illegible]每服二錢濃煎白[illegible]
[illegible]
治大小便不通
葵[illegible]

[illegible]赤芍藥　白茅根　大黃[illegible]　瞿麥穗[illegible]
右㕮咀每服五錢水一盞半煎一盞去滓入朴硝末一錢更煎二[illegible]
空心溫服
甘遂散　治氣壅心腹脹滿大小便不利
甘遂[illegible]　牽牛子[illegible]　葶藶子[illegible]　大戟[illegible]
右爲末每服[illegible]臨臥[illegible]下[illegible]
治大小便不通
大黃[illegible]　牛蒡子[illegible]　[illegible]　滑石[illegible]
右爲末[illegible]
五苓散　治大小便不通[illegible]
黃芩　木通　甘草　[illegible]　滑石[illegible]
右㕮咀每服二錢水一盞[illegible]煎至八分去滓溫服
車前子湯　治大便小便俱不通
車前子[illegible]　木通[illegible]　黃芩[illegible]　郁李仁[illegible]
右件藥[illegible]每服五錢水一盞半煎一盞去滓

入朴硝末半錢更煎二沸食前溫服之

榆白皮湯治大小便俱不通

榆白皮 甘草 滑石 桂心

右㕮咀每服四錢水一盞半煎一盞去滓食前服之

木通湯治大小便不通

木通 大黃 滑石 麻子仁

右㕮咀與麻子仁拌勻每服五錢水一盞半煎一盞去滓入朴硝末

半錢更煎二沸空心服之

治大小便不通臍腹堅脹小下部方

蓮葉 皂角一挺 生薑一兩切

右以漿水一斗二升煮十餘沸并滓分兩度用盛入小盆子坐

坐盆上熏之未通再用

大黃散治風熱壅滯氣入小腸膀胱堅急如吹狀大小便不通

膀胱熱結大小便起名關格大小便不通

川大黃 苦參 具梅 滑石各一兩

右為末每服二錢煎根湯不計時調下一方無大黃散下

榆楷湯治大小便不通

陳橘皮 生薑

右同研埋作餅子以熟麻中以帛定良久氣虎自通

每服一劑一亦得搗為末米湯下

治消大小便不通

芒硝 茯苓

右為末每服大便不通者加巴豆一枚

黃連散治大小便秘

黃連 川大黃 甘草

右為末每服二錢食後調下

芭蕉根 冬葵子 滑石

右以每服五錢水一盞煎入芒硝末半錢更煎一兩

空心溫服一方無滑石

芫花丸治大便小便不利

芫花 滑石 大黃

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸空心溫水下

治大小便不通

滑石二兩 葵子 榆白皮各一兩

右為散煮麻子汁一升和取二匕服二服即通

又方治大小便不通

乾薑 鹽 杏仁

右等分搗為末之

治大小便關格不通腹脹喘急

水銀 膩粉 滑石各一分

右為末研令水銀星盡每服調下一錢

治大小便秘

水銀 巴豆

右研為作一丸

治大小便難中含氣干腹脹

治大小便難

木香 青橘皮 枳殼

右水一大盞同煎至有去滓分二服

又方葵根十方治大小便不通

生冬葵根 生薑

右以兩服空腹一服即通一方不用生薑

治大小便關格不通

胡椒 川朴硝

右水一大盞煎至一兩半放溫服

又方

膩粉 生

右相和空腹服之

治大小便關格不通脹

蜀葵花 麝香

右水一大盞煎至五分去滓服之 [illegible] 用之

推車散 出[illegible]方 治大小便秘澀欲死者

推車客七個 土狗七個 [illegible]

右用新瓦上焙乾為末用桑白樹皮向南者濃煎十沸調下一服愈

治卒關格大小便不通支滿欲死一二三日則殺人 出肘後方

苦酒 [illegible]

右和塗臍上乾則易

又方 出肘後方

甘遂 [illegible]

右搗下以三合漿水又服之須臾即通

紫金沙散 治大小便不通

用紫金沙 [illegible] 多少 [illegible] 搗羅為末每服一錢溫酒調下

土馬騣湯 治大小便不通

用土馬騣不以多少 [illegible] 用新瓦焙為末每服二錢水一盞煎七分去滓溫服

豬脂湯方 出千金方 治大小便不通

用豬脂如半雞子大 [illegible] 以酒一升微煎 [illegible] 三沸分為兩服 [illegible] 再服 一方用水煮三沸服之

又方 葵子湯 治大小便不通

用冬葵子 [illegible] 一兩 [illegible] 用水二盞煎 [illegible] 去滓入人乳汁半合和 [illegible]

髮灰散 [illegible] 治人小便不通又便血

用亂髮一兩燒灰研細每服二錢 [illegible] 以通為度

治卒大小便不通 [illegible]

用鹽以紙裹燒投水中服之 一方以鹽實臍中灸 [illegible] 又以 [illegible]

又方

用含硝石吐去水

治大小便關格不通 出聖惠方

用芒硝 [illegible] 一人 [illegible] 服 [illegible]

治大小便關格不通 [illegible]

用烏桕樹東南向根皮 [illegible] 為末 [illegible] 以水調下一錢如急

用 [illegible] 為 [illegible]

鐵脚丸 [illegible] 治大小便閉格不通經三五日 [illegible]

用不蛀皂角燒灰細研粥飲調下二錢 [illegible] 一方用皂角炙去皮子為末 [illegible] 每服三十丸 [illegible] 一方 [illegible]

用 [illegible] 分 [illegible]

治大小便不通 [illegible]

用葵子末一升 [illegible] 水二升煮 [illegible] 服

又方 [illegible]

用榆白皮切一升葵子一升水五升煮取二升分三服

又方 [illegible]

用 [illegible] 三服

治大人小兒大小便不利 [illegible]

用 [illegible] 一升水三升煮取一升分三服

治老人虛大小便不通 [illegible]

用真琥珀研 [illegible]

[illegible] 痛老人虛大便不 [illegible]

得効

治關格大小便不通脹滿欲死兩三日則殺人 出肘後方

用芒硝二兩紙裹三四重炭火燒之令沸一升湯中盡服當先飲湯

一升已吐出乃服之

治卒關格大小便不通支滿欲死十日一月日不得大便 出千金方

用葵子二升水四升煮一升服入豬脂如雞子一丸彌佳

貼臍散

用甘遂為細末以生麪調為糊敷臍上 [illegible] 末在上 [illegible]

下 [illegible] 甘草 [illegible] 服之 [illegible]

甘遂散 [illegible] 治大小便不通及腹滿 [illegible]

用甘遂二兩 [illegible] 末 [illegible] 二合 [illegible] 一兩 [illegible] 服日進

一服當水下未知日三服漸加之一方用二分為散以飲服隨水下
如覺心下煩滿微利日一服
治大小便不通
用羊糞燒熏方寸匕主中惡心腹刺痛
又方
用桃葉以酢和封小腹上
又方
用茱萸南枝斷收如一寸許三指中綁合之立下
又方
用雄鼠糞兩頭尖者數粒研中立効
又方
用葱當末半兩分二服新汲水調下
又方
用白礬細研實臍中令人仰卧置臍中以冷水滴之候冷透見
冷透腹內即通如是曾失血脫不可用以紙作環子
蔥米[illegible]研一服半錢米飲調下若在[illegible]仍依前法用水調之
木香丸 治重[illegible]大小便不利腹痛
蒼朮一兩 巴豆十個 木三錢 去油炒
右為末白麵糊丸如菉豆大每服五七丸食後溫湯下
治男女大小便不通
用扁竹生紫花者根水煎空心服住研取汁一盞服通即止不
可過服
瞿麥散 治大小便不通亦治淋結大便秘澀
用瞿麥至大黃等分川芎冬葵子木通一兩甘草等分為末每服二錢水煎服一分童子小便溫服之
神應丸 治上焦下虛水火不升降大便秘澀小便不通赤
眼口瘡便紅溺血吐血小便不止寒熱與諸積氣嬰小兒脾疳婦人經
閉不通男子小腸疝氣等證
木香 當歸 枳殼 黃芩 苗陳
青皮 陳皮 檳榔 香附子 各一三錢
乾木各半兩 大黃 苗陳 牽牛末各二兩
右為細末水糊丸梧桐子大每服五十丸溫飯飲下不拘時
治上盛下虛水火不能升降大便秘澀小便不通
赤眼口瘡便紅溺血吐血小便不止若兼治諸積氣嬰小兒脾疳婦人
經脈不通男子打撲傷損等證
貫衆 山豆根 黃藥子 牙硝 寒水石
草龍膽 乾葛 黑大豆 百藥煎 紫河車
甘草節 薄荷 梔子 大黃 豆粉各四兩
右為細末煉蜜丸每一兩作十丸每用噙化為末溫飯飲下不拘
時加山豆根二兩大效
大黃散 治大小便不通
大黃 甘草 五錢 滑石 五錢 黑豆 一合
右銼為細末每服二錢新汲水調去滓服之立効
治閼格 大小便不通
用蚯蚓以燒熱去皮細研以納下部氣立通
療大人小兒腹中諸積大小便不通
以羊屎交湯下
冬葵散 治大小便
用大冬葵子十枚去皮用真輕粉一錢研一處入粉少許合在蘭子上
之滑石半兩煎白湯下
通心散 通治陰陽利大小便
通心 一兩 木通 一方 治 飲服
右作一服用新汲水調服立通
主大小腸並不通
用蜱蝗服汁和服半升又用服
利大小便
以田中螺黃食之
調中下氣治肚腹利大小便
用好井水及土石間新出泉水多飲之令至滿小便即通下
治大小腸痛熱

取猪腸貯食之

治大小便関格不通出本草

服蕎麥十兩粥食之

一方 治大小便皆秘腹脹如鼓氣促

大黃 牽牛 八角茴香七個

右作末生葱白三七莖同研煎湯調五苓散又三和散加王不留行

麥門冬

治宿食便秘 加味平胃散方

沉香 三錢 茯苓 三錢 青皮 茯苓 巴豆 二十粒去殼

右同三味炒去巴豆加陳皮三錢木香半錢五靈脂杏仁殼一兩桃仁麻仁各五錢白茯苓半錢香附子各五錢甘草三錢炙蔓煎服

治小便不通

老人虛秘 大便秘結 右三味煎湯服之 木通 甘草

治小便不通臍下滿悶

右三味擣碎令每服三錢煎生薑甘草湯調下服無時大通得愈

○大便秘澀不通 附論

四十四難曰七衝門何在 脣為飛門 齒為戶門 會厭為吸門 胃為賁門 太倉下口為幽門 大腸小腸會為闌門 下極為魄門 故曰七衝門也 魄門即肛門也 其病以下衝上 故曰七衝門也 出入不通上下 治在幽門 大便不通 闌門不開 過而不得泄 通幽湯主之 大腸小腸燥結 糟粕不能傳化 精氣不舒 飲食入出者也 人或傷於飲食 饑飽勞逸 腸胃損傷 津液不足 大便結燥 大腸虛秘 名曰脾約 所以大便燥結 開而不通 閉而堅 大便不通 名曰脾約 飲食不化 胃氣虛 大便閉 人所因而治

之燥則潤之 溫則清之 燥則潤之 閉則通之 結則散之 各有成法○腎主五液 津液盛則大便如常 燥勞致虧損 血虛而成燥者 風熱燥結 氣虛而不運者 或因風邪搏於肺 傳於大腸 故大便秘也 寒熱燥結 虛秘 風秘 熱秘 冷秘 氣秘 老人虛秘 小兒秘結 大便秘結 宜潤燥 因火熱燥結 皆以潤燥 大便秘結 則是陰陽不和 不能通利 其人如燥 經云 腎主五液 以成其燥 虛秘者 以通利為先 虛則以補 氣血不足 津液枯燥 故大便秘結 不能開通 是也 如腸胃燥結 傳送不利 服藥不下 病後重亡津液 因老弱血氣不足 是謂虛秘 大腸枯燥 則多秘 老人津液少 大腸燥結 陰陽不和 風秘 大便燥結 治法宜和順陰陽 以治之○腎實不實 亦又令人大便秘 大腸者 腑之實 又云邪在腎 亦令大便難 以腎者胃之關 胃不虛而不能

大便難 以小便利 津液枯燥 腸胃乾澀 故大腸難 又曰 大便不通 所以腎者為津液之主 小便利而大便秘 其左手寸口人迎脈 手少陰經也 脈沉而 腎為陰 治陽明 大便不利 腹滿身重 肝脈 右手關上脈緩 胃者脾之府也 病若腸中伏熱 大便難 脈微 不甚有者 以大便秘而 大腸病此 是大從下而上也○人之五味之秀者 大腸大腸所以出而不納也 令得其陽氣不得 其陽不通 何也 熱邪 入於胃 胃有燥 三焦伏熱 則津液中乾 此大腸之火 令人燥結 大便秘 不能運 以致脾胃血脈枯者 人腸中燥熱 而大腸之氣 燥之也 脹滿悶痞 風閉 結火 以食 胃消渴之 則為燥秘 大凡 血虛 以致 有其 血 氣秘 大便不下 而反通 燥結 溫之 病有 者 言 故 骨 精 津液少 大腸燥 精血 耗 腎 之 津液 不 下 若 在 結 也 大腸與肺為表裏 大腸者 諸氣之道路 開則 氣 不 下 則清 之 溫 潤 秘 而 燥 結 者 燥其 以大 腸 流 行 肺 氣 也○ 諸 有 虛 秘 當 通 知 大 便 燥 下 後 腸 胃 虛 故 難 坐 皆 屬 此 更 有 熱 秘 者

先

[illegible]氣而蓄其下者糞也宜用黃連[illegible]大黃[illegible]下之於內以和[illegible]
穀百藥[illegible]多入最多[illegible]烏梅[illegible]前當歸四五斤可也凡通利大便
若用大黃巴豆等藥而大便不通者陰陽關格水火不升降故有
熱者宜投牛黃三黃丸荷包湯下之然後宜養正丹天神保丸蜜煎
導下○[illegible]

[illegible]

殊更服大黃以爲之津液皆去更損[illegible]老人臟腑秘澁不可用大黃老人[illegible]所以大腸[illegible]
平人之用[illegible]
師度附[illegible]不[illegible]
卯○有人[illegible]時疾後大便秘[illegible]大不[illegible]之危[illegible]
不通皆用滑膩之物及冷水並不通也[illegible]大便[illegible]內

[illegible]卷之十五

經謂小腸移熱於大腸爲虙瘕夫小腸者受盛之官化物出焉大腸者
傳道之官變化出焉二府[illegible]
[illegible]
[illegible]

方

剩聖餅子 治老人大便秘澁

草藥 石菖蒲 白茯苓 麻黃 羌活
獨活 枳殼 藿香 白朮 細辛
吳茱萸 甘草 木通 蒼朮 良薑
赤芍藥 川芎 藁本 柴胡 滑石
防風 半夏

右㕮咀每服三錢水一盞半姜三片煎至八分去渣食前空
心溫服老人小兒量以加減之食忌生冷油膩之物

京三稜丸 治痃癖注氣刺氣痞大便秘澁

京三稜 木香 當歸 桂

內蓯蓉 牛膝 赤芍藥
防風 枳殼 白朮 檳榔
郁李仁 大黃

右除郁李仁外爲末和郁李仁[illegible]煉蜜丸梧桐子大每服
二十丸空心米飲送下以利爲度

[illegible]湯 治[illegible]

大黃丸 [illegible]治百病

川大黃 木香 乾薑 赤芍藥 白朮
芎藭 桂心 檳榔 郁李仁
當歸 神麯 巴豆

右爲末入巴豆研勻煉蜜丸梧桐子大每日空心或夜服時以溫
水下二丸至五丸以意利爲度[illegible]良又以熱水投之

[illegible] 治三焦不和關氣不升降飲食遲化腸胃澁
[illegible]

沉香 檳榔 木香 青皮 陳皮 京三稜

[illegible]

右爲末[illegible]丸梧桐子大每服五六十丸食後[illegible]湯下
潤腸[illegible]一方有大黃[illegible]

大黃丸 [illegible]

川大黃 檳榔 大麻仁 郁李仁
牛膝 芍藥 枳殼 防風
桂心 桃仁 滑石

右爲末煉蜜梧桐子大每服二十丸空心生薑湯下

大五柔丸 治臟氣不調大便不通和榮衛利九竅消穀益氣

大黃 黃芩 牛膝 葶藶
甘草 黃芩 桃仁 杏仁

右爲末煉蜜爲丸梧桐子大每服三丸日三加至二十丸酒下

通心丸 下[illegible]

大黃 黃芩 滑石 黑牽牛

加減順氣[illegible]

甘遂 白芥子
朴硝 郁李人
檳榔
右為末滴水丸梧桐子大每服五十七丸或加至百丸臨卧温水下
開腸湯 治大便閉澀不通
升麻 生地黄 當歸尾 熟地黄 甘草
大黄 桃人 麻人各一錢 紅花三分
右㕮咀作一服水二盞先浸煎出一盞去滓熱食前服一方有黄
柏無紅花
麻人丸
郁李人 大麻子人 大黄 檳榔
白山藥 防風 羌活
木香 枳實
右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸至三十丸温
水下
大黄散子 治身熱頭疼大便不通胃脘急痛
川大黄 杏人 大黄 川升麻
人參 黄芩 甘草各二錢半 枳殼
右㕮咀每服三錢生薑五片葱二十一莖小烏梅一枚煎服一方用
枳實
勻氣丸 治胸膈痞悶氣滯大便秘澀不通
麻人 人參 訶梨勒皮 桂
木香 郁李人 白檳榔 大黄
右為末入麻人研勻煉蜜丸梧桐子大每服三十丸加至五
十丸温湯下 食前
枳殼湯 治大腸壅實氣滯不通或服泄藥不效欲食
枳殼 甘草 大腹皮 牽牛子 百合
赤茯苓 赤芍藥 桑根白皮各三分
郁李人
右㕮咀每服五錢水一盞半煎八分去滓空心食前温服以通利為度

滑腸木香丸 治大便不通腹中脹滿
木香 郁李人 大黄
半夏 芎藭 甘草 訶梨勒
右㕮咀每服五錢水一盞半生薑一棗三枚煎八分去滓食後温服
服日三
五子丸 治秘澀風虛不足飲食不生肌膚三焦不調和榮衛
開胸補三焦
大黄 半夏 細辛 芍藥
檳榔丸
檳榔 訶梨勒皮 桂心
乾薑 木香
郁李人 吳茱萸
右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸食前生薑湯下
牽牛子丸 治五臟伏熱便澀結塞小便赤澀
及小兒驚熱痢疾
連翹 芒硝
梔子
甘草 大黄 石膏
右為末煉蜜丸梧桐子大每服一二丸水化下日進二服
檳榔丸 治大腸秘澀冷熱相攻 細辛
檳榔 羌活 青橘皮 木香 郁李人
大黄 大麻人 牽牛子
右為末入研令勻煉蜜丸梧桐子大每服二十丸生薑湯送下
牽牛子丸 治脹悶心腹氣滯宿食不消大腸秘澀
牽牛子 青橘皮 桂心 枳殼 芎藭
木香各一兩
右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸食前温酒下
治風秘不通

青

通草　朴硝　郁李人　黄芩　[illegible] 各二兩

卓角子

右㕮咀水八升煮取二升半分三服一方用硝代朴硝煮取二升

六合散 治一切燥結千使利不通亦名全真散并治小

腸氣結血脈不智苦悶結痛腰疼痛

大黃　白牽牛　黑牽牛　甘草 各二兩　檳榔

輕粉 二分

右為末每服一錢蜜水調下量虛實減

滋腸五人丸 治津液枯渴大便秘澀傳道艱難

桃人　杏人　柏子人　松子人　郁李人

陳皮

右五人別研為膏入陳皮末研勻煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸

空心米飲下

潤腸丸 治大便秘澀不通

杏人　枳殼　麻人　陳皮　阿膠

普濟方卷 [illegible]

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸麻子湯下

厚朴散 [illegible] 治 [illegible]

青龍飲 [illegible] 使 [illegible] 湯主之 [illegible] 七宣丸之類主之 [illegible]

厚朴　白木　半夏　枳實　陳皮

甘草

右為末 [illegible] 服 [illegible] 一方 [illegible]

三枚 [illegible] 服 [illegible]

七聖丸 治風氣壅盛痰熱結搏頭目昏重 [illegible]

乾口燥精神不爽夜臥不安肩背拘急 [illegible]

大便秘結小便赤澀及治大腸疼痛不可忍 [illegible] 氣生於肺

大腸疼痛 [illegible]

川芎　木香　羌活　檳榔

郁李人　大黃

右為末陳蜜丸梧桐子大每服十五丸至二十丸溫熟水食後臨臥

服常服之 [illegible] 大便秘 [illegible] 一服 [illegible]

人 [illegible] 大便行 [illegible]

七宣丸 治風氣結聚宿食不消 [illegible] 及 [illegible] 腳氣

攻痛 [illegible] 脾胃氣 [illegible]

肢節 [illegible] 風毒 [illegible] 氣逆 [illegible] 大便 [illegible] 小便 [illegible] 脾胃氣 [illegible]

腳氣 [illegible] 頭目 [illegible] 心悶 [illegible] 臥不安寧 [illegible]

柴胡　枳實　木香　訶梨勒皮　桃人

甘草　大黃

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸米飲食後臨臥服稍增至四

五十丸取宣利為度 [illegible] 病勢退服五補丸不問男女老人並可服

[illegible] 一方用服

通幽湯 治大便燥結不通上衝吸門不開 [illegible] 不便 [illegible]

氣不得下 [illegible] 在幽門以辛潤之

當歸　升麻　桃人　生地黃　熟地黃 五分

甘草　紅花

右㕮咀作一服水二盞煎一盞去滓調檳榔細末半錢稍熱服

潤腸丸

郁李人　大黃　黑牽牛　桂心　當歸

枳殼

右為末滴水丸梧桐子大每服三十丸至四十丸溫水或生薑湯下

寬快湯 治氣不下 [illegible] 大腑 [illegible]

香附　天台烏藥　縮砂人　蘇子

青木香　甘草

右為末每服二錢 [illegible] 湯 [illegible] 青木香丸 [illegible]

脾積丸 治飲食停滯腹脹痛悶嘔惡吞酸大便秘結 [illegible]

蓬莪朮　京三稜　良薑

青皮　南木香　不 [illegible] 巴豆 [illegible] 百草霜

右木用川巴豆半兩去殼研如泥 [illegible] 入前末研和麪糊丸麻子大

荊服五十丸加至六十丸橘皮湯下

蕨痰丸 治飲食不消

召草 陳丁香 川乾姜 杏仁

木香

巴豆

右除巴豆 米 化作

重蜂

令未散

秋冬

丸以

麻仁丸 治 耗 大便 服

麻仁 木香

麻人 檳榔 人參

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸至五十丸生姜湯下

一十三

木香檳榔丸

檳榔 桂

木香 檳榔

郁李人 大黃

芒硝 烏梅 桑白皮 杏人

麻人 大黃 白芍藥

右件 服

外豪 有 白丈 乾地黃各一兩

大戟丸

大戟 羌活 陳皮

川大黃 木香 牽牛子

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸至三十丸空心下

麻人丸 治大便 氣亂三焦不和

大麻人 川大黃 枳殼 芍藥 川芒硝

郁李人 檳榔

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸空心生薑湯下

檳榔散 治大腸不通腹脹 桑根白皮 川大黃

檳榔 枳殼 牽牛子

郁李人 陳橘皮

右為每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服

檳榔丸 治臟腑壅滯心胸煩滿大小腸不和

郁李人 川大黃 木香

檳榔 青橘皮 牽牛子

木通

右為末蜜丸梧桐子大每服二十丸食前溫水下

檳榔丸 治一切氣

檳榔 桂心 枳殼 木香 訶梨勒皮

郁李人 川大黃

一十四

右為末蜜丸梧桐子大每服二十丸溫酒下

麥門冬 治虛熱 秘結 大便不通

麥門冬 赤茯苓 甘草 黃芩

大黃 赤芍藥

右㕮咀每服五錢水一盞半入竹葉十片生薑一棗大拍破煎八分

去滓食前溫服

牽牛丸 治大便不通 附痔氣

牽牛子 甘

陳橘皮 訶

右為末 生薑四兩取汁 白蜜五兩 和丸梧桐

子大每服一十丸夜臥時前米飲下 加至三十丸

大黃散 治大便不通 不然傷 熟藥

大黃 檳榔 川芒硝 枳殼

木香 子芩

右㕮咀每服四錢水一中盞生薑半分蔥白二寸煎至六分去滓空

腹溫服未通再服

牽牛子丸 治大便不通心中煩悶坐臥不安

牽牛子 川朴硝 大麻仁 川大黄 木香各一兩

甘遂

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸空心生薑湯下未通再服

木香丸 治大便不通心腹氣脹滿

木香 檳榔 川大黄 桂心

川烏頭 巴豆霜

右為末入巴豆霜合匀煉蜜丸梧桐子大每服三丸加至五丸空心

橘皮湯下

檳榔丸 治上焦壅滯頭目不利大小腸秘澀心腹滿悶

檳榔 羚羊角屑 前胡 大麻人 牽牛子

枳殼

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸食前生薑湯下以利為度

芒硝丸 治腹脹不通

芒硝 芍藥 杏人 大黄各二兩

右為末蜜丸梧桐子大飲服十五丸加至二十丸取通利為度

服

擒虎散 治……若有前……

檳榔……

芒硝…… 牽牛…… 大黄 甘草

右……每服……用皂角……煎至七分……

一盞……

遠服以利為度

……丸 ……風結……

肥皂角

南木香 …… 檳榔

右為末和皂角末……梧桐子大每服

二十丸空心溫熟水送下

治大便不通即時通

大黄 木通 枳殼 甘草

右為末每服三錢水一盞煎去滓服

木香逐氣丸 治食積虛滯通利大便寬快腸氣諸氣攻

刺脅痛

橘紅 青皮 檳榔 南木香 川巴豆肉

右為末生薑汁……丸……每服十丸……湯送下

如氣攻腹痛……

枳殼散 治……大便秘……

枳殼 甘草 杏人 …… 生地黄各一

右剉如麻豆大每服三錢生薑五片……服

大黄丸 ……

大黄 …… 青…… 厚朴 枳實

大麻人

右四味搗為細末與麻子人同研……丸如梧桐子大每服

十丸至十五丸食前蜜水下以通利為度

麻人丸 治大便不通……

大麻人 大黄

右三味……麻人……丸梧桐子大每服二

十丸空心……

治大便不通膀胱……

烏……子 木香 青橘皮

川大黄

右搗細為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸……

麻人丸 治大便秘澀……

大麻人 大黄 枳殼 厚朴

右三味搗為細末與麻人同研……丸如梧桐子大每服二十丸

空心溫水下以利為度 一方……

木香丸 治一切氣攻刺腹脇脹滿大便不利

木香　枳殼各二兩麩炒　川大黃剉炒　牽牛子四兩炒各

訶梨勒皮各二兩

右搗羅爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食前以生薑湯下

大麻仁丸　治風氣壅滯心腹脹滿[illegible]

食不消腸胃不調大腸秘澁

大麻仁四兩別研　川大黃炒　訶梨勒皮各二兩

人參去蘆　檳榔　枳殼[illegible]

右爲末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食前蔥湯下[illegible]加至

三十丸[illegible]亦得以此藥微利爲度[illegible]

治大便不通

大戟　大豆五升　商陸　牛膝各一斤

右以水五升煮二升以大豆五升同令汁盡至豆乾初服三枚以

通爲度

治大便難澁

豬膽　羊蹄　土瓜根

香枳湯　治大便秘結調順風氣

枳殼　檳榔　甘草

右爲末每服[illegible]溫湯調下一錢空心服

六磨湯　治氣滯腹急大便秘澀

大檳榔　沉香　木香　烏藥

右磨[illegible]大黃枳殼名六磨湯

麻子仁[illegible]

桃仁[illegible]

右前藥[illegible]如前[illegible]煎通

食前服

南木香丸　治大便秘結

南木香　檳榔　麻仁　枳殼各等分

右共爲末[illegible]用不[illegible]三十丸生薑五片煎湯送下

三物備急丸[illegible]

[illegible]川木香[illegible]麻仁可[illegible]

丸[illegible]湯下不拘時

[illegible]氣湯　[illegible]治大便多秘

青附子　[illegible]

甘草　[illegible]

右爲末每服[illegible]

[illegible]

蟾酥　麝香　輕粉　巴豆

右再研至細[illegible]爲丸如[illegible]米大[illegible]

[illegible]

大黃　黃芩　滑石　黑牽牛

右爲末滴水丸如梧桐子大每服五七十丸食後溫水下

[illegible]

[illegible]大便秘

[illegible]　蘇葉　木通　枳殼

右等分[illegible]每服四錢水一盞煎服

[illegible]

[illegible]

大黃　枳殼　甘草

右[illegible]每服五錢水[illegible]

升麻湯

升麻　大黃　前胡　梔子仁

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分去滓食前溫服未通再服

[illegible]散

[illegible]　蒼木　甘草

右㕮咀每服三錢水[illegible]

[illegible]丸

右[illegible]食不消大便秘[illegible]

結熱

大黃 [illegible] 杏人 [illegible] 芒硝 [illegible]

右為末煉蜜丸梧桐子大每服五丸至七丸以溫水下日三未通

加至十丸 一方有枳殼名大黃丸空心生薑湯下

半夏丸 治大便不通陳風虛秘下虛

半夏 [illegible] 牽牛子 [illegible] 木香 [illegible]

青橘皮 [illegible]

右為末煉蜜和劑為丸梧桐子大每服卅丸夜服溫生薑湯下

大黃湯 治大便不通宜大腸熱結風秘

大黃 [illegible] 黃芩 [illegible] 梔子人 甘草 [illegible]

右㕮咀每服四錢水一盞半煎八分去滓不拘時更以前丸空

心溫服若大秘加芒硝二兩

秘傳丸 [illegible] 治風痺 [illegible] 大便秘澀腹滿 [illegible]

熱有積痰 [illegible] 氣結 [illegible] 痛 [illegible]

牽牛 [illegible] 四黃 [illegible] 人參一分

右為末煉蜜丸梧子大每服三十丸溫水下未動加至五十

治五實 [illegible]

[illegible] 大黃 [illegible] 服不人 [illegible] 吳茱萸 [illegible]

治大便秘 [illegible]

[illegible] 為末每服三錢食前 [illegible] 水調下 以利為度

治大便不通 [illegible] 上奔心痛

皂莢 [illegible] 五靈脂 [illegible] 巴豆霜 阿魏 [illegible]

右為末煉蜜丸如豌豆大每服五丸生薑湯下未動再服

牽牛丸 治 [illegible] 大腸秘澀

牽牛子 [illegible] 木香 青橘皮 [illegible]

檳榔 [illegible]

右為末 [illegible] 牛子末和勻煉蜜丸梧桐子大每服一十丸食前溫

酒下 ○一方 [illegible] 為丸木狀下 生薑湯亦可

治大便難 [illegible]

枳實 [illegible] 麻仁 [illegible] 蔥白 [illegible]

右合同 [illegible] 服 一方 [illegible]

威靈仙丸 治老人 [illegible] 津液枯燥大便秘澀

黃耆 [illegible] 枳實 威靈仙 各等分

右為末煉蜜丸梧桐子大每服五七十丸 [illegible] 溫水下 一方用防風無

黃耆 [illegible]

蜜通格丸

黑牽牛 大黃 木通 各 [illegible]

右為末水丸如菉豆大量人大小三五十丸或百十丸水下

治大便閉不通 [illegible]

皂角末 [illegible]

右 [illegible] 心 一方用皂角二挺去皮 [illegible] 丸梧桐子大

每服三十丸空心溫水下

[illegible] 治 [illegible] 大便難 [illegible]

[illegible] 大黃 [illegible] 大麻人 研如膏四兩

右為末 [illegible] 入同研 [illegible] 丸梧桐子大每服二十丸食前米飲下

牽牛丸 治氣脹 [illegible] 大便秘澀腹刺痛

牽牛子 [illegible] 檳榔 [illegible] 木香 一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸 [illegible] 或米飲下亦可

桃人法 治 [illegible] 後更大便不 [illegible]

桃人 [illegible] 吳茱萸 二兩 鹽 一兩

右同炒熟去鹽并茱萸只以桃人空心夜臥不拘時任意嚼五七粒

至一二十粒

大腹湯 治老人虛秘

青皮 大腹 [illegible] 木瓜 [illegible] 蔥白 五莖

右㕮咀 [illegible] 五盞半去滓分為五服

三人丸 治大腸有熱津液竭燥裏急後重大便秘澀

松子人 柏子人 大麻子人 各一兩

右研令勻 [illegible] 丸梧桐子大每服一十丸食前米飲下未

快加丸數服 一方 [illegible] 治老人 [illegible]

摩臍方 治大便不通腹脹

杏人（湯浸去皮尖研） 葱白（二莖去鬚） 塩（一分）
右研如膏每取如皂莢大許塗手心摩臍上三百轉須臾即利如利
不止以冷水洗手即定
（腸結方）治病後津液燥少大便不通
猪膽（一枚） 沙糖（少許） 糯米（二合燒灰存性研細）
右研如膏內少許入下部立通
治卒大便不通或熱結或風秘及婦人產後大便不通
皂莢（兩挺去皮酥炙為末） 白梅肉（五枚） 蜜（少許）
右將白梅肉并蜜搗和皂莢末如棗大以綿裹引內下部中須臾
即通
（導腸方）治大便七八日不通服諸藥未動者
猪膽（一枚） 蜜（二兩） 礬粉（一分）
右件內入膽中搓如中指長內下部立通
蜜膽湯（出千金方）主大便不通七日腹中有燥屎寒熱煩迫短氣汗
出脹滿
主胃損 猪膏（各三升） 大黃（一兩）
右㕮咀水七升煮五升去滓內膏蜜三升煮取三升強人頓服羸
人再服亦治大小便不通
（猪膽導方）（出千金方）治大便七八日不通者氣上衝
用猪膽一枚繫口聯竹下部麻鞋問頭使入肛門須臾即通（出千金）
（枳殼丸）（出千金方）治大腸結實
枳殼（炒） 川大黃（炒） 芒硝（各一兩）
右為末煉蜜丸如梧桐子大食前用生薑湯下三十丸
（治大便卒不通並結）（出千金）
吳茱萸（五錢） 梔子（十四枚） 川朴硝（一兩）
右以水一大盞煎至六分去滓下朴硝空心分為二服
（療上氣大便秘塞）
杏人（五兩去皮尖） 印成鹽（一兩） 乾薑（一兩）
右搗篩以猪膏和之令得相着作丸可長一寸餘如指大兩頭尖仍
以綿裹之於風日中乾令少乾內下部中時時易之不過三易即

有惡物下氣上即定亦下食肉中痛甚少須臾如桑內少頃亦不
大痛急出所物即出痛思之不須然可便勒將出服及惡物多大便不
並佳傳之
（治大便不通）
菖蒲末 石鹽末（各一兩）
右相和取羊脂和烏麻脂少許綿裹內下部中即通
（治大便難）（出千金方）
瀉清 烏梅
右將瀉清漬烏梅塞下部中
（又方）（出千金）
桑根白皮 榆根白皮（各一把）
右㕮咀水三升煮取一升半分三服
（又方）（出千金）
猪脂（一兩） 葵子（一兩半）
右將葵子為末猪脂和丸梧桐子大每服十丸溫水服一方水三升
煮取一升空心服
（又方）（出千金）
葵子 牛酥（各一升猪脂亦可）
右水四升煮葵子取一升內酥煮一沸待冷分作二服
（又方）（出千金）
葵子汁 乳汁
右等分和服之立出一方單用葵根汁生服
（治大便秘塞不通）（出千金）
猪膽 羊膽
右用猪羊膽無在以筒灌三合許令深入即出矣出不盡須臾
更灌一方加冬葵子汁和之亦妙又微取蜀五升和猪膏三合
灌之若臟冷易可用即用之又蒸天康酒半升鹽三錢已煉成
如上法
（紫蘇麻人粥）（出明方）順氣滑大便男婦皆可用體虛之人風秘結燥
服之皆得效

紫蘇子　麻子仁各等分

右研爛水濾取汁，煮粥食之。《良方》云：有一貴人，每年八十四，忽腹痛頭痛，悪心不能食，醫者供補脾進食、治風清頭目，數日益甚。許學士曰：此老人風秘，臟腑壅滯，聚於胸中則腹脹惡心不喜食，至巔頭痛神昏，如得臟腑流暢，諸疾悉去矣。予進蘇麻粥，而氣泄下結糞如栗十餘塊，少間通利，諸證悉除。

牛黃散 治上焦熱，臟腑秘結

大黃一兩　白牽牛頭末五錢

右為末，有痰，冷用酒調下三錢；熱麻，冷手足，蜜湯調下

小提金散 治大便卒結，服轉藥又不通

盆硝　皂莢一錢　倉鹽一錢

右研勻，每用少許，吹一錢肛門內，立通

治大便不通

霜梅　香白芷各等分

右為末，每服二錢，溫米飲調下

蔥白散 一名阿膠散，治老人及虛人大便不通 出千金方

蔥白三莖　阿膠一片

右以水煎蔥候熟不用，却入阿膠溶開溫服。一方用蜜二匙，溶服，又以酢和蔥封臍，尋變通，此方許學士曾服得效

黃芪湯 治年高老人大便秘澀

綿黃芪　陳皮去白，各半兩

右為末，每服三錢，用大麻仁一合爛研，以水投取漿水一盞，慢火熬，候有乳起，即入白蜜一大匙，再熬令沸，調藥末，空心食前服。秘甚者不過兩服愈，常服則無秘澀之患，此藥不冷不燥，其效如神

蚕先法 治閉結胸熱，即肛塞腫痛生瘡

蚕 [illegible]　猪膽 十五枚

右以蚕入猪膽內，[illegible] 以竹管插入肛門 [illegible]

良 [illegible] 又 [illegible] 無 [illegible] 以浸液調作餅用之，一方 [illegible]

治大便不通 [illegible]

猪脂　羊脂

右以 [illegible] 同 [illegible] 以下部入一寸，推之入，[illegible] 一下

治人有腸結之患

天麻一兩　蓖麻子去殼

右先安置天麻於碗中，上用蓖麻子 [illegible] 外便用三重紙蓋定，緊從口至木 [illegible] 又出蓖麻子 [illegible] 安天麻於碗內用炒了蓖麻子於中，作兩蓋又隔三伏時後出，如此七遍，[illegible] 出後用布拭上氣，不用刀剪，結之細剉，單搗 [illegible] 亦同天麻

提金散 治大便秘，服藥不通者

倉鹽　皂角二錢　屋塵牆草節七兩

右為末，研勻，每用半錢至一錢，以竹筒吹在肛門內，立效

潤腸枳實丸 治老人虛秘，服不得氣，又治風秘，降氣潤腸，調和臟腑，并治三焦氣壅，大便秘

枳實麩炒　杏仁去皮尖，麩炒，各等分

右為末，以蜜丸如梧桐子大，每服五十丸，空心溫水下，一方米飲下

牽牛散 治大便秘

牽牛子半生半熟

右為末，每服二錢，生薑湯調下，未利，良久熱茶投，以利為度

大豆地方 治消渴風痺，熱積聚，口瘡，與大便秘澀

大豆黃卷　[illegible] 各一兩

右研勻，不拘食前後，溫水調下一錢匕

甘遂散 治大便不通

甘遂炒，一兩　木香一分

右為末，每服一錢，蜜湯調下，不拘時

荊芥散 [illegible] 治大便不通，[illegible] 小便 [illegible] 急痛，肛門 [illegible]

荊芥穗一兩　大黃生用

右為末，每服二錢，溫生薑蜜湯調下，未通再服

商陸豆方 治大便不通

商陸乾者　大戟各一分

右㕮咀，水四盞，棗十枚，去核，[illegible] 豆半合，煎水盡，揀取豆 [illegible]

更初吞三粒稍加之以通利為度

滑石散 治大便不通腹脹氣急妨悶

滑石 [illegible] 手足指甲 [illegible]

右取滑石末[illegible]以水一斛半[illegible]分去滓[illegible]空心服至辰時

再服

粉霜丸 治大腸壅結不通

膩粉 [illegible] 沙糖 [illegible]

右研令勻丸如梧桐子大每服五丸臨臥溫熟水下

皂莢散 治大便不通

豬牙皂莢 [illegible] 蔓荊子 [illegible]

右為末每服一錢溫茶湯調下

大黃丸 治大便不通

大黃 [illegible] 大麻仁 [illegible]

右為末煉蜜丸梧桐子大每服十丸食後熟水下

治肛門[illegible]閉塞大便不通腫縮生瘡

[illegible] 乾薑 [illegible]

右和丸如指頭大[illegible]下部中[illegible]三升[illegible]如[illegible]中令[illegible]丸如指大

長一寸[illegible]下部[illegible] 又方常

服蜜煎五合

大黃芒硝丸 治大便暴閉不通腸結

大黃 [illegible] 芒硝 [illegible]

右先切大黃以水四升煮取二升去滓內芒硝頓服之須臾利良久

不瘥以熱飲投之一方為末每服二錢[illegible]下

治乾霍亂腹脹痛不通

毛桃花 [illegible] 麵 [illegible]

右和麵作餛飩熟煮空腹食之日午後腹中如雷鳴當下惡物得效

治大便旬日不通

牽牛 [illegible] 白膠香 [illegible]

右為末水丸如棗核大油塗納穀道中良久便通

又方

膩粉一分 黃丹一錢

右為末每服一錢粥飲調下

治臟腑壅滯 心腹氣悶[illegible] 大腸秘澀

牽牛子 [illegible] 青橘皮 [illegible]

右件令細搗和蜜丸如梧桐子大每服十五至二十丸食前用溫酒下生

薑湯亦可

治便不通

用蜜煎如指大每納下部佳

又方

用[illegible]七枚[illegible]內下部如非[illegible]瓜亦得

治卒大便閉不通

用刺瓜蔓如指大導下部中即效

又方

用蜜和麵[illegible]內大孔中[illegible]又方蜜一升水四升煎[illegible]下部中

治大便[illegible]

用葵子三升水五升煮取一升頓服一方水服桃花方寸匕無花白

皮亦得又方[illegible]煮取汁服之佳

又方

用車前子及葉煮服良

治大便澀不通

用豬膽[illegible]內下部中[illegible]又乾薑[illegible]杏仁搗

[illegible]

巴豆丸 主寒癖宿食久飲飽不消大秘不通

用巴豆仁一升清酒五升煮三日三夜[illegible]合[illegible]前令可丸如胡

豆大欲取吐下者服二丸[illegible]去[illegible]心腹[illegible]服二十

粒丸如菉豆大溫水下二丸

蒸餅方 [illegible]大便[illegible]不通[illegible]生瘡

用蒸[illegible]

劑如棗核[illegible]肛門中坐良久自通[illegible]

少許一寸[illegible]即通

加皂莢末捐以較之後捏了蘸在猪膽汁內一名丸妙海藏曰蜜導
用蜜相合亦可如用草烏頭末相合亦可蜜則較堅潤燥草
烏末則化寒消結可隨証陰陽所宜用之

治虛人并老弱人虛秘
用大麻子仁淘洗不許多少研細用水濾取麻汁以米相和煮粥食之一方水調服又方白煮麻子十一飲蜜五合常服
亦效熟湯泡大服亦可

（蘇前散）治大便不通
用蒜頭不以多少泡油少許鹽少許搗作錠子放在肛門

治大便秘澀不通
用牽牛子半生半熟為末每服二錢煎薑湯調下如未通再服又以茶投之量虛實臨候加減服

治大便不通風秘或死
用烏梅十箇置湯中須臾去核為丸如棗大內下部少時即通

治大腸氣秘
用威靈仙蜜丸如梧桐子大於一服生薑湯米飲下十丸至二十丸

治大便秘結
用陳皮不去白酒煮至軟焙乾為末復以溫酒調服二錢為妙一方以米飲下

治大便秘澀不通
用蜣螂不以多少炒去翅足為末熱酒下一錢

治卒大便閉澀不通
用猪羊膽作三丸如指大內下部中一方用食鹽和苦酒傅臍中乾即易

（敗散）治閉結至殆昏不知人
用生大螺一二枚以鹽一匕和殼生搗碎置病者臍下一寸三分用寬
帛緊繫之即大通烏桕木根二寸研井水服亦效乾者研細末
熨臍下亦可

治大便不通
用烏桕木停一寸大擘破以水煎取小半盞服之立通不用取水

（薑導）用生薑削如小指長二寸塗鹽內下部中立通

治下部閉不通
用胡荽根一把搗汁水和絞去滓強人服一升弱用之并治脚氣

治大便卒然結不通
用羊蹄根一兩剉水一大盞煎取六分去滓溫頓服

治小兒大小便閉結
用胡麻油亦服合取利為度食油煎紫令翻覆生油浮殺其厚為度

治大便秘澀經日不通名脾約湯
用皂角一二兩去皮弦子炙黃為末每服以棗肉為丸煎米湯下不通又方用麻仁定水一盞煮一二沸去滓溫服
生薑汁煮一方丸梧桐子大每服五丸熟湯下根秘為末煎湯調服

（附子散）治大便冷秘
用附子一枚炮去皮臍剜去心留中心如棗大研為末蜜水調

（土瓜根汁方）治大便不通亦治小便
用生土瓜根搗汁少許水解之竹筒中傾內下部即通

（玄明粉散）治大便不通
用玄明粉半兩每服二錢以大黃湯或米飲調服即通

（郁李仁湯方）治大便不通
用郁李仁湯去皮細研分兩服者一兩強一兩熟時下郁李仁煮
三兩米研末空心煮粥兩服一服以通利為度止服

（羌活散）治便忘多發大便難中生瘡
羌活一兩　人參　枳殼　胡黃連　赤茯苓去皮　羌活去蘆
附子　郁李仁　牡丹皮　黃芩　麥門冬去心
薔薇根皮　大黃　防己一兩　甘草炙二分
右㕮咀每服五錢水一盞生薑半分柏葉鹽豉四十枝煎一盞去滓更入

（秦艽湯）治大腸虛痢秘澀
淡竹瀝少許攪勻食前溫服

秦艽去苗土 防風去叉 枳殼 羌活去蘆 桂去皮
檳榔 麻子仁生 朴硝
右入每服三錢水一盞煎至七分去滓下朴硝末半錢更煎兩沸食
前溫服日二
檳榔丸 治腸胃受熱氣不宣通痞聚腸脹滿大便秘澀
檳榔 大黃 枳殼 大麻人研
桃人 青橘皮去白 木香
右除桃人麻子人外為末同研勻煉蜜丸梧桐子大每服二十丸溫
水下日二服以知為度 方無青皮
大黃散 治小腸移熱於大腸腹脇脹滿痞聚秘澀
大黃 黃芩 甘草
石膏研四兩 山梔 桂心
右㕮咀每服三錢水一盞半煎八分去滓空心溫服微利服
二黃湯 治虛痞大便秘
大黃 芒硝 黃芩 桃仁 甘草
右除芒硝外㕮咀每服三錢水一盞煎七分去滓入芒硝半錢煎一
二沸溫服食後臨臥
木香丸 治大腸受氣痞聚沉靡秘澀不通
檳榔 大黃 木香 陳橘皮
牽牛子
右四味為末入牽牛末和勻煉蜜杵丸梧桐子大每服
三十丸空心臨臥下
潤腸丸 治發汗利小便亡津液大腸秘老人虛人皆可服
沉香 肉蓯蓉
右為末用麻子人汁打糊丸梧桐子大每服七十丸空心用米飲下
潤腸丸 治脾胃中伏火大便秘澀或乾燥秘塞不通全不思
食乃風結秘血結秘皆令閉塞也以潤燥和血疏風自然通
麻子仁 桃仁 羌活 當歸尾 煨大黃半兩
右除麻仁桃仁另研如泥外搗羅為末五上火煉蜜丸如梧桐子大每服
三五十丸空心白湯送下○如病人不大便為大便不通而滋其
邪盛者急加酒製大黃以利之○如血燥而大便燥乾者加桃仁酒製大黃
○如風結燥大便不行者加麻子仁大黃○如風澀而大便不行者加皂角仁大
黃秦艽以利之○如脈澀覺身有氣澀而大便不通者加郁李仁大黃以
除之氣燥○如陰陽之病為寒結閉而大便不通者以局方中半硫丸或加煎
附子乾薑湯水冷與之其病雖陰寒之證當服陽藥補之若大便不通者
亦當十服中與一服藥微利而止其大便不令閉結乃治之大法○若病人雖是
陰證或是陰寒之證其病燥結脈實堅亦宜於陽藥中少加苦寒之藥以去
熱燥燥止勿加如陰燥欲坐井中者其二腎脈必按之虛或沉細而遲此
易為辨耳知有客邪之病亦從權加藥以去之
活血潤燥丸 治大便風秘不通常燥結
當歸 防風 羌活 大黃 桃仁
麻仁 皂角仁
右除麻仁桃仁另研外為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服
五十丸三兩服後大便日久不能結燥也以磁器內盛紙封之無令
見風
升陽潤燥湯 治膈間不通過氣衰急大便不行
青皮 甘草 檳榔 黃芪一錢 青葉三分
升麻 麥門 熟地黃 當歸四分 桃仁 蒼朮
右㕮咀如麻豆大作一服另研桃仁泥子一處同煎水二大盞煎
至一盞去滓稍熱服食前
麻黃白朮散 治大便不通三日一遍小便黃赤渾身腫面上及
腹痛甚其色黃麻木身重如山沉困無力四肢痿軟不能舉動喘促
唾清水吐哕痰唾白沫如膠時燥熱發欲去衣須臾而過振寒項額有如冰
時作有時如服眼目中溜火鼻塞不聞香臭少腹急痛當臍有
動氣按之堅硬而痛
麻黃 桂枝 杏仁 吳茱萸 草豆蔻
厚朴 炒麴 升麻 柴胡 白朮一分
蒼朮 甘草 澤瀉 茯苓 猪苓 紅花二分
青皮 黃連 黃柏 黃芪 人參三分
炙甘草 猪苓三分

右㕮咀，每服水二盞，[illegible]去滓，入諸藥同煎至一盞
溫[illegible]熱服[illegible]
[illegible]為丸[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
搜風丸 治大便不通[illegible]
皂角 [illegible] 巴豆 [illegible] 枳殼 [illegible]
右以皂角[illegible]，不[illegible]枳殼為細末，入[illegible]
順氣丸 治大腸[illegible]風[illegible]氣秘
蜜丸如梧桐子大，每服三十丸，空心白湯下。
大黃 [illegible] 車前子 [illegible] 檳榔 麻仁 [illegible] 牛膝 [illegible]
郁李仁 [illegible] 菟絲子 [illegible] 山藥 [illegible] 山茱萸
防風 枳殼 獨活 [illegible]
右為末，煉蜜丸如梧桐子大，茶湯或米湯任下。此藥補益，通利，疏風，順氣。
治老人[illegible]上[illegible]肺[illegible]，[illegible]大小便秘結不通
腸風等疾，並皆治之。
人參 [illegible] 訶梨勒皮 [illegible] 大黃 [illegible] 麻仁 [illegible]
右為末，除[illegible]仁研[illegible]入前藥，煉蜜丸如梧桐子大，每服二十
丸，空心[illegible]任下。
枳殼丸 治[illegible]腸胃風[illegible]，大便秘澀。
皂角 [illegible] 枳殼 [illegible] 大黃 [illegible] 羌活
木香 [illegible] 陳皮 白芷 [illegible] 桑白皮 [illegible]
右為細末，煉蜜丸如梧桐子大，每服七十丸，[illegible]米飲或[illegible]湯下。
三和散 治七情氣結，五臟不能和，[illegible]大便閉[illegible]
金液丹 治[illegible]大腸[illegible]冷結[illegible]
硫黃 [illegible]
右[illegible]末[illegible]，[illegible]丸如梧桐子大，每服三十
丸，多至百丸，[illegible]米飲下，空心服之。[illegible]麻仁[illegible]湯下，如大腸乾

[illegible]要事法 [illegible]
正真丹 治老人虛氣滿，大便秘，[illegible]日不通，不敢服下藥
[illegible]
硫黃 [illegible] 陳皮 [illegible] 五靈脂 [illegible]
右共搗陳皮，次搗五靈脂、硫黃，[illegible]丸如梧桐子大，每服五
十丸，食前米飲下。
和血通經湯 [illegible]
[illegible]大[illegible]有風氣[illegible]
伊[illegible]
[illegible]
之邪[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]以升麻葛根，以升陽氣[illegible]陽明之經
[illegible]以桂枝[illegible]手陽明之經[illegible]
甘草[illegible]
以[illegible]元氣[illegible]當歸[illegible]而加血用之
[illegible] 升麻 [illegible] 葛根 [illegible] 桂枝 [illegible] 當歸身 [illegible] 人參 [illegible]
[illegible]
右剉如豆大，[illegible]，空心[illegible]服乃愈
化精[illegible]
[illegible] 牽牛 [illegible] 鱉甲 [illegible] 狼毒 [illegible]
大黃 [illegible] 羌活 牡丹皮 [illegible] 桔梗 [illegible] 獨活
[illegible] 荊芥 [illegible] 半夏 [illegible] 當歸
右件依法[illegible]，[illegible]末[illegible]，[illegible]諸藥合作
一處[illegible]
[illegible]每服二錢[illegible]
大橘皮丸 治大便秘
[illegible] 橘皮 [illegible] 杏仁 [illegible]

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸非時米飲下

神功丸 治……大便秘

黃耆 大黃 甘草 各等分

右碾羅細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸臨卧煮甘白湯下

五仁丸 治……大便虛秘可以常服

杏仁 …… 郁李仁 …… 柏子仁 ……

陳皮 …… 大麻子仁 ……

右五味再合……極細以水浸蒸餅為丸梧桐子大每服五十丸空心

米飲吞下

通秘散 ……治風秘大便澀

香白芷 不以多少炒

右為細末每服二錢蜜少許房米飲調下連進二服

通食散

蒼术丸 ……治腹脹痛腸秘

蒼术 …… 厚朴 …… 陳皮 各……兩 生好硫黃 ……

右搗羅為末煮……為丸如梧桐子大每服二五十丸日兩服米湯……

麻仁丸 ……治……三焦……五臟治大便秘塞不通年高老人宜服

白檳榔 …… 羌活 …… 木香 各一兩 肉桂 …… 山茱萸 ……

菟絲子 …… 枳殼 …… 防風 ……

山茱萸 …… 麻仁 …… 大黃 …… 郁李仁 ……

右為細末入另研藥……煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸溫

木香 …… 檳榔 ……

通腸丸 ……治大腸乾結不通

厚朴 木香 …… 檳榔 ……

右用搗研如梧桐子大每服……十丸生薑湯下

四順飲子 ……治……大便不通……

得瀉……大熱……洪大

大黃 赤芍藥 甘草 當歸 各等分

右為麁末每服五錢水一盞煎至一盞溫服

潤腸丸 ……治……大便不通

麻子仁 …… 桃仁 …… 生甘……

枳實 …… 清煉大黃 …… 白芍藥 …… 木香 二錢

陳皮 …… 升麻 …… 檳榔 …… 人參 二錢

右件……桃仁另搗為末卻入麻仁……煉蜜丸如梧桐子大每

服……十丸溫水食前送下

又方 大便不通 ……

用麻子……相為粥食

治大便不通十日至一月 出本草

用大麥……三升水四升煮取一升去滓服不差更作

又方 ……

用枳實皂角等分為末飯……為丸亦以米飲下

枳實散 ……治……脹……大便秘……多洪數此名熱脹

枳實 …… 厚朴 …… 大黃 …… 甘草 …… 桂心 ……

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑三五片棗二枚煎至七分去滓溫

麻子仁散 ……加……一分

小黃耆丸 ……治……腸胃壅熱大便秘澀及五痔結核

防風 一兩 黃耆 二兩 川芎 …… 皂子仁 一分 枳殼 一分

右為末煉蜜和丸梧桐子大每服三十粒不以時候米飲下

麻仁丸 ……治大便秘

麻仁 …… 杏仁 …… 枳實 …… 白芍藥 半兩

黑牽牛 ……七錢

右為細末……為丸如梧桐子大每服五十丸溫熱水送下食前

麻子仁丸 ……治趺陽脈浮而澀浮則胃氣強澀則小便數

……大便則堅其脾為約大便堅小便利而不渴

麻子仁 …… 芍藥 …… 枳實 …… 大黃 …… 一斤 厚朴 ……

杏仁 ……

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸溫水下未效加五十丸一法麻

仁一兩半杏仁二兩大黃一兩枳殼……厚朴各半兩……

方出本是景方合用大黃……枳殼一斤……得合二兩厚朴當用四兩

杏仁當用六錢一方麻仁一兩二錢生八分尊一兩乃均製合理內
當以理推
治大腸秘塞聲結 出不宣
麻子仁 桃仁 [illegible]
右以熟蜜和丸如梧桐子大每服温水服二三十丸不可久服
亦行腎胃故氣也
導引法
養生方云低臥直兩手捻左右脇除大便難腹痛腹中寒口
內氣鼻出之氣晶之氣數之十病愈
大便不禁
論
夫大腸為傳導之官宣化糟粕肛門為之候若其臟寒之氣虛
不能收斂致糟粕無所禁約故言之先不禁治之宜溫固津液
方論所謂虛則泄是也
陳麴丸 治大便不禁腹內疼痛
陳麴（炒） 白茯苓（去皮） 黃連（去須） 當歸（去蘆） 乾薑（炮）
附子（炮） 龍骨 赤石脂 甘草（炙） 人參
當歸（切焙各等分）
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十五丸空心米飲下日再
救陽丸 治大便不禁手足厥冷面色青白
吳茱萸 乾薑 赤石脂 硫黃（研）
龍骨 桂 附子 大椎 陽起石
右等分為末煉蜜丸如梧桐子大每服十五丸米飲下空心食前
新加丸數鹽易亦可
龍骨散 治大便不禁真氣虛損
龍骨 乾薑 黃連 粳米
附子 甘草 茯苓 石榴
右以㕮咀每服五錢水一盞煎至七分去滓空心溫服日再
地榆丸 治大便不禁
地榆 白龍骨 赤石脂 艾葉 熟艾

椿實殼 黃蘗（去粗皮炙三分）
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲下日再
附子湯 治下焦虛寒大便不禁
附子（炮去皮） 黃連（去須） 阿膠（炙） 甘草（炙） 乾薑
赤石脂 厚朴（去粗皮薑汁炙）
右㕮咀每服五錢水一盞半煎一盞去滓空心溫服日再
石榴皮散 治寒冷下焦腸滑洞泄困極欲死
酸石榴皮 乾薑（炮各） 黃蘗（去粗皮炙） 阿膠（炒各三分）
右㕮咀每服四錢水一盞煎四分去滓空心溫服或與黃藥同黃連亦得
厚朴豆蔻湯 治大便不禁
肉豆蔻（去殼） 龍骨 白术 訶子 厚朴（去粗皮薑汁炙各一兩）
右㕮咀每服五錢水一盞半生薑三片煎一盞去滓空心溫服日再
硫黃丸 治臟虛大便失禁
硫黃（研） 青鹽（研） 蕎麥 [illegible] 各一兩
右研勻水浸蒸餅丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸溫酒空心食前
又用丹砂為衣亦得
福建丸 治大便失禁并腸鳴
附子（去皮臍一兩） 厚朴（去粗皮 [illegible]）
右為末用黃陳麴末為糊丸梧桐子大每服十五丸至二
十丸生薑湯下空心食前服
石硫黃湯 治虛冷大便不禁氣弱神昏
石硫黃 [illegible] 茯苓 [illegible] 木香一兩
右㕮咀一盞 [illegible] 去滓溫服不拘時候
太理中丸 [illegible] 治大便虛滑不禁每一丸用平胃散一貼煎
化服便止加 [illegible]
人參 白术 乾薑 甘草 各等分
右為末煉蜜丸如梧桐子大
論 脫肛
夫肛門者主大行道肺大腸候 [illegible] 大腸重十二兩長二丈一尺二

逯

大腸二寸三分應十二時若臟傷熱則肛門閉塞大行不通或腫
縮入生瘡若腑傷寒則肛門開大行洞瀉肛門凸出良久乃入熱則通之
寒則補之虛實和平依經調理之 四十八難曰病之虛實出者為虛入
者為實肛門之脫豈非虛也蓋肺與大腸為表裏[illegible]
寒則肛氣脫而不能收見大腸之虛[illegible]脂之者肛亦挽大肉氣之虛
實何如耳大凡脫肛者以溫湯洗令和軟然後用藥而入治法以溫
[illegible]脫出[illegible]而不止風邪所襲亦有此證
[illegible]腸頭作癢或大腸中有蟲生瘡若病根[illegible]宜以乾艾生薑煎
[illegible]肛腸痛因腫脹不可以[illegible]以藥塗搽熱丸不可
[illegible]裏急見痛腫[illegible]以藥塗之意在肛腸皆固
後宜用一先[illegible]不可脫出者因大腸寒氣以腸之至固不能便收
[illegible]脫肛[illegible]故河之脫肛[illegible]右方[illegible]生湯[illegible]皆良法也
[illegible]不散也[illegible]而不出外脹[illegible]先以枳殼散作[illegible]
[illegible]性細末摻[illegible]或[illegible]生薑汁
調五苓[illegible]入剉水研散[illegible]香薷[illegible]阿膠丸此論肛門挾熱
而[illegible]也若或腸中虛冷[illegible]不收宜理中湯 腸丸[illegible]湯[illegible]
之[illegible]本[illegible]傳之

猪肝散 七十大腸虛冷肛門[illegible]脫肛門事出

猪肝 [illegible] 黃連 [illegible] 阿膠 [illegible] 芎藭 [illegible] 烏梅肉 五個

艾葉 [illegible]

右為末每服 錢溫酒調下白米飲亦可食前日二

金屬[illegible] 一名[illegible]

鼈頭 [illegible] [illegible]

右為末用[illegible]

鼈甲[illegible]大腸之候大腸
傷於[illegible]不收脫中
全氣可安

鱉甲 [illegible] 蝟皮 [illegible] 桂心 [illegible] 磁石 [illegible]

右為細末蜜[illegible]大每[illegible]下[illegible]大小加減服一方為散

食前粥飲服

[illegible]脫肛 [illegible]

蓖麻子 蓮殼 一副 搗研[illegible]

右搗碎水煎五沸入朴硝熱洗其肛自上

[illegible]脫肛[illegible]

香荊散 [illegible] 治脫肛

大香附 荊芥穗 [illegible] 縮砂 [illegible]

右為末每服三錢食前[illegible]數為即服小兒通用一方無縮砂洗

[illegible]治大腸虛而挾熱脫肛腫

縮砂 黃連 木賊

右為末每服二錢米飲調下

[illegible]大腸虛冷大便後脫肛洞出

紫[illegible] [illegible] 硫黃 [illegible]

右為末每服二錢食前粥飲下肛上更灸鞋底熨之

[illegible]大腸虛冷脫肛[illegible]不可忍

石灰 白礬 黃丹 [illegible]

右研[illegible]和為餅子[illegible]令細研又和又炒如此三
[illegible]末入[illegible]香末[illegible]服一錢食前艾葉湯飲調下

治脫肛不[illegible]

[illegible] 蒲黃 [illegible] 白[illegible]

右為末傅脫肛上揩抑令入日三可瘥

治脫肛瀉血不止 [illegible]

石耳 [illegible] 白礬 [illegible] 密陀僧 [illegible]

右為末水[illegible]蒸餅丸梧桐子大每服十丸食前粥飲下

蝟皮散 治[illegible]肛門脫出或因病乃太[illegible]或因[illegible]不收 出千金方

磁石 [illegible] 桂心 [illegible] 蝟皮 一枚

右為末飲服方寸匕日[illegible]服即縮[illegible]重[illegible]

年乃佳治女人陰脫出外用生鐵引出頭一枚鱉甲栽之灸[illegible]

末為四味[illegible]脫肛[illegible]用破草鞋底炙[illegible]上而熨按之

壁土散 [illegible] 治肛門脫出

故屋東壁土 [illegible] 皂莢 一[illegible]

右末後上為末以敷肚頭出以手分取皂莢炙乾更近炙水入則止
又方 出外治肛脫出
蝟頭 故敗麻履底 各等
右件藥燒灰為末內肛門外下出用以手取擦履底接入即不出矣
治脫肛 [illegible]
槐花 槐角
右等分炒香為末用羊血蘸藥炙熟食以酒送下或云
猪腳去皮為末服
治大人小兒脫肛不愈 [illegible]
荊芥 皂角
右為末煎湯洗了以鐵漿塗肛即入 又治產後婦人子宮出亦如此用
治大人小人腸頭出 出經驗良方
百草霜 五倍子
右為末鋪紙成素子以鵝毛傅上即入
蛇床散 出經驗良方 治脫肛
蛇床子 甘草 各一
右為末熱湯調服一錢日進三服
又方 出[illegible]
白雞冠花 防風 各等分
右為末糊丸空心米飲下百丸
荊芥散 治脫肛 方見本門[illegible]下血類
香草丸 [illegible] 治脫肛 方見[illegible]
治脫肛 方見[illegible]
治積熱脫肛 出千金方
用枳實石磨令滑鑽安柄蜜塗炙令暖更易熨肛取縮上
治白蟲脫肛
用木瓜一錢百藥煎一錢烏梅二箇以水一碗煎至半碗無時候服
治大腸虛冷脫肛及產後脫肛 出聖惠方
蝸牛子 [illegible] 磁石 [illegible]
右水一大盞煎磁石五錢至五分去滓調蝸牛末一錢服之日三服

一方為末每服二錢以空心米飲調下日午再服
治脫肛瀉血不止 出聖惠方
附子 [illegible] 蘗[illegible]
右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸[illegible]粥飲下
治披肛不縮 出聖惠方
石榴皮 葛根 各一
右以水[illegible]大盞煎至七分去滓分溫二服
治[illegible]生不收
赤石脂 白礬 等分
右擣先傅之用青物托進肛門
治腸頭挺出
用蝦蟆皮一片瓶傳[illegible]一方瓶內燒熏
治肛門[illegible]出 出千金方
用生故麻鞋底按令入頻按令入永差
治肛門脫出 出千金方
用女萎一升以器中燒坐上熏之即入
治脫肛腸出數寸 出千金方
用蒲黃二兩以猪脂和傅肛上內之二三度即愈以粉之良
治腸頭出又不可入者 出經驗良方
用生栝蔞根[illegible]以猪脂[illegible]隨手和[illegible]自得縮入 又方生栝
[illegible]溫服以猪肝汁洗手[illegible]之令[illegible]自得入一方用栝蔞
治脫肛歷年不愈 出[illegible]方
用生鐵五斤水[illegible]煮取五升出鐵以汁洗日再 無不差[illegible]
石粉之[illegible]亦良
木賊散 出直指 治脫肛不縮
用木賊不以多少燒存性為末摻肛門上按之
治脫肛 出經驗良方
用磨刀水下錢以毛翎蘸少許於肛門上却以磁石煎湯坐
心服半盞許一方用磨刀水洗
又方 出經驗良方

用貼水荷葉焙爲細末好酒調下二錢又將荷葉一片將藥末二錢在葉上令病人在葉上坐即入

又方 治脫肛

用炙竹葉多用晨未爲先二服

治痔漏脫肛 出州得方

用虎脛骨兩節蒸二兩金骨上炙令赤搗末水浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服空心溫酒服二十丸腸脫先退大腸然後服一方治肛門凸出燒虎骨末服方寸匕日三服良

治大腸脫肛

用蓖麻子去殼研碎貼頭上頂髮間揉此藥於腦上頂髮中少頃之大腸頭收上即急去了藥若婦人產後去不下用此藥去殼研碎貼兩腳底心即下

太砲膏

用芎藭根不以多少搗爛煎湯熏洗

治脫肛痔病等

用荊芥煎湯洗之却將浮萍草研細入白礬末去津入蜜調敷患處用油單紙傳上貼之坐臥亦可

蝟頭散 出十全方 治脫肛大腸久不收每大便脫肛收不能入

用蝟頭燒灰炙焦黄自死者尤佳爲末傳腸頭用軟絹揉擦按入仍以方寸匕食前米飲調下一方如不愈以蝟頭血塗之又方燒令烟絕研末傳肛上手按托之一方用鞋底按入即不出

磁石散 出直指方 治脫肛

用磁石半兩燒入醋淬中令火爲末每服一錢空心米飲調下又服亦可次用鐵片燒入醋令同煎熬洗先用托上

鐵粉散 出直指 治大腸本虛風毒客熱乘之脫肛紅腫

用鐵粉研細入白斂末夫和傳之即按入又方鐵粉以少許摻之按令即愈

樺斗膏 出直指 治脫肛

用樺斗子燒存性豬脂和傳按入

石灰方 出直指 治大腸積冷久年脫肛及治每因大便脫肛按不入

用石灰炒熱以帛包裹坐其上令冷又別換仍以海螵蛸末傳之

文蛤散 出外台 治大便脫肛門脫出不收用此方多效兒啼哭久病後坐便脫肛患者治之

用五倍子不拘多少爲末水煎汁爲先更入白礬蛇床子先洗後赤石脂爲末以少許摻在片紙上托入或長尺餘者以兩末相接中空一尺以此藥[illegible]仰臥以其所須在被中[illegible]用[illegible]爲末金上亦可一方不用蛇床子

凡大人小兒脫肛每大令及換令食即脫[illegible]不止肛則下脫久痔不差者小兒用[illegible]以[illegible]乾二兩爲末如滑石末七兩相和研細塗肛上內入既內了即使人噀令冷水於面上即吸入腸中每日塗藥實兩次以五年之後[illegible]知散一方寸匕空腹服之日再漸加至二方寸匕以知爲度五歲已下小兒即以杏子半許散和令服之亦佳忌生冷辣食等

治脫肛

用防己實焙乾爲末如茶法煎服

又方 出經驗

用蝸牛燒灰末和豬脂傳之立縮此藥全似蝸牛黄小而微好發

參葉一方亦可乾作末敷之

治大腸脫肛久積虛冷每因大便脫肛收不得

用蝸牛有小殼生研取服上清爲一方燒灰豬脂和傳則縮

治小兒脫肛

用莨菪子炒以醋煎末傳之

蟠龍膏 出經驗 治脫肛門脫出

用乾地龍取一大握又名曲蟮搗爛如泥先用朴硝水洗淨肛門用芭蕉葉托入却用藥於臍下貼之自然收入

治腸頭脫出

用羊脂傳上以鍛精粉傳羊脂上另以布裹指炙令溫按內仍酒服磁石末方寸匕日三服之

獨虎散 出經驗 治脫肛不收

用五倍子半兩爲末井水一碗入磁瓶內慢火煎半碗入朴硝

各一錢為末先洗後以五倍子末傅之
治脫肛
用龜頭灰亦治之一方用甲灰
治脫肛出半門三五寸者 出衛生寶鑑
用陳茶艾熬水通手去渣洗却用田螺大者二三枚水中養一日去泥
尾用黃連末少許填起螺靨入螺殼內候化成水却用
鷄翎蘸藥掃上再以乾晶納肛門內自然收不復發
治大腸風冷下血不止脫肛來肆
用野狸一頭以大瓷瓶一所可容得者內於瓶中以厚泥固濟
候瓶乾以火炙之候火煙住止候冷取入麝香末半兩研令勻
於瓷器中收之每於食前溫粥飲調下二錢
治脫肛不縮 出聖惠方
用生韭一斤細切以酥拌炒令熱分為兩處以軟帛裹更互熨
之冷即再易以入為度
又方 出聖惠方
用五倍子不拘多少以陰乾為末每服二錢食前粥飲下患
腸頭亦差
又方 出聖惠方
用蛇床子一兩炒為末貼之
治脫肛腸出 出姚氏方
用黃連研細末擦水調塗腸頭
治卒大便脫肛 出肘後方
用豆豉漬合爛傅之
釣腸丸 出直指方 治大腸虛冷脫肛內收及腸風諸痔 方見痔漏門
加味犀角消毒飲
用蒡子 赤芍藥 防風 荊芥穗 甘草
當歸 各等分
右先以猪大腸頭長一尺二寸春雨二枚於沙鍋內用水四五升
煮爛熟去腸頭入前藥同四五沸取汁熏先數次令肛軟却於黑
芝蔴燒煙熏之

硇砂丸 治冷熱不和下部虛冷或傷後重或結滯腸頭脫出
硇砂 半兩 硫黃 半兩 白礬 各等分
已上三味同研勻用葱兩一枚重五兩者割開留元蓋子剜作坑子
填上件末在內將元蓋用竹簽定麵裹十五兩開地坑一枚方
深闊各三寸安定麵裹於在上更以馬糞蓋之發火燒後通
日取出麵將葱取藥攪搗入青更入後藥
肉豆蔻 去殼 胡蘆巴 去子 訶梨勒皮 附子 茴香子 各分
補骨脂 炒各一兩
右六味為末連前藥為同搗為末好酒和糊丸如梧桐
子大每服十五丸至二十丸空心食前溫酒飲下
赤石脂散 出聖惠方 治大腸虛冷久痢不瘥脫肛
赤石脂 龍骨 白石脂 當歸 各一兩 黃連 去須
肉豆蔻 去殼 黃連 去鬚 白芍藥 厚朴 去粗皮生薑汁炙
右為末每服二錢粥飲食前調下
香梅散 出聖惠方 治久痢不瘥脫肛
烏梅 一兩 龍骨 訶梨勒 煨去皮 黃連 去鬚 縮砂 去皮
肉豆蔻 去殼 草果 白石脂 各一兩
右為末每服二錢粥飲下
地榆芍藥湯 治泄痢膿血乃至脫肛
蒼术 八兩 地榆 二兩 卷柏 三兩 芍藥 二兩
右㕮咀每服一兩水一盞半煎一盞溫服
龍骨丸 治諸痢疾脫肛久不差
龍骨 艾葉 炒各二兩 [illegible]
右為散每服二錢粥飲食前調下
一聖散 治瀉痢日久脫肛疼痛
用大蜘蛛一枚以瓠子葉兩重裹以線繫定合子內燒令黑色
勿太過細研為散入少許研勻每上用白礬湯洗並前收洗浴試乾後
將藥摻在軟帛上仍手托托上肛頭即不下
崇十月紅葉湯白大棗名候而堅起長脫因為脫肛日久服藥不
驗近日復以赤白膿痢作其患後重白多赤少不任其苦以百

此小肉食甚然少多薄食氣胃氣不歛其衰一也衣蓋觸冷寒侵其衰二也充天大時過甚大三也不禁腸頭脫下甚寒也胃也真氣不能…故肛門下脫也當料之以去其服而降其痛微酸之味固氣以大熟之劑而除補湯以補三氣之藥升益之氣之名曰訶子皮散

訶子皮散 出東垣蘭室秘藏

御米殼 去蒂萼蜜炒 訶子 煨去核 乾薑 炮 橘皮 半錢

右為末分作二分服每服水二盞煎至一盞和渣空心服

內服全愈

治腸出 出聖惠

用蓖麻子搗爛貼頭頂甚効

治脫肛 出本草

用鐵帚煮汁服

治卒脫肛 出本草

燒蜘蛛為灰末傅肛上

治脫肛 出本草

以年久筆頭燒灰水服之

治肛帶出 出本草

以胡荽一升燒以煙薰肛即入

治脫肛

用五倍子草炙令香…兩服之

又肛門有蟲

論

夫肛門有蟲者因胃弱腸虛蟲動…下求之也肛門為大腸候胃氣…肉之一蟲也在胃腸間若臟腑氣實…不安動胃弱腸虛則蟲…求之蝕養成瘡或蟲從肛門出…侵蝕肛門但瘡也

蝟皮丸 出聖惠方 治肛門痒或出膿血有蟲傍生孔竅肉

蝟皮 … 新牛蒡 … 好肥羊肉 …

右都搗如膏丸如梧子大炙令熱以新綿薄裹內下部中半日少時飯即大便中蟲出三五度永差

又方 出聖惠方

白蕪荑 半兩 … 豬牙皂莢 …

右為末以猪膽汁同研令勻…丸如棗子大綿裹一丸內下部中日二換

又方 出聖惠方

雄黃 胡粉 各等分

右研以棗肉丸如梧子大以綿裹一丸內下部中日再易之

肛門赤痛

論

夫肛門為大腸之候其人熱壅…冷熱…氣擊搏故令肛門赤痛也

積椒散 出聖惠方 治大腸風毒攻肛門赤腫疼痛

槐角 … 大黃 … 沉香 赤芍藥 防風 去芦

羌活 皂角 … 甘草 炙剉 枳殼 麩炒

右㕮咀每服四錢水一中盞煎至六分去滓食前溫服

牛蒡子散 出聖惠方 治大腸風毒肛門赤痛令人煩熱坐臥不安

牛蒡子 炒 川大黃 剉炒 黃耆 剉 白蒺藜 炒去刺

枳殼 麩炒 當歸 剉 芎藭 甘草 炙剉

右㕮咀每服四錢水一中盞煎至六分去滓食前溫服

大黃散 出聖惠方 治大腸風熱攻肛門赤腫

川大黃 剉炒 黃芩 黃耆 玄參 各一兩 丹參 一分

赤芍藥 半兩 枳殼 …

右為末每服二錢食前以溫粥飲調下

治大腸風毒氣毒攻肛門赤腫疼痛 出聖惠方

枳殼 麩炒 芎藭 … 川朴硝 … 川大黃 …

甘草 一分炙剉

右為末每服半…食前以粥飲調下

又方 出聖惠方

皂莢樹白皮 一兩 甘草 … 枳殼 …

右為末每服二錢食前粥飲調下

治穀道生瘡赤腫痛又方

用苦人杵作末傳之一方黃樗以綿包[illegible]之

又方 [illegible]

用雁肉炙在上熨

治肛門腫痛

用木鱉子去殼取仁四五枚研如泥安新瓷器內以水一盞沖入以沸湯[illegible]

敷重[illegible]少許金患處

又方 [illegible]

用方散 [illegible]

地榆散 出聖惠方

地榆 荊芥穗 蛇床子 菊花 苦參 各等分

右㕮咀每用藥一匙水一椀煎三五沸去滓通手熏洗患處

三黃丸 治肛門腫痛或下鮮血

黃連 黃芩 大黃

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服四十丸熟水吞下

普濟方卷之十六

考論官典簿王[illegible]
對方醫士李永[illegible]
劉[illegible]
張[illegible]
陳[illegible]
[illegible]山
畢[illegible]
刊[illegible]等

普濟方卷之十七目錄

小腸腑門

小腸虛 小腸實

小腸實（論）（方）十九方

升麻散 柴胡湯 柴胡黃連湯 鬱金散
鬱金散 赤茯苓湯 貝母湯 大黃丸
秦川芎湯 芍藥散 木通散
地黃湯 胡桃湯 射干湯 海蛤丸

小腸虛（論）（方）二十六方

牡蠣丸 烏頭丸 益智丸 補骨子丸 溫腸丸
乾薑黃連湯 沉香湯 木香丸 吳茱萸散 椒附丸
厚朴散 阿膠湯 寸金丸 蓮花散 牛膝丸
厚朴散 木香湯 斷弓弦散
治小腸虛熱[illegible]
治小腸[illegible]散[illegible]小便[illegible] 治小腸冷熱不調取[illegible]方
治肝[illegible]春本[illegible]生[illegible] [illegible]痛不可勝[illegible]
治小便[illegible]以此[illegible] 利小腸
治小腸[illegible]大如[illegible]不[illegible] [illegible]小腸

普濟方卷之十七

小腸腑門

總論

小腸腑者心之腑也古人具候也心合於小腸小腸者受盛之腑也號監

分史重二斤十四兩長二丈四尺廣二寸四分

之小便附於左迴疊積其注于迴腸者外傳臍上迴運環反十六曲當

臍水穀一斗四升……二升……定水……二十四氣也

小腸病者小腹痛腰脊控睾而痛時窘之後耳前熱……

及手小指次指之間熱……其候也○小腹控睾引

腰脊上衝心……邪在小腸者連睾系屬於脊貫肝肺絡心系氣盛則厥逆

上衝腸胃動肝肺散於肓結於臍故取之肓原以散之刺太陰以予之

取厥陰以下之取巨虛下廉以去之按其所過之經以調之○左手關

前寸口陽絕者無小腸脈也苦臍痹小腹中有疝瘕王月即冷上搶心

刺手心主治陰心主在掌後橫文中入一分左手關前寸口陽實者小

腸實也苦心下急熱痹小腸內熱小便赤黃刺手太陽治陽手太陽在

手小指外側本節陷中○小腸有寒其人下重便膿血有熱必痔小腸

有宿食常暮發熱明日復止小腸脹者小腹䐜脹引腰而痛心前受病

移於小腸心欬不已則氣與欬俱出厥氣客於小腸為聚○診其心脈

……小腸……

……小腸……

……

……

……

小腸實

附論

夫小腸者受盛之腑也心之府也……則為實……故左

手寸口人迎以前脈陽實者小腸實也實則生熱口瘡故有身熱來去

口瘡心煩身重汗不出小便不利之證治宜瀉之

【升麻散】治小腸實熱口瘡舌爛心胸煩悶小便不利

川升麻　羚羊角屑

梔子仁　黃芩　杏仁　甘草

川大黃　甘草

右為散每服……水一中盞煎至六分去渣食前溫服

【羚羊角湯】治小腸實熱心煩口瘡小便赤澀

羚羊角　人參　杏仁　梔子

赤茯苓　木通　黃連

麥門冬　白茅根　甘草

右㕮咀每服三錢匕水一盞入竹葉二七片煎至六分去滓溫服

不計時候

【柴胡澤瀉湯】治小腸熱脹身熱手足心熱汗不出中煩滿結

塞不通口瘡身重

柴胡　澤瀉　橘皮　黃芩　旋覆花

枳實　升麻　芒硝　生地黃

右㕮咀以水一斗煮取三升去滓下芒硝分三服無時

【鬱金散】治小腸實熱則心下急痺口舌生瘡

鬱金　白附子　犀角……　甘草　黃連

黃芩　川大黃……　麥門冬　川升麻

右為細散每服食後前麥門冬湯調下一錢忌炙煿熱麵

【鬱金散】治小腸實熱心下急痺口舌生瘡

鬱金　白附子　天竺黃　甘草

黃芩　……　乾蠍　黃連

右為細散每服二錢匕食後薄荷水調下生姜蜜湯下亦得

【赤茯苓湯】治小腸實熱面赤多汗小便不利

木通　赤茯苓　檳榔　生地黃

赤芍藥　甘草　麥門冬　黃芩

右㕮咀每服四錢水一盞入生姜五片煎至八分去滓溫服不拘時

候一方熟去滓放溫服

瞿麥湯 治小腸有熱小便黃赤結澀不通

瞿麥穗　犀角　猪苓　防己　黃連

車前子　木通　甘草

右搗篩每服三錢匕以水一盞煎取七分去滓溫服不拘時

木通散 治小腸有熱心胸煩悶小便澀少臍中急痛

木通　檳榔　羚羊角屑

黃芩　當歸　車前子　甘草　赤芍藥

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓食前溫服

大黃丸 治小腸熱結滿不通

大黃　芍藥　葶藶　大戟　朴硝

杏仁　巴豆

右為末煉蜜和丸如梧桐子大飲服大人七丸小兒三丸日二熱去日一服

麥門冬湯 治小腸實熱脉弦多寒小便下血脉實病實方可喫此藥

麥門冬　知母　蒲黃　黃芩　木通

升麻　大黃

右搗篩每服三錢匕水一盞煎至八分去滓食後溫服

滑石散 治下焦滯熱莖中疼痛小便難

滑石　甘草　大黃　黃芩　地榆

山梔子　乳香

右為散食前乳香酒調下一錢匕未愈再服

胡荽湯 治小腸風熱小便黃赤澀結不通

胡荽　車前子　木通　防己　瞿麥穗

犀角　黃連

右為散每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服日進三服

射干湯 治小腸有熱小便赤澀莖中痛不可勝忍之方

射干　黃芩　麥門冬　大黃　知母

木通

右為散每服三錢匕水一盞入竹葉五寸切碎同煎至八分去滓

食後溫服以利為度若一服以上未通以芎藭湯盡投之即

下[illegible]至夜[illegible]服

蒲蛤丸 治小腸有熱小便淋澀小便出血

蒲蛤　漢防己　[illegible]　檳榔

木通

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服[illegible]葵根湯下二十丸

地黃湯 治小腸熱心中煩悶小便出血

生地黃　茅根　蔥白

右剉如麻豆大每服三錢水一盞[illegible]去滓食前分溫二服

小腸虛 附論

夫小腸者受盛之府也手太陽其經也其氣虛則為不足故左手寸口人迎以前脉陽虛者小腸虛也虛則生寒是攻有[illegible]臍[illegible]偏[illegible]耳等不聰[illegible]小便數之證[illegible]且論之○小腸者受盛之官化物出焉[illegible]受盛[illegible]變化[illegible]出焉其經有寒則不傳於大腸故化物難而又腸中疼痛[illegible]脉細滑小腸實[illegible]令人下重便膿血者是也

牡蠣丸 治小腸虛寒小便數[illegible]不禁如乳汁狀 方

牡蠣　萆薢　續斷　益智子　石斛

蓯蓉　桂　狗脊　五味子　石硫黃

山茱萸　巴戟天　龍骨

右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心溫酒下四十丸小便止即已不要多服

一方[illegible]空心[illegible]

烏梅丸 治小腸虛[illegible]

烏梅　乾薑　黃連　當歸　細辛

附子　蜀椒　黃蘗　人參

右件九味[illegible]末以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之[illegible]煉蜜少許和丸如梧桐子大每服十丸米湯下食前日三至二十丸

益智丸 治小腸虛冷小便後或時遺瀝不禁
益智子 萆薢 狗脊 茴香 巴戟天 去心
乾木瓜 續斷 牛膝 附子
右爲末煉蜜和丸如梧桐子大空心鹽湯下四十丸
茴香子丸 治小腸虛冷小腹疼痛不可忍
茴香子 桂 去皮 附子 當歸 蓽澄茄
木香 赤石脂 蜀椒
右爲末煉蜜和丸如梧桐子大每服溫酒下二十丸空心食前 方有
益腸丸 治小腸虛寒下痢便出膿血腸滑不禁
補骨脂 肉蓯蓉 狗脊 獨活
附子 巴戟天 去心 鹿茸 五味子
右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸鹽湯下或酒下亦得
乾薑黃連湯 治小腸虛寒頭偏或耳鳴痢下赤白腸滑腸中
小腹中疞痛裏急後重

乾薑 當歸 黃蘗 地榆 黃連
石榴皮
右㕮咀以水七升煮取二升五合去滓下膠煮取膠烊盡分三服
方加茴香
沉香散 治小腸虛寒臍下急痛小便滑數
沉香 桂 附子 白龍骨 木香
當歸 枳實
右剉如麻豆每服二錢水一盞入生薑半分煎至六分去滓食前
熱服
木香丸 治小腸虛寒便痢赤白腸滑
木香 黃連 訶子皮 無食子
赤石脂 厚朴 當歸
右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸米飲下食前
吳茱萸散 治小腸虛冷小腹痛引心腹冷汗出
吳茱萸 厚朴 芎藭

蘹香
右爲散每服一錢水一中盞煎至六分去滓不計時候稍熱服之
椒附丸 治小腸虛冷小便頻多
椒紅 鹿茸 龍骨 山茱萸
附子
右等分爲末酒糊丸如梧桐子大每服七十丸空心鹽湯送下 一方
煖腎丸
厚朴散 治小腸虛寒腹痛下重便利膿血
厚朴 黃連 乾薑 當歸
白茯苓 無食子
右爲細散每服一錢匕粥飲調下食前服
[illegible] 治小腸虛冷小腹疼痛
[illegible] 桂 生薑 黃連
右爲散每服五錢匕水[illegible]煎[illegible]去滓[illegible]服日三
[illegible]金丸 治[illegible]小腸[illegible]

之劑 [illegible]小腹連屬陰間故[illegible]痛不可忍
楮實子 川楝子 巴豆 全蝎 當歸
右爲細末用酒糊打麪糊和丸如綠豆大空心溫酒鹽湯下
下二丸至三丸併進二服[illegible]入藥用
[illegible]散 治小腸虛冷[illegible]
[illegible]茂 [illegible]子 芎藭 [illegible]
[illegible]
右爲散每服二錢[illegible]
牛膝丸 治小腸虛冷小便頻數[illegible]
牛膝 續斷 芎藭 萆薢
右爲末煉蜜丸如梧桐子大空心鹽湯下四十丸或作散入鹽煎
服亦得
厚朴散 治小腸虛冷氣小腹疼痛[illegible]不可忍
厚朴 高良薑 當歸 桂心
芎藭 白芍藥

右爲散每服三錢水一盞煎至六分去滓不計時稍熱服

木香丸 治小腸有寒下利赤白腹痛下墜

木香 黃連 當歸 附子

芎藭 吳茱萸

右爲散每服三錢水一盞煎至七分去滓稍熱服食前

新子鈎散 治小腸虛寒撮痛婦人血刺心痛

石菖蒲 蒲黃

右同研爲散每服二錢先用以水一小盞煎

至七分熱呷之

治小腸虛熱...水...

秘而...熱結於小腸下病狀...

小腸...宜服此方...小腸...

溺下...不...

吳茱萸 芎藭 木通 半夏

右件細銼爲末每服三錢以水一盞生薑三片同煎取八分去滓

食前...

...

即...方行...

治小腸冷熱不調取結子方

吳茱萸 不通草 芍藥 官桂 大黃

細辛 茯苓 檳榔 生薑 乾薑

半夏

右件細銼爲末每服四錢...

...空心...大腸...

帶熱...使大腸...不...

右小腸病數不化...小便時...

疾必先大腸...熱不通水...小腸中行大腸...即不通也大腸

甚即...常思...如此即...

貪...好色...中有...

腸中...此熱毒之...小腸...小便時...

平生...熱毒之...小腸...

斷疾此與淋病不同但小便赤澀且疼亦有...若是虛而

疼痛者宜之又不同也由小便頻數不止及欲然小便時疼痛不可勝

忍宜服此方

葵子...

右件細銼爲末每服二錢水一盞同煎取八分和滓空心服之

葵子散 治...使...

治肝肺熱毒...

入腸...水道...只行於小腸...小便常數而

疼痛不可...

於穀道中令上下相...引水道下入大腸...自然小便不數疼痛自止

也若此病大腸...小腸...

下令...大腸...小腸...

以此方治之...

天行...

治小便頻數肝肺有熱以此疼痛宜服此化肝肺熱毒方

...自六字

杏仁 牡丹皮 黃芩 虎杖 麻黃

木香 芍藥 柴胡 升麻 紫菀

吳茱萸 荊芥穗 連翹 ...

右件細銼爲末每服二錢...生薑二小片同煎取八分食後...

...

...

...大腸...

安大腸...

二錢...穀道中...

利小腸...

滑小腸...

治小腸...

用...

普濟方卷之十七

...刊字正 ...

普濟方卷之十八目錄

○膀胱門 論 二道 方 一十一方

總論 類 叙法 附

膀胱實熱 膀胱虛冷

胞轉

○膀胱實熱 論 一道 方 二十二方

赤茯苓散 葵子湯 榆皮散 大[illegible]散 梔子散

猪苓散 地膚子湯 黃防己散 瞿麥飲 通[illegible]飲

升麻飲 石膏湯 車前子散 滑石湯 紙[illegible]丸

靈砂散 兼金丸 坎離丸 芒硝散

治膀胱實熱腹脹小便澀五目

治膀胱積熱小便赤澀不快

治膀胱虛熱下焦石淋痛

○膀胱虛冷 論 方 三十八方

龍骨丸 石斛散 [illegible]丸 腎瀝湯 杜仲散

鹿茸丸 黃耆丸 蓮子丸 治膀胱冷咳唾則有血

韭子散 桑螵蛸散 乾地黃散 磁石散 沉香散

[illegible]散 [illegible]散 肉蓯蓉丸 牡蠣丸 石斛湯

蛇床子丸 五味子丸 兔絲子散 華澄茄散 補脬湯

鹿茸丸 補骨脂散 鍾乳丸 沉香丸

治膀胱[illegible] 治膀胱與腎臟皆冷腰膝沉重

逐氣散 治膀胱氣小腹痛

○胞轉 論 方 二十四方

石韋湯 滑石湯 滑石散 琥珀湯

通草湯 琥珀湯 治胞轉不得小便 又方

[illegible]湯 [illegible]石湯 葱白湯 洗方 蒲黃散

治胞轉欲死 治胞轉不得小便方 亂髮灰散 治胞轉不得小便

參苓湯 中州草[illegible] 治飽食後忍小便胞轉

治胞轉小便不得 又方 七方 治胞轉小便不能通

治忍小便胞轉 治小便忍數胞轉 治小便久致胞轉

治卒小便不通及胞轉方 治胞轉不得小便方 胞衰滑去

普濟方卷之十八目錄 畢

普濟方卷之十八

膀胱門

總論

夫膀胱者主腎也耳中是其候也腎合氣於膀胱膀胱者津液之腑也號水曹掾名玉海重九兩二銖左回疊積上下縱廣九寸受津液九升九合兩邊等應二十四氣白日宜在外膀胱爲泄○黃帝曰夫五臟各一名各一形腎乃獨兩何也岐伯曰膀胱爲腑有二處腎亦二形應腑有二處腑名一腑名一故五臟六腑也一說腎有左右而膀胱無二今用當以左腎合膀胱右腎合三焦○左手關後尺中陽絕者無膀胱脈也病苦逆冷婦人月使不調王月則閉男子失精尿有餘瀝刺足少陰經治陰在足內踝下動脈是也○右手關後尺中陽絕者無子戶脈也病苦足逆寒絕產帶下無子陰中寒刺足少陰經治陰○左手關後尺中陽實者膀胱實也病苦逆冷脇下邪氣相引痛刺足太陽經治陽在足小趾外側本節後陷中○

右手關後尺中陽實者膀胱實也病苦少腹滿引腰痛刺足太陽經治陽○病先發於膀胱者背脊筋痛小便閉五日之腎小腹腰脊痛胻痠一日之小腸一日之脾閉塞不通身痛體重二日不已死冬雞鳴夏日晡○

○膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之則欲小便而不得肩上熱若脈陷及足小趾外側及脛踝後皆熱若脈陷取委中膀胱脹者小腹滿而氣癃○若胃前受病移於膀胱咳而不已則遺溺○厥氣客於膀胱則夢遊行○腎受邪傳膀胱者三焦膀胱俱受邪[illegible]膀胱病急反而無毫毛者三焦膀胱急毫毛美而粗者三焦膀胱直[illegible]者三焦膀胱結也○扁鵲云六腑有病候面部胃膀胱與足少陰太陽爲表裏膀胱總通於五臟所以五臟有疾即應膀胱膀胱有疾即應胞囊傷熱則小便不通膀胱急寒若傷寒則小便數有白或發白水根在膀胱四肢小其腹獨大也實則不合[illegible]黃[illegible]下日死

○膀胱實熱

論

夫左手尺中神門以後脈陽實者足太陽經也病苦逆滿腰中痛不可俛仰面目黃口舌燥咽腫痛小便不通四肢不滿小腹偏腫胞轉不得小便咽腫痛脊背緣脈熱如日晡肩背痛也皆膀胱不利爲癃名曰此

赤茯苓散 出聖惠方 治膀胱實熱腹脹小便不通口舌乾燥咽腫不利

赤茯苓 豬苓各一兩 射干一兩 子芩一兩 桑螵蛸微炒

漢防己 羚羊角屑 川升麻 川大黃剉碎微炒 大青

木通剉各一兩

右爲散每服二錢水一盞煎至六分去滓不計時候溫服

葵子湯 出聖濟總錄 治膀胱實熱腹脹小便不通口舌乾燥咽腫不利

赤茯苓去皮 木豬苓去皮 葵子 枳實麩炒 瞿麥

木通剉 黃芩 車前子各一兩 滑石 甘草炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞生薑五片煎至八分去滓溫服不拘時候

榆皮散 出聖惠方 治膀胱實熱小便赤澀

榆白皮剉 車前子 葵根 木通剉 瞿麥

白茅根剉 黃芩[illegible] 桑螵蛸微炒 赤茯苓各一兩

右爲散每服三錢水一盞生薑半分同煎至六分去滓食前溫服

大黃散 出聖惠方 治膀胱實熱腹脹小便不利

川大黃剉碎微炒 冬葵子 瞿麥各一兩 黃芩 赤茯苓

紫蘇莖葉 檳榔 木通剉 白茅根剉[illegible]

右爲散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓食前溫服

梔子散 出聖惠方 治膀胱實熱心腹煩悶小便不利

梔子人一兩 石膏二兩 白茅根剉 赤茯苓一兩 羚羊角屑一兩

木通剉 黃芩一兩 甘草炙微赤剉半兩

右爲散每服五錢水一大盞入竹葉二七片生地黃半兩煎至五分去滓食前溫服忌炙煿熱麪

豬苓散 出聖惠方 治膀胱實熱小便[illegible]連小腹

木豬苓去黑皮 防己剉 梔子人 滑石 車前子

榆白皮剉 大黃剉炒

右爲散每服二錢用水調下水一盞煎至七分溫服亦得

梔子人湯 出聖濟總錄 治膀胱實熱小便不通小腹不快腰脊痛舌乾

咽腫

梔子仁 各一兩 石膏 四兩 赤茯苓 去皮 知母 各一兩
生地黃 麥門冬 芒硝 一兩
右㕮咀如麻豆大每服四錢水二盞煎至一盞去滓溫服
葵煎服
漢防己散 方入 治膀胱實熱小便不通
漢防己 一兩 海蛤 一兩 滑石 一兩 葵子 一兩 豬苓 去皮
瞿麥 一兩
右為散每服食前煎葱白湯調下二錢
瞿麥飲 治膀胱實熱小便不通淋瀝
瞿麥穗 黃芩 甘草 木通 茅根
車前子 各一兩
右為散每服四錢水一盞半煎至一盞去滓溫服
犀角飲 治膀胱實熱小便澀痛日夜不通
犀角 羚羊角 大黃 甘草 赤茯苓 去皮

卷之八 二十一

防己 一兩
右為散每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服
升麻飲子 治膀胱熱小便不通舌乾咽腫
升麻 大黃 射干 玄參
薔薇根白皮 各一兩
右㕮咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞去滓入蜜一匙攪
勻去滓服
石膏湯 治膀胱實熱小便澀
石膏 生梔子 赤茯苓 甘草 木通 一兩
右為散每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服
車前子散 治膀胱熱小便赤澀
車前子 鬱金 少 井泉石 滑石 葶藶
右為散每服二錢以蜜熟水調下未利再服 一方治小便不通用新
汲水食前調下
滑石湯 治膀胱急熱小便黃赤

滑石 一兩 子芩 一兩 車前子 葵子 榆白皮 四兩
右㕮咀以水煎取二升分三服
治膀胱熱多因大病後熱毒不解小便澀而欲水擁
之臍腹痛者
蒲黃子 郁李仁 菌芋 白牽牛
右各等分為末煉蜜丸如梧桐子大每服五丸以蜜和散下
時服白史利下惡穢之物一方用香蠶散
葵花散
蓮子 生
右件先器收將倒石銀石器內澆入同炒至煮難黑去苦不用
揀取黃連為末每服二錢空心清湖調下
威金丸 治熱入膀胱上下臍腹痛疼便澀欲如水棟之
痛者
大黃 硝石 甘草 桃仁
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五七十丸空心米飲送下

本草方卷之八 十四

坎離丸 治腎水益元氣補下元不足去膀胱積熱
知母 一兩 黃柏 黃連
右為末水丸如梧桐子大食前服鹽水送下五十丸
芒硝散 治膀胱熱結不通
芒硝 赤茯苓
右為末研和勻每服二錢空心熱水調下以通為度
治膀胱實熱腹脹小便不通
取浮萍草晒乾細研為散每服食前以白湯調二錢 一方治
不得小便以水調服二錢
治膀胱積熱小便不通
麥門冬 山梔 子芩 茯苓 升麻
麻黃 通草
右細剉為末每服一錢水一盞煎取八分食後溫服
治膀胱虛熱下砂石淋痛利水道

以故傷寒後及咳嗽皆屬陽虛也

膀胱虛冷（附論）

左手尺中神門以後脈陽虛者足太陽經也病苦腳中筋急腹中痛引腰背不可屈伸轉筋惡風偏枯腰痛外踝後痛肌肉振動耳聾忽忽不聞惡風颼颼作聲小便利多頻背冷痛小便不禁尿多白色面黑腰冷兩脇脹痛名曰膀胱虛冷也此經口膀胱不約為遺溺

方

龍骨丸 治膀胱虛冷虛損日夜愦愦氣不足骨痿

龍骨　桶十个　乾地黃　甘草　防風

烏餘粮　白石英　桂心　黃耆　茯苓

五味子　羌活　人參　附子　山茱萸

玄參　芎藭　磁石　杜仲　乾薑

右為末煉蜜和丸如梧桐子大空腹酒服二十丸日二加至四十丸

石斛散 治膀胱虛冷兩脇脹滿腳脛多疼腰背痛小便多數

石斛　附子　五味子　澤瀉　當歸

牛膝　白茯苓　沉香　人參　桂心

磁石　黃耆　肉蓯蓉

蓬莪子

右為散每服三錢水一盞生薑半分煎至五分去滓食前溫服

草薢丸 治膀胱虛冷小腹脹滿腰腳冷疼面色多黑並宜服

草薢　安息香　木香　肉桂

附子　當歸　補骨脂

沉香　檳榔　肉豆蔻　青橘子　蓬香子

吳茱萸　桃仁

右為細末用蒸餅和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食前以溫酒下二十丸

腎瀝湯 治膀胱及腎臟虛冷小便色白稠濁日夜數無度膀胱疼痛

肉蓯蓉　黃耆　五味子

附子　芎藭　乾薑　人參　黃耆

磁石　當歸　石斛

右為散每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至五分去滓食前溫服之

杜仲散 治膀胱虛冷氣攻注腰胯疼痛

杜仲　當歸　附子　石斛

檳榔　牛膝　桂心　丹參

木香　青橘皮　白茯苓　蓬香子

右為散每服二錢水一盞生薑半分煎至六分去滓食前溫服

鹿茸丸 治膀胱虛冷面色萎黑小便不禁腰膝疼痛不能飲食肌骨肉也

鹿茸　石斛　肉蓯蓉　附子

桑螵蛸　鐘乳粉　白龍骨

沉香　兔絲子　磁石

右為細末煉蜜入酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服以溫酒下三十丸漸加至四十丸空心及晚食前服

黃耆丸 治膀胱及腎臟久虛積冷上焦煩熱小便滑數如米泔

黃耆　熟乾地黃　玄參　栝樓根

白龍骨　菝葜　牡蠣　人參　桑螵蛸

五味子　沉香

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心以粥飲下三十丸

韭子丸 治膀胱腎冷小便白濁數日夜無度

赤石脂　韭子　川牛膝　覆盆子

附子　桑螵蛸　牡蠣　龍骨

雞肶胵　沉香　白茯苓

右為細末酒糊為丸梧桐子大每服七十丸空心鹽湯鹽酒任下

方無牡蠣

治膀胱冷欬唾則有血喉喘息
當歸 人參 玄參 黃耆 桂心
芍藥 甘草 茯苓 地骨皮 生薑各五
白朮
右㕮咀以水一斗二升先煮取三升去滓下藥煮取三
去滓分爲三服
韭子散 治膀胱虛冷小便白濁骨髓日夜出無節度
韭子 赤石脂 牛膝
牡蠣 黃耆 附子 狗脊 鹿茸
肉蓯蓉
右件藥搗細羅爲散每服食前以溫酒調下二錢
桑螵蛸散 治膀胱虛冷小便滑數色如米泔
桑螵蛸 赤石脂 補骨脂 萆薢
白龍骨 韭子 鹿茸 狗脊 肉蓯蓉
菟絲子

右件藥搗細羅爲散每服食前以溫酒調下二錢
乾地黃散 治膀胱虛冷小便數日夜無度精滑如米泔
熟乾地黃 赤石脂 雞膍胵 桑螵蛸 牡蠣
鹿角膠 黃連 白石脂 肉蓯蓉 赤石脂
右件藥同搗羅爲散用豬胞盛縫煮令熟細研
乾搗羅爲末每服二錢以溫酒送下
磁石散 治膀胱虛冷飲不消食腰疼
磁石 黃耆 杜仲 五味子
白石英 白茯苓 白朮 當歸 沉香各一
右件藥搗篩爲散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗五枚煎至
五分去滓食前溫服
沉香圓 治膀胱虛冷氣攻腰脅及腹脅疼痛
沉香 木香 桃人 蘹香子 蓽澄茄
附子 檳榔 白蒺藜

右件藥搗羅爲散每服食前以生薑湯調下二錢
菝葜散 治膀胱虛冷小便滑數白濁
菝葜 土瓜根 白龍骨 牡蠣
附子 沉香 五味子 肉蓯蓉
右件藥爲散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓食前溫服
雞膍胵散 治膀胱虛冷小便滑數漏精白濁如泔
雞膍胵 熟乾地黃 牡蠣 白龍骨 鹿茸
茴香 赤石脂 桑螵蛸
肉蓯蓉
右件藥搗細羅爲散每服食前以溫酒調下二錢
肉蓯蓉丸 治膀胱虛冷小便滑數白濁夢中失精
肉蓯蓉 鹿茸 白龍骨
澤瀉 菟絲子 桑螵蛸 山茱萸
椒紅 菟絲子

右件藥搗羅爲末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食前以
鹽湯下二十丸
牡蠣丸 治膀胱虛冷小便滑數白濁
牡蠣 附子 狗脊 白龍骨
澤瀉 韭子 鹿茸 椒紅
肉蓯蓉
右件藥搗羅爲末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服食前以
溫酒下二十丸
石斛湯 治膀胱虛冷小便頻數腰背及腿痛
石斛 附子 五味子 澤瀉
肉蓯蓉 白茯苓 人參 檳榔 黃耆
右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服食前
蘹香子丸 治膀胱虛冷氣攻腰胯脹痛
蘹香子 木香 桃人 附子
桂心 安息香 胡蘆巴 青橘皮

右為細末，以酒煮麵糊和丸，如梧桐子大，每服不計時候，[illegible]鹽酒
下二十丸。

五味子丸 治膀胱虛冷，小便頻數。

五味子 礬石 杜仲 附子
木香 鹿骨 蒺藜子 青鹽
右為末，酒煮麵糊丸，如梧桐子大，每服三十丸，空心温酒下。

菟絲子散 治膀胱及腎臟虛冷，小便白濁滑數不止。

菟絲子 [illegible] 肉蓯蓉 [illegible] 五味子
桑螵蛸 [illegible]
雞肶胵 [illegible]
右件藥搗細羅為散，每服二錢，食前以温酒調下二錢。

萆薢散 治膀胱虛冷，小便不禁，小腹冷痛。

萆薢 木香 沉香 桂
菟絲子 白茯苓
右為細末，每服二錢，空心温鹽湯調下。

奇效良方卷之三十八 九

補脬湯 治膀胱虛冷，脚膝[illegible]不可屈伸，[illegible]
小便數，遺白，[illegible]不思飲食。

黃耆 人參各一 杜仲 磁石
五味子 白朮 白石英
右為散，每服四錢，水一盞半，煎七分，去滓，空心服。

腎瀝丸 治膀胱[illegible]小便[illegible]
[illegible] 肉蓯蓉 石斛 覆盆子
鹿茸
右研為末，煉蜜丸如梧桐子大，每服三十丸，空心温酒下。

固脬散 治膀胱[illegible]小便不禁。
[illegible] 茴香 [illegible]
右為末，每服二錢，[illegible]酒調下。

雞乳丸 治[illegible]
雞内金 沉香 桑螵蛸 白茯苓 龍骨

右為末，煉蜜丸如梧桐子大，每服三十丸，空心温酒下。

沉香丸 治膀胱[illegible]

沉香 木香 川楝子 蓯蓉
菟絲子 桃仁 [illegible]
右七味為細末，酒煮麵糊丸，如梧桐子大，每服十丸至十五丸，空心温酒或鹽湯下。

治膀胱氣，小便[illegible]頻數。
[illegible] 桂心
[illegible] 茴香 [illegible]
[illegible] 三枚 [illegible]
右[illegible]為末，每服二錢，[illegible]水一盞，煎八分，空心服。

[illegible] 治膀胱[illegible]小便如[illegible]
[illegible] 茴香 茯苓 官桂
[illegible] 益智子 [illegible] 牡蠣 石斛
[illegible] 木香各一 吳茱萸

右細末，酒煮麵糊丸，如梧桐子大，每服[illegible]鹽湯下四十丸。

奇效良方卷之三十八 十

逐寒散 治膀胱[illegible]不止
蛇床子 蒼朮 山藥 防風
右件以[illegible]每服[illegible]水五[illegible]
[illegible]小腹[illegible]

石韋散 主之
[illegible]石 大黃 [illegible]
大黃 [illegible] 石各用二分

胞痺(附論)

夫胞痺者，[illegible]小便不通，[illegible]
是也。[illegible]
運[illegible]氣，[illegible]

其狀[illegible]內外相壅塞故令不通也此病至四五日乃有致死者飽食訖應小
便而忍之或飽食訖而走馬或小便急因疾走或忍尿入房亦皆令胞轉
或胞落並致於死

方

石韋湯(出聖惠方) 治胞轉小便不通

石韋(去毛) 榆白皮(剉各一兩) [illegible] 滑石(二兩) 葵子

木通(剉) [illegible] 甘草(炙各半兩)

右件搗羅為散每服五錢水一盞半煎至一盞去滓[illegible]溫服[illegible]

滑石湯 治胞轉小便不通

滑石(一兩) 亂髮(燒灰) 鯉魚齒 雀糞(各一分) 琥珀(半兩)

芒硝(一分)

右件搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至七分去滓不計時溫服

滑石散 治胞轉[illegible]因忍小便或[illegible]令水氣迫於胞屈辟不得充張

胞外水應入不得入內溲應出不得出小腹急痛不得小便小腹脹不

[illegible]人

(出聖惠方)寒水石(三兩) 白滑石(二兩) 葵子(一合) 亂髮灰 車前子

木通(剉各一兩)

右剉散水一斗煮取五升時時服一升即利

琥珀湯 治胞轉小便不利煩悶

琥珀 大黃(剉炒) 滑石(各一兩) 車前子 [illegible]

右麤搗篩每服三錢水一盞入蔥白半分拍碎煎至七分去滓溫服

不拘時

葵草湯 治胞轉不得小便

葵[illegible] 車前子 滑石 [illegible] 通草 [illegible]

右切以水七升煮取三升分服五合日三先食服[illegible]

琥珀湯 治胞轉[illegible]

琥珀[illegible] [illegible] 車前[illegible]

右先用水五升煮取[illegible]又下琥珀末[illegible]分作三服[illegible]時候溫服

治胞轉不得小便

川大黃(一兩) 琥珀(半兩) 車前葉(一兩)

右為散每服四錢以水一中盞入蔥白[illegible]煎至六分去滓不計時候溫服

又方

亂髮(燒灰) 滑石(一兩) [illegible]

右細研令勻用葵白皮一斤剉以水煮取汁二升不計時候以汁一

小盞調下二錢

芍藥湯 治胞轉小便不利

赤芍藥 車前葉 木通(剉各一兩)

右細剉每服五錢以水一盞半煎至一盞去滓食前溫服

[illegible]

滑石[illegible] [illegible]

右[illegible]每服五錢水[illegible]溫服

蔥白湯 治小便卒暴不通小腹脹急氣上衝心悶絕欲死此由

[illegible]

(出聖惠方)陳皮(三兩) 葵子(一兩) 蔥白(三莖)

右剉散水五升煮取二升分三服

又方 治胞轉小便不能通先用

良薑 蔥頭 紫蘇[illegible]

右煎湯盆內洗小腹外陰肛門留湯再添[illegible]

下拭乾[illegible]

[illegible]葵子 赤茯苓 [illegible] 白芍藥

右剉散每服三錢[illegible]

蒲黃散 治胞轉不得小便經三四日困篤欲死

蒲黃 滑石[illegible]

右[illegible]每服[illegible]酒調[illegible]方用酒

治胞轉[illegible]

取[illegible]如[illegible]大[illegible]孔[illegible]

治胞轉不得小便方

吹介真頭白［illegible］蔥白［illegible］
右以水四升煮取三升去滓［illegible］溫服一升日三
服大利
亂髮散 治小便不時起胞轉小便不得四五日用蔥熨欲死無
救服此療
滑石二兩 亂髮（燒灰）
右二味搗篩取［illegible］方寸匕以水合［illegible］汁［illegible］服
方寸匕日三服即愈其位猶若取亂髮三兩燒灰滑石三兩搗篩
散服方寸匕日三 一方有鯉魚齒一兩無桃白皮
治胞轉不得小便
雞子一枚［illegible］
右以溫水調服之不過三服
秦艽湯 治胞轉不得小便
秦艽（去土一兩）
右搗篩每服五錢水一盞半煎一盞去滓食前服［illegible］

車前草飲 治胞轉不得小便急牢
車前草（一把）
右以水三盞煎至二盞去滓分三服連併服不拘時 一方用子一斤
水一斗煮取四升分四服
治胞轉後或忍小便或走馬或忍小便入房皆致胞轉臍下急
痛不通 治之
用亂髮急纏如棗大燒為末服四合和二方寸匕服之亦即
以熟艾裹葉臍生上
治胞轉小便不通
用阿膠三兩以水二升煮取七合頓服
又方 用豉五合以水三升煮數沸頓服之
又方 用連枷關草灰水服之
又方 取羊角燒灰水服之
又方 燒死蛇蛻二枚末水服之
又方 以白鹽子莖孔中
又方 用酒和豬脂雞子大頓服之
又方 用梔子煮取汁頓服之
治胞轉小便不能通 用炒鹽半斤熨臍下小腹
治忍小便胞轉 用自取爪甲燒灰水服之
治小便久致胞轉 取梁上塵三指撮以水服之
治小便久致胞轉 以蒲黃裹腰腎令頭致地三度通 一方取蒲黃服方寸匕日
三良

治卒小便不通及胞轉方 ［illegible］為末未飯水服之方寸匕日三服之效
治胞轉不得小便方 用蒲席捲人倒立令頭至地三反則通
胞轉治法
凡尿不在胞中為胞屈辟津液不通以葱葉除尖頭內陰莖孔
中深三寸微用口吹之胞脹津液大通即愈

普濟方卷之十八

考論官典寶王祖昭
對方醫學李永澍治
寫書［illegible］陳彬
刊字金［illegible］等

普濟方卷之十九目録

三焦腑門（論）一道（方）□十三方（類）一類

總論

類

三焦熱用藥大例　三焦實熱　三焦脹　三焦約

三焦寒用藥大例　三焦虛寒　三焦欬

○三焦熱用藥大例（方）三十三方

上焦　清神散　連翹防風湯　涼膈散　龍腦飲子

犀角地黃湯

中焦　小承氣湯　調胃承氣湯　洗心散　四順清涼飲

桃仁承氣湯

下焦　五苓散　大承氣湯　立効散　八正散

石膏散　四物湯　抵當湯丸

氣分熱　柴胡飲子　白虎湯

血分熱　清涼飲子　桃仁承氣湯

通治大熱　三黃丸　黃連解毒湯

○三焦寒用藥大例（方）下五方

上焦

中焦　桂附丸　鐵刷湯　胡椒理中湯

二氣丹　附子理中丸　大建中湯

下焦　還少丹　八味丸　天真丹

氣分寒　桂枝加附子湯　桂枝加芍藥人參新加湯

血分寒　巴戟丸　神珠丹

通治大寒　大巳寒丸　四逆湯

○三焦實熱（論）一道（方）六十六方

潤焦湯　犀角丸　三黃丸　勝冰丹　三黃湯

滑石散　牛黃散　大三黃丸　治上焦壅熱口乾頭頂煩熱

治上焦虛熱咽乾口苦不欲飲食　菊花散　澤瀉湯

大黃湯　地黃散　天門冬丸　烏犀散　麥門冬湯

前胡枳殼湯　清氣丸　玉露丸　大青湯　仙乳丸

接神散　松蘿丸　水蘇丸　桔梗根丸

射干湯　大黃瀉熱湯　阿膠丸　黑尾草散

冬門散　松殼散　藍青丸　地骨皮湯　苧根散

前胡散　五苓子散　槐花散　龍腦丸　香豉湯

治下焦有熱不通不續止吐不禁名曰走哺　止嘔人參湯

柴胡通塞湯　茵陳蒿丸

石長生丸　吳茱萸丸　升麻湯　玉露十丸　香豉湯

紫胡湯　赤石脂湯　梔子仁湯　人參湯

火府丹　人參散　三焦散　人參前胡散　厚朴散

犀角散　麥門冬湯　犀角消清丸　桔梗湯

加味神功丸　神功丸　大三脘散

利膈丸

○上焦虛寒 論一道 方六十六方

[illegible]丸 [illegible]神散 沉香石斛丸 當歸湯
前胡湯 安中散 沉香湯 梔子人丸 吳茱丸
補和湯 附子散 人參散 乾薑丸 半夏瀉心湯
折殺湯 白朮散 大腹皮散 厚朴湯 黃耆湯
通神湯 胡椒理中丸 黃連丸 生薑湯
七香丸 茯苓安心湯 紫蘇子丸 黃連湯
化痞丸 檳榔散 神妙丸 黃耆湯 木香散
扶沉湯 真聖丸 厚朴散 人參湯 紫蘇湯
温白丸 清食丸 檳榔湯 半夏丁香丸 草撥丸
治[illegible]手丸 椒紅丸 沉香草撥丸 補骨脂丸
人參續命湯 韭子丸 附子散 茯苓丸
訶梨勒丸 內固丸 大龍肝湯 芍巴湯 黃耆湯
續斷散 石鐘乳丸 厚朴丸 燒石子茴香散

胡椒青礬丸 治下焦虛冷小便數
治下焦虛冷脚弱無力 平腸胃令人能食下三焦停惡氣
主補中焦諸不足柔和脾 治下焦弱理胃氣令人能食
治下焦冷氣

○三焦脹 論一道 方一十六方

檳榔丸 木香安胃散 三和湯 檳榔湯
五香丸 寸金丸 檳榔湯 撥氣丸 京三稜散
小丁香丸 均氣丸 匀氣散 生薑丸 丁沉丸
白朮藿香湯 陳皮湯 澤瀉湯 茯苓散
甘遂散 甘遂散 茯苓湯 小半夏加茯苓湯
牽牛子丸 檳榔散 人參香朮散 木香丸

○三焦欬 論一道 方一十七

藿香湯 黄香湯 半夏湯 貝母湯 胡椒理中丸
人參湯 半夏湯 葶藶子散 五味子丸 玉液散

○三焦約 論一道 方七

順氣丸 郁李仁丸 枳殼丸 枳殼散 疎風散
皇[illegible]散 淮南五柔丸

普濟方卷之十九目錄畢

百十五

普濟方卷之十九

三焦腑門

總論

夫三焦有名無形主持諸氣以象三才之用故呼吸升降水穀往來皆
待此以通達是以上焦在心下下鬲在胃上口主內而不出中焦在胃中脘主腐熟水穀
下焦在臍下當膀胱上口主分別清濁出而不內以傳道也三者之用又本於中焦
中焦者胃脘也天五之沖氣陰陽清濁自此而分十二經絡所自以始
不得其平則有寒熱偏勝虛實不同[illegible]而生諸病矣
故曰氣會三焦手少陽[illegible]中[illegible]之海[illegible]
知三焦者冲和之本○古人謂左腎爲腎臟其[illegible]有一白脈自[illegible]
[illegible]三焦[illegible]有[illegible]如[illegible]王[illegible]女[illegible]以[illegible]推之三焦當如上[illegible]
而上[illegible]於腦[illegible]經云[illegible]三焦有位無形其意以爲上中下三焦如[illegible]
其形[illegible]是[illegible]乃云[illegible]

[illegible]下焦如瀆不可[illegible]見故曰有位無形而王叔和[illegible]失其旨[illegible]
[illegible]有名[illegible]後[illegible]不已且名[illegible]無[illegible]形[illegible]何以
[illegible]膀胱[illegible]其所謂三焦者何也上焦在[illegible]內[illegible]心中焦在中脘
[illegible]下焦在臍下[illegible]背[illegible]人身有上中下之異方人[illegible]
[illegible]不[illegible]氣[illegible]三焦[illegible]百脉及其[illegible]一起[illegible]
三[illegible]命門[illegible]而去[illegible]三焦[illegible]○夫三焦者一
名三[illegible]也上焦名三[illegible]中焦名[illegible]下焦名[illegible]有名
[illegible]五[illegible]六腑[illegible]不可見和[illegible]
[illegible]上焦[illegible]中[illegible]之
[illegible]上焦如[illegible]
[illegible]
[illegible]手陽明上至舌下[illegible]足陽明[illegible]
[illegible]二十五度[illegible]日夜五十周身[illegible]太陰手少陽[illegible]
也主心肺之病內而不出人有熱則飲食下胃[illegible]未定汗則出

[illegible]而或出[illegible]
[illegible]不得從其[illegible]
[illegible]所以飲食先吐而後下也[illegible]
[illegible]○中焦如[illegible]
[illegible]於胃中[illegible]在上焦之後此所受氣者泌糟粕蒸津液化其精微上注
於肺脈乃化而爲血以奉生身莫貴於此故獨得行於經隧名曰營氣
主足陽明[illegible]在外[illegible]上[illegible]入寸[illegible]太陰絡諸經之
脈上下[illegible]太[illegible]不吐不下[illegible]閉塞不通上下隔
[illegible]出[illegible]與其氣異其形而同類
[illegible]精神之所[illegible]則稱其實
[illegible]有一[illegible]○下焦如瀆[illegible]
[illegible]別迴腸注於膀胱而滲入焉故水穀者常并居於胃中成糟粕而俱
下於大腸主足陽明[illegible]膀胱生出不主入別於[illegible]

之病也若實則大小便不通[illegible]吐[illegible]故曰[illegible]
大小便不止[illegible]入[illegible]小便[illegible]下者何也
蓋[illegible]殺之液也其氣[illegible]以[illegible]故後穀入而先穀出也所以[illegible]
於[illegible]○三焦病者腹脹氣滿小腹尤堅不得小便[illegible]
則[illegible]在足太陽之外大絡在太陽少陽之間亦見于[illegible]
取[illegible]小腹病腫痛不得小便邪在三焦約取太陽大絡視其結脈
[illegible]陰小絡[illegible]而血者[illegible]在皮[illegible]而不堅[illegible]
[illegible]

[illegible]

〇三焦熱用藥大例

上焦

清神散 連翹防風湯

龍腦飲子 犀角地黃湯 涼膈散

中焦

小承氣湯 調胃承氣湯 洗心散

四順清涼飲 桃仁承氣湯

下焦

五苓散 大承氣湯 立効散

八正散 石膏散 四物湯

抵當湯丸

氣分熱

柴胡飲子 白虎湯

血分熱

清涼飲子 桃仁承氣湯

通治大熱

三黃丸 黃連解毒湯

上焦

桂附丸 鐵刷湯 胡椒理中湯

中焦

二氣丹 附子理中丸 大建中湯

下焦

還少丹 八味丸 天真丹

氣分寒

桂枝加附子湯 桂枝加人參芍藥新加湯

血分寒

巴戟丸 神珠丸

通治大寒

大已寒丸 四逆湯

右此內有實熱之大略者 ⋯ 有熱寒者當求別法

論三焦寒熱

上焦在心下 其氣起於胃上口 並咽 [illegible] 則候古乾 [illegible] 而不 [illegible] 胃中脘 ⋯ 不上不下 ⋯ 下焦者 在臍下 當膀胱上口 主分別清濁 出而不內 以傳導也 [illegible]

有餘而便難胃脹消穢之證

潤腸湯 治三焦[illegible]目[illegible]不下[illegible]氣未定[illegible]

泄瀉遺溺

地骨皮　半夏　柴胡　茯苓

麥門冬　甘草　人參

右剉散每服四錢水二盞[illegible]

犀角丸 治三焦邪熱一切風熱[illegible]

腸胃燥澀大小便難

犀角　黃連　人參　大黃

右爲末蜜丸如梧桐子大每服十五丸臨臥溫水送下量虛實加減

三黃丸 治丈夫婦人三焦積熱上焦有熱攻衝眼目赤腫頭項腫痛口舌生瘡中焦有熱心膈煩躁不美飲食下焦有熱小便赤澁大便秘結五臟俱熱即生癰癤瘡痍及治五般痔疾糞門腫痛或下鮮血

[illegible]丹 治三焦壅滯上衝頭目赤腫疼痛口舌生瘡咽喉不利[illegible]物有[illegible]昏悶[illegible]之

白芍藥　山豆根　朴硝　黃藥子　甘草

黃連　薄荷　龍腦

右爲末用[illegible]每一丸含化[illegible]

三黃湯 治三焦[illegible]大小便秘

黃連　黃芩　大黃

右剉細每服三錢[illegible]

清氣散 治[illegible]

柴胡　前胡　川芎　枳殼　白朮

青皮　羌活　獨活　甘草　茯苓

人參

右爲末每服二錢水一盞[illegible]

桔梗加白朮青皮[illegible]

平胃散[illegible]治上焦熱[illegible]

大黃　白芷[illegible]

右爲細末每服二錢[illegible]

人二黃丸 治上焦壅熱[illegible]

治目赤腫疼[illegible]

大腹皮　連皮　小豆根　黃芩

蘇藥　朱砂　梔子　薄荷　甘草

百草霜

右爲末[illegible]

龍腦[illegible]　梔子人

右爲散每服四錢水一中盞[illegible]

治上焦[illegible]

赤茯苓　麥門冬　甘草　生地黃

右四味爲散[illegible]

甘菊花散 治上焦[illegible]

甘菊花　人參　防風　羌活　赤茯苓　麥門冬

蔓荊子　川升麻

右爲散每服四錢水一中盞[illegible]

[illegible]湯 治上焦[illegible]

石膏　生地黃　茯苓　甘草　竹葉

人參　桂心　麥門冬

右切水一斗煮取三升[illegible]

人參湯 治上焦咳嗽氣動…
上疾
人參 杏仁 人參三両 款冬花二両
麦門冬 乾百部 石膏
五味子 麻黄 半夏
右切以水一斗…三升五合去滓下杏仁二合生薑汁二
合攪令混三合更上火煎取二升分三服一方無
射干散 治上焦虚熱膈上有…
射干 百合 紫菀 杏仁
半夏 前胡 玄参 麦門冬
右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓食後
溫服
天門冬丸 治上焦…熱…
天門冬 地骨皮 人参 甘草
黄耆 枸杞子 菊花 防風 黄芩
五味子

赤茯苓 生乾地黄
右為末煉蜜和丸如雞子黄大每服一丸以水一盞煎七分和
滓食後臥時溫服
烏梅散 治上焦虚熱…不欲見人
烏梅肉 龍齒 川升麻 茯神
麦門冬 玄参 甘竹根 黄芩
生乾地黄 犀角
右為散每服四錢水一中盞入竹葉三七片煎至五分去滓不計時候
溫服
麦門冬湯 治上焦熱結胸満不欲食食則先吐後下…
或食入胃未定汗出身背皆熱名曰漏氣
麦門冬 白朮 赤茯苓 芦根
甘草 橘皮 人參
陳粟米
右為散每服五錢以水一盞半生薑三片棗如大…煎

八分去滓不計時候溫服一方無薑
心下…冬…理中湯
前胡枳實湯 治上焦熱結…煩悶…
悉心不欲飲食
前胡 人參 赤茯苓 枳殼
半夏 桔梗 甘草 蘆根白皮
旋覆花 麦門冬
右為散每服三錢以水一盞生薑二片…
煇丸 治上焦熱…
井泉石 丹砂
大黄 黄連 人參 朴硝 龍腦 黄蘗
右搗羅五味為末與四味研者和勻煉蜜丸如菉豆大每服十丸
以…湯下以知為度
大青湯 治上焦…結煩痛
大青 百部 紫菀 蘆根 黄芩

生乾地黄 白前 五味子 甘草
右麁搗篩每服三錢以水一盞煎至六分去滓食後溫服以知為度
仙丸 治…結上焦…
伏翼 丹砂 雄黄 麝香
右搗研為末煉蜜和丸如菉豆大每服七丸食後通草湯
下漸增至十五丸小兒每服三丸以知為度
安神散 治内熱上衝目暗如…
菊花 射干 白朮
朴硝 石膏 白石英
右搗研為散每服二錢匕食後溫水調下漸增至三錢匕以知
為度
消氣丸 治上焦熱結肺氣…
咽…飲食無味…
芒硝 防己 人參

明

射干　桑白皮　茅草　知母
馬兜鈴三十枚　檳榔七枚
右為末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服二十丸，食後煎湯下，日二
松脂丸　治下焦熱結，咳嗽喉頸作腫，飲食不下，或成癆氣
松脂　山梔根　防風　海藻　連翹
木通　檳榔　青皮　芫花
右為末，煉蜜丸如梧桐子大，每服二十丸，食後鹽湯下，日三
水蛭丸　治熱結上焦，氣風秘，下焦疼痛
水蛭　葶藶　皂莢　芫花
右為末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服二十丸，食後溫酒下
括樓根丸　治中焦熱結，腸胃不通，飲食無度
括樓根　瓜根　苦參　黃連
朴硝　白石英　龍膽
白英　水萍　款冬
右為末，煉蜜丸如梧桐子大，每服十五丸，早晚食前溫米湯飲下

普濟方卷之十九　九

稍增三十丸，止以知為度
射干湯　治中焦熱結，咽喉腫，口生瘡，咽喉壅塞，舌本強，數項腫
射干　升麻　枳殼　大黃　羚羊角
桔梗　木通　玄參　甘草　龍膽
馬牙硝
右麤擣篩，每服三錢匕，水一盞，入竹葉二七片，同煎七分，去滓，放溫食後服
大黃瀉熱湯　治關格隔痛，陽氣上治中焦熱閉，壅上下不通，
絕關格不吐不下，腹滿膨脹急
蜀大黃　黃芩　澤瀉　升麻
芒硝　羚羊角　梔子　生地黃汁　玄參
貝
右以水七升，煮取二升二合，下大黃，更煮兩沸，去滓，下
分作三服

十二

白英丸　治中焦熱結，腸胃氣壅，口舌生瘡
白英　白芷　甘草　芒硝　大黃
葛根　梔子　厚朴　枳殼
右為末，煉蜜丸如梧桐子大，每服二十丸，早晚食前用米湯下
以知為度
鼠尾草散　治中焦熱結，下赤白痢
鼠尾草　槐花　犀角　黃連　梔子仁
黃芩　白芍藥　地榆　甘草
右為散，每服二錢，早晚食前溫酒調下，稍增至三錢，以知為度
久際散　治中焦熱結，目瞼赤爛
樂葉　百合　沙草　蔓荊　朱砂　黃芩
右為散，於早晚食前用沙糖水調下一錢匕，稍增至二錢匕，以知為度
枳殼散　治中焦壅熱，關格不通，吐逆喘急
枳殼　黃芩　前胡　半夏

普濟方卷三十九　十

赤茯苓　木香　人參　檳榔
右為末，每服五錢，水一大盞，入生薑半分，煎至五分，去滓，不計時候溫服
藍青丸　治中焦熱結，水穀不利
藍青汁　黃連　苦參　白朮　地榆
地骨皮　阿膠　烏梅
右將後七味為末，用藍青汁和為丸如梧桐子大，每服十丸至十五丸，空腹飲下，日三
合丸如杏仁大，每服一丸，日三
地骨皮湯　治中焦熱結，四肢拘倦解
地骨皮　人參　柴胡　梔子　甘草
右為散，每服三錢，水一盞，入竹葉七片，同煎至六分，食後去滓溫服
茅根散　治中焦熱結，瘡癢，熱痛如□
茅根　松脂　槐花

右為散每二錢甲晚食前温需末敢下稍增至三錢以知為度

開苑散 治中焦熱渾下寄忘不樂

菊茹 甘草 硝石

右為散每服一錢用温酒調下於初更時又鳥鳴時後服稍増三錢以知為度

五倍子散 治中焦熱結唇口生瘡

五倍子 荒舌 方風

右並生研為散每服一錢煮湯調下食後服

槐花散 治腸熱生瘡嘔吐

槐花 白礬 甘草

右搗研為散每服二錢以白湯調下先吐是腸熱即生疏升吐此

半夏丸 治胃腸熱又特有殊効

龍膽 治解暴熱化涕淚 同桑 天門冬 半夏

右搗研為末麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸至令清湯下食後服麵糊如滑可也

凡上實熱又讓瀉者可服小丸良

香鼓湯 治下焦熱結嘔吐不止心腹滿悶

鼓 白术 甘草 石膏

赤茯苓

右為散每服四錢水一盞半煎至一盞去滓温服日二夜一

治下焦壅熱蒸足不足嘔止不禁名曰走哺

人參 梔子仁 麥門冬 石膏

右為散每服四錢水一盞煎至六分去滓不拘時候温服

柴胡通塞湯 治下焦熱大小便不通

柴胡 羚羊角 黃芩 橘皮 澤瀉各一兩

香豉 梔子 石膏 生地黃

右以水一斗 煎取三升分三服一方五合鼓

止嘔人參湯 治下焦熱後風涂逆嘔吐不禁名曰走哺

人參 梔子仁 萎蕤 黃芩 知母

茯苓 白术 陳橘皮

右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓温服日二夜一

治下焦虛根下焦又病大便熱伏痢淨痛

肉蓯蓉 菊茹 蕪荑 黃芩 赤茯苓 積殼

威靈仙 上太 蘇根 柴胡

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸食前溫水下以知為度

石長生丸 治下焦又熱大便難及多痔瘍

石長生 苦參 黃連 川大黃 石膏 木香 古香 小麻 硝石

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十丸早晚食前温茶送下加至二十丸以知為度

斂漿丸 治下焦腸胃伏熱婦人胎熱產難

威靈仙 寬實 烏蘭子 大鹽 橘白皮

柴胡 黃芩 桔梗 菊茹

右為末煉蜜丸如梧桐子大不計時候用木香湯下二十丸至三十丸以知為度

升麻湯 治下焦結熱脇下血如鴨肝

升麻 紫草 黃芩 桔梗 犀角

石膏 梔子仁

右為散每服三錢水一盞半煎至一盞去滓温服日三夜一服

五味子丸 治下焦熱渴

五味子 天門冬 白芍藥 車前子 檳榔 知母 大黃 硝石

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸食後木香湯下稍增至三十丸以知為度

香豉湯 治下焦熱毒氣 中熱 [illegible] 下痢 [illegible] 不可忍者

痢不止

香豉 薤白 黃連 黃檗 白朮

茜根 梔子 黃芩 地榆

右㕮咀，以水九升，煮取三升，分三服

柴胡湯 治下焦熱結，大小便不通

柴胡 黃芩 陳橘皮 梔子仁

石膏 羚羊角 生乾地黃 芒硝

右為散，每服一錢，水一盞，煎至七分，去滓，溫服，日二夜一

赤石脂湯 治下焦熱，痢下膿血，腹痛滑泄

赤石脂 烏梅 梔子仁 白朮 乾薑

升麻 廩米

右為散，每服三錢，水一盞半，煎至一盞，去滓，不拘時候溫服

梔子人參散 治下焦壅熱，氣逆不續，嘔吐不禁，名曰走哺

赤石脂 烏梅肉 梔子仁 人參 川升麻 各一兩

甘草

聖濟卷之一九　十三

右為散，每服五錢，水一盞，煎至五分，去滓，不拘時候溫服

香豉湯 治下焦結熱，或便赤血，腹痛不可忍

豉 梔子人 黃檗 地榆 白朮

茜根

右為散，每服三錢，水一盞半，煎至一盞，去滓，溫服，日二夜一

大腑丹 治上焦熱結，心肺壅滯，面赤心忪，口乾煩渴，引化熱毒

生乾地黃 黃芩 木通 各二兩

右為末，煉蜜和丸，如梧桐子大，每服十五丸至二十丸，食後溫米飲下

大腑熱結，小便不通，小兒化破，數服，溫加減。一方治心經蘊熱，小便赤少，五淋澀痛，生地黃、木通、黃芩等分，不用甘草，每服三錢，水一盞，煎至七分，服五十粒，溫水下，三日

人參散 治下焦壅熱，不思飲食，嘔吐不禁，名曰走哺，宜服此止嘔

三焦

人參 蘆根 梔子仁

知母 赤茯苓 麥門冬 葳蕤 黃芩

石膏 陳橘皮

右為末，每服五錢，水一盞，煎至五分，去滓，不拘時候溫服。一方有白朮，無麥門冬

三焦散 治三焦不和，脅肋不調，肢體煩倦，頭目昏疼，飲食無味，或時寒熱，痰壅頭旋

前胡 柴胡 桔梗 羌活 獨活

人參 枳殼 當歸 旋覆花

甘草 石膏

右為末，每服二錢，水一盞，煎至七分，溫服。治傷寒鼻塞，入

黃芪一兩，白朮，如上焦多壅熱，入地骨皮一兩半

人參荊芥散 治上焦壅滯，頭目昏眩，涕唾稠粘，心胸煩悶

人參 柴胡 羌活 荊芥 旋覆花

甘菊 桑白皮 各等分

聖濟卷之一九　十四

右為末，每服二錢，水一盞，煎至七分，食後臨臥溫服

利膈散 治上焦風熱，多患咽喉胸膈不利

荊芥 鼠粘子 白牽牛

甘草

右為末，每服一錢，入鹽點，兼治風牙疼，以三錢末入川椒一百粒，鹽煎熱含之，冷去吐出

白蒺藜散 治上焦壅熱，頭目昏疼，口乾，心胸煩悶

地骨皮 白蒺藜 旋覆花 白菊花

鼠粘 石膏

右並生為末，每服一錢，食後茶清調下，日可三服

麥門冬散 治上焦不利，痰多壅滯，積口舌乾燥，咽嗌腫疼，胸膈胃虛，氣血不調

麥門冬 桔梗 半夏 赤茯苓 菊花

甘草 黃芩 前胡 防風 桑白皮

款冬花 杏仁 五味子 白朮 貝母

升麻（半兩）

右件一十六味，除先令研外，杵羅為末，令度更研，每服末二錢，水七分，生薑一片，同煎至六分，去滓溫服。大益心肺。

犀角菖蒲丸 治心上焦熱，壅口舌生瘡，聲重，眼澀，肺風瘡毒，老幼皆可服。冬間常宜之。

木通 川芎 白朮 杏仁 桔梗
龍腦薄荷（四兩） 官桂（四兩） 砂仁 附子

右為末，煉蜜為丸，如彈子大，每服半丸，細嚼，茶酒任下，食後臨臥亦服。○都下潘防禦家貨此方，藥丸小，就年常服，有效。

桔梗湯 治中上焦不和，氣道阻塞，水飲不利，胸膈吉老痰。

前胡 赤茯苓 人參 枳殼 甘草
半夏 桔梗 陳橘皮

右為麤末，每服二錢，水一大盞，生薑五片，煎至六分，去滓，常熟服，日二三，不拘時。

加味神功丸 治一切氣，積心腹痞悶，臟腑風熱，大便不通，腰腿疼痛，肩背重疼，頭昏面熱，口苦咽乾，心胸煩躁，睡臥不安，及治腳氣，并素有風人，大便結燥。

木香（一兩） 人參（半兩） 大麻仁 枳殼
桃仁 訶子皮（一兩） 大黃

右為細末，入麻仁研令勻，煉蜜丸如梧桐子大，每服二十丸，溫水下，溫米飲亦可，食後臨臥服。如大便不通，可倍丸數，以利為度。

神功丸 治三焦氣壅，心腹痞悶，六腑風熱，大便不通，腰腿疼痛，大腸乾燥，裏急後重，或下鮮血，痔瘡腫痛，結風氣下注，腰疼腳重，臍下脹疼，溺赤如金。

大黃（四兩） 人參 麻子仁 訶子皮

右件研為細末，煉蜜丸如梧桐子大，每服二十丸，溫水下，日三服，以通為度。產後大便秘者，減下十丸。

三和散 治三焦不和，氣不升降，腸胃壅滯，心腹痞悶，兩脇氣脹，面赤，手足腫，大便秘澀，并治腳氣。

羌活 白朮 乾木瓜 沉香
木香 陳橘皮 川芎 檳榔 甘草
紫蘇 大腹皮

右十一味同為麤散，每服二錢，水一盞，同煎至六分，去滓溫服，不拘時。如小腸氣痛，服之便利為效。如未快，常服半丸，依法煎服。腳氣，心腹脹滿，氣不升降，宜服之。方利者，依法煎服。此藥極不虛人，能治腳氣，心腹滿，大便秘澀者，最良。

利膈丸 治三焦氣不順，胸膈壅塞，頭昏目眩，涕唾痰涎，精神不爽。

牽牛（四兩，半生半熟） 不以早晚，皂角（二兩，為末）

自然汁煮糊丸，如梧桐子大，每服二十丸，茶湯下。

三焦虛寒

論

夫上焦虛則引氣於肺中，寒則脣口乾燥，腹痛洞泄，實則霍亂下焦，虛則大小便不止。津液虛寒則補之，下焦狀，三焦者，水穀之道路，氣之所終始也。其一具，氣過則寒，故有俱虛之病。上焦如霧，氣起於胃上口，並咽以上貫膈，其病令人精神不守，引氣於肺，吐逆不下。中焦如漚，在胃中脘，不上不下，主腐熟水穀，其病令人飲食不化，腹痛，食泄，霍亂，不下飲食。下焦如瀆，在臍下，當膀胱上口，主分別清濁，出而不內，其氣虛寒則津液不固，大小便利不止，小腹痛，不欲聞人語，治宜溫之。

溫脾丸 治三焦俱虛，和胃進飲食，去寒冷，止吐瀉。

厚朴 乾薑 附子

右為末，熟蜜丸如梧桐子大，每服二十丸，米飲下，食前。

敦神散 治三焦虛，心胸痞悶，兩脅脹滿，不思飲食，四肢無力，或多痰涎，咽喉不利，或上氣促，頭目昏眩，心腹疼痛，又治中滿下虛。又服和補脾元，調過寒溫，順四時之胃氣，大能進飲食，滴流津液，上壯育食養氣。

枇杷葉 石斛 丁香半兩
薏苡仁 縮砂仁 藿香葉 杜仲
沉香 防風子 大腹皮 木香
半夏 橘皮
檳榔 白术一兩 桑白皮 陳橘皮
人參一兩 白扁豆 五味子
白茯苓 穀蘗 甘草
右為散每服三錢匕以水一盞入棗三枚擘破生薑三片同煎七
分去滓溫服不計時
沉香石斛丸治三焦虛損心胸刺疼安和五臟化痰利膈止嘔進食
沉香 石斛 人參 白茯苓
菟絲子 麥門冬 五味子二兩
肉蓯蓉 山茱萸一兩 熟乾地黃
陳橘皮 枸杞子 百合 黃耆
巴戟天 柏子人 牛膝

卷之十九 十七

右為末酒煮白麪糊和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸溫米飲
下溫酒亦得空心食前
當歸湯治三焦虛損或上下洩血或吐血從三焦起或熱在
或用酒煎亦得
當歸 乾薑 小薊 阿膠 羚羊角
乾地黃 柏葉 芍藥 白术
蒲黃 青竹茹 伏龍肝 髮灰 黃芩
甘草
右以咀每服以水一升二合煮取三合去滓下膠烊下髮灰及甫
黃分三服
胡蘆巴湯治三焦俱虛平補
胡蘆巴 沉香 芎藭 陳橘皮 丁香
人參 白茯苓 附子 木香
益智 桂 乾薑 甘草 白术
右剉如麻豆每服三錢匕以水一盞入生薑三片棗二枚擘破同煎七

止

分去滓空心溫服日二
安中散治三焦虛寒短氣不續[illegible]不安食已即洞下小便赤
澀不禁腳脛酸疼小腹脹滿
熟地黃 巴戟天 遠志 伏苓
天雄 五味子 山藥 續斷
蛇床子 菟絲子
右為末每服二錢匕溫酒調下夫三焦屬精府精以養身
累于心肺腎三焦[illegible]
沉香湯治三焦俱虛脾胃氣不和心腹疼痛不思飲食
沉香 厚朴 乾薑
桂 益智 青橘皮 附子
桔梗 白术 五味子 甘草
右剉如麻豆每服三錢匕以水一盞入生薑三片同煎七分去
滓食前溫服
柏子人丸治三焦俱虛氣道不通散痛[illegible]進飲食

卷之十九 十八

柏子人 熟乾地黃 肉蓯蓉
補骨脂 巴戟天 遠志 木香
五味子
右搗羅為末入柏子人研令勻酒煮[illegible]糊和丸如梧桐子
大每服十五丸至二十丸溫生薑湯下溫酒下亦得空心食前服
覆盆子丸治三焦[illegible]
桂 附子 人參
[illegible] 白茯苓 陳橘皮 陳麴
右搗羅為末[illegible]丸如梧桐子大空心食前
酒下二十丸至三十丸[illegible]
補和湯治三焦俱虛胃虛弱不進飲食
人參 黃耆 白术 甘草 乾薑
白扁豆 陳橘皮
右件[illegible]每服三錢匕水一盞生薑三片棗一枚同煎七分去滓溫熱服
附子散治三焦俱虛臍腹冷氣不止飲食不進

行中少方
附子 縮砂人一兩
肉豆蔻 檳香子 蜀椒
右為散 ……
……
……
……
……
人參散治脾胃俱虛上引肺氣精氣
人參 甘草 前胡 五味子 桔梗
木香 大腹 益智 白茯苓 山芋
烏藥 茯苓 沉香 黃耆 白朮
檀香 莎草根 藿香 檳榔 白芷
丁香皮 京三稜 丁香 陳橘皮
白朮 青橘皮
右以京三稜烏藥等 白朮等四味
四味前藥炒令黃色去陳麵同前藥為散每服二錢水一
盞入生薑半分煎七分不去滓食前溫服
…… 嘔吐不出
…… 白朮 附子 桂 五味子
甘草 麻黃
右為末 如梧桐子大每服二十丸溫酒送下
半夏瀉心湯治心下痞滿身重發熱乾嘔不安腹中
雷鳴泄瀉不止水穀不消欲吐不吐煩悶者急宜治之
半夏 黃芩 甘草 人參
乾薑 桂心
右以九升水煮取三升去滓分二服
……
……加乾薑

以飲……
下咽塞不通……
寬中散治……氣
枳殼 京三稜 乾薑 甘草 厚朴
益智人 陳橘皮 木香
肉豆蔻 檳榔 桂 青橘皮
右為散每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎至八分去滓
服不拘時候
沉香散治上焦虛實氣滯……飲食……
枳殼 赤茯苓 陳橘皮 檳榔
桂心 白朮 乾薑 人參
木通 半夏
右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓每於食
前溫服
大腹皮散治上焦虛寒氣壅攻注頭痛胸膈不利
大腹皮 檳榔 赤茯苓一兩 桂心 半夏
青橘皮 沉香 枳殼
芎藭 前胡 白芷 人參
右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓不計時
候溫服
厚朴湯治上焦閉塞乾嘔不出吐延沫吞酸
厚朴 桔梗 吳茱萸 人參
白茯苓 黃芩 白朮
附子 陳橘皮
右剉如麻豆每服一錢生薑一小塊水一盞煎至七分去滓溫
服不拘時候
黃耆湯治上焦虛寒短氣語聲不出
黃耆一兩 桂 丹參 方用人參 枳殼
乾薑 五味子 白茯苓 杏人
甘草 芎藭一兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候 一方有桔
梗無枳殼入生薑半分煎

通神湯 治上焦虛寒乾嘔痰逆
乾薑 炮五兩 蜀椒 去目閉口炒 菖蒲 桂 去麤皮
白朮 各一兩半 半夏 湯洗七遍焙 人參 五味子 炒
甘草 炙剉
右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服食後良久稍增至四
錢以知為度

胡椒理中丸 治上焦虛寒氣不宣通欬嗽喘急逆氣虛痞胷膈噎
悶腹脇滿痛迫寒短氣不能飲食嘔吐痰水
胡椒 蓽撥 乾薑 炮 款冬花 去梗 甘草 炙剉
陳橘皮 湯浸去白焙 高良薑 細辛 去苗葉 各四兩 白朮 五兩
右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服五七丸溫湯下米飲湯亦得不拘
時日夜

黃連丸 凡五十七字 治上焦冷下焦熱腹內不安食或注下

聖濟總錄卷十九 九十

黃連 烏梅 八兩 桂心 二兩 乾薑 附子
阿膠 炒燥 橘皮 芍藥 黃蘗 各二兩
右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸加至三十丸米飲下

半夏湯 治上焦氣不調順胷膈煩悶所以飲食先吐而後下
半夏 湯洗七遍 生薑 切焙 竹葉 麻黃 去節
前胡 澤瀉 細辛 枳實 麩炒 杏人 去皮尖 各三兩
右切以水九升煮取三升去滓分三服忌羊肉餳生菜等 一方無
竹葉

七香丸 治上焦虛實心胷冷氣攻刺疼痛消酒食毒
丁香 三分 桂 去麤皮 青橘皮 湯浸去白焙 縮砂 去皮
木香 一分 巴豆 去心膜出油 檳榔 剉三枚
右為末醋糊丸如菉豆大每服十丸至十五丸生薑湯茶酒任下不
拘時候

茯苓安心湯 治上焦虛寒精神不守泄下便利語聲不出
茯苓 人參 乾薑 遠志 去心 各三兩 桂心 一兩

甘草 炙剉
右切以水九升煮取三升去滓分三服忌生蔥醋物海藻菘菜等
一方入生薑半分煎

紫蘇子丸 治上焦虛寒一切氣逆胷膈噎悶心腹刺痛脇肋脹滿
飲食不消嘔逆欬嗽及治肺胃傷冷痰喘氣上氣奔急不得安臥
紫蘇子 微炒 陳橘皮 湯浸去白焙 各二兩 高良薑 炮 桂 去麤皮
人參 各一兩
右為末鍊蜜和丸彈子大每服一丸細嚼溫酒下米飲亦得不計時
若食瓜果生冷覺有所傷噫氣生熟欲成霍亂者含化一丸細細嚥
汁服盡自時立愈

黃連湯 治中焦有寒洞泄下利或因霍亂後瀉利無度腹
中虛痛
黃連 去鬚 黃蘗 去皮 厚朴 去麤皮生薑汁炙熟 當歸 切焙 各三兩
酸石榴皮 剉炒 地榆 阿膠 炒燥 各四兩
右為散每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服日三 一方有乾薑

聖濟總錄卷十九 九十一

化痰丸 治中焦有寒痰壅不思飲食
半夏 湯洗七遍 礬石 燒令汁盡
右為細末以生薑自然汁煮麪糊和丸如梧桐子大每服十五丸生
薑湯下不拘時

檳榔散 治中焦虛實氣不調
檳榔 赤芍藥 人參 去蘆頭 白朮 芎藭
桂心 陳橘皮 湯浸去白焙 前胡 去蘆頭 枳殼 去瓤麩炒
附子 炮裂去皮臍 大腹皮 剉 甘草 炙剉 各一兩
右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

神麴丸 治中焦胃虛飲食遲化氣不升降嘔逆惡心留飲寒痰結
動氣腸下逆滿有時而痛積之有形或積有聚痛腹痞滿食物多傷
噫氣酸臭心腹常脹霍亂吐逆煩悶不安
陳麴 炒 木香 厚朴 去麤皮生薑汁炙 甘草
檳榔 青橘皮 去白 白朮 枳殼 去瓤麩炒 京三稜 煨 各八兩
乾薑 炮 桂 去麤皮 各一兩

右為末，水煮麵糊丸如梧桐子大，每服五七丸，溫米飲下，不計時候。

黄耆湯 治中焦虛冷，日中忽瘦，耳鳴腹寒。

黄耆一兩 防風去叉 細辛去苗 栢子人別研 桂去麤皮

陳橘皮湯浸去白 人參各半兩 甘草炙一分 吳茱萸湯浸焙乾一兩

芎藭半兩

右除研者外，麤擣篩，拌勻，每服五錢，生薑五片，棗三枚擘破，水一盞半，煎至八分，去滓溫服，食前。

木香散 出聖惠方 治中焦虛冷，或時泄瀉，腹痛。

木香 草豆蔻去皮 桂心 附子炮裂去皮臍 訶梨勒皮

白朮 白芍藥 丁香各一分 甘草炙微赤剉半兩

右為散，每服三錢，水一中盞，入生薑半分，煎至五分，去滓稍熱服。

朴沉湯 治中焦有寒，胃中逆冷泄利。

厚朴去麤皮生薑汁炙五兩 沉香三兩 丁香 附子炮裂去皮臍

高良薑各二兩 白朮 藿香葉 木香 甘草炙剉各一兩

右剉如麻豆大，每服三錢，水一盞，煎至六分，去滓，食前溫服。

通聖丸 治中焦虛寒，泄瀉不止，臍腹疞痛。

乾薑炮 白礬燒汁盡 龍骨各二兩 肉豆蔻人 桂去麤皮

附子炮裂去皮臍 吳茱萸湯洗焙乾炒 縮砂人 訶梨勒皮各一兩

右為末，同研令勻，煮麪糊和丸，如梧桐子大，每服十五丸，加至二十丸，艾湯下，食前服。

厚朴散 出聖惠方 治中焦虛寒，好吐白沫，胃冷吞酸。

厚朴去麤皮塗生薑汁炙令香熟 吳茱萸湯浸七遍焙乾微炒 白茯苓一兩

桔梗去蘆頭 芎藭 白朮二兩 附子炮裂去皮臍各一兩

陳橘皮湯浸去白焙各半兩

右為散，每服四錢，水一中盞，入生薑半分，煎至五分，去滓稍熱服。

人參湯 治中焦虛寒洞泄。

人參 當歸切焙 甘草炙剉 黄芩去黑心 赤茯苓去黑皮

乾薑炮 厚朴去麤皮塗生薑汁炙四兩 芎藭三兩

右麤擣篩，每服五錢，入粟米二錢，水二盞，煎至一盞，去滓溫服，日三。

紫蘇湯 治中焦有寒。

紫蘇莖葉 藿香葉 赤茯苓去黑皮 甘草炙剉 人參

桔梗炒 葛根剉 丁香炒各半兩

右麤擣篩，每服三錢，水一盞，煎至七分，去滓溫服。

溫白丸 治中焦虛寒，痰積不散。

丹砂別研 白礬熬汁枯 半夏湯洗七遍去滑

生薑 白朮一兩 丁香半兩

右除丹砂一半為衣外，擣研為細末，薑汁煮糊和丸，如梧桐子大，用丹砂為衣，每服二十丸，食後臨臥生薑湯下。

消食丸 治中焦虛寒，穀氣不能食。

小麥蘖炒 麴炒 乾薑炮 烏梅肉焙

右為末，鍊蜜丸如梧桐子大，每服十五丸，不拘時，生薑湯下，日再，稍加至四十丸。

蓽澄茄湯 治中焦有寒，陰證胃口嘔噦不止。

蓽澄茄二兩 高良薑三分 草豆蔻去皮一兩

右麤擣篩，每服三錢，水一盞，煎至七分，去滓，入醋數點，滿呷，以知為度。

半夏丁香丸 治中焦寒痰。

半夏湯洗 白礬枯 丁香一分

右擣研為末，生薑汁煮麪糊和丸，如小豆大，每服五丸至七丸，鹽湯下。

蓽撥丸 治下焦不足，腎虛脾弱，上膈煩滿，下元虛冷，腹內雷鳴，胃膈氣滑泄無力。

蓽撥 胡椒 乾薑炮 人參 白茯苓去黑皮

訶梨勒皮各一兩 桂去麤皮

右為末，鍊蜜和丸如梧桐子大，每日空心以溫酒下二十丸，漸加至三十丸。

茴香子丸 治下焦虛冷，腰膝疼痛，肌肉消瘦，漸加無力。

茴香子炒 桂去麤皮 巴戟天去心 附子炮裂去皮臍 補骨脂炒

乾薑炮一兩

右為末，用羊腎二對，切去筋膜，以酒二升煮令酒盡，研和諸藥末，更擣一二百杵，丸如梧桐子大，每日空心生薑酒下三十丸，晚食前再服。

撥紅丸治下焦虛寒臍腹疼痛小便滑數赤澀下元

蜀椒 附子 乾薑

右為末用豬腎二對去脂膜薄切攤於紙上去血然後鋪一重腎一重藥末以重為度卻以二五重濕紙裹於塘火內燒待香熟取出去紙細研以精硬米粉少許煮糊為丸如梧桐子大每日空心以溫酒下二十丸漸加至三十丸

沉香華撥丸治下元虛傷逐積冷暖脾胃

沉香 華撥 附子 肉豆蔻 木香

藿香子 石斛 訶梨勒皮 山茱萸 桂

乾薑 補骨脂 巴戟天 華澄茄 檳榔

右為末鍊蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每日空心及晚食前溫酒下三十丸

補骨脂丸治下元虛冷溫中壯力暖胃

補骨脂 木香 附子 檳榔 肉豆蔻

青橘皮 桂 牛膝 乾薑

鹿茸 硫黃 膃肭臍

肉蓯蓉 蜀椒

右件研外搗羅為末入硫黃研令勻用白羊腎五對去筋膜細研入前藥末相和杵了白麵裹煻火中燒令麵熟為度取出搗五七百杵丸如梧桐子大每日空心以溫酒下三十丸漸加至四十丸

人參續斷丸治下焦虛寒夜不止氣欲絕

人參 厚朴 續斷 白茯苓 烏梅

芎藭 乾薑 白朮 吳茱萸

桂 麥門冬 黃耆

右搗篩每服二錢水一盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前服日三不拘時 一方入生薑半分煎

韭子丸治下元虛憊小便滑數虛損不足

韭子 肉蓯蓉

厚朴 附子 龍骨 鹿角屑

山茱萸 桂 車前子 天雄 補骨脂

槐實

右為末鍊蜜和擣二三百杵丸如梧桐子大每日空心溫酒下四十丸

附子散治下焦虛寒腹痛氣逆不下食

附子 乾薑 桂心 青橘皮

芎藭 當歸 木香 五味子

甘草 吳茱萸 厚朴

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓空心溫服之

茯苓丸治下焦虛寒損腹中瘀血令人喜忘不欲聞人語胸中噎塞而短氣

茯苓 乾地黃 當歸 甘草 乾薑

人參 黃芩 芎藭 桂心 厚朴

杏人

右為末蜜丸如梧桐子大初服二十丸加至三十丸為度日二清米飲下 一方無乾地黃

訶梨勒丸治下焦虛冷氣溫脾胃不思飲食

訶梨勒皮 華撥 桂 胡椒 附子

沉香 木香 人參 草豆蔻 檳榔

右為末鍊蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服食前以溫酒下二十丸

內固丸治下焦虛寒肝腎不足膀胱疼痛

藿香子 木香 楝實 乾薑

草豆蔻 吳茱萸 葫蘆巴 補骨脂 甘草

右搗細末鍊蜜和丸如小彈子大以丹砂為衣每服一丸嚼破以溫酒鹽湯下亦得空心食前服

伏龍肝湯治下焦虛寒或先見血後便轉此為遠血或利不利

伏龍肝 乾地黃 阿膠 牛膝

甘草 乾薑 黃芩 地榆

髮灰一合

右㕮咀以水九升煮取三升去滓下膠煮消下蜜及芍二服

防己湯療下焦冷嘔逆吐不下食蒸去温毒

防己　芍藥各一兩　枳實炙　獨活　防風

桂心各一兩　生姜八兩　葛根二兩　半夏一升洗

右切以水九升煮取二升分四服相去八九里久中間食少粥一方

無防己枳實加附子二兩炮餘依本方忌羊肉餳生葱

黃蘗止瀉湯 出千金 治下焦虛冷大小便洞泄不止

黃蘗　人參　地榆　阿膠各一兩　黃連五兩

茯苓　橘皮各四兩　艾葉一升

右㕮咀以水一斗煮取三升去滓下膠消分三服一方有石榴皮

續斷散 出千金 治下焦虛寒損或先見轉後見血此為遠血或利或不

利好因勞冷所發

續斷　當歸　桂心　蒲黃　阿膠各一兩

甘草二兩　乾姜　乾地黃各四兩

右㕮咀以水九升煮取三升半去滓下膠取烊下蒲黃分三服

普濟方卷四十九　十七

石鍾乳丸 治下焦虛冷臍腹疼痛手足厥逆脈氣沉短

石鍾乳 研　陽起石 各一兩　附子 炮裂去皮臍

桂 去粗皮　硫黃 研　磁石 煅醋淬 一分　鹽精 半兩

右為末用酒煮糊為丸如梧桐子大每服三十丸空心食前生薑鹽

湯下

厚朴丸 治下焦虛冷便利頻併飲食無力不思飲食

厚朴 去皮　附子 炮裂去皮　蜀椒 去目及閉口者炒出汗

右以漿水六升煮鹽三兩生姜三兩切同於銀鍋中煮令水盡焙乾

搗羅為末以水浸炊餅和丸如梧桐子大每日空心温酒下三十丸

燒石子茴香散 出聖惠 治下焦虛冷臍腹搗痛心胃痞脹和元氣進飲食

川附子 炮　蘹香 炒　桂 去皮　川椒 去目　舶上茴香　木香

胡椒　陳橘皮 去白　蓽澄茄　乾薑 炮　京三稜 煨

右件一十味同杵為細末每服用猪腰子一隻切去筋膜切作片子以末三錢入蔥白少許鹽半錢濕紙裹煨熟細嚼以酒或粥

飲壓之須臾覺臍下暖甚妙

胡椒青鹽丸 出楊氏家藏方 治下焦虛冷腳膝無力多倦少力不美飲食

附子 炮裂去皮臍　青鹽 別研　厚朴 去粗皮生薑汁炙

人參 去蘆頭　木香　白朮　沉香 剉　丁香

茴香 炒　破故紙 炒　川楝子 去核　肉豆蔻 麪裹煨

黃耆 蜜炙　杜仲 去粗皮生薑汁炒　胡椒 各一兩

右件為細末炒入青鹽酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服一百丸鹽

湯送下空心

治下焦虛冷小便數漸無力 出本草

以羊肺一具細切內少羊肉作羹食之煮粥亦得

治下焦虛冷腳膝無力陽事不行補益 出本草

以羊腎一隻熟煮和米大羹練成乳粉空腹食之甚有效

厚腸胃令人能食下三焦除惡氣 出本草

以橘子 即木通實也 和子食之更好

主積中滯氣不足實和辛苦食後氣不通 出本草

以蒸生搗汁服之

普濟方卷四十九　十八

治下焦虛理胃氣令人能食

用豬肉以五味炙食之良不可食者令人縮

治下焦冷氣

用桑皮一斤去粗皮搗為末以蜜為丸如梧桐子大每食前酒下三十丸

○三焦脹

論

黃帝鍼經謂三焦病者腹脹氣滿不得小便窘急溢則為水留則為脹

夫三焦者決瀆之官水道出焉上焦其治在膻中膻中為氣海中焦主

腐熟水穀下焦當膀胱上口主分別清濁今三焦俱病故腹脹氣滿不得

小便溢而為水為脹也治宜升降氣道則腹滿自消水道自利矣三焦

脹者經所謂氣滿於皮膚殼殼然而堅不痛是也蓋脹有痛否以別虛

實若鼓脹之狀內挾宿食積之堅痛而是謂邪實今三焦皮膚殼殼然而

堅不痛特以氣滿為虛脹而已

補氣丸 治三焦病久欲成水腹脹不消小水不利

海蛤　葶藶子　赤茯苓 去皮　防己　犀角 鎊

訶梨勒（去核）　苦葶藶（炒）上　芍藥　木通（剉）　大戟（炒）
防風（去叉）　木香　桑根白皮　陳橘皮（湯浸去白焙）
郁李人（去皮研）　大黃（剉炒）　生乾地黃（焙）一兩半
右為末，煉蜜和丸如梧桐子大，空心米飲下十丸，覺壅不快加至十
五丸，覺通利即減三五丸，大小便不通服三十丸。
木香枳殼散　治三焦氣脹滿，水道不利。
木香　枳殼（麩炒）　白芷　蓬莪茂（剉炒）　白朮
甘草（炙剉）　桂（去粗皮）　益智子（炒）　青橘皮（湯浸去白焙）各三兩
陳麴（炒）各四兩
右為散，每服二錢，生薑鹽湯點服，不計時候。
三和湯（出濟生拔粹方）　治五臟不調，三焦不和，降水道不利，心腹痞悶，脇肋
腹脹，風氣壅塞，肢節煩疼，頭面虛浮，手足微腫，腸胃燥澀，大便秘難，
年高氣弱，服又治背膊痛，有妨飲食，及腳氣上攻，胸腹滿悶。
大腹皮（炙黃）　紫蘇莖葉　沉香（剉）　木瓜（切焙）　羌活（去蘆頭）
白朮　甘草（炙剉）　芎藭　木香　陳橘皮（去白焙）

大面二十五字

普濟方卷[illegible]　廿九

檳榔（麵裹煨熟去麵剉）各三分
右麤搗篩，每服三錢，水一盞，煎至七分，去滓溫服，不計時候。
檳榔湯　治三焦積氣漸成水病，腫脹四肢，浮腫，寬胃腸，利小腸。
檳榔（生剉）　大腹皮（剉）　白朮　五味子（炒）　枳殼（麩炒）
茴香（剉）　防己　木通（剉）　桑根白皮　陳橘皮（湯浸去白焙）
厚朴（去麤皮生薑汁炙）　桂（去麤皮）　木香　人參
大黃（濕紙裹煨各半兩）
右為散，每服三錢，水一盞，生薑三片，棗二枚擘破，同煎至七分，去
滓溫服，早晨臨臥服。
五香丸　治三焦虛脹，心腹痞悶。
沉香（剉）　丁香　白檀香（剉）　藿香子（炒）　蓽澄茄
青橘皮（焙去白）　胡椒　縮砂（去皮）　赤茯苓（去黑皮）　白芷
半[illegible]（焙）　甘草（一兩）　木香一兩半　麝香（研）一分　蓬莪茂（煨剉半兩）
枳殼（去瓤麩炒半兩）　葛花一兩半　肉豆蔻（去殼五枚）　檳榔（煨剉）　人參（各半兩）
半夏（兩同入生薑汁搗爛作餅炒焙）　桂（去粗皮一兩）　蓽撥半兩

訶梨勒（炒二兩）　赤小豆（炒二兩）
右為末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服三十丸，細嚼，用溫生薑湯下，不拘
時候服[illegible]
小金丸　治陰陽氣不升降，心腹脹滿，胸膈痞悶，不思飲食。
雄黃（研）　京三稜（煨）　石三稜　鵝爪一錢　蓬莪茂（炒）
桂（去粗皮）　木香　沉香　半夏（湯洗）
丁香　硇砂（研）一兩
巴豆（去皮心出油）　檳榔（剉四枚）
藿香　金鈴子二兩　大麥蘖（炒）
右為細末，同和勻，以糊麵餅劑作餅和丸如梧桐子大，風乾用油單裹
紫色為度，入瓷合內收，以研麝香一分為之，每服先嚼棗一枚，下二
丸，乾嚥，不得嚼破，食後臨臥服，虛弱人有所傷皆可服。
檳榔湯　治三焦氣滿虛脹，及一切積聚氣病。
白檳榔一兩（半生半熟）　肉豆蔻（去殼）　木香　青橘皮（湯浸去白焙）
厚朴（去粗皮薑汁炙）　枳殼（麩炒）　京三稜（煨剉）　桂（去粗皮）
人參　白茯苓（去黑皮）　陳麴（炒）　麥蘖（炒）　乾薑（炮）

五百九十六字

普濟方卷[illegible]　卅

白朮　訶梨勒（煨去核）　甘草（炙剉）各二兩
右為散，每服三錢，入生薑一塊拍碎，棗二枚去核，水一盞半，同煎至
七分，去滓溫服，不計時候。
暖氣丸　治三焦積氣
沉香（剉）　木香　乾薑（炮）
白豆蔻（去皮）　蓽撥一分　訶梨勒（煨取皮）　桂（去粗皮）　胡椒一分
人參半兩　白茯苓（去黑皮）　白朮半兩
阿魏[illegible]
右為末，煉蜜丸如梧桐子大，每服二十丸，米飲湯下，空心食前。
脹
京一稜散　治三焦脹，和養脾胃，降痰[illegible]
京三稜（煨）　陳麴（炒）　大麥蘖（炒）　木香
肉豆蔻（去殼）　白檳榔（剉）　乾薑（炮）　甘草（炙剉）　厚朴（去麤皮薑汁炙）
杏人（去皮尖雙仁炒）各一兩
右為散，拌勻，每服二錢，入鹽少許，沸湯點服，不計時候。
小丁香丸　治三焦脹氣消化宿食

丁香　沉香　乳香　蘹香子　甘草炙半兩

桂去皮　蓬莪术　檳榔二枚　豆蔻去皮

巴豆十五粒去皮心出油研　阿魏

右除研者外爲末，入乳香巴豆阿魏令勻，煮白米粥和丸如菉豆大，每服五丸，生薑湯下，如胸膈氣不利及元臟冷氣上攻，空心加至十丸，溫酒下，常服熟水亦得，更微斟酌人虛實加服之。

內氣丸　治脾胃氣弱不化，飲食嘔逆吞酸，腹內虛鳴，下痢嘔氣，飲食遲化，氣道否滯，升降不利，臥飲停留，腸下偏痛，宿氣加之結聚成形，動氣痛攻衝冷痰，久而不去者，常服運脾，寬調中，進食消飲，勻氣

蘹香子炒　木香　桂去皮　桃仁去皮尖麩炒　京三稜煨

青橘皮去白　萊菔子炒　檳榔　沉香　牽牛

右爲末，湯浸蒸餅和丸如梧桐子大，每服五十丸，溫熟水下，不計時候。

勻氣散　治三焦痞脹，[illegible]之堅不痞

京三稜煨　蓬莪茂　益智子　甘草炙　木香

桂去皮　丁香各一兩　草豆蔻二枚去皮　肉豆蔻二枚

右爲散，每服二錢，鹽末飲入鹽少許調下，空心夜臥服，小兒每服半錢，水下半錢

生薑丸　治三焦虛脹通氣

生薑　厚朴　半夏

人參一兩　陳橘皮去白　白茯苓去皮　陳麴

大麥蘗炒各一兩半

右爲細末，用生薑汁煮麵糊和丸如梧桐子大，曬乾，每服三十丸，空心食前米飲下

丁沉丸　治三焦虛脹

丁香　沉香　木香　蘹香子　雞舌香

胡椒　阿魏

右除阿魏外爲末，次以阿魏末煮糊和丸如菉豆大，每服五七丸，細嚼，蘹香子湯下，婦人血氣，醋湯服下

白术偶香湯　治三焦[illegible]氣

白术四兩　陳橘皮　白茯苓　甘草　附子

乾薑炮半兩

右剉如麻豆，每服三錢，水一盞，生薑二片，棗一枚，同煎至七分，去滓溫服，如覺感冒人，則茶煎服，稍覺三焦不和，併服即效

陳麴湯　治三焦帶氣

陳麴炒　萊菔子炒

右爲散，每服三錢，水一盞，煎一兩沸，去滓，入麝香少許，再煎，溫服，不拘時

澤瀉湯　治三焦不調，上氣於膀，[illegible]身體手足[illegible]不安

澤瀉　防己　甜葶藶　郁李仁

百合　陳橘皮　桑根白皮　木通

赤茯苓去黑皮各一兩

右搗篩，每服三錢，水一盞，棗二枚擘破，同煎至七分，去滓溫服，不拘時

茯苓飲　治三焦痞水氣滿悶不能食，消痰氣，令能食

赤茯苓　人參　白术　生薑　枳實

陳橘皮

右剉如麻豆，每服五錢，水一盞半，煎至一盞，去滓溫服，不拘時候

甘遂散　治三焦氣不通，心腹脹滿，促，大小便不利

甘遂　牽牛子　續隨子　大戟　葶藶

右爲散，每服半錢，空心濃煎燈心湯調下，利下水爲效，未減更一服

甘遂散　治三焦水氣，四肢虛腫甚者

甘遂半兩　檳榔　木香　牽牛子　萊菔子

右爲散，每服半錢，煎紫蘇木瓜湯調下，空心服，利下水爲度，更量老虛實加減

茯苓散　治三焦有水氣，胃弱短氣目眩

赤茯苓去黑皮四兩　桂去麁皮　白术　甘草炙二兩

右爲散，每服五錢，水一盞半，煎至一盞，去滓溫服，不拘時

小半夏加茯苓湯　治三焦不順，心下痞滿，膈間有水，目眩悸動

半夏湯洗去滑焙五兩　生薑半斤　赤茯苓去黑皮三兩

右□□如餅狀每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服不計時

牽牛子丸治三焦氣壅腹脹滿大小便不利

牽牛子 烏頭 木香 益智

大黃 檳榔 陳橘皮

羌活

右為末煉蜜和丸如梧桐子大日中夜臥後各服溫甘草湯下十丸

漸增至二十丸以知為度

檳榔散治三焦氣不通致滿水脹

檳榔 木香 生薑 茯苓 青橘皮

前胡 丁香 山芋

右為散每服三錢水一盞煎至七分空心溫服腳腫加牽牛子半兩

面目浮腫加郁李人半兩

人參木香散治陰陽不和三焦氣澀胃脘虛痞腹脇滿脹小便不利飲

食不消

人參 甘草 木香 白朮 五味子

右為散每服二錢入鹽少許白湯點服不計時候

木香丸治三焦病腹脹氣滿小便不利

木香 牽牛子 蓽澄茄

檳榔 補骨脂

右搗四味為末入牽牛子末勻以青水和令得所丸如菉豆大每服

二十丸茶湯或熟水下食後服如因食過傷可服五七丸小兒一歲

可服一丸妊娠不可服

○三焦欬

論曰

內經謂久欬不已則三焦受之三焦欬狀欬而腹滿不欲食飲此皆聚

於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也蓋三焦之氣以胃氣為本水

穀之道路氣之所終始也今好而欬嗽以實氣滯溢閉塞胃中則腹滿

不食氣逆上行則喘多而面浮也

藿香湯治久欬傳三焦腹滿不欲食

藿香葉 人參 赤茯苓 青橘皮

細辛 訶黎勒皮 縮砂人 陳橘皮

甘草 木香 白朮

右為散每服三錢水一盞入生薑棗各三片同煎至七分去滓稍

熱服不拘時候

黃耆白朮湯治脾肺欬嗽氣急三焦欬嗽喘息急

黃耆 人參 白朮 當歸 赤茯苓

百合 蒼朮 桔梗 桑根白皮

枳殼

右為散每服三錢水一盞入紫蘇五葉同煎至七分去滓食後稍熱服

半夏湯治三焦欬腹滿不欲飲食

半夏 木通 前胡 白朮

赤茯苓 陳橘皮 檳榔 桂

枳殼 旋覆花

右為散每服三錢水一大盞生薑三片煎至八分去滓溫服不拘時

乾薑湯治三焦欬腹脹滿不思食

乾薑 桂 款冬花 細辛 白朮

甘草 五味子 木香 附子

右剉如麻豆每服三錢水一盞入棗二枚擘破煎至七分去滓溫服

日三

胡椒理中丸治三焦欬嗽胸膈氣滿逆嘔吐腹脇脹滿不能飲食

人參湯治三焦欬久嗽滿悶四肢不和

人參 杏人 麻黃

桂 乾薑 甘草 紫菀 五味子

陳橘皮

右為散每服四錢水一盞半棗二枚擘破煎至七分去滓溫服日三

半夏湯治三焦欬腹滿不欲食

紫蘇子湯治三焦欬心胸不利不思飲食

紫蘇 陳橘皮 甘草 乾薑

桔梗剉炒 杏人湯浸去皮尖炒

右為散每服四錢水一盞半入薑三枚同煎至七分去滓溫服日

三

五味子丸 治三焦欬腹滿不欲食順氣

五味子炒 蘿蔔子炒 新仙靈脾炒

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸生薑臘茶下加至三十

丸空心食前服

玉液散 治久欬傳三焦腹滿不思飲食及胃膈有痰

半夏湯洗七次焙 生薑 陳橘皮湯浸去白焙

右為散每服一錢水一盞煎至六分溫服

三焦約

論

黃帝三部鍼灸經言小腹腫痛不得小便邪在三焦病名曰三焦約內

閉發不得大小便夫三焦者水穀之道路氣之所終始也上焦如霧中

焦如漚下焦如瀆三焦乃流行之道榮衛致養則腐熟水穀分別清濁

以時而下無壅滯但若榮衛不調風邪入客則決瀆之官約而不通所

以不得大小便也刺法取足少陽太陽之經瀉以湯劑則三焦通暢清

濁判矣

順氣丸 治三焦約滯大小便

木香一兩 青橘皮 人參 赤茯苓

郁李人 大黃 麻人

甘遂 訶梨勒皮 大黃

右除郁李三味外搗羅為末即入三味拌和再羅煉蜜和丸如豌豆

大每服十丸煎棗湯下小溲時飲

郁李人丸 治三焦約小腸澀滯不得大小便

郁李人 大黃 赤茯苓 葶藶

大麻人 檳榔 杏人

右搗研令和勻再研細細煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空

心用甘草湯下日三服甚者不過再得

枳殼丸 調順三焦平勻氣脈消痰滯和胃脈袪風利大小腸

枳殼 檳榔 牽牛子 木香

陳橘皮

右搗羅四味為末與牽牛末拌勻再羅過煉蜜和丸如梧桐子大每

服十五丸至二十丸食後生薑湯下欲利加丸數

枳殼散 治三焦約大小便不通

枳殼 牽牛 滑石

桂

右四味搗研拌和每一兩藥末更入膩粉半錢和勻每服一錢用冷

米飲調下臨卧時服更量老小虛實加減

疎風散 治三焦氣約大小便不通

牽牛子 大黃 檳榔 陳橘皮

右為散每服二錢蜜水調下食後良久服

皂莢散 治三焦約大小便不通

豬牙皂莢 白蒺藜

右為末如大腸不通用鹽湯茶湯調下一錢小便不通用溫酒調一

錢

淮南五柔丸 治三焦不調小便秘澀和榮衛利腠理

大黃 前胡 赤茯苓 細辛 半夏

肉蓯蓉 葶藶 當歸 芍藥

右為末煉蜜和搗千杵丸如梧桐子大每服五丸食後溫水下

日三稍增之

考論官典寶王祖昭

對方醫士李永

劉翱

張鏞

寫書冷英

陳彬

刊字匠張璽等

普濟方卷之十九 畢

頭門

總論 論十首 方七百六方

頭痛 偏頭痛 偏正頭痛
頭面風 風頭痛 首風
風頭旋 風頭眩
腦風 頭眩

頭痛 論一道 方百十四方

防風散 上清散 人參順氣 摩頂散 麝香芽散
神芎丸 六神散 香芎湯 芎辛湯 川芎茶調散
旋覆花散 石膏丸 太陽丹 方 石膏散
白芷散 石膏丸 烏頭散 四川丸 寬中丸
藿香散 硫黃丸 玉真丸 治頭痛發歇不止 三生丸
太白散 偏頭丸 搐鼻散 治風毒攻注頭目痛
又方 白頭痛 葫蘆巴散
又方 定腦散 治頭痛不可忍方 極山散 治頭痛不止
細辛散 又方
又方 芎烏散 神砂丸 又方 附子方 附芎散
又方 芷根丸 蚌膏方 治頭痛 又方 治頭痛
芎术湯 上痛入腦丹 治氣攻上頭疼
白頭痛不可忍方 括蔞方 立效散
斜頭方 白大病後虛頭痛 治頭痛不可忍者 一方
葛根方 芎藭茶方 芎辛丸 龍腦丸
當歸方 白茶日進人間分痛 仲景石膏丸
治頭痛或偏攻一邊痛 白附膏湯 烏星膏

風頭散 治年頭痛如破 龍珠丸
白芥散 方引六 石膏散 千金散 星奇湯
以石膏方 入陽頭痛
少陽頭痛 陽明頭痛
太陰頭痛 少陰頭痛 厥陰頭痛 諸氣虛頭痛
諸氣虛頭痛 諸血虛頭痛 治頭痛傷風
可用只錫川 麻黃吳茱萸湯 太陽經嚏藥
紅豆散 順氣和中湯 大柴胡湯 茶散
半夏頭湯 玉壺丸 澤附湯 青上面火湯 補氣湯
白芷散 細辛丸 葛根葱白湯 參蘇飲 升麻胃根湯
金露清散 子繼記刑公治頭痛去 張洪道治頭痛去
荊芥散 芎茶湯 清香散 更生散
王真丸 既濟解毒湯 白頭痛 白辛頭痛
白人初得頭痛 白熱頭夏結頭痛 治頭疼利丈夫動陰力
白頭主心眩背胸悶 白病酒頭痛 石膏散

偏頭痛 論一道 方三十八方

芎犀丸 指迷 天南星散 天南星散 四神散
川烏散 細辛散 中聖散 白頭偏痛方 白雪丹
丁香散 烏頭散 白偏頭痛方 又方 石乳鼻散 烏金丸
又方 治大腦風及頭偏痛方 白頭偏痛不可忍方
白偏頭疼 輕黃丸一名如神丸 通頂散 立效散
乳香散 至靈散 治偏頭痛連眉痛 治婦人偏頭痛
神妙方 一方 山露定交自方 又方
華撥方 白偏頭疼方 川芎散 秀閉散
一字散 細辛散 如聖散 通關滴香甚散方

偏正頭痛 論一道 方四十一方

川芎散 白芷丸 飛丹散 千金散 王衣散
川烏散 通天散 青空膏 散清膏 芎黃湯

正容湯　白殭丹　通頂散　搐鼻散　半字散
石膏丸　乳香散　真珠散　神効散　抽刀字散
細辛散　川附散　治偏正頭疼　又方　愁擾散
石膏散　神効藿香散　名入八肴茶　星烏石膏散　急風散
龍香散　至寶散　人勝散　熱頭散　一名芎[?]散
治偏正頭疼　治偏正頭疼方　治[?]方　太附丸　一名芎[?]丸
立効散　一字散　一芎餅子　如聖餅子
入一散　救苦神白散　川芎神効散　[?]散
往芎散　茶調散

○頭面風　一論　追　方　四十一方

巴戟天散　入頂散　菊花丸　菊花散　烏蛇散
羌活湯　羌活湯　羌活湯　麻黃湯　山茱萸散
白蒺藜丸　防風散　芎藭散　羊角湯　芎藭丸
茱萸散　羊角升麻湯　白芷前丸　青膏散

蒼耳散　防風散　旋覆花湯　一名菊花散　天麻丸
全生方　散名見芎朮散　羌活散　松脂膏　獨活丸
羌活丸　芎菊散　檳香散　防風散　附芎散
又威膏　天人膏　香白芷散　牛蒡子膏
治卒中風頭面腫方　知母湯　烏犀天麻丸
主頭面遊風遍身癢

○風頭痛　一論　方　七十四方

天麻散　一名天麻散　防風湯　羌活湯　比金散
川芎散　治頭風痛木頭方　消風散　人參順氣散
治偏風感風一切頭痛　安神湯　治中風頭痛發熱
川芎茶調散　生犀鍾蘇丸　芎藭散　木乳散
石膏散　防風散　小消風散　菊花散　豆粉丸
盧會散　黑龍丸　天南星丸
龍腦芎辛丸　通關散　山茱萸散　石膏湯

川芎湯　白附散　羌活飲　木頭方　天南星丸
立効丸　通頂散　川龍散　旋覆花湯　芎葛根湯
芎藭散　石膏丹　天香散　治頭痛不可忍方
捷步散　天南星散　桂枝葛根湯　皂莢散
治風頭痛又偏頭痛吹鼻方　治一切風疾又頭疼
治鼻塞又頭痛　治又法中方　治一切風虛常患頭痛
上清丹　人方　南荊散　一聖散　菊花湯　一名放生散
石膏丸　芎芷散　荊芥散　都梁丸　一名[?]
又方　治卒中風頭痛方　又方　大麻搐鼻法
治風頭痛手欲大腰項風先發者　救湯方　枕頭方
烏金煎　吹鼻散　通頂散　治風頭痛
又方　篆香散　治卒中寒風頭痛　神木散
消風散　治一切風攻頭目痛

○首風　一論　追　方　一百六十方

仙方如聖餅子　追風散　搐鼻藥　巴戟天散
牛黃丸　救生丸　天麻丸
茯神湯　附子丸　清明飲　茯苓湯　一字拄金散
十味如神丸　芎菊湯　前胡湯　治頭中痱癢
麝香膏　天麻餅　一名如神餅子　白龍丸　芎朮湯
摩風丹　治頭風冷大　八風湯　頭風方
防風飲　青神散　青香散　南星丸　羌活散
菊花散　名知便[?]散　芎藭散　荊貴湯　九生丸
七生丸　荊芥湯　名[?]散　香芎散　川芎散
青[?]方　治風勞氣吐逆不能食　一字散　芎藭散
透頂散　不引散　治偏正頭風　太陽丹　定[?]抽刀散
川芎丸　菊花散　天麻散　通關青金散　開陳散
通頂散　荊芥散　御[?]香鼻散　芎芷散　天香散
茶調散　黑散　全蝎膏　治頭風　溫腦散
治頭風方　一字散　治頭風　細辛散　芎草散

霞前散　二仙丹　一方　小金丹
治積年頭風　治八般頭風　治膏頭目餘病氣
白歸散　治頭風餅子　神應餅子　祛風神妙散
雁黃丸　塔眞散　治頭風痛　治頭風累年方
治諸般頭風　白雪丹　□□定丸　辛香散
芷芎散　一字輕頭風藥　附子湯　一甯金丸
附子摩頭散　大川烏丸　黃烏丸　荊芥散
治偏正頭風痛　人參酒　治頭風方　又方　四方
治頭風百藥不效者　備急散　又方　治頭風并出汗方
主頭風本頭方　又方　芎藭方　又方二方
菊花方　川烏丸　摩頭風　治頭風　治諸般頭風
治洗頭風　治頭風　治頭項強不得顧視方　又方二方
治頭風頭痛明目　治頭眩痛不食忽倒甚者　如聖散
治雷頭風　治雷頭風發　黑白散　治赤眼頭風
摩頂散　羊角升麻湯　金花一聖散　又方

徐介翁苦頭風方　治胃心并肩骨疼者　沈香□風湯
金鈴散　細辛散　屬香如神丸　神妙散　擁煎散
駐顏妙散　金花散　天雄散　通關散　香芎散
石腳古散　治男子女人一切頭風　前氣防風湯
聖餅子　辛夏丸　調南□□□思退滲□□□衣
洪州芎藭附子湯　白龍心散　治頭風頭痛
治頭風明目補腦　治頭風日伏　治頭風痒　治頭中一切風
治中頭風　療風頭

腦風

論　方

芎藭丹　□□元丸　甘露丸　一方白烏丹　芎芷散
摩頂玉瓜膏　附子散　芎香散　八香□散　硃心散
白附子散　白附子丸　通關散　香芎散　光谷丸
又提散　細辛火散　石膏菊花散　芎藭湯　烏金煎
吹鼻恐頂散　神聖散　太乙散　川芎平湯　勝金散

清神散　吹鼻散　細辛散　石膏散　救苦散
朴硝散　治洗腦風頭痛而子埋下者　羌活附子湯
川烏散　腦痰頭痛　主本腦

風頭旋

論　道　方　二十一方

治頭旋湯　芎荊子散　治熱風頭旋心悶　黃防己散
遠志散　牛菊花散　鷹犀香大麻丸　芎菊散
摩頂細辛膏　菊花丸　旋覆花丸　羚羊角湯
療頭面熱風頭旋眼痛　地骨飲　療風邪氣未除
白术散　前胡散　芎藭散　獨活散　羚羊角散
荊芥丸　羚羊湯　人參丸　八風散　山茱萸散
防風丸　芎藭散　白蒺藜丸　白术飲　松香散
防風飲子　貼頂膏　天雄散　延年□□
桑花飲子方　祛痰丸　鴻頭丸　澄香散
楓花浸酒方　荊芥方　蜂蜜方　治頭風頭旋

止逆湯　化風丸　芎辛湯　白附子丸　枳實散
獨活散　羚角煎　百杏丸　龍腦方

風頭眩

論　去方　道　方　一百四方

醒頭酒　鮮散　羌活丸　防獨散　增損黑錫丹　羌活湯
天雄散　一方去惡散　菊花散　青龍摩頂膏　獨活湯
菌芋湯　杜若散　茯苓散　旋覆花散　青菊花散
白芷散　沉香磁石丸　茯神湯　防風散
防風枳實散　生風丸　壓風丸　生犀杏芎散
防風散　前胡散　劉前散　桑子丸　前胡湯
天麻羌活丸　清神散　治風頭眩忌風吐冷水
芎藭散　人參前胡湯　人參湯　菊花湯
山芋散　防風散　青風散　獨活散　羚羊角散
黃防風散　茯神散　羌活散　延年薯蕷酒　犀角湯
防風湯　寧中丸　菊花丸　新方薄荷白檀湯

加減薄荷煎丸　香芎散　三五七散
如聖湯　山芎散　人參湯　八帶神砂散
療頭痛眼眩入門　連待散　大三五七散　石龍飛散
川芎散　川芎散　加味二陳湯　防風散　芎藭散
芎朮湯　近效白朮附子湯　四神湯　芎黃湯
救生散　芎朮散　白薇湯　倉公散　芎藭湯
茯苓桂枝白朮甘草湯　茶調散　小三五七散　附子膏
麴朮散　芎歸湯　木香湯　桂苓丸　消香丸
水蘇方　甘菊方　玉屑散　治諸風搐搦
治一切氣不散頭痛　玉液湯　追引法　大防風丸
天麻除風丸　川芎散　川芎散　羌活清空膏　羌活湯
茯苓半夏湯　治頭目昏　芎辛湯　芎犀丸　人參芎朮丸　川芎圓
點頭散　梔子散　人參荊風散　治諸風作頭疼
治頭目昏眩　治頭暈經久不瘥
治中風頭疼心痛手熱
偏正風痰頭痛　附論　方三十二方
牛黃鐵粉丸　金犀丸　芎犀湯　犀角半夏丸
天南星丸　附子散　乳香散　麝香天麻丸　化痰丸
芎辛白湯　防風散　石膏丸　青黛湯　玉壺丸
菊花散　白附子丸　消風丸　天南星丸　順元散
治痰厥頭痛立效方　治卒頭痛如破　又方　治痰厥頭痛方
又方　治痰厥頭痛　山芎丸　附子湯　黑附丸
三生散　半夏白朮天麻湯　石膏散　八風丹
十六丸　拒風丸　羊松散　大芎辛湯

普濟方卷之四十四目錄

普濟方卷之四十四

頭門

總論

夫人頭者，諸陽之所聚，諸陰脈皆至頸而還，獨諸陽脈皆上至頭耳，則知頭面者，諸陽之所會也。且平居之人，陽順於上而不逆，則無頭痛之患。陽逆於上而不順，衝壅於頭，故頭痛也。風寒在腦，邪熱上攻，痰厥腎厥，氣虛氣攻，皆致頭痛。但氣虛氣攻頭痛，愈而復作，經引歲月者多有之矣。偏正頭風，婦人氣盛血虛，產後失血過多，氣無所主，皆致頭痛。惟婦人頭白氣虛氣攻頭痛，不合宣化之妙。其間所用附子，取其助陽以扶虛氣；取其補陽以鎮陰；全蝎取其鎮壓，或蔥豉取其發散，能下達者能引用。使虛氣歸於下，對證用之，無不作效。天雄、烏頭、半夏，出產於上，用之可得諸陽之會，以扶陽足。凡頭痛者，乃足太陽足厥上連風府，風府者，諸陽所會，可入於泥丸。凡頭痛者，皆可灸。足太陽、足少陽，上入於泥丸。

宜而痛者，是為真頭痛，不可以藥愈，夕發旦死，旦發夕死，青黑者氣先絕。原其所因，有中風寒暑濕而疼者，有氣血飲食厥而疼者，有五臟氣鬱厥而疼者。治之之法，當先審其三因，三因明則所施無不切中。大頭風者，亦由陽氣虛衰，又為風邪所傷，陽經致頭目昏痛，壯不能起，或頭足腫，作或兩人傷於痛，目疼腹滿，嘔吐不可食，起則頭眩，或是九分爲頭風證也。頭由風痛是經絡虛，陽經受風所乘也。諸陽經脈上走於頭面，遇動作，使陽氣每世臟理開而受之，風邪入於頭面者，致多汗惡風，病甚則頭痛。又新沐中風則為首風，又新沐未乾不可以臥。頭風重身熱，反得風則頭痛，其臉上口噤，湯炙及至額，甚如風在目，又不甚則風入腦，則腦痛，不可以養生，方飲食如則久成乳病頭風。又云：假令下元虛，頭痛，又云：真不服藥而目瞑，頭上冷而皮膚寒，麻木，痛不能，又風邪入於髓海，不散化為膿，輕則黃膿，虛則取冷，不可附久而頭虛冷，食足寒痰致癡者。治之之法，小兒頭風，止頭頂痛用之，以夫服補陽於內用內托散，加川烏、乾薑，以盾調服附子，止中用頂重汗灸，其會頂天心，左痛灸左，右痛灸右。

訣云頭痛短壽虛頁死手骨風疼川芎為除

○頭痛 門論

夫諸陽之脉皆上行於頭面若人氣血俱虛風邪傷於陽經入於腦中
則令人頭痛也又有手三陽之脉受風寒伏留而不去者名厥頭痛厥
者逆也言其脉厥逆而不順行逆壅而衝於頭故也又有入連在腦痛
甚手足冷者名真頭痛由風寒之氣循風府而入於腦中故云入連在
腦則痛不可忍其真頭痛不可療也又有風熱痰厥氣虛腎厥新沐
之後露卧當風皆令人頭痛也

防風散 治上焦風壅頭痛口乾煩熱
防風二兩 甘菊花二兩 赤茯苓一兩 石膏四兩 葛根一兩
柴胡去苗 黃芩一兩 甘草炙微赤剉 杏仁一兩湯浸去皮尖麩炒微黃
右件藥為散每服四錢以水一中盞入生姜半分煎至五分去滓入竹
瀝半合更煎三二沸不計時候溫服忌炙煿熱麪大蒜等

上清散 出袖珍方 治頭痛眉骨痛眼痛不可忍者

卷之三 二

川芎 鬱金 芍藥 荊芥穗 芒硝各半兩
乳香 沒藥 薄荷葉各一分 腦子半分
右為細末每用一字鼻內搐之

人參順氣散 出袖珍方 治頭疼憎寒壯熱四肢疼痛
麻黃去節兩半 乾葛 甘草炙 白术 人參
桔梗去芦 香白芷各一兩 白姜炮半兩
右為末每服三錢水一盞姜三片葱白一寸同煎連進取汗

摩頂散 出御藥院方 治風毒攻腦疼痛 方見首風類

麝香芽散 治頭疼不已諸藥不効者
茶芽兩 川芎 細辛 荊芥 川烏
甘草 麝香少許
右為粗末每服二錢水一盞半煎至八分去滓溫服食後

神芎丸 出袖珍方 治一切頭痛併牙利咽膈能令痛身時間通暢除痰
飲解諸熱
大黃 黃芩各一兩 黑牽牛 白滑石半四兩 黃連

味川芎 薄荷葉
白 末水丸如菉豆大小温水下十丸至十五丸三服或煉蜜丸亦
可

六神散 治頭痛眼睛痛
雄黃 芎藭 馬牙硝 石膏研 乳香研各
龍腦研少
右為細末每用一字含水搐於鼻中

香芎湯 治頭痛清氣
芎藭二兩 細辛去苗葉一兩 人參一兩半 甘草炙半分
半夏麴 炒用生姜汁
右㕮咀如麻豆每服一錢水一盞入生姜三片薄荷葉同煎至七分
大半且服不拘時
其半夏湯治如頭疼但發熱者不宜服且飲痰厥飲厥腎厥氣厥
厥等正偏頭疼不可忍者只以此藥並如聖餅子服之不拘病因但
每服自能作效可兼治宜老高之人仍服養正丹並用此藥調
乳粉散服 頭疼之法無以此但頭疼多用石膏蓋取
其能治痰飲然恐傷冷故以雄黃乳粉代之腎厥頭疼尤得其宜
以硫黃乳粉硬煉之藥則凡軟石膏硬過為末服之亦驗

袖珍方卷之三 二

生附子 生烏頭 天南星 乾姜 細辛
川芎各一兩 甘草一分
右㕮咀每服四錢水二盞姜十片茶芽少許煎至六分去滓食前服
中脘素寒者不用茶芽 若氣虛盛只用川芎一兩細辛半兩甘草二
錢煎如前法○一方治頭疼以細辛二錢川芎白芷減半為細末
搐入鼻中○一方用高良姜熟煎不見火碾為細末口含冷水以少許
搐入鼻中如此數搐即愈又患頭疼尤能作效○一方治氣虛
人頭疼以附子一隻生去皮切作數片生姜自然汁一大盞浸一宿
火炙乾再浸再炙以汁盡為度高良姜等分為末臘茶
調服名必效散 一方用白芷四錢生烏頭一錢為末每服一字許
茶湯調服自今患根偏疼者先含水次用此藥搐入鼻中其效尤
驗○治肴滋頭重眩暈 用川芎白术生附子各等分官桂甘草減半

每服四錢薑三片煎服名芎术除眩湯一方加茯苓…

川芎羌活散 治頭痛

羌活 四錢 細辛 一兩 川芎 一兩 藁本 一錢 荊子 二兩
白芷 … 防風 四錢

右為麤末每服二兩水煎去滓臨卧溫服

旋覆花散 治風痰上攻頭痛不止

旋覆花 一兩 蔓荊子 一兩 石膏 一兩 枳殼 一兩炒
甘草 炙 甘菊花 一兩

右搗篩為末每服三錢水一中盞煎至六分去滓不拘時候溫服忌熱麪炙煿物

石膏丸 治頭痛不止心神煩悶

石膏 … 馬牙硝 一兩 硫黃 一兩 大伏龍肝 …
雄黃 二兩 硃砂 一兩

右細研入膏… 蒸餅和丸如梧桐子大每服不計時候薄荷茶下五丸

太陽丹 治頭疼傷寒風氣偏正夾腦一切頭疼又治壅痰

浮效方 治腦寒之病皆因邪攻於上焦令人頭痛皆發引痛不能療者

川烏 川芎 白芷 甘草 各一兩 石膏 煅二兩
腦子 半錢

右為末煉蜜為丸如指大以為衣每服一丸薄荷茶下食後日一二服
方每兩作十八丸食後以生薑茶嚼下或五丸以水磨服倉卒

一方 治男子婦人一切頭痛不可忍者

川芎 藿香葉 乾葛 桔梗 各半兩 甘草 一分
軟石膏 一兩煅

右㕮咀每服三錢水一盞半煎至一盞去滓溫服不拘時候二三服立

石膏散 治頭疼不可忍如神效

麻黃 … 石膏 一兩 何首烏 半兩 乾薑 … 川芎 一兩

右為細末每服四錢水一盞生薑三片同煎至七分去滓稍熱服極者三服必效

白芷散 治風熱頭痛

石膏 白芷 各二錢 薄荷葉 芒硝 各半錢 鬱金 一錢

右為極細末口含水搐鼻內搐之

白附散 治諸風頭痛不可忍者

川烏 炮去皮 御米殼 … 甘草 … 桔梗 各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服立効

川芎丸 治頭痛如破

大川烏 … 川白芷 川細辛 大川芎 各一兩

右為末用葱白搗汁為丸如彈子大每服一丸細嚼葱白茶清下

三中丸 治風氣滯不快飲食不消胸膈痞塞痰飲嘔吐如傷寒頭疼胸痞

大附子 炮去皮 木香 … 青皮 大黃 …

右為末糊煮麵糊丸如梧桐子大每服十丸薑湯下頭疼甚則細嚼生葱下

天南星丸 治厥頭痛齒痛骨寒…胃脈皆同腎厥逆頭痛不可忍

硫黃 研 石膏 研 天南星 炮 焰硝 各等分

右為末麵糊丸如梧桐子大每服三十丸空心食前溫酒下

芎香散 治傷風伏涎上攻頭疼偏正夾腦諸風

藿香 … 川烏頭 … 乳香 … 草烏頭 …

右為末每服一字以薄荷茶清調下食後服

硫黃丸 治痰厥腎厥諸般頭痛百藥不効風頭旋太陽穴痛上連風府眉角皆可灸治而愈如痛上穿風府太甚者是為真頭痛藥不可愈腎厥頭痛內腑俱有虛之於外亦有寒痰上是也

硫黃 研 川烏 炮去皮 硃砂 … 天南星 …

右為末薑汁煮麵糊丸如梧桐子大每服十五丸生薑薄荷湯下

方用硫黃 … 石南星 半夏 …

玉真丸 治腎厥頭痛不可忍其脈舉之則弦按之則石堅

生硫黃 … 石膏 … 半夏 … 硝石 …

右為細末研和勻生薑汁煮麵糊為丸如梧桐子大每服四十丸食前

用益胃散。虛者夫右齊肝…一兩，更灸關元百壯。
名中背…大頭痛，使下虛攻…在足少陰巨陽，甚則入腎。
徇蒙招搖，目瞑耳聾，下實上虛，過在足少陽厥陰，甚則入肝。下虛者
腎虛也，故腎厥則頭痛；上虛者肝虛也，故肝虛則頭暈。徇蒙者，如以
物蒙其首，招搖不定，目眩耳聾，皆暈之狀也。故肝厥頭暈，腎厥頭痛
不同如此。治肝厥釣藤散在…

治頭痛發散不止

蘿蔔 … 寒水石 … 硫黃 … 膩粉 …

右先以寒水石內蘿蔔中，用蓋子蓋，却以泥裹，候乾，燒令通赤，取
出，候冷，去蘿蔔，入三味藥同研令勻，以湯浸蒸餅和丸，如菉
豆大，每服不計時候，以新汲水下五丸。

三生丸 … 治痰厥頭痛

半夏 白附子 天南星 各等分

右為細末，生薑自然汁浸蒸餅為丸，如菉豆大，每服四十丸，食後服，
薑湯送下。

太白散 … 治頭痛

石膏 … 川芎 … 甘草 一分

右為細末，茶芽少許，熱湯調二分服，食後。一方無甘草。

備急丸 … 治積聚頭疼

大黃 乾薑 巴豆 去皮心出油

右等分為末，煉蜜丸如豌豆大，米飲下一丸，病人服半丸，茶
豆大，以大便利為度。

楊梅散 … 治頭疼

楊梅青 硝石 把蔥子 各等分

右為細末，搐鼻立效。

治風寒攻注，頭目痛不可忍者

黑豆 … 附子 … 生薑 …

右件藥以酒大盞，煎薑豆至十分，去滓分為二服，每服調附
子末一錢，不計時候服之。

又方 … 治頭痛不止

丁香 分 白芷 … 瓜蒂 …

右除持羅為散，每服半字，搐入鼻中，即差。

治頭痛兒作塞，頭目不利

白僵蚕 分 黃丹 … 硝石 分

右持羅為末，於…以火燒令軟，持旋取汁，先調藥末一錢，
入新汲水調之，如丸三度，丸如菉豆大，每服以冷茶下五丸。

蝎附丸 … 治氣虛頭疼

大附子 … 全蝎 … 鍾乳粉 …

右用附子剜去心，安全蝎在附子內，却以餘附為末，同鍾乳粉、
麵少許，如作劑，包裹煨令熟，並為細末，蔥涎為丸，如梧子
大，每服七十丸，空心食前，同椒鹽湯下，作散，蔥茶湯下。

又方 宣癎散

川椒 … 丁香 … 山梔子 …

右為細末，用一字，鼻內搐之。

葫蘆芭散 … 治氣攻頭痛如破

葫蘆芭 炒 乾薑 … 三稜 …

右為末，每服二錢，溫生薑湯或酒調下，治氣攻頭痛如破
者，或瘴瘧瘥後，頭痛呼號，服之即愈。一方用生薑。

治一切頭疼

防風 川芎 各二兩 附子 …

右為末，每服…荊芥薄荷茶調下。

治丈夫婦人風虛頭疼，氣壅頭疼，婦人胎前產後傷風疼，一
切頭疼，並皆治之。

茵陳 … 麻黃 … 石膏 …

右為末，每服一錢，臘茶調下，食後，服畢卻臥，稍安特。

細辛散 … 治頭疼眼睛疼

治頭痛不可忍方

童子小便 盞 豉心 …

右件藥同煎至五分，去滓溫服。

恒山散 … 治頭痛往來寒熱，心肺痰壅，宜服。

恒山（[illegible]）　[illegible]一兩
右件藥相和研令勻每服以溫水調下一錢良久當吐如吐未
快即再服之（一方用溫湯調下）
〔治頭痛不宜服〕（[illegible]）
伏龍肝一兩　附子一兩（炮裂去皮臍）
右搗羅爲散每服以冷水調下二錢一方溫酒調下治齒亦痛
又方（[illegible]）
川烏頭（炮裂去皮臍搗令碎）　生薑一分切
右以水一中盞煎至五分去滓入蜜半合相和服之
又方（出聖惠方）
明礬半兩　硫黃一分（切）
右件藥同研令細以軟飯和丸如梧桐子大當頭痛時以冷
水下五丸良久服之
治頭痛鼻塞頭目不利宜服（出聖惠方）
牛酥一分　川朴硝一兩（細研）

右藥同研令勻頻用少許點鼻內瘥
〔又方〕（出聖惠方）
附子（炮去皮臍）　地龍一分
右搗爲末每用一字以生薑汁調塗兩眼角及頂上（一方治偏頭痛）
〔又方〕（出聖惠方）
龍腦半分　鉛粉一兩
右細研令勻每於食後以新汲水調下半錢
〔茸根丸〕（出經驗良方）治頭疼根情紅刃剉
大川烏（火炮去皮）
全蝎（炒去毒等分）
右爲末煎糊十丸每服十五丸薄荷茶清食後下
〔神砂丸〕（出□方）治頭疼及腦風
硫黃　鹽（[illegible]）
右爲末水調生麪爲丸如梧桐子大每服十五丸用薄荷茶
食前下一劑亦得
〔附子方〕（出千金方）治頭痛

附子（炮）　石膏（[illegible]）
右爲末入腦麝少許茶酒下半錢
〔附芎散〕（[illegible]）治風虛頭疼
大川芎（[illegible]）　大附子一兩（和皮生用）
右以水和附子末如麪劑裹芎作罨如附子末少入少麪裹
[illegible]
服半錢蔥茶調下不拘時候
〔芎术湯〕（[illegible]）[illegible]止鼻塞聲重
川芎（[illegible]）　白术（[illegible]）
右爲麤末每服三錢水一盞生薑五片煎至七分去滓溫服
或爲細末白湯點亦得
芎犀散（[illegible]頭痛及[illegible]頭風痛甚者）
川芎　天台烏藥（[illegible]）
右等分爲末每服二錢臘茶清調服或用蔥茶湯調服食後

〔止痛太陽丹〕（出□□方）
川芎　天南星各等分
右爲細末用連鬚蔥白搗爛調藥末貼於太陽痛處
〔治大頭上頭痛不可忍者〕
萆麻子　乳香
右搗如泥以太上如痛定急去頂上餅開髮出氣即去藥
〔治頭痛不可忍方〕
右用蒜一顆去皮研取自然汁令病人仰臥垂頭以銅筯點少
許墮入鼻中急令搐入腦眼中淚出瘥
〔搐鼻方〕治熱病頭疼發熱足
用栝樓一枚大者取穰細剉置瓷碗中用熱湯一盞沃之蓋
却良久去滓不計時候頓服
〔蜂房方〕治頭偏熱以致小便赤少
用蜂房一分炙水一升煎取八合分溫服當利小便下石萎
小便出

又方 凡欲出路時 荊芥一兩 水五升煮取二升 入藥令人內服斛子三枚攪勻
更煮 尋飲之
拾遺方 出王氏集驗方 治肝氣頭痛 方見火門 解風門
治人病後虛頭痛
用四柱散 荷煎 熱於入 生臈茶一錢 服之良甚
立効散 出事 治風虛頭痛
用上合本大調川芎 置於盞內 瓦上以熱 熱作二次 炒煙盡
之勝 乾用乳鉢研細 每服一字 別入好茶末 食後熟服
治頭痛 出肘後方
用水調決明子 貼太陽穴 方作枕 去頭風明目
蒼根方 治熱氣頭痛壯熱
右用生蒼根 淨洗 擣取汁一大盞 豉一合 煎至六分 去滓 不計時候
分作二服 汗出即差 未汗再服 若心熱 加梔子入豉 回葱 去滓服
苦葉方 出肘後方 治卒頭痛如破 非中冷 非中風 其病是胸膈有痰

厥氣上衝所致 名為厥頭痛 吐之即差
右以苦葉作飲 以二三升 適冷暖飲 一二升 須臾吐 吐畢又飲 能
如此數過 劇者 須吐膽汁 乃止 不損人 待吐即差
治頭痛不可忍者 是風痰所致
用梔子末 和蜜濃傅舌上 吐即止 神効
一方 出肘後方 治頭疼欲死
右用硝石末 吹鼻內愈
當歸方 出肘後方 治頭痛欲裂
右用當歸一兩 酒一升 煮取六合 飲至再服
治偏頭不日近太陽分痛
右用薄荷共磨 火紙貼太陽上
芎辛丸 出聖惠方 治頭痛面赤 煩悶咽乾 上膈風痰 頭目昏
百節疼痛 背項拘急
川芎 防風 殭蠶 獨活 各二兩 桔梗 三兩
天麻 四兩 細辛 白附子 羌活 甘草 各半兩

薄荷 荊芥 各一兩
右為細末 煉蜜和丸 如彈子大 每服 細嚼 茶酒任下 食後
龍腦丸 治頭痛頭旋眼暗 及頭目昏悶 風等
龍腦 一錢 丹砂 一兩 馬牙硝 一分 麝香 研 各一分
右同研令細 於猪肉臘內 用牛膽角 十入藥中 旋和成丸 如黑豆
大 以牛合盛 每用一粒 以蘆管吹入鼻中 以手小指送近上 兩鼻
背如此 夫枕 如別少時 候藥落入腦 涎唾從喉內出 其病立瘥
治頭或偏或一邊痛不可忍 出千金方
苦參 半夏 各一分 桂心 二分
右為細散 以米醋調如糊 塗紙帛上 當痛處貼之 神効
石膏湯 治頭痛
石膏 二兩 甘草 炙一兩 天麻 藿香葉 各一兩
右麁搗篩 每服三錢 水一盞 入臘茶半錢 煎至七分 去滓溫服
不拘時
神朱石膏丸 治頭痛

石膏 研 川芎 二兩 龍腦 少許 研
右為細末 用麪糊 丸如櫻桃大 丹砂為衣 細嚼一丸 茶酒任下 食
後服
烏星膏 出肘後方 治太陽穴痛不可忍
川烏 南星 楚心
右為末 酒調塗傅痛處
通頂散 治頭痛 鼻塞胸悶
藥以薑 研半兩 黃連 各一分
右為散 每用少許 嗅入鼻中
治卒頭痛如破
右以鹽湯吐 不吐 擣鹽 去生熟湯 先作一升湯 使服 以一升 又食
合鹽 以半湯走之 如木出盡 更服二合 湯一二升良
麝香散 治頭痛不可忍 吹鼻
右用藜蘆 和州者一莖 暴乾 擣為散 入麝香麻
子少許 研令 吹鼻中

龍珠丸 治頭痛目暈 又療經驗風寒

右用長蚯蚓不拘多少 五月五日取 以龍腦麝香相和研勻 丸如麻子大 每用以生薑汁令鼻中吸送各內一丸立愈

白芷捻方

用香白芷為末 將生葱自然汁調敷患處 如用手末 候

頭飲少熱粥 待取汗出即愈

導引法

長坐 以兩手拓頤向上極勢 十向後長舒急努 四方頭手掌 特拘極勢 左右換手皆然 拓頤手兩向共頭欹 [illegible] 身三 十去骨髓頭風 [illegible] 又云 解髮東向坐 握固不息一通 舉手左右 導引 手掩兩耳 治頭風 令髮不白 以手複捋五通 脈也 又云 熱食 枕手臥 久成頭風目赤 云端坐 左右 [illegible] 頭 [illegible] 日以鼻內氣 徐吐出 [illegible] 二十過 又云 欲治頭痛 [illegible] 自 [illegible] 息 [illegible] 以鼻內徐吐 [illegible] 氣令鼻極 [illegible] 不息 汗出乃止 又不 [illegible] 兩手 頭後極勢 振搖二 七 [illegible] 手掌 [illegible] 安之 頭欲得向後仰之 特一努 欲得 [illegible]

四角急救之三 去頭風 [illegible]

石膏散 治頭疼不可忍

麻黄去節 石膏各二兩 何首烏半兩 乾葛七錢半

右為末 每服三錢 生薑三片 水一盞半 煎 稍熱服

一字金散 出瑞竹堂方 治一切頭疼 夫為風邪 若風熱痰作不已

川芎 白芷 藿香 防風

人參各半兩 雄黃三錢研 地龍去土 甘草各一分 [illegible] 砂分

細末 每服半錢 茶清調下 食後服 立効 若風寒客於頭中 偏痛無時 久久牽引兩目 遂致失明 一用白附子一兩 炮 麻黄不去節 川烏 炮去皮尖 天南星各半兩 全蝎五個 去毒 乾薑 炮 硃砂 水飛 麝香各一兩 為細末 酒調一字服之 去枕少臥 若偏頭風痛不可忍 用細辛一兩 [illegible] 為細末 每服用一字 如左邊痛搐右邊 右邊痛搐左鼻 瘥

選奇湯 治眉骨痛不可忍 大抵元氣 [illegible]

羌活 [illegible] 防風 [illegible] 甘草根 [illegible] 黄芩 [illegible]

右㕮咀 每服三錢 水一盞 煎至一盞 去滓 稍熱食後 時時服之

又方 石膏 [illegible] 炭 取石膏為末 食後茶調 [illegible]

太陽頭痛 惡風寒 川芎 [illegible]

少陽頭痛 脈弦細 往來寒熱 [illegible] 柴胡

陽明頭痛 自汗 發熱惡寒 [illegible] 白芷

太陰頭痛 必有痰 體重或腹痛 為痰癖 [illegible] 半夏

少陰頭痛 手三部三陽經不流行 而足寒氣逆 為寒厥頭痛 [illegible]

細辛

厥陰頭痛 項痛 其脈浮微 [illegible] 又大陽病 痰 [illegible]

諸血虛頭痛 [illegible] 川芎

諸氣虛頭痛 [illegible] 黄耆

諸氣血俱虛頭痛 [illegible] 黄耆

白頭痛 偏風 偏正夾腦 太陽穴痛 及延夜不止 [illegible]

白芷 細辛 川芎 龍腦 牛黄

雄黄 [illegible]

右各為末 用少許搐鼻 大解其毒

河間星[illegible]丹 [illegible] 治偏正頭痛

蓽撥 炒 [illegible] 蒴藋 [illegible]

巴戟 [illegible] 木香 破故紙 炒 楝子

桂 [illegible] 沉香 [illegible]

右為末 同敬子大 酒糊丸如梧桐子大 陰乾 每服 [illegible]

壁每服 [illegible] 空心 薑鹽湯下 一方 有沸湯 化石

麻黄吳茱萸湯 [illegible] 治頭痛 胸中痛 食減少 咽嗌不利 [illegible]

麻黄 [illegible] 吳茱萸 [illegible] 黄芩 [illegible] 川芎 [illegible] 羌活 [illegible]

蔓荊子 [illegible] 細辛 [illegible] 藁本 [illegible] 柴胡 [illegible] 黄耆 [illegible]

蒼朮 [illegible] 黄連 [illegible] 半夏 [illegible] 黄蘗 [illegible] 升麻 [illegible]

紅花少許 當歸 [illegible]

右件㕮咀 都一服 水二盞 煎至一盞 去滓 稍熱 食後服

太陽經嚏藥 出試効方

防風二分 羌活 [illegible] 紅豆 [illegible]

右為細末 鼻內搐之

紅豆散（治頭重如山此濕氣在頭也）

麻黃 苦丁香 紅豆 羌活根 連翹各三分

右五味為細末鼻內搐之神効

參謀柏德仲年六十一歲壬子歲二月間患頭痛不可忍晝夜不得眠郎中曹通甫邀往視之其人云近往燕京患頭痛[illegible]頭痛晝作復醉之干出痛轉加復併一二服痛尤甚遂還鄉已前證晝同對今痛甚不得安卧惡風寒不喜飲食今其脈弦細而微氣短促懶語言內經曰春氣在頭年高氣弱清氣不能上升頭面故脈弦細本無表邪發汗數四清陽之氣愈虧損不能上榮亦不得外固所以頭苦痛惡風寒不喜飲食氣短弱宜升陽補氣頭痛自愈名之曰

順氣和中湯（[illegible]）

黃芪 人參 白朮五分 當歸五分

白芍藥 炙甘草 升麻 柴胡 川芎二分

細辛一分 蔓荊子二分

經曰陽氣者衛外而為固也今年高氣弱又加發汗衛外之氣愈

損故以黃芪甘溫補衛實表為君人參甘溫當歸辛溫補氣補血芍藥酸寒收衛氣為臣白朮陳皮炙甘草苦甘溫養胃氣發陽氣上實皮毛肥腠理為佐柴胡升麻苦平引少陽陽明之氣上升通百脈灌溉周身者也川芎蔓荊子細辛辛溫體輕浮清利空竅為使也

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去滓溫服食後服之一服減半再服而愈明年春赴○召至六盤山[illegible]郎中以古風贈云東垣李明之嘗以醫鳴[illegible]得與試為號黃金[illegible]一燈[illegible]內經黃帝[illegible]伯實曰[illegible]不易信半世豈但三折肱所長用藥有古意曰方[illegible]白為性不閑予延同居且同病一下一千俱得其卒乃知古人一熟一方後世以方合證此理殊未明公心書具者[illegible]以[illegible]已[illegible]生歡恨卧黃粱門生[illegible]人[illegible]相一旦去已[illegible]非輕建年應召天策府塞北草木皆欣榮好散[illegible]

[illegible]指名

大柴胡湯（[illegible]頭痛）

柴胡 黃芩 川芎 甘草 半夏

大黃 [illegible]

右為粗末每服五錢水二盞生薑十片棗一枚同煎一盞去滓溫服

苦茶散（[illegible]）治頭痛

苦茶一合用水三盞煎一盞半熱服即愈

草烏頭湯（[illegible]）治頭痛

茶芽 細辛 草烏頭

右為粗末每服三錢水二盞煎一盞去滓溫服

玉壺丸（[illegible]）治痰厥頭痛

雄黃 蒼朮 丹砂 巴豆

礬石 八角附子

右將研勻以清明吉日煉蜜和丸如豆大每服一粒米飲下臨卧服之上以熱物投之則吐痰在下即利

浴根本一服未知每服以知為度

[illegible]湯（[illegible]治[illegible]頭痛）

大附子 生薑

右咬咀以水一升煮[illegible]分三服

[illegible]湯（[illegible]）[illegible]溫官人年小時氣弱常於氣海[illegible]之鄭大的五七千壯至年老[illegible]頭痛雖各大大寒[illegible]痛則愈[illegible]短又其痛復作五七年不愈皆灸之過也

羌活根 防風 柴胡根 細辛

川芎二分 升麻 荊芥穗 蔓荊子 黃連

黃芩 黃芪 黃柏 知母 炙甘草

蒼朮二分 生地黃 當歸身 紅花 甘草根

右件剉如麻豆大分作二服每服水二盞煎至一盞去滓稍熱[illegible]

後

補氣湯（[illegible]）服前藥之後服此藥

黃芪 炙甘草 當歸身 升麻 柴胡

紅花

右件剉如麻豆大每服秤五錢水二大盞煎至一盞去滓稍熱服[illegible]

前

白芷散 治頭疼及目睛疼
白芷一錢 生烏頭一錢
右為末，每服一字，茶調服。有人患眼睛疼者，先含水，次用此藥搐入鼻中，其效尤速。
細辛散 治偏頭痛久不差
烏梅 蒼朮 川芎 北細辛 甘草各半兩
右細末，石膏半斤研細，入甘鍋子內火煅通紅，去石膏，滴石膏水和丸彈子大，茶清任下一丸，無時候。
葛根葱白湯 治頭痛不止
葛根 白芍藥 知母各半兩 川芎 生薑各一兩
葱白一握
右剉散，水三升，煎取一升半，去滓，每服一盞半，熱服。
參蘇飲 治痰飲停積，發熱咳嗽
木香 枳殼 桔梗 甘草炙 陳皮去白
紫蘇葉 乾葛 半夏製 前胡 人參
茯苓各半兩
㕮咀，薑七片，棗一枚，煎服。氣盛者去木香。以參蘇飲對四物湯，名茯苓補心湯，治咳嗽有血。大方人治婦人妊娠惡阻。
升麻葛根湯 治頭痛發熱，惡寒，身體痛
升麻 白芍藥 葛根 甘草各等分
㕮咀，水煎，溫服。或鄉中有瘟疫，宜服。內用白芍藥甚穩。
金沸草散 治頭目昏疼，發熱惡寒，清涕，咳嗽痰涎
荊芥穗四兩 半夏製 甘草各一兩 麻黃 前胡
旋覆花各三兩 赤芍藥一兩
㕮咀，薑棗煎，熱服。
如頭風疼痛作苦，及偏正頭疼，宜川芎一兩，香附二兩，為末，茶清調。
下出如宜方
予瞻此劑公治頭痛矣 出如宜方
朝聞荊公云：僕平昔苦頭痛，有道人教云：取生萊菔汁一蜆殼許，注鼻中，
中然時立效。累驗如神，以此法治人，不可勝數。

茶附首 治頭痛大
予與濮陽先生... 患頭痛... 三人並頭痛，悴
道... 箱中... 大烏頭二枚，去皮... 細切焙乾為末，以好
細茶... 煎各一服，... 一服先並加... 吐逆故也
痰厥頭痛... 項痛
桂 附子 半夏
右以薑汁調... 服之
川芎茶調 治氣虛頭疼
右用... 川芎半兩為末，每服二錢，... 調下，甚捷。曾有鄉人產後
頭痛，一服愈。
... 散 治三陽伏留風邪，頭疼不可忍
附子 白附子 川烏頭 當歸
天竺黃 天麻 肉桂 朱砂 山藥
腦子 麝香
右件為細末，每服一錢，薄荷茶調下，不拘時候。
更生散 治... 頭痛... 頭目昏，項背拘急
附子 天南星
川芎 桂 生腦子 朱砂 麝香 羌活
白僵蠶
右件為細末，每服一錢，溫酒調下，茶調亦得，食後。
玉真丸 治腎厥頭痛
石膏 硫黃 半夏 硝石
右為末，研勻，薑汁糊為丸如梧子大，每服三十粒，食前生薑湯下。
中書左丞張公，年六十七，宿有時毒，至元戊辰春因酒再發，頭面赤
腫而痛，耳前後尤甚，胸中煩悶，咽嗌不利，身半已下皆寒，足胻尤甚，由
是以床坑相接，身半已上臥於床，身半之下臥於坑，飲食減少，精神困
弱... 脈... 數按之弦細，上熱下寒明矣。內經云：熱勝則腫。又云：春氣者病在
頭。難經云：蓄則腫熱，砭射之也。... 取其易散故也。遂於腫上約五十餘刺，
其血紫黑，如露珠之狀，頃時腫痛消散。又於氣海中大艾炷灸百壯，
乃助下焦陽虛，退其陰寒，次於三里二穴各灸三七壯，治足胻冷，亦

引導熱氣下行故也遂恐方云熱者寒之然而有高下治有遠近無越其制度者以黃芩黃連皆寒而製炒亦爲因用以瀉其上熱桔梗甘草辛甘溫上升佐諸苦藥以治其熱柴胡亦辛苦平味之薄者陰中之陽散發上熱以爲臣連翹苦辛平以散結消腫當歸身辛溫和血止痛大黃苦寒荊芥性上行至巔頂熱而下以爲使也投劑之後腫痛全減大便利再服減大黃頃言語節飲食不旬日良愈

既濟解毒湯 治上熱頭目赤腫而痛胸膈煩悶不得安臥身半已下皆寒足䯒尤甚大便微秘

桔梗　炙甘草　黃芩 酒製　黃連 酒製　大黃 酒蒸 各二錢

柴胡 去苗　升麻 上各　當歸身 酒洗　連翹 一錢

右件剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去滓食後溫服忌酒麪大料物之類及生冷硬物

治頭痛 出本草

以石膏和葱煎茶服

治卒頭痛 出本草

以皂角末吹入鼻中令嚏即止

治人初得頭痛 出本草

以人溺數升飲之亦多愈 合葱豉作湯彌佳

治熱煩及結頭痛明目鎮心 出本草

用或鹽水研服之

治頭疾利丈夫助陰力 出本草

用蔓荊子爲末和麪作餅食之又熟煮和米煮爲粥或爲粉食之

治頭重心煩背膊勞悶 出本草

以苦瓠枝食之

治風頭痛 出本草

以小豆花於豉中煮五味調和作羹食之

石膏散 出醫林 治頭疼

川芎　石膏 研者　白芷

右各等分爲細末每服四錢茶清調下

偏頭痛

論

夫偏頭痛之狀由風邪客於陽經其經偏虛者邪氣湊於一邊痛連額角故謂之偏頭痛也夫頭偏痛者由人氣血俱虛客風入於諸陽之經偏傷於腦中故也又有因新沐之後露臥當風或讀書用心勞細視經絡虛損風邪入於肝而引目系急故令頭偏痛也

方

芎犀丸 治偏頭痛一邊鼻塞不聞香臭常流清涕或作臭氣一陣加芎犀等偏服一劑服此不十數服或作嚏突出一鋌稠膿即愈

石膏 四兩　生龍腦 別研　朱砂 水飛　生犀角 兩

人參 上各　茯苓 去皮　川芎 四兩　阿膠 炒　細辛 去苗 兩

麥門冬 去心　甘草 炙　山梔子 一兩

右除別研藥並入重研爲末煉蜜丸每服一丸至二丸細嚼茶酒任下

全蝎服

拈痛 治偏頭痛服藥

薄荷　盆硝　石膏

乳香　華細辛　貫芎 各等分

右爲細末每年夕三時搐之

天南星散 治偏頭疼

南星 生　乾薑 二錢　附子 三錢　麻黃 一兩　全蝎 二箇

硃砂 一錢　麝香 少

右爲細末滴水調服於後腦用食後茶半盞任下

天南星湯 治偏頭

天南星　白芷　芎藭 一兩

防風　川芎　自然銅

右除二味不用外餘並研爲細散每服半錢已服茶清少許調下作一口呷盡分作三次服

四神散 治偏頭痛

地龍　乾蝎　蔓荊子　龍腦

右除龍腦外餘並爲細散再研勻每用半字許先滿口含水男左女右搐半字入鼻內隨痛處用之久痛定

川芎散 治偏頭疼神效

甘菊花 石膏 川芎 白殭蠶

右為細末每服三錢茶清調下一日三服忌熱物及猪肉麵

細辛散 治偏頭疼連牙齒風痛不可忍

細辛 夏枯草 華撥 高良薑

右為細散每用少許隨痛左右搐入鼻內如牙疼用擦須開口流涎

出得青涎盡以冷水漱齒愈之

神聖散 治偏頭痛不可忍

治頭偏痛方

蚯蚓 乳香 硇砂

右以蚯蚓研取汁都和丸如小豆大頭痛發時左邊痛內在左鼻中右

邊痛內在右鼻中立有黃水為效

白雪丹 治頭偏痛

硝石一兩 硫黃一兩 白礬一兩

右以固濟了瓶子一所先下硝石次下硫黃後下白礬其瓶蓋上留一

小竅子先掘一地坑內安著水瓶子一所坐令安穩後將藥瓶坐於瓶上用

泥固濟之以炭火逼之候見中間藥煙出盡即却泥之候用火煅令通

赤然後開瓶收出藥於紙上攤開于地上以盆合之一日出火

毒了細研用黃豆粉以水調和丸如梧桐子大每服食後以冷水下五丸

丁香散 治偏頭痛

丁香 蜂針 麝香

右同研勻以紙撚糝藥隨痛左右搐之

烏頭散 治久患偏頭痛

草烏頭尖 赤小豆 麝香

右除麝香外為細末研勻每服半錢用薄荷茶清入麝香調下更以搐

痛一邊鼻內搐藥少許

治偏頭痛方

旋覆花 蔓荊子 荊芥

右為細散欲發時以蔥湯調下兩錢良久立出汗立差

生薑汁 [illegible] 麝香

右同研令細每服用少許吹入鼻中即差

烏金丸 治頭偏痛

皂莢 石膏

右都研令勻以軟飯和丸如梧桐子大每服以荊芥湯下十五丸

又方

硇砂 [illegible]

右都搗和為丸如皂莢子大以綿裹一丸出一頭頭左邊痛

於左邊鼻中如右邊痛即內右邊鼻中差

治夾腦風及頭偏痛方

蔓荊子 川大黃

右為細散每服少許吹鼻中後有黃水出其疾永差如有膿

以鵝翎刷血之亦効

治頭偏痛不可忍方

草麻子 棗

右都搗令熟塗在紙上用筋一隻卷之去筋內在鼻中良

久取下清涕

治偏頭疼方

苦葫蘆子 鬱金

右為細末用白鵝子棗藥末一錢於新汲水內浸滿瀉向

患處鼻中得黃水出差

硫黃丸 治頭痛并中暑

硫黃 硝石

右同研入銚子內溶作汁候冷取出更入石膏末一兩又同研令細

用軟粟米飯和丸如梧桐子大每服以鹽水下五丸頻服之差一

方空心臘茶下一丸如神[illegible]

暑者米水下[illegible]以艾湯下

通頂散 治頭偏痛

硝石 滑石

右於銚子內同研令黃色候冷細研為末每用少許吹入鼻中差

立効散 治偏頭痛
地龍 寒水石
右同研勻每服半錢㧞紙上作紙燃分分上燃酒向左右熏鼻中
乳香散 治偏頭痛不可忍
乳香 高良薑
右爲大上燒煙薰鼻隨痛左右用之
至靈散 治偏頭痛
治偏頭痛連睛痛
石膏 黍黏子
右爲末茶酒調下食前
治婦人偏頭疼
右用香附子爲末每服二錢臘茶調下食後日三五服一用艾茶
神妙方 治偏頭風疼
右用生蘿蔔汁仰卧注鼻中左痛注右右痛注左若頭疼二兩鼻皆
數十年病皆能愈
一方 治偏頭風

右用白芥子一兩研細醋調攤紙上貼於痛處
仙靈皮浸酒方 治偏頭風手足不遂皮膚不仁宜服
右用仙靈皮一斤好者細剉以生絹袋盛於不津器中用無灰酒二斗
浸之以厚紙重重密封不通氣春夏三日秋冬五日後旋開每日
性煖飲之常令醺醺不得大醉若酒盡再合服之無不効驗合時切
忌雞犬見之
又方 治偏頭疼
右用京芎細剉酒浸服之佳一方川芎茶調下甚捷
華陰方 治偏頭痛及風
右以華撥爲細末每用一字先令病人滿口含温水隨病左右搐入
鼻中效左邊疼令左鼻吸一字右邊疼令右鼻一字其効如
治偏頭疼方
右以芫花不以多少以醋煮乾搗羅爲末或左邊疼則於
左鼻吸藥或右邊痛則於右鼻吸藥一字入藥時先含水一口防藥

入喉内喉中吐涎出即瘥
川芎散 治風盛膈壅鼻塞清涕熱氣攻眼下淚多眵齒間緊急作
偏頭疼
川芎 柴胡 半夏麴 甘草 甘菊
細辛 人參 前胡 防風
右爲麁末每服四錢水一盞生薑四片薄荷五葉同煎至七分去滓
温服
搐鼻散 治偏頭疼
一字散 治偏頭疼不可忍者
乳香 延胡索 當研 川芎
蓽撥
右件爲細末每用少許左疼搐左鼻右疼搐右鼻
細辛散 治偏頭痛
細辛 川芎 柴胡一兩 炒黄芩 黄芩
生黄芩 瓜粉 甘草 黄連 芍藥

右麁散每服二錢或三錢水一大盞生薑三片煎至一盞取清食後服之或
發而不治
有婦人偏頭疼一邊鼻塞不聞香臭常流清涕或作臭氣一陣
等眼目偏諸醫數服局方芎犀元不十數服忽作
嚏涕突出一錠稠膿疾
知偏頭疼宜芎辛爲下右搐右左搐左仍先含冷水方搐藥宜
大芎辛湯小芎辛湯如聖餅子川芎茶調散勤勤令服之
如聖散 治服同偏頭疼頭風
麻黄 盆硝 麝香 腦子
右件爲細末搐之神効
通關散 治上盛止偏頭疼進食藿香散方
藿香 人參 桔梗 枳殼
蔓荊子 旋覆花 白朮
半夏 青橘皮 木通草 柴胡
麻黄 甘草 桑皮

右件藥並剉焙乾杵羅爲麄散每服一錢水一盞生薑三片煎至
八分去滓熱服要煎二度服大腑秘則加郁李仁十五枚搗碎同煎
取食後服

偏正頭痛 附論

夫頭圓象天故居人身之上爲諸陽之會頭疼之疾非止一端如痛引
腦巔陷至泥丸宮者是爲真頭痛旦發夕死夕發旦死非藥物之可療
今人之體氣虛弱者或爲風寒之氣所侵邪正相搏伏而不散發爲偏
正頭疼其脉多浮緊者是也

方

川烏散 治頭風偏正頭疼

川芎 細辛 羌活 槐花 甘草
香附子 石膏 荊芥穗 薄荷葉 菊花
山茵蔯 藁本 防風

右爲細末每服一錢食後茶調下一日三服忌發風物一方無藁本

白芷丸

白芷 石膏 乾薑 細辛 五味子
厚朴 肉桂 防風 茯苓 甘草
陳皮 白朮

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服三十丸不拘時清米飲下

天麻散 專治偏正頭疼

白附子 香白芷 荊芥穗 石膏 川芎
天麻 薄荷葉 防風 蒼朮 兩頭尖

右爲細末每服一錢臨卧清茶調服忌食熱物

千金散 治偏正頭疼

川芎 細辛 防風 甘菊花 甘草
石菖蒲 青藤 全蝎 細茶芽 藁本

右以㕮咀每服五錢水一盞半葱白一根同煎至七分去滓食後臨卧
服滓再煎一方如眼目疼者加貫仲一兩

玉眞散 專治偏正頭痛

木香 川芎 天麻 麻黃
防風 細辛 甘草 荊芥穗

右爲細末每服二三錢食後熱茶清調下

川芎散 治偏正頭痛傷風冷打撲所傷致傷風頭面虛腫嘔逆惡
心

川烏 草烏 當歸葉 川芎 甘草
白芷 川蝎 雄黃

右爲細末每服一錢入葱茶半錢百沸湯點起熱服之如被傷風每
用大半錢以葱白三寸細嚼熱酒大半盞調服甚者女人行五里

通天散 附 治偏正頭疼并天腦風壅滯明目

赤芍藥 川芎 黃連 玄胡索 黃芩
草烏頭 當歸 乳香

右爲細末每用少許抄于鼻孔之中

清空膏 治偏正頭痛年深不愈者善療風濕熱頭上壅及目
及腦痛不止

羌活 防風 黃連 柴胡 甘草
川芎 黃芩

右爲細末每服二錢匙入盞內入茶少許湯調如膏抹在口內少用白
湯送下臨卧如苦頭痛每服可加細辛二錢如太陰脉緩有痰名
曰痰厥頭痛去羌活防風川芎甘草加半夏一兩半如偏頭痛服之
不愈減羌活防風川芎一半加柴胡一倍如發熱惡熱而渴此陽明
頭痛只於白虎湯中加好吉香白芷

茶調散

川芎 荊芥 細辛 生甘草 薄荷葉
羌活 甘草

右爲細末食後茶清調下一錢或半錢二錢亦可

芎黃湯 治偏正頭疼外傷風邪眼多淚多嚏

川芎 雄黃 細辛 荊芥穗 全蝎

大川烏 [illegible]

右爲細末每服半錢茶少許白湯點服不拘時候

羌活湯 治偏正頭疼痛 [illegible]

麻黃 [illegible] 人參 陳皮 甘草 蒼术 [illegible]

右㕮咀每服五錢生薑七片煎至七分去滓溫服食遠服

白龍丸 治一切風偏正頭疼鼻塞腦悶大解傷寒及頭風遍身疼癢手足頑麻

川芎 藁本 細辛 白芷 甘草

右等分爲末每四兩入煆了石膏末一斤水搜爲丸每一兩作八丸每服一丸食後薄荷茶嚼下如牙痛一丸分作三服乾揩後用薑湯嚼下一丸一方有陳皮

通頂散

[illegible]

川烏 白附子 石膏 半夏 南星

右爲細末每服二錢水一盞薑三片薄荷葉白梅一箇煎至七分食後臨卧服 [illegible]

半字散

川烏 草烏 川芎 石膏 荊芥

右爲細末每服半錢茶調服忌食熱物

石膏丸 治偏正頭疼噁心嘔逆

石膏 川烏 硝石 玄精石

右爲末薑汁丸如梧子大每服十五丸荊芥湯下食後服

乳香散 治偏正頭疼牽引目眶眼睛疼

乳香 盆硝 青黛 加蝎子

右研勻疼左邊患者入右鼻搐一字

真珠散 治偏正頭風頭疼

盆硝 白滑石 乳香 片腦

右各研爲細末再同研細每用一字口噙水鼻內搐之

神効散 治偏正頭疼

川芎 杜丹皮 滑石 木殼

右㕮咀每服五錢生薑一兩水一盞半煎至七分去滓臨卧溫服

仙刀一字散

生烏頭 [illegible] 細辛

蟬退 川芎

右爲細末每服一字茶清調下

香茶散 治偏正頭疼不思

末 柴胡 桔梗 甘草

右㕮咀每服五錢水一盞煎至七分入[illegible]去滓食後服若是往來痛加生薑[illegible]服藥[illegible]後服

川芎散

川芎 白附子 牛蒡 荊芥

右爲細末每服二錢臘茶調下

治偏正頭疼

豬牙皂角 香白芷 白附子

右爲末每服二錢食後臘茶清調下右疼右側卧左疼左側卧

內遶者痛仰卧

又方

硝石 青黛 地龍皮

右爲末嗃鼻內一方石膏龍骨每用半字以下含水滿口嗃藥鼻中如不痛左痛右嗃右痛左嗃兩邊痛左右俱嗃立止

[illegible]散 治偏正頭疼

[illegible] 赤小豆 大力子

右爲細末每服三錢食後溫酒茶清任下忌動風發熱之食

石膏散 治偏正頭痛

石膏 芍藥 川芎

右各生用爲細末每服一錢茶清調下併進三服

神効[illegible]散 治偏正頭疼[illegible]頭項[illegible]者

星烏石膏散

南星　草烏　石膏 [illegible]

右為細末每服一錢[illegible]三片[illegible]七葉烏梅一箇水一盞煎至半盞

如頭風註服[illegible]此藥更服[illegible]烏梅服之

香芎散 治男子婦人偏正頭疼[illegible]太陽穴痛[illegible]不可

生川烏 [illegible]　生南星 [illegible]

右為細末每用酒調[illegible]傷風[illegible]茶清[illegible]下酒調[illegible]

上不可服

龍香散 治偏正頭疼不可忍

地龍 [illegible]　乳香 [illegible]

右為細末每用一錢摻在紙上作紙撚子燈上燒之以煙出鼻內聞煙氣

聖金散 [illegible] 治偏正頭疼

[illegible]　細辛 [illegible]

右等分為末每用一字左疼搐右鼻右痛搐左鼻口中噙水搐之一

方治偏頭疼名透頂散一方如左痛搐右鼻右痛搐左鼻名透頂散

[illegible]散 [illegible] 治風寒濕注陽經以治偏正頭疼大年不愈者藥

最有神効

醫方類聚卷之七十八　十八

附子 [illegible]

[illegible]

右為末每服二錢臘茶清調下食後連進二服定驗如少時

點頭散 [illegible] 治偏正頭痛

川芎 二兩　香附子 [illegible]

右為細末每服一錢好茶清調下常服可除根一方等分空心熱酒調

下明目兼治婦人血風

治偏正頭疼

川芎　盆硝 [illegible]

右為末用一字搐入鼻中立効

一方 治偏正頭疼

右用[illegible]一兩去[illegible]以白麵和貼紙上貼痛處就兩旁之

白殭蠶方 治偏正頭疼斯夾腦風連兩太陽穴疼痛

右用白殭蠶細研為末用葱茶調服方寸匕一方白[illegible]頭痛熱水調下

大附散 [illegible]治元氣虛壅上攻偏正頭疼不可忍欲倒卓者

右用大附子一枚炮去皮臍為末[illegible]糊丸[illegible]大每服十丸至

十五丸茶清下一法以川烏頭炮去皮尖為末韮葉自然汁和丸治

風虛頭疼服如前法

全蝎散 [illegible] 治偏正頭疼

右用蓖麻子不以多少去殼研爛紙花攤上貼在左右太陽穴上即

住疼 一方研爛取汁於頭偏痛處塗之

治偏正頭疼方 [illegible]

右用[illegible]分為末搐鼻中立效

芎辛餅子 [illegible] 治氣厥上盛下虛痰飲風寒伏留陽經偏正頭疼痛

連腦巔吐逆惡心目暗耳聾常服清頭目化風痰

川芎　乾薑 [illegible]　藁本 [illegible]　蒼耳 [illegible]

南星 [illegible]　防風 [illegible]　甘草 [illegible]

右為細末生薑汁煮麵糊丸如雞頭子大捏作餅子曬乾每服五

餅細嚼茶酒任下不拘時候

醫方類聚卷之七十八　十九

如聖餅子 [illegible] 治男子婦人氣厥上盛下虛痰飲風寒伏留陽經偏

正頭疼痛連腦巔吐逆惡心目暗耳聾常服清頭目消風化痰暖胃

方見[illegible]

太一散 治偏正頭疼發散風壅上清頭目甚妙

川芎　石膏　藜蘆　甘草 [illegible]

右為細末每服少許鼻內搐之嚏為妙

一字散 [illegible] 治偏正頭疼

全蝎 [illegible]　防風 [illegible]　天麻 [illegible]　川烏 [illegible]

南星 [illegible]

右同為末入麝香米砂各半兩拌勻每服一字食後葱茶清調下

[illegible]白散 [illegible] 治男子婦人偏正頭疼項骨痛兩太陽穴痛及熱

上攻頭目目赤下已項筋拘急耳作蟬鳴

川芎　甘松 [illegible]　赤芍藥 [illegible]

川烏頭 [illegible]　甘草 [illegible]　兩頭尖

右為細末每服二錢豆茶清調下服藥飲熱水半盞許

川烏神效散 治風熱上攻偏正頭痛無問微甚久新
川芎 甘草 川烏頭 生白芷 天南星
麻黃 各半兩
右為細末每服三錢水一盞生薑三片薄荷七葉同煎至七分接青葱半盞和溫
溫服略重避風如人行至七里再服平出為度其病立愈
通關散 治偏正頭風旋悶痛暴發頭痛又治赤目腫痛
香港鼻塞眉稜骨痛不止衛生醫方謂此散下不愈者服之神效
山茵陳 薄荷葉 木賊 當歸
川烏頭 殭蠶 川芎 甘草
香白芷 羌活 華撥
石膏 麻黃 荊芥穗
防風
右件為細末每服一大錢臘茶調下食後
太白散 治一切風虛痰攻偏正頭痛嘔吐涎沫服之神效
草烏頭 乾薑 防風
當歸 天南星 藁本 肉桂 甘草
雄黃 白殭蠶 川芎
右件為細末入雄黃研勻每服一錢入生薑汁五七
點茶調下食後
茶調散 治偏正頭風諸藥不愈者宜服此
香白芷 川芎 甘草 川烏頭
右四味細研為末每服二錢好茶少許薄荷三葉茶清調下如暴傷
風頭疼可加葱白二寸細切和茶調下
○頭面風
論
方書所謂頭面風者即此痛是也然有三因不可專為頭面風
如重傷風寒暑濕在三陽經皆能壯人頭重項強但風則有汗寒則掣
痛暑則熱悶濕則重著吐逆脈外所因暑怒憂思致氣不行鬱
而生涎結為飲隨氣上厥伏留陽經亦使人眩暈嘔吐背膂疼痛服
不得關屬內所因或飲食飢飽所傷房勞過度下虛上實
令痛吐或因刺去血過多及婦人崩傷皆令頭眩甚則昏倒
屬不內外因頭面風者由體虛之人陽脈為風所乘也諸陽之經皆上
走於頭面若運動勞役陽氣發泄腠理開疏而受之風邪謂之首風其
狀頭面多汗惡風頭痛又新沐髮未乾不可使卧使頭重身熱或則煩
悶又夏月露下臥處隨面上令面皮厚成瘢瘡乃作面風也
巴戟天散 治頭面遊風
巴戟天 菊花 芎藭 乾薑 防風
石南葉 烏頭 附子 細辛
蜀椒 山芋 人參
秦艽 桔梗 澤瀉 甘草 羌活
天雄 山茱萸 熟乾地黃
右為散每服一錢半加至二錢食前溫酒調下日再
入頂散 治頭面腫癢為腦痛抽掣作聲如刀刺失聲
又治頭面目浮腫青方
山茱萸 芎藭 防風 獨活 細辛
莽草 白朮 蒺藜 牛膝 石南
甘草 烏頭 通草 菖蒲 附子
麻黃 天雄 蜀椒 桔梗
右治下篩酒服方寸匕日三 治服逆頭痛
甘菊花丸 治頭面風皮膚瘙癢頭目不利項強耳聾
甘菊花 人參 當歸 防風 秦艽
山茱萸 白鮮皮 黃芩 漢防己 桂心
白朮 白蒺藜 生乾地黃 獨活
薯蕷 芎藭 細辛 蔓荊子
右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服不計時候以溫酒
下二十丸
菊花散 治頭面遊風
菊花 細辛 附子 桂心 乾薑
巴戟 人參 石南 天雄 茯苓
秦艽 防己 防風 白朮 山茱萸

薯蕷 蜀椒

右治下篩清服方寸匕日三

烏蛇散 治毒風上攻頭面赤癢或生細瘡皮膚瘙癢心神煩躁

烏蛇肉 羚羊角屑 人參 赤茯苓

沙參 麻黃 防風 白蒺藜

白鮮皮 獨活 黃芩 秦艽 川升麻

川大黃 牛蒡子

右細羅爲散服不計時候以溫漿水調服二錢

羌活湯 治頭面風眩及風頭痛身熱

羌活 人參 蔓荊實 菊花 石膏

白朮 前胡 防風 地骨皮 芎藭

枳殼 荊芥穗 桔梗 白茯苓 麻黃

右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑三片薄荷五葉同煎至七分去滓溫服一方更入甘草三分

羌活湯 治頭面諸風

羌活 黃連 梔子 羚羊角 枳殼

蔓荊 白朮 芎藭 當歸 天雄

麻黃 石膏 黃芩 旋覆花

杏仁

右麁搗篩每服五錢水一盞半入生姜半分切煎至八分去滓溫服

羌活湯 治頭面風頭目昏眩筋脈拘急痰涎壅滯肢節煩痛

麻黃湯 治頭面風面熱頰腫皮肉如刺似痛

麻黃 杏仁 桔梗 秦艽

薄荷葉 牡丹 防風 升麻

黃芩 紫花 羊角 羌活

右麁搗篩每服二錢水一盞入生薑三片煎至七分去滓食後臨臥熱服

山茱萸散 治頭面氣皮膚瘙痒心肺煩悶目眩頭疼

山茱萸 甘菊花 荊芥穗 秦艽 芎藭

茯苓 蔓荊子 山梔子 羚羊角屑 漢防已

藁本 甘草

右爲散每服三錢以水一中盞入薄荷三七葉煎至六分去滓不計時候溫服忌炙煿油膩

白蒺藜丸 治風毒攻頭面瘙痒如似蟲行時發風疹

白蒺藜 獨活 羚羊角屑 防風

薯蕷 地骨皮 枳殼 甘草

蔓荊 人參 楓香 蟬殼

右爲末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服不計時候以溫酒下二十丸忌豬魚肉

防風散 治頭面風在肩間行輒如蟲行或頭眩目中淚出

防風 桂心 天雄 細辛 朱砂

乾薑 人參 烏頭 附子 莽草

茯苓 當歸

右治下篩酒服方寸匕日三

[illegible]散 治頭面風皮膚不仁頑痺心悶四肢不利

蔓荊子 防風 山茱萸 枳殼

麻黃 旋覆花 甘菊花 芎藭 莽草

甘草 羚羊角屑

右麁羅爲散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

犀角湯 治風毒熱頭面腫

犀角 生薑 苦參 桔梗 防風

石膏 黃芩 青木香 升麻 防已

竹葉

右㕮咀以水七升煮取二升分三服相去十里久內消不利

芎藭丸 治頭面風生瘡久不止

芎藭 黃耆 防風 山梔子 枳殼

生乾地黃 羌活 白芷 苦參 白附子

右爲末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食後溫水下

菊花散 治頭面有風牽引眼睛疼痛偏視不明
藁本 細辛 秦艽 羌活 桂心
山茱萸 天雄 薯蕷 蔓荊子
右為細散每服不計時候以溫酒調下二錢
犀角升麻湯 治陽明經絡受風熱口唇頰車髮際腫痛及鼻額間連頭

皂莢煎丸 治頭面風瘙痒如蟲行上焦痰壅胸膈痞塞
皂莢 烏蛇肉
枳殼 川大黃 防風
苦參 牛蒡子 天麻 荊芥
右為末入皂莢膏和丸如梧桐子大每服不計時候以荊芥湯下三
十丸
赤箭丸 治頭面風瘙痒頭目昏痛上焦壅
赤箭 前胡 白蒺藜 黃耆
防風 枳殼 羚羊角屑 甘菊花

甘草
右搗羅為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服
蔓荊散 治頭面風目眩耳聾
蔓荊 防風 細辛 山茱萸
甘菊花 蔓荊子 藁本 川升麻
右細羅為散每服不計時候以溫酒調下二錢
防風散 治頭面風皮膚瘙痒或生瘡不已
防風 芎藭 荊芥穗 黃耆 蒺藜子
人參 枳實 甘草
右為散每服一錢食後用湯調下
金沸花湯 治頭面風目眩頭痛痰涎壅盛心胸煩滿咽喉熱疼
喉如膠粘
旋覆花 菊花 桑根白皮 石膏
甘草 蒺藜子 地骨皮
右搗篩每服二錢水一盞煎至七分食後溫服一方為散每日不

計度調如茶點喫忌熱麵魚物等
天麻丸 治頭面風及偏風
天麻 附子 白附子 芎藭
白殭蠶 荊芥穗 當歸
右為末煉蜜和搗三千杵丸如彈子大每服一丸茶薄荷酒嚼下日三
如不喜者薄荷茶下亦得
全生方 治頭面風多汗惡風頭痛不可以風謂之頭面風
川白芷 山茱萸 山藥 甘菊花 細辛
天雄 甘草
右為末每服二錢溫酒調下不拘時
芎朮方 治頭面多汗惡風頭痛身體煩疼
芎藭 白朮 天麻 防風 荊芥穗
細辛 甘草
右為散每服二錢荊芥湯調服或煉蜜丸如櫻桃大每服一丸茶清嚼
下亦得不拘時候

羌活散 治頭面風眼痒及面腫
羌活 獨活 芎藭 桂 [illegible]
附子
右為散每服二錢夜臥荊芥湯調下二錢立瘥
松脂膏 治頭面上生風
松脂 石鹽 杏仁 蜜蠟 薰陸香
草麻人
右先將作餅子刮百會穴貼膏上安紙三日一易若痒刮動上下又貼定
獨活丸 治頭風面風頭目疼痛昏眩不止利膈化痰
獨活 芎藭 甘草 乾蠍 半夏
防風
右為末以半夏末同生薑汁和丸如梧桐子大每服七丸加至十丸
荊芥薄荷湯下一方有甘菊無甘草
羌活丸 治頭面風頭目昏痛皮膚上衝旋運
羌活 蒺藜子 芎藭 薄荷葉 白殭蠶

右爲末入龍腦麝香少許研勻蜜和丸彈子大每服一丸細嚼茶或溫酒下頭目旋運荊芥湯下一方無麝香用乾胭脂亦得

甘菊散 治頭面風頭目昏眩

甘菊花 旋覆花 防風 石膏

右爲散每服二錢茶調服食後服此藥大去白屑

[illegible]香散 治頭面風頭目昏眩有時皮痛頭皮腫痒頸項拘急

白檀香 甘菊花 川芎 甘草

右爲末每服二錢薄荷湯調下茶清或湯調亦得

防風散 治頭面偏身風腫方

防風 白芷 白术

右治下篩酒服方寸匕日三

附芎散 治頭風

艾煎膏 治頭面風熱小兒多痒少痛黃汁出並皆治之

艾葉 醋

右將艾葉同醋於銀鍋內同煎成膏攤在紙上貼患處日一兩上

杏人膏 治上氣頭面風頭痛胸中氣滿奔豚氣上下往來心下煩熱產婦金瘡百病方亦治喉痺鼻塞眼暗食澀

右用杏人一升去皮尖雙人者不在用搗研以水一斗濾取汁令盡以銅器塘火上從旦煮至日入當熟如脂膏下之空腹酒服一方寸匕日三服不飲酒者以米飲服之忌豬魚蒜酢一方杏人三升為末水煮四五沸洗頭冷汗盡三度差

香白芷散 治頭面諸風

右用新白芷剉以蘿蔔汁浸日乾為末每服一錢食後服或以沸湯點服入鼻中左用右右用左

牛蒡子膏 治頭面忽腫熱毒風攻或手足頭面赤腫觸著痛

右用牛蒡子根一名蝙蝠刺洗淨爛研酒煎成膏攤在紙上貼腫處仍熱酒調下一服腫止痛減

治卒中風頭面腫方

右擣杏人如膏雞子黃合擣令相得傅帛上厚裹自乾頻傳不過八

九傳瘥一方無雞子黃

知母湯 治遊風走攻頭面四肢作腫塊

知母 麻黃 黃芪 甘草 羌活

白术

以咀入枳殼等分每服四錢水一盞半煎至八分去滓溫服

烏犀天麻丸 治頭面諸風口目瞤動精神昏憒咽膈不利

犀角屑 天麻 細辛 防風 香白芷

羌活 甘菊花 川芎 龍腦 麝香

右件爲細末入腦麝研勻煉蜜爲丸每兩作八丸每服一丸細嚼茶清下食後

主頭面遊風連耳囊

以與風獨[illegible]

風頭痛 附論

夫風頭痛之病由風邪客於陽經循風府而上至於頭腦令人頭痛惡寒痛心胸煩熱上焦壅滯頭目昏眩其脈左手寸口浮緊者是也

方

天麻散 治頭項痛頭面腫拘急風毒傷臟衝發腫

川芎 細辛 地骨皮 苦參 何首烏

菖蒲 蔓荊子 薄荷葉 杜蒺藜 牛蒡子

荊芥穗 旋覆草 威靈仙 防風 天麻

甘草

右爲末每服三錢用沸水調下不計時候

防風湯 治風頭痛

防風 柴胡 黃連 當歸 枳殼

大黃 天雄 地骨皮 桑根白皮 羌活

芎藭 石膏 旋覆花 桂 菊花

右剉如麻豆每服五錢以水一盞半入薑半分切煎取八分去滓

溫服

[illegible]湯 治頭風頭旋四肢拘急偏正頭痛

〔七金散〕治偏頭風頭目痛四肢拘倦鼻塞

荊芥穗 麻黃 白芷 細辛 何首烏

菊花 防風 石膏 川芎 薄荷

乾蝎 草烏頭

右爲末每服一錢水一盞煎至七分食後服茶亦得

〔川芎散〕治頭風偏正頭疼

川芎 細辛 羌活 槐花 甘草

香附子 石膏 荊芥穗 薄荷 菊花

茵陳 防風

右爲細末每服二錢食後茶清調下日三

〔治頭風痛沐頭方〕

甘菊花 獨活 莽草 皂莢 桂心

朮 防風 細辛 川椒 茵芋

白芷 石膏

右擣篩爲散每用四兩以水一斗二升煎取八升去滓於煖室中

淋洗頭勿令見風洗了須避之如有汗出切宜避之

〔消風散〕治諸風上攻頭目昏痛項背拘急肢體煩疼肌肉瞤動目眩旋暈耳嘯蟬鳴眼澀好睡鼻塞多嚏皮膚頑麻瘙痒癮疹又治婦人血風頭皮腫痒眉稜骨痛旋暈欲倒痰逆惡心

人參 羌活 川芎 白茯苓 白殭蠶

藿香葉 荊芥穗 防風 甘草 蟬殼

厚朴 陳皮

右爲末每服二錢防風荊芥煎湯調下一方茶清調下如久病偏頭風每服溫酒調下小兒虛風目澁昏困急慢驚風用烏梅荊芥湯調下半錢不計時候

〔人參順氣散〕治感風頭痛鼻塞聲重及一切中風宜服疏風順氣

乾薑 人參 川芎 甘草 桔梗

厚朴 白朮 陳皮 白芷 麻黃

乾葛

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片棗一箇薄荷五七葉煎熱服無時

如感風頭疼咳嗽鼻塞加蔥白煎一方加殭蠶一兩乾薑半兩去白朮人參間有加柴胡枳殼去厚朴乾薑等分不同專進滯氣

〔治偏風頭風一切頭痛〕

甘菊 細辛 甘草 白芷 香附

羌活 薄荷 荊芥 茵陳 蒼朮

川芎

右爲末每服一錢茶清調下婦人產後去蒼朮加石膏末調下

〔安神湯〕治頭痛頭旋眼黑

羌活 防風 柴胡 升麻 知母

生地黃 黃柏 黃芩 甘草

生甘草

右㕮咀每服秤半兩水二大盞煎至一盞半加蔓荊子半錢川芎三分再煎至一盞去滓臨卧熱服

〔治中風頭痛發熱耳頰急方〕

麻黃 葛根 石膏 桂心 附子

芍藥 甘草 秦艽 防風 生薑

右㕮咀以水一斗煮取三升分三服覆取汗

〔川芎茶調散〕治諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞聲重傷風壯熱肢體煩疼肌肉蠕動膈熱痰盛婦人血氣攻注太陽穴疼但是感風氣並宜服之常服清頭目

川芎 荊芥穗 白芷 羌活 甘草

防風 細辛 龍腦薄荷 香附子

右爲細末每服二錢食後茶清調服一方無香附子用菊花湯調點服

〔生犀鷄蘇丸〕治風壅頭痛目眩

犀角 雞蘇葉 荊芥穗 天麻 細辛

獨活 甘草 人參 芎藭

太陽穴

右爲末煉蜜和丸如雞頭大每服一丸食後茶清嚼下

〔芎藭散〕治風頭痛或時旋轉

芎藭 防風 葛根 旋覆花

白蒺藜 枳殼 石膏
甘菊花 甘草
右搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

木香散 治風頭痛胸膈多痰時復運悶
木香 旋覆花 枳殼 石膏
甘菊花 防風 芎藭 甘草 荊芥
右為麤散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計
時候稍熱服之

石膏散 治風頭痛心煩體熱
石膏 枳殼 羌活 防風
甘菊花 獨活 芎藭 黃芩 甘草
右為麤散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計
時候溫服忌炙煿熱麪

防風散 治風頭痛[illegible]
防風 川升麻 黃芩 赤芍藥 蔓荊子

石膏 葛根 甘草
右搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓入淡竹瀝半合
更煎一二沸不計時候溫服

小消風散 治傷風頭痛鼻塞聲重面赤多嚏自汗惡風
川芎 荊芥 薄荷葉 蒼朮 川烏
石膏 甘草 防風
右為細末每服一錢熱酒或茶調下不拘時候服

菊花散 治風熱上攻頭痛不止口乾煩熱
石膏 甘菊花 防風 旋覆花 枳殼
蔓荊子 甘草 川羌活
右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓溫服不拘時候

豆粉丸 治風熱頭痛
川芎 細辛 甘草 龍腦薄荷葉 白芷
石膏 菉豆粉 朴硝
右為末煉蜜和丸如彈子大別用石膏末為衣每服一丸茶清嚼下

食後

[illegible]散 治風頭痛
[illegible] 防風 白附子 白朮 天麻
白芷 朱砂研 龍腦
右為細末每服半錢用薄荷茶湯調下食後服

黑龍丸 治中風頭疼
白芷 藁本 軟石膏 川烏
南星 麻黃 乾薄荷 京墨
右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸薄荷茶湯下

天南星丸 治風頭痛化痰涎
天南星 白附子 石膏 羊角屑 甘草
丹砂 龍腦
右為末次入研者和勻以生鵝或薑自然汁和蜜煉熟丸如雞頭
大每服一丸茶清嚼下食後臨卧服

龍腦芎犀丸 治風熱頭痛痰涎壅盛旋運昏倦

芎藭 細辛 甘草 龍腦 天南星
[illegible] 朱砂
右為末煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸食後細嚼以茶清或荊芥湯下

通關散 治感風氣熱頭疼鼻塞聲重背拘急身體痠疼肌肉瞤
動手腳緊急及大斷頭風攻注眼睛
赤芍 川芎 川烏 細辛 白芷
甘草 龍腦薄荷
右為末每服二錢用白茶清調下薄荷湯亦得

山茱萸散 治風頭痛目眩心悶時復發甚
山茱萸 當歸 防風 柴胡 黃芩
旋覆花 石膏
右為㕮咀每服三錢以水一中盞煎至五分去滓不計時候調鵝清
一枚服之

石膏湯 治風頭痛
石膏 枳殼 蒼朮 防風 菊花

旋覆花　芎藭各等分

右麁擣篩每服四錢水一盞入生薑三片薄荷五葉同煎取七分去滓食後溫服

知母湯　治頭痛口乾煩悶寒熱

知母　升麻　子芩　葛根

麥門冬　甘草　石膏

右麁擣篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服食後

石膏散　治風壅頭痛肩背痛

石膏　芎藭　旋覆花　細辛　甘草

白附子

右為散每服半錢臘茶調下不拘時候

羌活飲　治傷風頭目昏痛吐逆不下食

羌活　防風　茯神　藁本　甘菊花

桂

右麁擣篩每服三錢水一盞半入生薑五片煎至一盞去滓食前溫服如人行五里再服

木頭方　治風頭痛或頭旋目眩四肢煩痛坐臥不安

蔓荊實　玄參　芎藭　石膏　葛根

甘菊花

右擣羅為三度用每度以米泔計一升二合煎取八合去滓於食後溫中間熱木頭如汗出避風

天南星丸　治風頭痛痰逆煩痛腦脇拘急手足麻痺

天南星　半夏　天麻　石膏

白附子　滑石

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十丸食後荊芥湯下

立效丸　治頭風痛不可忍

豆豉　川芎　殭蠶　石膏　地龍

蔥子

右為末蔥汁煮糊為丸如梧桐子大每服二十丸生蔥茶下

通頂散　治風頭偏痛正頭痛不可忍者

龍腦　地龍　瓜蒂　赤小豆　馬牙硝

右為散每用一小豆許食後含水搐入兩鼻內

地龍散　治風頭痛

地龍　半夏　赤茯苓

右為散每服一字生薑荊芥湯調下兼治產後頭痛

旋覆花湯　治風頭痛

旋覆花　菊花　芎藭　甘草　白芷

右麁擣篩每服二錢水一盞入荊芥穗一莖同煎至七分去滓溫服

石膏葛根湯　治大人傷寒頭項強痛壯熱表實

葛根　麻黃　官桂　芍藥　甘草

右剉散每服四錢薑五片大棗一枚水一盞半煎服

芎藭散　治風頭痛

芎藭　莎草根　藿香葉　荊芥穗

石膏

右為末每服二錢荊芥湯調下食後服

石膏丸　治風壅痰壅頭疼不止

石膏　白附子　鉛霜　丹砂

龍腦

右研如粉用蒸餅和丸如桐子大丹砂為衣每服二丸好茶嚼下

天香散　專治久年頭風甚者

治頭痛不可忍方

馬牙硝　麝香　瓜蒂　大手膽

右入研為細末每用少許吹鼻內左痛吹右鼻右痛吹左鼻

兩度愈

枳實散　治風頭痛黃頭目眩風疾

枳實　荊芥穗　甘草　防風

右為散每服一錢茶酒任調下食後服

天南星散　治風頭痛心膈煩熱痰壅頭目昏重及上焦痰熱並治之

天南星 半夏各一兩[illegible] 附子[illegible]

川烏頭[illegible]

右[illegible]

〔桂枝葛根湯〕治太陽病項背強几几[illegible]惡風者

桂枝 芍藥 甘草各一錢 葛根[illegible]

右剉散每服四錢薑五片大棗一枚水煎服

〔皂莢散〕治風頭痛

皂莢[illegible] 川芎[illegible]

甘草根[illegible]

右為散每服一錢臘茶調[illegible]服

〔治風頭痛及偏頭痛[illegible]〕

紫蘇子[illegible] 生薑汁半合

右搗和研極細[illegible]入麝香少許用鼻中搐入立定偏痛隨左

右用之

〔治一切風痰及頭痰不可忍方〕

藜蘆一兩 雄黃一分研

右為散研勻每服半錢至一錢溫水調服取吐一方只單搐藜蘆

取細末每搐少許作嚏[illegible]

〔治鼻塞及頭痛風痰〕

馬牙硝[illegible] 地黃汁一合

右相和於銅器中用慢火煎令乾便取出研細每挑少許入鼻搐上

吐痰即瘥

〔惡嚏入鼻中方〕治風頭及腦痛不可禁者摩膏主之

右用牛蒡莖葉搗取濃汁二升合無灰酒一升鹽花一

匙頭煻火煎令稠成膏以摩痛處風毒散自止亦主時

行頭痛摩時須極力令作熱乃速效冬月無苗用根代

之亦可

〔治一切風痰常惡頭痛欲破者〕

右用杏仁去皮尖乾暴為末水九升研濾如作粥法緩火煎令如麻

腐[illegible]取和羹粥[illegible]此服之每食前不限多少服七日後大汗出

[illegible]風冷搐鷄蘇大酢一劑後諸風減去[illegible]所少作服之秋九月

後煎之

〔上清丹〕治風痰頭痛不可忍者

天南星[illegible] 茴香[illegible]

右生用為末鹽醋煮糊為丸如梧桐子大食後薑湯下二十粒

〔又方南荊散〕

天南星[illegible] 荊芥穗[illegible]

右為末生薑汁煮糊為丸如梧子大食後茶湯下二十丸

〔二聖散〕治風頭痛上攻壅悶心煩煩熱及治偏頭疼

研乙 細辛[illegible]

右研為細散每服用半字發時搐入不痛邊鼻內如未已方搐痛

邊鼻內既用[illegible]搐于藥紅鼻中

〔菊花散〕治風頭痛

〔石膏丸〕治風毒上攻頭痛

石膏[illegible] 菊花 防風[illegible] 葛根[illegible]

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸如至三十丸食後臨臥

[illegible]茶下

〔芎芷散〕治風熏頭痛[illegible]

〔荊芥散〕治風邪客陽經頭目重痛及頭面虛汗連腦痛

荊芥穗[illegible] 烏頭[illegible] 雄黃[illegible] 白薑蠶[illegible]

右為散每服一錢荊芥茶調下每服半錢[illegible]

〔都梁丸〕王定國因被風吹項背拘急頭目昏眩太陽穴痛俱

痛自山陽挈舟至泗州求醫楊吉老[illegible]診脈即與藥一彈丸使服王因

款詰鉅一時再作併進兩丸病若失去王甚喜問名公如道

得其中一味即傳此方王思索良久曰川芎防風之類凡舉數種皆非

但一味白芷耳王益神之此藥初無名王曰是藥處自都梁名人可名

都梁丸也大治諸風眩暈婦人產前產後乍傷風邪頭目昏重及血風

頭痛服之令人目明凡沐浴後服一二粒甚佳暴寒乍暖神思不清頭

目昏重並宜服之

右用香白芷大塊擇白色新潔者先以棕刷刷去塵土用沸湯泡洗

同五倍子細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸多用荊芥細茶細
嚼下食後常服諸無所忌只能嚼者可一方加消風散同調食後服
茶調下一方加川芎白芷等分煎湯送下

（又方）治頭風腦骨痛

右用水浸皂莢春夏三日浸秋五日冬十日洗水先爭新瓦焙乾為
末每用一字茶調服又將少許吹入鼻中

（治卒中惡風頭痛方）

右搗生烏頭以大酢和塗故布上薄痛處須臾痛止日夜五六遍逐
痛處薄之（揩鼻法）揩烏頭尖皮一方塗於頂上髮角太陽穴風府之上須
臾痛止

（又方）

右用羊膽入玄精石末陰乾水調一字吹鼻中立止

（人參搐鼻法）治頭風痛不可忍亦可搐小兒驚風

右用蓖七箇先燒地通紅掃出火將蓖去皮逐箇於紅地上磨成
手在地上卻將殭蠶一兩去嘴足安在蓖上用碗覆定四邊勿泄氣

醫方類聚卷之八十二

來日取出只用殭蠶為末每用少許吹一口內搐藥末豆大搐於鼻內立効

（治風頭痛）每發天陰雨風先發者

右用桂心一兩為末以酒調如膏以傅頂上并額角一方用酒調下

（豉湯方）治頭風痛

右用豉湯洗頭避風即差

（枕頭方）治頭風頭痛頭冒不差

右用食茱萸葉細剉酒拌勻以絹袋盛之於甑中蒸熟承熱分兩
包互換枕之取差為度

（烏金散）治頭風頭痛若歲健忘

黑豆二升　獨活　荊芥　石膏　當歸各一兩

右細剉以水五大盞煎至一大盞入無灰酒一升燒煎去滓再煎如
稀膏盛於瓷合中每服食後用溫酒調下一分匙

（吹鼻散）治台風頭痛及偏頭疼

瓜蒂末　地龍末　苦瓠末　硝石末　麝香末

右件末都研令勻先令口水滿口後搐藥末半字入鼻中當取下惡

物即効

（通頂散）治頭風定痛

石膏　川芎　赤小豆　瓜蒂　藜蘆少許

右為細末每用少許水嗅之

（治風頭痛每發天陰風先發者方及風毒上攻頭昏眼暈）

甘菊花　芎藭

右為細散每服不計時候以溫酒調下二錢一方茶清調下

（又方）

右熱大豆內鐺中炒作灰日日過先頭良

（霍香散）治風客陽經頭疼痛及偏疼一邊連頭角痛

（治卒中惡風頭痛）

用芥子為末醋和傅頭一周時

（神朮散）治傷風頭痛鼻塞

蒼朮四兩　川芎　藁本　甘草

右㕮咀每服二錢水一盞生薑三片同煎至七分通口服不拘時候

醫方類聚卷之八十二

（消風散）治風頭疼

龍腦薄荷葉一兩　荊芥穗　羌活　芎藭
細辛　白朮　石膏　甘草

右件為末每服二錢茶清或酒調下熱服日三服不拘時候
一切風疾或赤白之候立且服之

（治一切風攻頭目痛）

用天南星一箇燒地坑子火燒令赤安於坑中以醋一盞淋之不令
透氣候冷取出為末每服一字以荊芥湯調下熱茶亦可

首風

內經謂新沐中風則為首風首風之狀頭面多汗惡風當先風一日則
病甚頭痛不可以出內至其風日則病少愈夫諸陽之脈皆會於頭若
居安靜則邪無自而入新沐之人皮腠既疎腠理又虛不慎於風風
邪得以乘之故客於首而為首風登頭面多汗惡風頭痛不可以出內
者以邪氣之客也當先風一日則病甚至其風日則少愈者陽之氣以

天地之父風名之風，行陽化，頭者諸陽之會也，之相應也○足太陽者
頭之經也，六經陽實惟太陽受病最多，血[illegible]為其上當風寒之衝，一者
閉塞則為偏為腦為耳為鼻，風邪乘氣得而入之矣，况復掃木取涼
飽食仰卧之人，汗子頭風為病，不必皆有偏正頭疼也之證，但自頭項以
上耳目口鼻眉稜之間或有[illegible]，不若吾之體，皆其證也，有頭疼有
頭重有[illegible]不自覺知，有口舌不仁，又知為味，或耳聾或頭汗或
目痛或[illegible]上下[illegible]痛或鼻中[illegible]者[illegible]或只呵欠而作胃
[illegible]之[illegible]頭風證也[illegible]大[illegible]證者[illegible]風散[illegible]荊芥前
[illegible]之可散[illegible]又有[illegible]頭風之人或因陽風寒
者[illegible]理[illegible]頭風發作則不必拘於前藥，當以頭風
四時之劑[illegible]其[illegible]大[illegible]頭風[illegible]下出此等用
[illegible]不可[illegible]若夫[illegible]陽強一證[illegible]汗惡風[illegible]合用
[illegible]則[illegible]表[illegible]桂枝[illegible]根[illegible]風[illegible]邪在頭風
[illegible]之[illegible]也[illegible]人月[illegible]多以為頭風癢痛，[illegible]頭如水[illegible]之
狀[illegible]夫人[illegible]頭[illegible]之[illegible]也頭痛[illegible]

一六八 [illegible] 一六八 四八

即為首風，此因邪風在於胸中，熱蓄化而為痰之所致也，可以茶調散
吐之。吐訖，次用藏用丸下之，後可服烏荊丸，若是雷頭者，上部多有赤
腫結核，或面部[illegible]，經云大[illegible]發之，刺之，却之可用[illegible]出血則愈[illegible]
[illegible]血[illegible]無汗[illegible]無血[illegible]不欲[illegible]者可用涼
膈[illegible]風散[illegible]為[illegible]者可以為[illegible]
[illegible]手足麻痹[illegible]心腹滿悶[illegible]如水聲
可用獨聖散吐之，吐訖可用[illegible]仲景曰此寒痰結在胸中
而致然也○夫大頭風者是陽明[illegible]少陽相火而為之也
多在少陽或在陽明或在太陽，視其腫勢在何部，分隨經取之[illegible]為
腫[illegible]為病此邪[illegible]多在前[illegible]其
病所謂[illegible]先[illegible]此病自外而之內者是血病
况[illegible]部[illegible]之部[illegible]邪氣在上
[illegible]之部[illegible]用[illegible]速[illegible]病難已[illegible]若急
服之[illegible]服[illegible]不能[illegible]病[illegible]無形之邪
也或[illegible]皆要[illegible]是也[illegible]邪

凡人於中[illegible]則[illegible]此[illegible]終始却為
[illegible]之是[illegible]也[illegible]邪在上[illegible]邪在下
[illegible]之不能[illegible]和[illegible]也[illegible]法[illegible]受陽
邪此[illegible]之也，假令少陽陽明[illegible]為邪出於耳前後也
陽明為邪者首[illegible]也，先以[illegible]黃連[illegible]少不任
服或[illegible]子[illegible]上[illegible]香[illegible]大[illegible]
[illegible]無[illegible]飲食在前[illegible]邪氣已[illegible]服前藥若不已
[illegible]服之取大便利[illegible]則止[illegible]陽明[illegible]少陽者
[illegible]根[illegible]陽明行經[illegible]升麻[illegible]葛根[illegible]少陽行經[illegible]防風之類

如聖餅子[illegible]

川烏 天花粉 何首烏 川芎 半夏
細辛 薄荷 荊芥 香白芷 防風
羌活 蒼术 茴香 甘松 藿香
[illegible] 赤小豆 菊花 甘草 赤芍藥
[illegible]子[illegible]

右為細末[illegible]為餅[illegible]每服一餅[illegible]茶清送下

[illegible]散[illegible]
[illegible] 防風 [illegible] 桂枝 白附子
[illegible] 天麻 [illegible] 附子 麻黃
[illegible] 當歸 乾薑
右先[illegible]入諸藥[illegible]每服一[illegible]
[illegible]
[illegible]風散[illegible]
[illegible] 白[illegible] 防風
[illegible] 南星 山附子 羌活
[illegible] 地龍 白芷 草[illegible]
右為末，每服半錢，入好茶少許[illegible]食後臨卧服

[illegible]

香附子　川芎　[illegible]　荊芥　乳香各一錢

決明子　黃芩　[illegible]　當歸　藜蘆　[illegible]

荊芥　[illegible]　藁本　石膏　細辛　薄荷

甘草　[illegible]

右為細末，每服[illegible]水用[illegible]入[illegible]中

玉壺丸　治[illegible]虛陽[illegible]風[illegible]頭痛[illegible]

天麻　[illegible]　附子　[illegible]　天南星　[illegible]

半夏　[illegible]　川芎　[illegible]

人參　[illegible]

芎藭　藿香葉　[illegible]　木香

旋覆花　[illegible]

右為[illegible]丸如[illegible]每服五丸用[illegible]水

[illegible]取[illegible]在[illegible]水中[illegible]四十丸

捷徑[illegible]定之者如[illegible]中風只用[illegible]水各下三丸[illegible]

天麻丸　治[illegible]風[illegible]肢節疼痛

天麻　[illegible]　熟乾地黃　[illegible]

白茯苓　[illegible]　防風　[illegible]　黃[illegible]子　[illegible]

[illegible]　白朮　石膏　[illegible]　附子　[illegible]

右為末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服十五丸，加至二十丸，荊芥[illegible]

烏梅湯下

茯神湯　治首風頭痛[illegible]

茯神　羌活　[illegible]　防風　[illegible]

蔓荊子　[illegible]　白朮　當歸　[illegible]

陳橘皮　[illegible]　芎藭　[illegible]

右[illegible]每服二錢水[illegible]食[illegible]服

[illegible]丸[illegible]頭[illegible]血[illegible]風邪所乘也[illegible]陽經

走於頭面因運動勞役氣發[illegible]腠理開[illegible]而風邪[illegible]風之狀面多

[illegible]甚則[illegible]頭痛[illegible]病久不[illegible]

因風邪[illegible]入於[illegible]而目[illegible]目[illegible]成[illegible]其[illegible]

[illegible]是也[illegible]服[illegible]

巴豆[illegible]　[illegible]　乳香　[illegible]　當歸　[illegible]

[illegible]　丁香　桂　[illegible]　龍腦　[illegible]

右[illegible]為末[illegible]如梧桐子大，每服[illegible]用[illegible]茶清下一丸[illegible]

當門[illegible]茶下之[illegible]一[illegible]汗出即[illegible]一方有麝香

柴胡飲[illegible]治[illegible]首風頭[illegible]

柴胡　[illegible]　芎藭　[illegible]　桑根白皮　[illegible]　白[illegible]

羚羊角　人參　[illegible]　黃連　[illegible]　天雄　[illegible]

旋覆花　桂　[illegible]　枳殼　[illegible]

右[illegible]每服三錢，以水一盞，生薑三片，煎取七分，去滓溫服

茯苓[illegible]治[illegible]首風頭目[illegible]痰[illegible]不利

赤茯苓　[illegible]　沉香　[illegible]　菊花　[illegible]

藿香　[illegible]木香　[illegible]　檳榔　[illegible]　白朮　[illegible]　枇杷葉　[illegible]

枳殼　[illegible]　甘草　[illegible]

右[illegible]每服三錢，入生薑[illegible]少許，煎至七分，去滓溫服，不拘時

一字輕金散　治[illegible]偏正頭風[illegible]夾腦風[illegible]骨痛[illegible]

[illegible]生[illegible]視物不明

藿香葉　荊芥穗　旋覆花

石膏末　[illegible]　川芎　[illegible]　香白芷

天南星　[illegible]　草烏頭　[illegible]　川烏　[illegible]　防風各[illegible]

右各[illegible]日[illegible]為末，每服一字，食後茶清調下

[illegible]如神丸　[illegible]治偏正頭風[illegible]

頭腦[illegible]

川[illegible]　天門冬　五味子　半夏　[illegible]

南星　[illegible]　麥門冬　[illegible]　遠志　[illegible]　甘草　[illegible]

白朮　人參各一分

右為末，生薑自然汁[illegible]如梧桐子大，朱砂一分為衣

每服十丸至十五丸，食後臨臥，生薑湯下，或有因[illegible]

芎藭[illegible]治首風目運頭痛

芎藭　防風　[illegible]　[illegible]　前胡　[illegible]

菊花　枳殼　生地黃　細辛　石膏 二兩
右麤搗篩，每服二錢，水一盞，入薑三片，同煎至六分，去滓，食後溫
服
前胡散 治右有風壅，發頭痛，頭目昏眩，嘔逆，痰涎，飲食不下
前胡　赤茯苓　升麻　木香 一分　桔梗
枳殼　旋覆花　半夏
麥門冬　甘草 一兩
右麤搗篩，每服五錢，以水一盞半，生薑半分，棗二枚，同煎至一盞，去
滓，空心日午臨臥溫服
治頭中風身熱風熱方
竹瀝　升麻　生薑　杏人 各二兩　芍藥
柴胡 各四兩　石膏　生葛根 各八兩
右㕮咀，以水六升合竹瀝煮取二升七合，分三服
摩頂膏 治頭中二十種病，頭眩，髮落，面中風
烏頭　莽草 各二兩　桂心　茼茹　附子
細辛 各一兩　半夏　乾薑 各一兩
右㕮咀，以生豬脂二十兩合搗，令脂消盡，藥成，先沐頭令淨，然後以
藥摩頂上，日一，即愈。如非十二月合，則用生烏麻油和塗頭，更沐頭
令淨，乃用之，一頓生髮如前法。[illegible]方無蜀椒、莽草、半夏、乾薑
天麻餅 治頭風痛，[illegible]明目，偏正頭風，不問所因久
服更不再發，藥效
川烏　天麻　防風　乾薑　羌活
甘草 [illegible]　半夏　天南星
右為細末，[illegible]成餅，每服三[illegible]，茶細嚼送下一寸
有川芎無羌活，用生薑汁和捏餅子，陰乾一兩，日[illegible]服，更增餅數
治急頭疼甚者，更入[illegible]方中，[illegible]因汗而解而飲
頭疼者茶清，[illegible]生薑湯下，治中脘痰飲停積及痺，脾胃[illegible]
中快膈，元得其宜
白龍丸 治[illegible]頭痛難忍
白附子　附子　半夏　天南星　麝香

凝水石　[illegible]
龍腦 研
右為細末，用麵糊為丸，如綠豆大，每服三丸至五丸，薄荷酒下，空
心食前服
芎朮湯 治首風，頭痛，多汗惡風，頭痛
芎藭　蒼朮　麻黃 去根節　芍藥
甘草 炙　白芷　石膏　荊芥穗
右麤搗篩，每服[illegible]錢，水一盞，入薑[illegible]七葉，同煎至七分，去滓熱服
驅風丹
草烏　川烏 四兩　芎藭　白膠香
赤小豆　荊芥穗　[illegible]　五錢
右為細末，用白麵半斤搗勻，滴水為丸，如梧子大，每服十五丸至
二十丸，茶酒下；打撲傷損，乳香酒下；頭風，薄荷茶下；渾身[illegible]，蘇木
酒下；產婦童便服
治頭風秘決
草烏　決明子　白朮　羌活　川芎
細辛　白芷　荊芥穗 各[illegible]
右為細末，每服一錢，煎湯調下，食後日三服
八風湯 治[illegible]風頭目昏痛，[illegible]拘急疼痛
防風　人參 二兩　芎藭　細辛 去苗　柴胡 去蘆頭
白芷　甘草　羌活
右麤搗篩，每服三錢，水一盞，入[illegible]五葉，煎至六分，去滓溫服，不拘
時
頭風方
川芎　天麻　細辛　石膏
白芷梢　甘草　全蝎　荊芥穗
右為末，白湯或茶清食後臨臥服，有風者加[illegible]白丸子加朱砂
[illegible]湯下，皆要藥
防風飲 治首風[illegible]頭項[illegible]
防風　龍骨　升麻　赤芍藥　黃芩

菊花十 石膏防風各一

右搗篩每服五錢水一盞煎至六分入荊竹瀝半合更煎一兩

沸去滓空心日午夜臥溫服

青神散

麝香 腦子 雄黃 各等分 全蝎

乳香 没藥各等分

右為細末每用抄少許口含温水搐入鼻中

清香散 治偏頭風夾腦風不可忍

川芎 藁本 各 防風 羌活各一兩 細辛三錢

香白芷 一兩 甘草半兩

右為細末清茶調服食後如疼甚者加黑豆二十粒以助

南星丸 治頭風

天南星 大 全蝎 川芎 一兩 人參 藁本 各半兩

龍腦 二錢 防風 一兩

右為末以蒸餅一兩水浸一宿去皮搜和為末丸如梧子大食後茶

嚼下三丸入薄荷茶任下

羌活散 清頭目去風邪順真氣

羌活 殭蠶 白殭蠶 炒去絲 白附子 炮 各一兩 菊花

朱砂 麝香 各一分

右為細末每服一錢薄荷茶酒任意調下

菊花散 治男女頭風頭痛上攻頭眩

僵蠶散 治頭目有風牽引目睛疼痛偏視不明

僵蠶 各五兩 細辛 一兩半 黃芪 天雄 各二兩 羌活

桂心 山茱萸 各二兩

右治篩每服方寸匕日三

荊芥湯 治頭風項頸筋急四肢疼痛

荊芥 一兩 芍藥 防風 各 酸棗仁 半兩

黃芩 一兩半 羚羊角 一兩 桑根白皮 半兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半入生薑一棗大拍碎煎至八分去滓

空心日午臨臥溫服以瘥為度

九生丸 治頭風

半夏 南星 大烏 川芎 白芷

硫石 各一錢 細辛 半兩

右為末生薑汁煮麵糊和丸生薑湯送下十丸

已生丸 治男女八般頭風一切頭痛痰厥腎厥飲厥傷寒傷風頭痛不

可忍

川烏 草烏 南星 半夏 各等分生用

川芎 石膏 白芷 天麻

右為細末韭汁為丸如梧子大每服七丸至十丸以薄荷生薑湯送下

一方加細辛全蝎減半每服二十丸

荊芥湯 治首頭目昏眩肢體疼痛手足麻痺上膈壅悶或發

寒熱

清風散 治偏正頭風

香附子 炒 川芎 石膏 煅 白芷 甘草

薄荷 各一兩 川烏頭 半兩 炮去皮臍

右為細末每服二錢温酒或茶調下無時

川芎散 治頭風

川烏 二兩 白芷 二兩 細辛 半兩去苗 草烏 炒 石膏 煅

防風 各一兩

右為細末每服一錢茶調服

清芎散 治頭風

川芎 白芷 細辛 防風 川烏 各半兩

草烏 一錢半

右為粗末每服七錢水二盞煎至一盞去滓熱淋在碗內却把碗覆

椎黃作四分入一分在碗內通口使服再煎滓通服

治風勞氣吐逆不能食四肢骨節酸疼頭痛頂重方

茯苓 二兩 枳實 橘皮 人參 芍藥 各一兩

生薑 四兩

右切以水五升煮取二升去滓分溫二服日晚再服忌熱麵諸毒物

二生散 治本頭中風頭面多汗名為首風頭痛

藿香葉　烏頭（[illegible]）　零陵香（各[illegible]）　白附子
天南星（各半）
右生用為散每服一字溫酒調下中風口噤斡開口後灌服半錢
未愈再服
芎茶散（[illegible]）
川芎　[illegible]　荊芥穗　甘草（炙）
[illegible]
右為散每服半錢臘茶清調下加至一錢空心食前服之
[illegible]散（[illegible]）治偏正頭風夾腦風并一切頭風不問年深日近對日取
效
蓽撥（[illegible]）　丁香（[illegible]）　檳榔（[illegible]）　腦子（一[illegible]）　細辛（[illegible]）
麝香（[illegible]）
右先將腦麝末研令細卻將前四味碾羅為末乳鉢內
研起腦麝令勻用蘆管子盛之搐鼻開口含水人隨左右搐之大驗
許良久出水效一方許即安

不臥散（[illegible]）治偏正頭風夾腦風頭牙疼並宜服
細辛　甘草　人參　藜蘆　川芎（[illegible]）
石膏（[illegible]）
右為細末以少許口含水搐[illegible]許嗅入鼻中
治偏正頭風久年不愈
沒藥一錢　乳香一錢　川芎一兩　青黛（[illegible]）　腦子二分
細辛二錢　白芷二錢　盆硝（[illegible]）　薄荷葉（[illegible]）　川烏尖（[illegible]）
右為細末水調口中次用藥以竹管吹入鼻中
太陽丹（[illegible]）治[illegible]頭風
石膏（[illegible]）　川芎　白芷　本草（[illegible]）　腦子二兩
右為細末蜜和麵為丸綠豆大分作二十八丸朱砂為衣每服一丸食
後薄荷湯下
[illegible]抽刀散（[illegible]）治頭風[illegible]
川烏（[illegible]）　雄黃　蟬退（[illegible]）　川芎　細辛（[illegible]）
右為末每服半錢食後臨臥茶清調下

川芎丸（[illegible]）治頭風冷淚
川芎　甘菊花　細辛　白术　白芷（[illegible]）
右為細末煉蜜丸如黍米大夜卧[illegible]一丸[illegible]中[illegible]臨卧一丸
菊花散（[illegible]）治[illegible]風頭痛
菊花　地骨皮　石膏（[illegible]）　蔓荊子（[illegible]）
甘草（[illegible]）
右為散每服一錢熱湯點食後服
天麻散（[illegible]）治[illegible]頭痛
天麻二兩　藿香（[illegible]）　石膏（[illegible]）　防風根（[illegible]）
[illegible]
右為散每服一錢臘茶調下
清膈青金散（[illegible]）治偏正頭風[illegible]
薄荷葉　厚朴　硝（[illegible]）　川芎　青黛（[illegible]）　腦子（[illegible]）
右為細末搐入鼻中
搐鼻散（[illegible]）治一切頭風牙關緊急肩臂骨痛鼻塞清涕眼昏
[illegible]作搐[illegible]並宜服之
北細辛三錢　荊芥穗　石膏（[illegible]）　川芎一兩
右為細末每服二錢茶清調熱服
[illegible]痛散（[illegible]）治偏正頭風
石膏（[illegible]）　荊芥一兩　川芎二兩　薄荷五錢
右為細末每服二錢食後茶清調下
[illegible]散（[illegible]）
全蝎子（[illegible]）　蓽撥（[illegible]）　川烏（[illegible]）　川芎（[illegible]）
右為末每用少許搐入鼻中或以茶清食後調服亦可
御[illegible]散專治頭風去面上[illegible]
川芎　細辛　芒硝　藁本（[illegible]）
右為細末口含水鼻內搐用筒吹之立效
芎芷散（[illegible]）治頭風風壅
川芎　白芷　荊芥穗　軟石膏（[illegible]）
右為末每服一錢食後茶湯調服

天香散 治患年日久一切頭風證候

天南星 半夏 川烏 川香芷

右爲末每服七錢或十錢水一盞半生薑煎至一盞入生薑自然汁半盞

再煎至八分熱服累十服累驗服須要汗又三服

仍服手香切忌麻油酒麪之忌房事

茶調散 治一切諸風痰壓日夜頭疼

升風壽麼目神志通和開竅消風

菊花 細辛 石膏 甘草

右爲粗末每服一錢茶清調下食後服

黑散 治頭風偏痛不可忍

川芎 天南星 荊芥 蒿本 皂莢

右件合研勻每服一錢茶清調服不可忍者

金鎖膏 治正頭風氣上攻不可忍者

金 白芷

右爲細末用酒調成膏子貼在太陽穴上

治頭風方

芎藭 川芎 藜蘆

右爲細末水調之

通腦散 治頭風

川芎 川烏

右爲細末服二錢茶調下

治頭風方

香附子 川烏頭 甘草

右爲末煉蜜和丸如彈子大每服一丸蔥茶嚼下

一字散 治頭風

雄黃 細辛 川烏尖

右爲末每服一字薑汁茶芽調服

治頭風方

熟乾地黃 附子 川芎

右㕮咀每服水一大盞薑三片棗一枚煎至六分去滓入細

蔓荊子再煎服此方屢以醫人皆立効

細辛散 治頭風心嘔逆

細辛 川芎 白芷

右爲末搐鼻中仍以薄荷湯調川芎細辛等爲末服之

芎辛散

川芎 荊芥 甘草

右爲末搐鼻中

香芷散

旋覆花 石膏

右爲末爲丸如大茶下二丸

痛一丸立愈

三仙不老丸 治頭風偏痛

貫衆 苦參 香附子

右爲細末爲丸如梧子大每服三十丸空心米湯下

一方 治頭目風

荊芥穗 細辛 川芎

右等分爲末每服二錢白湯調下立効

千金 治頭風偏正

川芎 烏頭 甘草 荊芥 薄荷

右爲末丸每服一丸茶清嚼下

治積年頭風

乘米 胡椒 紅豆

右爲細末搐鼻中取下服

治八般頭風

草烏 細辛 黃丹

右爲細末搐入鼻中立効

治清頭目風氣

蒼朮一兩 荊芥 [illegible]
右爲細末每服一錢[illegible]早晨服凡入煙瘴之地且[illegible]隨行令
昔人[illegible]合一劑每日一服又歸[illegible]使作[illegible]之無害
煙瘴者又況於[illegible]
治腦風[illegible] 治首風每遇風時即發頭痛
白殭蠶 荊花 石膏
右爲研爲末用生[illegible]細研汁一大盞同拌和入[illegible]爲丸如梧
桐子大每服二十丸荊芥湯下
治頭風餅子
白芷 川芎 [illegible]
右爲末用[illegible]和合爲餅子每服一餅[illegible]湯下
神聖餅子 治腦及一切頭風
猪牙皂角 [illegible] 青黛
右爲末滴水和丸如梧桐子大作餅子每用一餅新水化開男
左女右抑而用[illegible]之口[illegible]一十五丈[illegible]
此藥用井水化下
搐鼻神效散 治偏正頭風
[illegible] 赤小豆 小黃米
右爲細末於已時口含水搐鼻內
雄黃丸 治八般頭風及眩暈惡心吐逆
川烏 雄黃 [illegible]
右爲末滴水爲丸如梧桐子大每服[illegible]白茶清下臨用[illegible]
藥內一方[illegible]湯下二十丸名烏頭丸
搐鼻藥
華撥 良薑 白芷 細辛
右爲末每服一小字水一口搐鼻內吐水即止
治頭風痛
黑牽牛子[illegible]一兩
右細研井花水調服仰臥搐鼻中得涎出即愈
治頭風藥秘方

白殭蠶[illegible]分
右爲細末每服半錢白梅茶清[illegible]臨睡服
治諸般頭風二三年不愈者
天南星 [illegible] 川烏 [illegible] 一兩
右爲細末水一盞好茶三錢薄荷七葉鹽梅一箇同煎至五分食後
臨臥放冷服[illegible]入生薑[illegible]一方無茶薄荷
烏頭丸 專治頭風
川烏頭[illegible] 五靈脂一兩
右爲末水丸如梧子大以硃砂爲衣每服一丸薄荷湯下
治[illegible]丸
芒硝一兩 生明硫黃一兩
右爲細末爲丸如彈子大每服一丸食後葱茶嚼下
丁香散
細辛 丁香各等分
右爲細末搐入鼻中
[illegible]
白芷 川芎
右爲末每服二錢茶清調服
治[illegible]頭風[illegible]
雄黃[illegible] 香白芷一兩
右爲細末用[illegible]白芷[illegible]研入[illegible]調[illegible]丸
前藥[illegible]重者不過三服[illegible]之後
[illegible]頭[illegible]出即愈
附子湯 治頭風
大附子一箇[illegible]一分
右同入銚子內煮[illegible]爲度去附子[illegible]即[illegible]每[illegible]五服後爲
末服之
滴金丸 治頭風及偏正頭疼
人中白 地龍[illegible]一分
右爲細末入羊膽汁和丸如芥子大每用一丸新汲水一滴化開點

在兩鼻竅中搐
附子摩頂散 治因沐頭中風多汗惡風當先風一日而病甚頭
痛不可以出至日則少愈名曰首風
大附子一枚 鹽等分
右爲散沐了以方寸匕摩頂上令藥力行 一方用麻油和鹽摩之
大川芎丸 治首風旋暈眩急外合阻塞風寒頭目昏眩
頭疼身拘倦
川芎一斤 天麻四兩
右爲末煉蜜丸每兩作十丸每服一丸細嚼茶酒下
菊花丸 治頭風不時發作
硫黃 [illegible] 烏藥 [illegible]
右爲細末煮薄糊爲丸如梧桐子大每服三五丸食後茶清送下稍
覺一服任多日則三五服便退
菊茶散 治偏正頭風及諸般頭痛
荊芥末 滑石 青木

右件每服二錢葱白三莖薑三片煎爲湯調服茶清調下亦得立効
一方無薑葱
治偏正頭風痛不可忍者
防風 白芷 各一兩
右爲細末煉蜜丸如彈子大如牙風毒只用茶清爲丸每服一丸茶
湯下如偏正頭風空心服如身上麻風食後服未愈連進三服
大豆酒 治頭風
用大豆三升炒令無聲先以二斗 [illegible] 盛清酒九升乘豆熱即投
甕中密封頭七日温服之
治頭風方
用荊瀝不限多少取瘥止
又方
用精菊花根一升搗 [illegible] 一升温服 千金
又方
用蔓荊子一升爲末絹袋盛以酒一斗浸七日温服三合日三服

又方 出千金方
用蔓荊子附子雞冠 [illegible] 爲末絹袋盛以酒二升浸温服任性常
令醺醺
又方 [illegible]
以七月七日麻油三斗桃子一石相和浸之服藥石五斗三箇桃
之量取一石清神麴二斤和合沐浴未用石五斗熟封三七日服
盡一斤百日身中生光風腦脇下膈胃懸伏風百病悉去
治頭風目眩不效者 出本事方
用天南星一兩以白礬湯浸去毒水五七次焙乾爲末作丸
合用水二盞白梅三箇同煎至一盞温服食後服
楊梅散 出本事方
用楊梅爲末每服二錢食後薄荷茶清調下
又方 出本事方
用香白芷二兩爲末以白梅肉爲丸如梧桐子大每服三十丸食後
茶清任下

治頭風并出汗者及頭中一切風
用荊芥煎服之
治頭風沐頭方 出[illegible]
用茱萸二升水五升煮取三升以綿拭髮根良
又方 [illegible] 治頭風
右搗蓖麻子以酒研取汁塗頭上三四度即愈
又方 [illegible] 治頭風眩暈
用川芎不計分兩以泔水浸之 [illegible] 乾或焙併爲末煉蜜
丸如小彈子大不拘時茶酒嚼下一丸
又方 [illegible] 治頭風通大小便
用烏頭根皮以灰火炙令焰 [illegible] 乾後用
又方 治頭風目眩
用鴟頭燒灰以飲服之
菊花方 [illegible] 男子婦人久患頭風眩悶髮乾落胸中痰結每風發即
頭旋眼昏暗不覺欲倒者是其候也

右先灸兩風池穴各二七壯并服八仙菊花丸法見求去其法春末夏
初取地菖蒲花陰乾爲末空腹一方寸匕和細辛服之日再加三方寸匕
若不飲酒者但和羹粥中服之亦得秋八月合花根莖乾切取三大
斤以生絹囊盛於三大斗酒中經七日服之日三常令酒氣相接
佳

荊烏丸 治八風一切頭風
用荊芥穗四兩 川烏頭用青白者去皮臍各爲細末
欲後服自然汁搜和丸如梧桐子大每服四丸以加至七八丸用冷
茶清送下臨臥服忌熱腥

摩頂風 出千金方
用生烏頭二斤細剉一斤本細煎一宿令有黑色塗頭頂不盡無忌退

治頭風 出聖惠方
用川芎燒灰碎服其節入瓷瓶內罨上充滿門頁更忌
下細服令痛立愈可以除根勿以合藥為疑

治雷頭風

用真薑汁細辛不以多少水煮令白製如米大研細茶酒調細
嚼末下痊即愈

治光頭風 出直指方
用萵通草木敷頂上仍燒焠為灰每服二錢熱酒調下牙關緊者斡
開口灌

治頭風
羌活 防風 旋復花 川芎 細辛 芎 蔓荊子 各等分
甘草 石膏各半兩 中風作散
太師留下羌活散
治頭項強不得顧視方 不知他
右蒸好大豆一斤令變色內囊中枕之

又方 出千金方
右以九月九日取菊花作枕袋枕頭良及白頭風眩

又方 出千金方
右以八月後取荊芥穗作枕及頭墊立春日去之

又方 出千金方
右穿地作小坑深尺許一小尺坑令深以水灸之令小冷去水內生
桃葉其上布席就卧延一頭入臥之令坑口葉上以衣覆頭覆身
令氣蒸病上汗出良久愈若病大者作地坑亦大

治頭風頭痛明目
用綠豆作枕枕之即無頭風亦發患

治頭痛及大不可忍痛甚者
用苦瓠瓤不以多少水一盞熬至三分於冬用筋頭或瓦頭點入鼻
中不可多痛此小立效 流涎中其痛立止隨
左右用之

鈐頭散 治頭風頭眩風兩身麻木常服充能
川烏頭 防風 白芷各一兩 川芎
細辛 蒼朮
右件生用曬乾研為末細傳如神

治雷頭風 夫雷頭風者震聲之語未知為經不可
乃痰所五子製藥以何必類象其震之形其色又青乃
升麻湯 一兩 蒼朮一兩 荷葉一個
右為細末每服五錢水煎食後服荷葉一箇研細用前藥調服

治頭風飲
治頭風驗 羊角夫不使 細為細末
延服兩

頂白散 治大頭痛如神
黑烏蛇 白花蛇去頭尾炙 雄黃二錢 大黃
右為細末每服二錢白湯調下無時

治赤眼頭痛 此方名為神聖
乳香 沒藥 川芎 石膏 雄黃各三錢
盆硝
右為細末每用搐鼻中專治赤眼及頭風耳鳴
如患牙疼一嚙便住

摩頭散 治白頭風及風毒攻腦疫痛

附子 乾薑 蜀椒各 烏頭 桂心各
藜草 … 細辛 …
右治下諸少火 … 數 … 五日 後一 著 … 如
前 … 以 … 後 … 中 … 内大如棗
蓯蓉 … 之即 … 有 … 用之良
重用 … 麻 … 痛 … 痺不仁 …
六化一字散 … 治頭風
川芎 川烏 白芷
右細末每服一字以生葱三寸荊芥三四斤同煎食後調服
又方 … 治頭風
樟腦 …
右 … 細 … 入白風 … 煎 … 一 … 細 … 末 … 加 … 合
細 … 末 … 用 … 分 … 如 … 入每服一 … 食後 … 茶 … 下
宋 … 風方
乳香 地龍 … 蒲黄 …
右同為細末每用一 … 向香 … 大 … 之 … 以 … 如 … 用 …
夫上 … 一小丸 … 之 … 重 … 度 …
滿口 … 去 … 度在内 … 茶一 … 之即愈
治 … 心 … 宜用 … 香 …
沉香 … 白 … 最驗
白朮 白茯神 縮砂仁 川芎 人參
陳皮 半夏 … 丁香
甘草 … 沉香 …
右為 … 每服一錢水一盞 … 至八分去 … 服不
拘時候 … 治頭 … 何 … 之 … 愈
金 … 散 … 治頭風 … 硇砂
全蝎 …
右件 … 細末 … 每服一字 … 調下食後 …
細辛散 … 治 … 頭 … 風 …

細辛 … 川烏頭 … 地龍 …
右件為細末每服二錢水一盞入 … 同煎至七分
温服不拘時候
麝香 … 清利頭目消風 … 方
香白芷 … 麻黄 … 甘草 …
羌活 … 細辛 …
川芎 … 附子 …
蔓荊子 …
右件為細末 … 每服 … 茶下不拘
時候
神效散 … 治 … 風
川茶 …
右 … 水 …
生 … 末每服一大錢薄荷七葉烏梅一箇水一盞煎至六分 …
發時服五七服立效

救急散 … 治頭風
川芎 … 白芷 …
右為細末每服一錢水一盞 … 茶一錢白梅 … 煎至 … 發時
服立效
蒼朮 … 草烏 … 白芍藥 … 何首烏
川芎 … 白芷 … 羌活 防風 … 獨活
藿香 … 地龍 …
右為細末每服一小錢用薄荷茶調下
金花散 … 治 … 頭風
川烏 … 全蝎 … 雄黄 … 白殭蠶
華撥 … 石膏 … 香白芷 … 川芎 … 荊芥
蔻 … 薄荷 …
右為細末每服一錢用葱白茶調下
天雄散 … 治頭 …

天雄 雄黃 川烏（一兩半） 全蝎

白殭蚕（去絲嘴） 蓽撥

右爲細末，同服一小盞，以茶清下，如不效，先以鹽湯取吐，次用[illegible]

汗出即愈

通關散（[illegible]）治八般頭風

用半夏爲末，百藥十斤，少許以紙[illegible]入藥末，錢作紙撚子，蘸藥

用藥時先含水一口，將紙撚子點右鼻中，搐之，如有涎，即吐去，再含

水再搐，如此用二次見効

香芎散（[illegible]）治頭風

香附子 川芎 甘草（一兩） 石膏

右爲細末，每服一錢，臘茶、荊芥湯點服，食後

荊芥散（[illegible]）治頭風血風，又名荊芥散

荊芥 乾菊花 川芎（一兩） 白术

右同爲細末，食後茶調二錢服，明目去風

治男子女人頭風，發作有時，甚則頭痛，大腦熱，耳聾，此方[illegible]

荊芥穗 防風 蝎梢 伏牛花 芎

藁本 [illegible] 白蒺藜 牽牛（各一分）

右爲細末，每服二錢，水一盞，煎[illegible]令藥入[illegible]

食後和滓吃

通氣防風散（[illegible]）治頭風[illegible]

蔓荊子 [illegible] 人參 葛根 防風（一錢）

右[illegible]知母[illegible]大分作二服，每服水一盞半，煎至一盞，去滓

溫服，以夾衣覆面，目勿語，盲者[illegible]出爲効，至服藥煎一日，火語

知服藥無不火[illegible]三日極効

聖餅子（[illegible]）治風痰頭目

川芎 防風 白芷 甘草

天南星 川烏 天麻 乾生薑（半兩）

右爲細末，湯泡蒸餅爲丸，如梧桐子大，捏作餅子，每服五七餅，細嚼

荊芥湯下，不計時候，此乃全蝎方云，一服見効，此天下第一

頭風藥

半夏丸 治頭風吐痰

半夏 [illegible]

右爲細末，薑汁煮糊爲丸，以米湯下，[illegible]

頭風[illegible]頭風[illegible]

以蝎一個[illegible]相和於銚鍋中，[illegible]令相入，捏作一丸，[illegible]可合

腦大眩，頭重額痛，止上

川芎丸 治諸般男女頭風，[illegible]

川烏 本蒲 地龍 [illegible]

右爲末，以五靈脂同麵糊爲丸，如[illegible]，每服一丸，溫茶下，五靈脂

[illegible]荊芥[illegible]治風痰

何首烏 [illegible] 薄荷 青木香

白芷 [illegible] 牽牛 川烏 牛膝

大輔丸 [illegible]何茶下三十丸

香附子湯 治風痰[illegible]頭痛[illegible]

實痰嘔吐清水氣壅

附子 [illegible] 生薑（一兩）

右三味細切，如麻豆大，每服五錢，水二大盞，又同煎至一盞

去滓，食後服，一日三服，不得傍服，忌食

白[illegible]散 治頭風痰痛至甚

[illegible] 白[illegible] 細辛 胡椒

右件爲細末，每服[illegible]，發時先含水一口，後用藥[illegible]

中左疼左[illegible]，右疼右[illegible]，吐去水，以[illegible]出爲度

治頭風頭痛

臘月烏頭[illegible]，全蒲大[illegible]入絹袋盛，酒三升，是一[illegible]

服[illegible]服

治頭風明目[illegible]

[illegible]芎[illegible]作[illegible]以[illegible]

治頭風目眩

服[illegible]盡，至[illegible]，可以[illegible]爲末，飲[illegible]下

治頭風諸方

以莽草煎湯洗之[illegible]令入眼

治頭中風[illegible]

人髓毛[illegible]以令黃投[illegible]中[illegible]二日空心細細飲使醉衣覆臥

取千兩白更依前服忌[illegible]食米麥麵等

治患頭風[illegible]

用山豆根[illegible]末油調塗之

療風頭[illegible]

以莽草[illegible]水[illegible]之

頭風論

[illegible]頭風者[illegible]府而上則為腦風夫風[illegible]高遠始自陽經[illegible]脈

陽[illegible]之會[illegible]風內而上至腦[illegible]足太陽之[illegible]太陽之脈起

於目內眥上額交巔上入絡腦令風於[illegible]經絡而不行則[illegible]

弱故頭特[illegible]而腦[illegible]多風[illegible]也

[illegible]

[illegible]丸[illegible]治[illegible]頭風[illegible]強眼[illegible]

[illegible]

頭狂[illegible]邪病[illegible]主之

芎藭　天雄　人參　天門冬

柏子人　[illegible]石　石膏　茵芋　山茱萸

白頭翁　桂心　秦艽　松蘿　羚羊角

細辛　薯蕷　[illegible]　甘草　防風

雲母[illegible]

右[illegible]以酒二斗漬七日[illegible]合[illegible]五合日三有女人[illegible]

[illegible]丸服之[illegible]

[illegible]生兒[illegible]

羌活丸[illegible]治[illegible]頭痛久不差

桂[illegible]　白茯苓　麻黃　白殭蠶　防風

枳殼　烏蛇　苦參　酸棗仁　烏頭

犀角　羌活　獨活　龍骨　郁李人

人參[illegible]

右[illegible]丸[illegible]服[illegible]

摩頂[illegible]治[illegible]頭風[illegible]發歇不定

蓮子草[illegible]　[illegible]　犍[illegible]　生麥門冬

[illegible]　[illegible]　[illegible]　甘草　防風

細辛　地骨皮　大青　紫蘇子　紫菀

右[illegible]五味[illegible]用[illegible]同[illegible]入[illegible]二七日[illegible]馬郁[illegible]

入生麻[illegible]和[illegible]

兩[illegible]每用[illegible]頭[illegible]

[illegible]九[illegible]治[illegible]頭風[illegible]不通[illegible]

[illegible]　芎藭　[illegible]　羌活

天麻　[illegible]　[illegible]

[illegible]

右[illegible]和丸如[illegible]一丸薄荷[illegible]下

[illegible]散[illegible]治[illegible]頭風[illegible]時出青[illegible]

芎藭　[illegible]　羌活　柴胡

黃芩　[illegible]　荊芥穗　甘菊花

地骨皮　[illegible]　石青　[illegible]

右為散每服二錢[illegible]治頭風[illegible]熱生瘡目赤痛

摩頂[illegible]膏[illegible]

青[illegible]　[illegible]　石膏

[illegible]　[illegible]　寒水石

蓮子草[illegible]

石以水三升[illegible]蓮子草[illegible]

石[illegible]石[illegible]

[illegible]每用二錢[illegible]

頭[illegible]散[illegible]治[illegible]頭痛

[illegible]附子[illegible]

蘆薈 川芎 龍腦 麝香
右先將白附子等搗羅為末次將丹砂研細同前藥末拌勻蜜為
中塗芽茶每服一錢用薄荷汁少許溫酒一盞調下
芎香散 治偏風頭痛至甚
芎藭 藿香葉 莪蒁 天麻 防風
蔓荊實 白芷 木香 甘草
右為細散每服二錢以荊芥茶清溫酒調下
又方 治風邪客於腦頭痛至甚或偏正頭痛夾腦風
是眉棱骨痛或遍頭疼痛不可忍者
草烏頭 細辛 新茶芽
右㕮咀如麻豆每服三錢水一盞半入真麝香一捻同煎八分去滓熱
服一方無麝香為末茶清調下臨睡食後服烏頭剉用鹽炒黃
桂心散 治腦風頭痛
桂 藁本 細辛
右等分搗羅為散每用一字先含溫水一口即搐藥於鼻中
頭痛隨痛左右用之
白附子散 治風寒上攻頭痛齒牙痛及治遠年頭痛
麻黃 天南星 烏頭 白附子 硃砂
麝香 乾薑 全蠍
右為末每服調半錢服就去枕臥少時
白附子丸 治腦風鼻息不通時流清涕多嚏不已
白附子 龍腦 麝香 蟾稍 天南星
膽礬 凝水石
右除凝水石外搗研為末再同研勻入白瓷罐子內研令如稀餳狀
入白麵和半匙研將凝水石末旋入以乳槌和丸如雞頭大
於凝水石末中留少許為衣逐一入焙乾每服一丸細嚼薄荷熱
水下茶清亦得食後服
通膈散 治腦風鼻息不通不聞香臭或鼻流清涕多嚏
肩項拘急頭目昏痛風府怯寒
蓽撥 白附子 苦參 益智

蒺藜子 荊芥穗
右為散每服二錢溫酒調下日三服
香芎散 治腦風邪氣留客頭痛久不已
芎藭 荊芥穗 白芷 桃蝎 炙草根
甘草
右等分搗羅為散茶清調下一錢日二服
芎香丸 治腦風氣致或腸疾氣上衝頭腦令旋運
天雄散 治腦風頭痛諸者
白花蛇 白附子 蒺藜子 蔓荊實
蓽澄茄
右為散每服一錢用薄荷自然汁和溫酒半盞調下食後服
地骨皮散 治腦風頭痛時作及偏頭痛
地骨皮 荊芥穗 石膏 白花蛇
天南星
右為散每服一錢入臘茶一錢湯點服食後臨臥
石膏菊花散 治腦風頭痛無任時遲時發
石膏 天南星 白殭蠶 甘菊花 甘草
右為散每服一錢臘茶調下食後服
芎辛湯 治腦風鼻息不通或流青涕多嚏
芎藭 細辛 黃芩 荊芥穗 甘草
右剉搗篩每服三錢水一盞入薄荷七葉煎至七分去滓溫服
烏金煎 治男子腦風頭腦掣痛及中風語澀手足無力
黑豆 兔肉 獨活 荊芥
右剉搗以水一斗煎至一升更入白蜜和令勻再煎令
稀稠得所盛於瓷器中每服一合溫酒或薄荷茶調下不計時服
吹鼻龍腦散 治腦風頭痛
細辛 高良薑 瓜蒂 硝石
右為細散每用新水滿含一口搐藥一字入鼻中良久即定
神聖散 治腦風項背怯寒腦戶極冷痛不可忍連肩背項
徹腦頂痛皆治之

麻黃去節　細辛去苗　全蝎炒一斤　藿香各五分
右為細末每服二錢煎荊芥薄荷湯調下兼治婦人血氣
一方用薄荷湯調
追風散　治肝臟風邪夾留攻頭痛不可忍方
右件追風末不以多少於手中口鼻搐之打嚏即醒可用也
小烏蒙散　治風寒在腦或感邪頭重頭疼眩暈欲倒嘔吐不定
川芎　細辛　白朮　甘草
右剉散每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分不拘時溫服　又方
以川芎二兩　細辛　甘草二錢　防風　半夏　白芷各等分煎　同上
手足蠲疼及除風動
荊芥散　治頭風痛時發不定或自昏眩多嚏不已
荊芥穗　烏頭　何首烏　木賊　蛇蛻
石膏　為散每服二錢茶清調下食後日三服
清神散　治頭風頭目昏眩腦痛急脹痛
荊芥穗　甘草　石膏　細辛　龍腦一錢
右為散每服二錢用荊芥茶清調下食後服
八卷十四
天麻散　治偏風頭痛
薑蠶　龍腦　水牛角　硝石
右件令為末每用一豆許吹之神驗
細辛散　治風入腦頂疼陣發頭痛連腦戶或但額
間與眉相引如風所吹如水所淋名曰風頭則經常欲得熱物熨此由風
寒客於足太陽之經入腦其脈微弦而緊謂之風冷頭
痛
細辛　川芎　附子炮　麻黃一分
右㕮咀入連根蔥白豆豉每服五錢水一盞煎至連進三服　一方
白芷　治服
石膏散　治腦風邪氣留連頭痛不已
石膏　天麻　何首烏　各等分
右為散每服二錢蔥白茶同調熱進食後服
搐鼻藥　治腦風頭痛

穀精草　銅綠　硝石
右研勻每用一字吹入鼻內隨痛左右吹鼻中
朴硝散　治時氣頭痛不止
右用生麻油調朴硝塗頂上立止
治破腦風頭面浮腫下脈入身者
右用萬年草不以多少用生薑同研極爛以酒調下熱服汗出即愈
附子湯　治冬月大寒犯腦令人腦痛齒亦痛名曰腦風
麻黃　黑附子　羌活　蒼朮　防風
黃耆　甘草　升麻　白芷　白殭蠶
黃藥
右件都作一服水二盞煎至一盞去滓溫服食後有寒嗽
加佛耳草三分
川芎散
防風　白附子　北細辛　白茯苓　川烏
當歸　乾薑　香白芷　川芎　甘草
右為末每服三錢生蔥白湯調下食後服
八卷　七五
治頭痛有風痰晝夜不得安白芷太陽為末水調貼患處
專治腦實之病邪攻上焦令人頭疼晝夜引痛不能安寧
方
用南方太陽加香白芷半兩用水調塗患處
主香腦
以鵝膽草點鼻中
風頭旋
論
夫風頭旋者以氣虛不充陽氣不能上榮於腦風邪易入
與氣相搏致頭運而旋也又有胸膈之上痰水結聚復犯大寒
陰氣逆上風痰相結上衝於頭亦令頭旋
旋覆花湯　治風上攻頭旋欲倒嘔吐不止惡見日光
不思飲食
旋覆花　前胡　菊花　防風　羌活

熟乾地黃 杏仁 玄參 白殭蠶炒
黃芩 白术 羌活 藁本
甘草炙 羌活 人參 赤茯苓
右為散每服五錢水一盞半生薑五片同煎至八分去滓食後溫服
荊芥子散 治風頭旋運悶起則欲倒
荊芥子 赤箭 細辛 麥門冬 羚羊角屑
地骨皮 石膏 黃芩 防風 甘菊花 三分
枳殼 芎藭 茯神
甘草 半夏
右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服忌熱麵飴糖羊肉
治熱風頭旋心悶衝風起即欲倒方
麥門冬 山茱萸 茯神 黃芩 地骨皮
葛根 人參 蔓荊子 沙參 防風
芍藥 枳實 大黃 甘菊花 龍腦

右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每食後以溫水服二十丸日二漸加
至三十丸忌熱麵豬肉魚粘食
羚羊角散 治風痰頭目旋運心神煩亂宜服
羚羊角 人參 荊芥 芎藭 二分
半夏 赤茯苓 旋覆花 防風
前胡 細辛 麥門冬 枳實
甘草
右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候
溫服忌飴糖羊肉
遠志散 治風頭旋眼運如似屋轉起即旋倒者
甘菊花散 治風頭旋忽忽如醉痰逆不下飲食
甘菊花 天麻一兩 石膏二兩 芎藭 羌活 三分
防風 白术 茯神 杏仁
羚羊角屑 杜若 黃芩 甘草
右搗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不

計時候溫服
麝香天麻丸 治風頭旋目瞑肩背拘急肢節疼痛宜服
麝香 天麻 天南星 白附子 羌活
青黛 乾蠍 附子 防風 桂
蟬蛻 烏蛇 硃砂
右除麝香外搗羅為末再研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服
二十丸溫酒下荊芥湯亦得不拘時
羌活散 治諸陽受風頭目旋運目視昏暗眉骨痛不清
羌活 甘菊花 芎藭 防風 細辛
白殭蠶 草決明 旋覆花 蟬蛻 密蒙花
天麻 蔓荊子 甘草
右為細散每服二錢水一盞煎至七分食後溫服湯點亦得
又方細辛散 治風頭旋
細辛 當歸 桂心 天雄
白芷 芎藭 乾薑 烏頭

山茱萸 生地黃 硃砂
豬肪
右搗篩如麻豆大以地黃汁浸一宿曝乾煎豬肪鎔下藥
下地黃汁令白芷黃色去滓入硃砂末用柳木
不住手攪令稠摩頭頂
菊花丸 治風頭旋目運筋骨疼痛
甘菊花 枸杞子 天麻 獨活 木香
芍藥 防風 天竺黃 赤茯苓
蔓荊子 羌活
右為細末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服十丸荊芥湯下不拘時
旋覆花丸 治肺脾風痰攻心膈頭目旋運不納飲食
旋覆花 枳殼 石膏 升麻 前胡
防風 羚羊角屑 赤茯苓 黃芩
羌活 川大黃 甘草
右搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食後煎竹葉湯下

羚羊角湯 治[illegible]風上攻頭旋目運耳內虛鳴或身體疼痛麻痺

羚羊角鎊 前胡 防風去叉 羌活 [illegible] 前胡

黃芩 玄參 蒼朮 杏仁[illegible]

甘草炙剉各

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後溫服之

檳榔丸 治風痰頭項筋急心胸悶膈痰積上熱下虛健忘方

肉豆蔻去殼 人參 羚羊角 枳實麩炒 黃連

白朮 大黃 甘草 苦參 旋覆花各四

檳榔仁

右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大以溫酒服二十丸漸加至三十丸日三服

無問食前後服之不利已生冷熱麵毒魚肉猪肉[illegible]

事及[illegible]

犀角散 治頭旋心悶[illegible]

犀角鎊 [illegible] 柴胡去苗 沙參

甘菊 [illegible] 石膏碎 杏仁[illegible]

[illegible]

右除牛黃外粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分入牛黃[illegible]各

火許更煎一兩沸去滓溫服

療風邪氣未除發即心腹滿急頭旋眼運欲倒方

蔓荊 獨活 防風 白朮 杏仁去皮尖

枳實 茯神 生薑 羚羊角屑 黃芩

右切以水九升煮取三升分溫三服日三忌桃李雀肉酢物大蒜麵等

白朮散 治風頭旋心悶不利

白朮一兩 前胡去蘆頭 防風 枳殼

赤茯苓 蔓荊子 甘草 半夏

菊花三分

右為粗散每服三錢以水一盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

前胡散 治風頭旋痰逆頭疼不欲飲食

前胡去蘆頭 白朮 [illegible] 防風 [illegible] 茯神一兩

細辛 羌活 [illegible] 甘草[illegible]

右為粗散每服三錢以水一中盞入生薑半分薄荷三七葉煎至

六分去滓不計時候溫服

芎藭散 治風頭旋[illegible]則心腹痛悶急眼運欲倒

芎藭 獨活 防風 杏仁

白朮 赤茯苓 [illegible]

[illegible] 枳殼 黃芩 羚羊角

獨活散 治風頭旋手足[illegible]逆[illegible]

羚羊角散 治一切頭旋本因體虛風邪乘於陽經上注於頭面遂入於腦

亦因痰水在於胸膈之上犯大寒使陽氣不行痰水結聚上衝於頭則令頭旋

荊芥丸 治[illegible]頭旋目痛[illegible]

荊芥穗 細辛 芎藭 白殭蠶 天麻

毛[illegible] 防風 蒺藜子

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食後細嚼荊芥茶[illegible]

下還同前傳

羚羊角湯 治體虛風眩旋眼黑昏悶[illegible]

羚羊角 石膏 甘草 旋覆花

前胡 細辛 羚羊角 菊花

右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑三片煎至七分去

滓食後溫服

人參丸 治風頭旋目眩痰逆惡心胸膈痞滿咳痰涎唾

涕唾逆不欲飲食

人參 甘草 白朮

麥門冬 前胡 枳殼 旋覆花 木香

右為細末湯浸炊餅和丸如梧桐子大每服二十丸食後溫生薑

湯下

祛風散 治[illegible]風頭旋目暗痰癖手足麻木[illegible]

荊芥穗 芎藭 防風 獨活 甘草

麻黃 人參

右爲散每服二錢水一盞入薑三片煎至七分去滓溫服

山茱萸散 治風頭旋目眩體痛

防風 山茱萸 川芎 菊花

天雄 山藥 細辛

右爲細末每服二錢温酒調食前服十便良方加天雄

防風丸 治風頭旋恆運有時心悶欲吐

防風 甘草 石膏 獨活 桔梗

芎藭 白芷

右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服一丸食後荊芥湯下

芎藭散 治風頭旋眼目昏痛運眩惡心

芎藭 人參 前胡 白殭蠶 防風

蔓荊實 天麻

右爲散每服二錢食後溫酒調下

白殭蠶丸 治風頭旋目運愛眠

旋覆花 石膏 [illegible] 龍腦

醫方類聚卷之[illegible]

菊花 [illegible]

右爲細末煉蜜和擣三百杵丸如雞頭子大每服一丸[illegible]

白朮飲 治風邪在頭頭旋不止復加嘔逆

白朮 厚朴 甘菊花 人參 白芷

防風

右㕮咀四兩每服五錢水一盞生薑五片煎至一盞去滓[illegible]

[illegible]散 治風頭旋目眩[illegible]

[illegible] 白芷 當歸 芎藭 甘草

右爲細散每服二錢[illegible]

防風飲子 療風痰氣發即頭旋嘔吐不食

防風 人參 橘皮 茯神

生薑四兩

右切以水六升煮取二升去滓分温四服中間任食一日令盡忌大酢桃

李雀肉蒜麪等物

貼頂膏 治風頭旋及頭旋眼闇皆主之

草麻子 杏仁 石鹽 芎藭 松脂

防風

右等分先擣石鹽以下四種爲末別擣草麻杏仁相次入前即擣細

良久之有膏者先炎自擣[illegible]使事作一帛貼子裁大小

[illegible]貼上兩日一日一易之其病必退即眼破[illegible]

此之[illegible]一方用旋覆花七物相和一方無防風

天雄散 治風頭旋口喎目痛耳聾

逐年痛頭風旋不食食則吐方

前胡 白朮 防風 枳實 茯神

生薑

右以水六升煮取二升去滓分温二服忌桃李雀肉酢等

醫方類聚卷之[illegible] 八一

茶究飲子吐方 患心虛病風頭旋心悶痰飲棄心悶[illegible]不能言

治風痰吐痰飲[illegible]

常山 人參 甘草

右切以水六升煮取二升去滓分温二服相去如人行四五里又

進一服取快吐不利忌生葱生菜熱麪蒜[illegible]

祛痰丸 治風頭旋痰逆惡心胸膈不利

天南星 半夏 赤茯苓 乾薑 陳橘皮

右爲細末薑汁糊丸如梧桐子大每服一十丸加至四十丸[illegible]

下不拘時

雞頭丸 治風頭旋每覺眩冒

雞頭 荊芥 白朮 川芎

右爲末煉蜜和丸如梧桐子大每服[illegible]

藿香散 治風頭旋目運痰逆惡心不思飲食

藿香葉

右爲散，每服二錢，食後臘茶清調下，日三。

松花浸酒方 治風眩頭旋腫痺

右用松花并臺，春三月取五六寸，如鼠尾者，不計多少，蒸，細切一升，

用生絹囊貯，以酒三斗浸五日，每服空腹煖飲五合，晚食前再服。

乾薑方 治頭眩

右以乾薑爲末，以酒調一錢服，立効。

蟬殼方 治風頭旋腦轉

右用蟬殼一兩，微炒爲末，非時溫酒下一錢。

治頭風項旋

右於九月九日菊花暴乾，取家糯米一斗蒸熟，用五兩菊花末拌，如常醞法，多用細麵麯爲良，候酒熟，即壓之，去滓，每暖一小盞服。

止逆湯 [illegible] 白蘞 日 [illegible] 吐逆善嘔 令生 [illegible] 此 [illegible] 用効

川芎 甘草

右㕮咀，每服四五錢，用水一盞，煎至八分，食前熱服。

化風丸 治風氣上攻，頭目旋暈，[illegible]拘急，心胸塞不通利

思不爽

藁本 荊芥穗 細辛 甘草

草烏頭 川芎 香白芷

右件爲細末，以蒸餅爲丸，每服一兩作一十丸，朱砂爲衣，陰乾，每服一丸，細嚼，茶清送下，食後。

芎辛圓 治風上攻，頭目昏眩，痰涎壅塞，聲重

桔梗 川芎 甘草 防風 細辛

蜀椒

右件爲細末，入研者研勻，煉蜜爲丸，每兩作一十丸，朱砂爲衣，每服一丸，細嚼，溫酒茶清任下，食後。

白附子丸 治風痰，頭目昏眩

半夏 天南星 寒水石 細辛

白茯苓 白僵蠶 肉桂 白附子

川芎 香白芷 木香

右件爲細末，生薑汁煮麵糊爲丸，如梧桐子大，每服三十丸，食後生薑湯送下。

枳實散 治風頭旋，起倒無定

枳實 獨活 石膏 蒴藋一兩

右件搗羅爲散，每服二錢，以水一中盞，煎至六分，去滓，不計時候溫服。

獨活散 治風頭旋，手足厥冷，身體疼痛，心亂，反倒如顛，發歇無常

獨活 白朮 防風 細辛 人參

旋覆花 天雄 桂心 菝葜根

右件搗羅爲散，每服不計時候，以溫酒調下二錢。

獨用散

荊芥穗 菊花 白[illegible]

右件同爲細末，煉蜜爲丸，每兩作一十丸，每服一丸，細嚼，茶清送下。

百[illegible]丸 治風氣上攻，頭目昏眩，項背拘急，肢節煩疼，大便多秘，夜間不睡，並皆治之

川芎 桔梗 甘草

荊芥穗 甘草 枳殼 白殭蠶

川芎 羌活 防風 香白芷 白茯苓

天麻 細辛 藁本 白附子

細松煙墨

右件爲細末，煉蜜爲丸，每兩作一十丸，每服一丸，細嚼，茶清送下，食後臨臥。

龍腦方 用龍腦 甘 [illegible] 治風頭眩

風頭眩

素問諸風掉眩，皆屬於肝，則知肝風上攻，必致眩暈。所謂眩暈者，眼花屋轉，起則眩倒是也。由此觀之，六淫外感，七情內傷，皆能致眩。以外感之，風則有汗，寒則掣痛，暑則熱悶，濕則重滯，此四氣乘虛而眩暈也。又有七情所感，遂使臟氣不平，鬱而生涎，結而爲飲，隨氣上逆，令人眩暈，眉稜骨痛，眼不可開，寸脈

多九有此為異月與夫產後虛勞家不能納氣歸元使諸氣逆奔
而上此眩運之出於氣虛也頭[illegible]吐嘔痰飲肝家不能收攝使氣徒
諸血夫真良[illegible]此眩運之生於血虛也以致新產之後血暈虛眩或
癆瘵不[illegible]及金刃血崩皆能眩運此可不推其致病之因乎然古云
不可妄施汗下攻然兩眩運欲解自汗此有之君諸虛損于衄者
言亂口噤與夫大[illegible]陰病下利止而頭眩時時自冒者此虛極而脫[illegible]
當大多依眩運)夫風頭眩者頭與目俱運也由血氣虛風邪入於腦
而引目系故也五臟六腑之精氣皆上注於目血氣與脈併上為目系上
屬於腦後出於項中逢身之虛則為風邪所傷入腦則腦轉而目系
急目系急故成眩也甚則倒仆也診其脈洪大而長者居眩又得陽
維浮者暫起目眩也風眩久不差則變為癲
祛風頭[illegible] 治風眩眩轉面上游風
[illegible] 茯神 防風 芎藭 薯蕷各四錢
葛根 桂心 細辛 人參 天雄
乾薑 枳實 黃芩 蜀椒 獨活二兩
[illegible]
麥門冬 天門冬 石膏 作石膏各五兩 山茱萸一斤
右㕮咀每服五錢[illegible]煎三合日三服[illegible]以知為度
蔓荊子丸 治白風邪鼓作頭目眩運目不忘隔晝則倒仆
[illegible]一兩 [illegible] 芎藭[illegible] 防風
天麻 [illegible] 人參[illegible] 白[illegible] 天南星
乾蠍 [illegible] 龍腦[illegible] 犀角[illegible]一兩
右為末再研[illegible]煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸臘茶清
下食後臨臥服
增損黑錫丹 [illegible]治陰陽不升降上熱下冷頭目眩暈病至危篤
或[illegible]痰上潮[illegible]者
黑錫 丹頭 川楝子 陽起石 木香 沉香
舶上茴香 官桂 附子
胡蘆巴 破故紙 [illegible] 磁石[illegible]
右為末酒糊丸如梧桐子大每服五十丸至七十丸空心人參茯
苓生薑棗湯空心食下[illegible]

[illegible]活湯 治風頭眩筋脈拘急痰涎壅盛肢節煩疼
[illegible] 甘菊花 麻黃 [illegible] 芎藭
防風 石膏 前胡 黃芩 細辛
甘草 枳殼 白茯苓 蔓荊實
右每服三錢水一盞入生薑一片薄荷三葉煎至七分去
天雄散 治頭目眩運[illegible]
[illegible]溫服不拘時
天雄 防風 芎藭 人參
桂心 葛根 莽草 白朮 獨活
[illegible] 茯神 山茱萸各六分 遠志
右治下篩先食以菊花酒服方寸匕日二漸加至三匕以知為度菊
花酒法九月九日取鄧州甘菊花曝乾作末以米[illegible]和作[illegible]
[illegible]散 治[illegible]風毒上攻頭痛目眩
[illegible]花 白花蛇[illegible]
天雄 甘菊花 天麻 肉桂[illegible]
[illegible]
藁本一兩 細辛一分 羌活一兩 秦艽[illegible] 防風[illegible]
[illegible] 甘草[illegible]
右為細散每服不計時候以溫酒調下一錢
[illegible]頸 治頭風目眩風毒[illegible]
[illegible]腦丸 入目中就風[illegible]明目去諸疾
生地[illegible] [illegible] 吳茱萸 大青一兩
[illegible] 梔子仁 山梔[illegible] 竹葉[illegible]
[illegible]
右先取[illegible]中[illegible]服[illegible]即
入[illegible]
令[illegible]
用[illegible]
每二三[illegible]
[illegible]
[illegible]湯 白風[illegible]

獨活 茯神 甘草 當歸 牡蠣
白术 附子 酸棗仁 防風 遠志
人參 二兩 黃耆
右剉如麻豆大每服五錢水一盞半生薑三片棗一枚同煎至一盞去滓
溫服不拘時
芎藭湯 治風痹眩暈
芎藭 一分 人參 甘草 黃芩 黃耆
茯苓 秦艽 厚朴 烏喙 防風 六兩
山茱萸 松實 各三兩
右㕮咀以水一斗煮取二升半分五服日夜盡服 方分五服
二日盡
杜若散 治風頭目眩心中悶不可飲食嘔吐不利
杜若 防風 赤茯苓 山茱萸 一兩 蔓荊子
芎藭 三分 秦艽 二分 天雄 石膏 一兩 黃芩
甘草 當歸

右為麤末每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候
赤茯苓散 治頭風目眩遍問起即欲倒不下飲食
赤茯苓 三分 防風 甘菊花 二分 麻黃
細辛 羌活 杜若 三分 前胡 白术 一分
杏仁 甘草
右件藥搗為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服
旋覆花散 治風熱上攻頭旋運眼目昏暗
旋覆花 白术 一分 麥門冬 前胡
枳殼 甘菊花 二分 防風 半夏
川大黃 獨活 甘草
右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不
計時候溫服
甘菊花散 治頭風目眩旋
甘菊花 茯神 羚羊角屑 三分 防風 一兩去蘆頭
川升麻 一分

石膏 一兩 白芷 芎藭 甘草
牡荊子 一兩 菊花 枳殼
右搗羅為散每服二錢以水一中盞入生薑半分竹葉二十七片煎
至六分去滓不計時候溫服
白芷散 治頭風目眩思風令心悶不下飲食
白芷 防風 一兩 白茯苓 一兩 細辛 一兩 芎藭 一兩
天雄 蔓荊 一兩 人參 杜若
桂心 一分 白术 一兩 前胡
右為細末每服不計時候以溫酒調下二錢
沉香磁石丸 治上氣下虛頭目眩暈耳鳴耳聾
沉香 磁石 胡蘆巴
陽起石 附子 椒紅 山茱萸 山藥
青鹽 甘菊花 蔓荊子 各半兩
右為細末酒煮米糊為丸如梧桐大每服七十丸空心鹽湯送下
命本不得服此丸者湯送下養正丹亦得

茯神湯 治風眩心中恍惚不能語
人參 麥門冬 山茱萸 各一兩 前胡
遠志 枳殼 白茯苓
半夏 甘草 半兩 茯神 各一兩
右剉散每服四錢以水一盞生薑五片棗一枚煎至七分去滓食前服之
防風散 治風頭旋運
防風 芎藭 山茱萸 人參 白术 遠志
獨活 桂心 茯神 天麻
右為細散每服一錢溫酒調下日三夜一服
防風枳殼散 治頭風眩
防風 枳實
前胡 牛蒡 麥門冬 芎藭 茯神 麻黃
右㕮咀以水六升煮取二升七合分三服
當歸丸

面如鬱冒……甚速……不救

白附子　天南星　烏蛇　防風　天麻
天麻　人參　全蠍　天麻
白茯苓　烏蛇肉　白鮮皮　白芷　麻黃
細辛　枳實　甘草　羌活
丹砂　蝎梢　龍腦　麝香
右為末煉蜜丸如鷄頭大每服一丸……酒化下
追風丸 治虛風頭痛目眩……手足舉力……不省人事
羌活　防風　人參　麻黃
天南星　甘草
白附子　川芎　川烏　白芷
細辛　白茯苓　白朮　全蝎　天麻
黑附子　人參
麝香　硃砂　馬牙硝　龍腦
右為細末煉蜜為丸每兩作十丸每服一丸溫酒化下或荊芥湯下
服食後臨臥服
香芎丸 治諸風上攻頭目昏眩痰涎壅滯……
生犀角　荊芥穗　白芷
香附子　龍腦　薄荷葉　甘草
右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸生薑湯下不拘時候
防風散 治……
防風　羌活　麻黃　茯神
川芎　細辛　石膏　黃芩
右㕮咀每服……水一盞半入生薑……竹瀝……
半夏……一盞不拘時候溫服
前胡散 治風頭目眩痛……嘔吐不下
前胡　旋覆花　防風　甘草　枳殼

黃芩　柴胡　桔梗　白茯苓　澤瀉
右為麤末每服抄五錢水一中盞煎至一盞去滓食後或臨臥溫服
然服之日進三服
茯苓半夏湯 治風熱痰逆嘔吐或眩運……
半夏　赤茯苓
黃芩　甘草　陳皮
右用水二盞生薑三片煎至一盞……
治眼目昏暗……
桑白皮　人參
黃芩　大黃
右剉散水一升……分三服食後臨臥服
芎辛湯 治……頭目昏……
川芎　細辛　甘草　白芷
右為細末每服二錢……
芎犀丸 治頭目運眩偏正頭痛……
犀角　石膏　天麻
硃砂　防風　白芷
右除丹砂外為細末……每服一丸……
大芎辛丸 治風痰頭目昏眩……頭痛服多効
川芎　生犀角　防風　甘菊花
白芷　細辛　甘草　龍腦
右為末煉蜜丸如彈子大硃砂為衣每服一丸細嚼荊芥……
食後服清頭目化痰……
天麻丸 治……風旋……陰陽氣……
頭疼身拘倦
川芎　天麻

戰汗自便先手足項是門[illegible]附之以[illegible]使[illegible]愈[illegible]
川芎頭面汗出
芎藭散 治[illegible]目眩心腹[illegible]不下飲食
芎藭　杜若　白朮　天麻
防風　赤茯苓　人參　半夏
陳橘皮　甘草
右銼為散每服三錢以水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計
時候溫服
人參前胡湯 治[illegible]風痰頭運目眩
前胡　橘紅　半夏麴　木香　枳殼
紫蘇葉　赤茯苓　南星　甘草　人參
右為粗末每服二錢生薑七片[illegible]煎[illegible]服
人參散 治[illegible]頭眩[illegible]不利
人參　防風　白朮　當歸　麥門冬
[illegible]　桂　黃芩　芎藭
[illegible]

右為粗末每服五錢水一盞半[illegible]去滓食前溫服日再夜一
菊花散 治[illegible]頭痛眼疼[illegible]
細辛　防風　前胡　茯神
[illegible]
右為粗末每服五錢水一盞半煎至一盞去滓入竹瀝半合更煎
食前溫服日再夜一
山芋散 治頭風目眩耳聾
山芋　甘草　五味子　細辛
山茱萸　升麻　蔓荊實　防風
右為細散每服三錢空心溫酒調下
防風散 治風頭眩目痛
防風　羌活　甘菊花　白附子　山芋
藁本　附子　蔓荊子　香附
右為末每服一錢[illegible]茶清調下或煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸茶
酒任下亦得

消風散 治[illegible]頭目昏眩[illegible]不利[illegible]
石膏　朱砂　芒硝
皂角　[illegible]　滑石
右為細末每服半錢新汲水調下[illegible]
可[illegible]
菊花散 治[illegible]消風化痰[illegible]頭目[illegible]
細辛　石膏　甘草　防風　藁本
旋覆花　蔓荊子　川芎
右為細末每服二錢水一盞生薑三片煎至七分食後熱服
人參[illegible]治邪[illegible]於陽經上注頭目逆[illegible]
[illegible]頭目一切[illegible]
茯神　芎藭　甘草　枳殼
半夏　白芷　防風　附子
右㕮咀每服四錢水一盞半生薑三片煎至七分不拘時
漢防己散 治頭風目眩[illegible]不下食[illegible]嘔吐[illegible]
漢防己　杜若　防風　細辛　桂心

右銼為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服
茯神散 治頭風目眩
茯神　甘菊花　蔓荊子　白蒺藜
石膏　防風　甘草　枳殼
右為細末[illegible]不計時候以熱水調下二錢
芎藭散 治[illegible]耳聾
芎藭　防風　細辛　山茱萸　杜若
白茯苓　芎藭　甘菊花　蔓荊子
右為細散每服不計時候溫酒調下二錢
[illegible]治[illegible]不飲食[illegible]益氣力
薯蕷　白朮　五味子　丹參　防風
山茱萸　人參　生薑
右切以生絹袋盛[illegible]酒二斗五升[illegible]五日[illegible]溫服七合日二[illegible]忌桃李雀

頭門

犀角湯 治風頭眩目痛

犀角 升麻 兩 甘菊花 人參 茯神 兩

防風 石膏 兩 葛根 兩

右為末每服三錢水一盞入芒硝末半錢竹葉十片煎至七分去滓

温服不拘時

防風湯 治風頭眩倒眼旋腦痛

防風 赤茯苓 芎藭 各 獨活 前胡 去蘆頭

麻黃 細辛 石膏

右為粗散每服五錢水一盞半煎至一盞入竹瀝半合再煎令沸去滓

温服日三不拘時

守中丸 治風頭眩腦轉目系急忽然倒仆

白朮 人參 甘菊花 山芋 枸杞子 二兩

白茯苓 麥門冬 生地黃

右為末先用生地黃汁於銀石器內入蘇三兩白蜜三兩同煎逆旋攪

取十上金花令盡得五升許於銀器內拌炒前七味藥末令盡候

乾入白蜜同搗數千杵丸如梧桐子大每日空心或食後清酒下五十丸

服百日後五臟充滿肌膚滑澤 四季 甲子日

此藥亦名為五芝地仙金髓丸

菊花丸 治風頭旋眩頭目俱運輕則心悶重則旋倒

甘菊花 枳殼 芎藭 防風 去叉

桂 細辛 獨活

右為末煉蜜丸如梧桐子大食服二十丸空心酒下

日再服

新補薄荷餅 治風壅頭旋煩悶

白檀 荊芥穗 白芷 薄荷葉

甘草 縮砂仁

右為末每服一錢百藥湯點食後臨臥熱嚼服

硃砂薄荷丸 治頭目昏眩口舌生瘡痰涎壅塞

咽喉腫痛除風熱消瘡疹利七竅爽氣清神

薄荷葉 川芎 桔梗 白芷 蒺藜仁 防風 各一兩

甘草 縮砂仁 腦子

右為細末煉蜜和丸每兩作二十丸每服一丸噙化或細嚼茶清送下

香芎散 治風虛眩運

木香 白朮 半夏麴 橘皮 白茯苓

縮砂 丁香 甘草

右判散每服三錢水一盞五片生薑同煎食前服

本方加當歸川芎各三分桂半兩治血虛眩運

三五七散 治陽虛眩運頭痛惡寒耳鳴或耳聾

人參 附子 細辛 甘草 乾薑

山茱萸 防風 山藥

右判散每服四錢生薑五片棗二枚煎食前服

枳實湯 治風痰運倒眼旋腦項急痛

枳實 防風 芎藭 麻黃

杏仁 半夏

右為粗散每服五錢以水一盞半煎至一盞去滓入竹瀝半合更煎

沸早晚食前温服

山芋散 治風頭眩轉耳聾

山芋 防風 升麻 山茱萸 細辛

甘菊花 蔓荊實

右為細散每服一錢食前温酒調下日再

人參湯 治風頭眩旋痰壅心胸煩悶

人參 柴胡 羌活 荊芥穗 旋覆花

甘菊花 麥門冬

右為粗散每服五錢水一盞煎至七分去滓早晚食後臨臥

温服

茶調散 治頭目昏眩偏正頭疼等

雄黃 川芎 薄荷葉 道人頭

蒼术 天竺黃

右爲末入合水煎中當一字稍熱

治頭痛眼昏心悶陰雨痛甚

當歸 山茱萸 防風 川芎 芎藭 各一兩

鵝子

右爲細末前藥入細散令調酒服方寸匕日三

薄荷散 治風邪上攻頭目心膈煩悶

薄荷葉 甘菊花 甘草 白芷 石膏

芎藭

右爲散每服二錢荊芥茶調下

大三五七散 治風頭旋口喎目斜耳聾亦治腸虛風寒入腦頭痛目眩如舟車之上耳內蟬鳴或風雨之聲應風寒濕痹脚氣緩弱等疾並皆治之

天雄 細辛 山茱萸 乾薯蕷 薯蕷

防風

右治下篩每服方寸匕日再不知稍加以知爲度

川芎散 出本事方 治風眩頭暈

川茱萸 山藥 甘菊花 人參 茯神

小川芎

右爲末每服二錢酒調下不拘時日三服不可誤用野菊花

川芎散 治風眩頭暈偏正頭疼身體不仁氣上衝胸膈如在舟車之上

川芎 北細辛 白茯苓 白朮 炙甘草

桂枝

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片煎不拘時服治痰熏

服青州白丸子

加味二陳湯 出究原方 治痰厥或因氣鬱所傷

陳皮 半夏 白茯苓 甘草 丁香

胡椒

右剉散每服四錢生薑三片烏梅一個同煎不拘時熱服体虛者增元散服之

防風散 治胃虛冷治頭目不清肩背強痛勿(?)明目及仲(?)不受

防風 川芎 香白芷 甘菊花 甘草

川芎散 治氣虛頭目昏眩肢體倦怠

芎藭 荊芥穗 石膏 甘草

右生用爲細散每服二錢熱湯調下

芎朮湯 治冒雨著濕重頭暈不欲食

川芎 白朮 附子

右剉散每服四錢水一盞半生薑七片棗一枚煎去滓食前服

近效白朮附子湯 治風虛頭重眩苦極不知食味暖肌補中益精氣又治風濕相搏骨節疼痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者

白朮 附子 甘草 桂心

右切以水六升煮取三升分溫三服日三初服得微汗即解能食復煩者將服五合以上愈恐長年人恐服一升多者宜服六七合爲妙

四神湯 治風頭眩運目不定

獨活 石膏 麻黃

羚羊角散 治風頭旋運目不定

羚羊角 川芎 茯神 防風 枳殼

右爲末每服一大錢水一盞煎至七分去滓服日三

天麻 附子 貫芎

右以水煎去滓溫服之

桂星散 治外傷風冷內積憂思氣鬱聚於胸膈隨氣上厥

伏留陽明頭痛肩背煩熱服藥不效者

芎菊散 治痰

石膏 甘草

右爲末每服三錢茶清調下

芎朮湯 治冒雨中濕眩暈嘔逆頭重不食

川芎 半夏 白朮 甘草

右咬咀用生薑煎服

白薇湯 治平居無疾忽如死人身不動搖默默不知人目閉口噤

閉口難開口噤不能言或微知人惡聞人聲但如此自移時方寤此由亡汗過多血少氣并於血陽獨上而不下氣壅而不行故身如死氣過血還陰陽復通故移時方寤名曰鬱冒亦名血厥婦人多有之宜白薇湯倉公散

白薇 當歸各一兩 人參半兩 甘草一分

右爲麤末每服五錢水二盞煎至一盞溫服

倉公散 治同上方

瓜蒂末 藜蘆 雄黃 礬石 煅各等分

右爲細末少許吹入鼻中覺自愈度

芎歸湯 治一切失血多眩暈不能起

芎藭 當歸 酒浸 白芷 甘草 各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時候

茯苓桂枝甘草湯 出王氏方 治上衝胸或顫眩運

茯苓 兩 桂枝 三分 白术 甘草 炙各 兩

右剉散每服四錢新水煎服風證加川芎荼葉天麻如證加生地黃

茶調通調散 一名茶調散 治一切諸風攻注頭目昏痛及心憒頭額皮膚痛痒并風毒壅滯清爽神志通和關竅消風去汗並宜服之

小三五七散 出…方 治頭風目眩耳聾

天雄 炮去皮 細辛 薯蕷 七兩 山茱萸 五兩

右爲末每服五分溫酒下不知稍增以知爲度或用粥飲服亦得

附子膏 治風頭痛摩頭 方見首風類

麴术散 治胃虛頭眩重若小不足嘔吐不飲食 食蒙嘔吐食

黃丸 神麴 一兩 炒 白术 兩

右爲末每服二錢生薑湯調下或以酒糊丸如梧桐子大每服三五十丸陰飲任下忌桃李雀蛤日三服

芎歸湯 治去血過多頭暈或崩漏不省人事不自知悶絕倒

推撿獨頭見前度

川芎 大當歸 去蘆各等分

右剉散每服二錢水一盞半煎不拘時候

桂花丸 出…方 治暑冷痰中

肉桂 茯苓 半分

右爲細末煉蜜丸每兩作八丸 每服一丸嚼碎茶清下

九通用

消暑丸 出…方 治暑暍頭疼不起

用局方常服消暑丸每服七十丸

水蘇丸 治風頭暈

用水蘇一斤爲末二兩蜜十一斤半每服之

菊花丸 治風目眩胸中痰目表出血痹背肉痛

用甘菊花切作片明淨生

玉骨散 出…方 治傷寒熱疾及頭風 風伏血脈頭痛頭旋面暈

川芎 二兩 細末每服半錢白湯茶調下 小兒大小加減與之

治諸風痰頭目暈悶嘔吐

用真方白丸子三十粒 蘇合香丸 三粒 全蝎一箇 人參 木三味研細

汝南橘皮煎湯生薑汁少許調下

治心氣不足怔忪頭運

用蘇合香丸間服交泰丹

玉液湯 出…方 治七情傷感氣鬱生涎隨氣上逆頭目眩運心嘈忪悸眉棱骨痛

右以大半夏 洗 湯泡七次 切作片子 每服四錢水二盞生薑十片

煎至七分去滓入沈香 一呷溫服不拘時候

[illegible]

食忌才六以兩手指右腋着脊按風夾文云凡人常覺食背疼不可忍

節脇腰間脚內仰面着褥兩手上頭左右內向挽之左右三十七 住待

氣動徒然始足用初機依息不得洗後被若無病人常欲得旦起

午時日沒三辰別七余東枕府舍腰頭項痛風痺口內生瘡牙齒

風頭頸眩衆病盡除又云大寒不能時熱又頭人急有驚因此病及

耶成痛去身五六不能者也又云低頭不息六通可發耳聾目眩咽喉不

利又云大前倒半不思六通愈耳聾目眩隨左右龍伏並兩膝耳

若地半夏急多日入至大坯食思耳聾目暗病天行不已耳冊十方亦
能滋頭則不快也
大防風丸 治風邪上攻頭目昏眩項背拘急
防風 山藥 甘草 蔓荊子
香白芷 獨活 藁本 川芎
天麻 肉桂 白附子 全蝎
細辛 大豆黃卷 細辛
右件為細末煉蜜為丸每一兩作十丸硃砂一分為衣細嚼茶酒
任下
天麻除風丸 治一切氣上壅頭昏目痛鼻塞耳鳴項
背拘急服此藥服後頓覺清氣利頭目
天麻 防風 細辛 藁本 川芎
香白芷 乾山藥 當歸 蟬殼 當歸
甘草 白附子
右件為細末煉蜜和丸每一兩作十丸每服一丸茶酒任下食後
川芎散 治頭目不清利
川芎 羌活 防風 柴胡 升麻
藁本 生甘草 黃芩 黃連
生地黃
右為細末每服一錢或二三錢食後茶清調下忌酒麵
川芎散
青黛 蔓荊子 川芎 菊花 石膏
細辛 荷葉 [illegible] 紅豆
右為極末[illegible]
羌活清空膏
羌活 防風 甘草 黃芩 蔓荊子
生黃芩
右為細末每服一錢茶清調下食後臨卧
羌活湯 治風熱壅盛上攻頭目昏眩
羌活 防風 細黃芩 甘草 黃連

黃芩 芍藥 杜若 防己 赤茯苓 石膏
右為粗散每服三錢以水一盞半入甜竹茹一分煎至六分去
滓不計時候溫服
釣藤散 治肝厥頭暈清頭目
釣藤 陳皮 半夏 麥門冬 茯苓
茯神 人參 甘菊花 防風 石膏
甘草
右為散末每服四錢水一盞半生薑七片煎至八分去滓溫服之
白朮[illegible]丸 治風痰上厥眩暈頭疼
白附子 南星 半夏 旋覆花
天麻 川芎 橘紅 殭蠶 乾薑
全蝎
右為末用生薑半斤取汁打麵糊為小丸每服五十丸食後薑湯下
前胡湯 治風頭眩飲食不下
前胡 旋覆花 黃芩 防己
枳殼 防風 甘草 赤茯苓 石膏 桂
右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓早晚食後臨卧溫服
天麻丸 治頭目風眩鼻塞或旋運
天麻 羌活 藁本 白芷 芎藭
芎藭 細辛 麻黃 牛黃
右為末煉蜜和丸如皂子大每服一丸研細荊芥湯下
青神散 治頭風旋運面目瞤動神志不清鼻塞聲重
玉[illegible] 川芎 防風 薄荷葉 白芷
荊芥穗 羌活 細辛 甘草 香附子
右為細末每服一大錢茶清調服或溫水
治風頭眩[illegible]吐冷水心[illegible]
防風 羊角 天雄 細辛 附子
薯蕷 茯苓 白朮 桂 乾薑
右合下篩酒服方寸匕[illegible]頭百無復

右為末煉蜜為丸每兩作十圓每服一圓細嚼茶清下

川芎散 治風熱上衝頭目眩熱腫及胸中不利

川芎　槐子各一兩

右細末三錢如胸中氣滯不利生薑湯調目疾病諸風熱上攻

㕮咀一兩水煎食後

槐子散

槐子　黃芩　木賊　蒼术各等分

右為細末茶清調下食後

人參消風散 治風上攻頭目昏痛耳鳴項背拘急

治諸風作熱皮頭目眩暈

南星　防風　甘草一兩

右㕮咀每服五錢水一盞半生薑十片煎服面上如蟲行加全蠍

治頭風[illegible]

以菊花茯苓合用丸以成膏[illegible]和每服如彈子一丸

治頭眩暈經久不差四肢痠痛飲食無味好入[illegible]

蒼术　知母

右二味剉細圓如梧桐子大參元末飲送下二十圓日進三服忌

桃李雀等

主中風頭眩心腦浮熱手足無力筋骨煩疼言語似澀身動搖

以烏雞頭一枚去毛先如去頭[illegible]令極熱細切更於豉汁內煮著五

味調和空心食之妙

腦受風冷頭痛

論

夫腦受風冷頭痛者謂腦虛有人風不下行復感風寒之邪相搏其氣

厥逆上攻頭故令頭痛也亦有數歲不已更腦痛者是風寒在於骨髓

也故云腦疾風疾頭痛其人脈伏而時見者手足寒令重節則必〇天厥

逆頭痛者頭痛甚者痛數歲不已是也蓋腦為髓海[illegible]於頭痛甚

骨髓屬腎[illegible]寒[illegible]

亦痛也

牛黃鐵粉丸 治風痰氣厥頭痛心胃[illegible]

牛黃　鐵粉　水銀　半夏　天南星各一兩

朱砂　蛤粉　丹參　甘松　白附子

右為細末煉蜜和如梧桐子大每服五丸至七丸生薑湯下

臥服[illegible]

金牙丸 治風氣厥頭痛痰逆惡心[illegible]

金牙　犀角　龍腦　麝香

川芎　天南星　半夏　天麻　白僵蠶

右為細末[illegible]和丸如梧桐子大每服十五丸[illegible]

芎藭湯 治胸膈風痰氣上攻頭痛[illegible]

芎藭　旋覆花　防風　藁本

細辛　[illegible]　石膏　甘草

右為粗末每服三錢生薑三片荊芥三五穗水一盞同煎

溫食後熱服

犀角半夏丸 治風痰攻衝頭痛利咽膈和胃氣進飲食

天南星　木香　桔梗　天麻　人參

半夏　白礬　[illegible]　青橘皮

右為細末[illegible]如梧桐子大每服

加至二十丸淡生薑湯下不計時候

天南星丸 治風痰頭目旋運肢節拘急

天南星　天麻　附子

白附子　川芎　半夏　旋覆花

右為細末[illegible]每服三十丸至五十丸荊芥薄荷湯下

不計時服

附子散 治痰厥頭痛胸膈短氣嘔吐白沫飲食不消

附子　前胡　半夏　枳殼

檳榔　石膏　芎藭　人參

右細剉和勻每服四錢水一盞生薑半分煎至五分去滓不計

時候溫服

夾香散　治風痰攻衝頭痛嘔吐[illegible]
川芎[illegible]
半夏[illegible]　白附子[illegible]　天南星[illegible]
右為細末[illegible]每服[illegible]加至
十五丸生薑[illegible]下食後服
[illegible]天麻丸　治風痰[illegible]頭[illegible]發運[illegible]
膽[illegible]
天麻[illegible]　防風[illegible]　[illegible]　甘菊花[illegible]
天南星[illegible]
右為末[illegible]每服[illegible]
化痰丸　治風痰[illegible]頭目[illegible]胸膈[illegible]
半夏[illegible]　天南星[illegible]　白附子[illegible]　朱砂[illegible]
[illegible]　丁香[illegible]
右為細末以生薑自然汁[illegible]半夏末作糊和丸如梧桐子大每服
十五丸至二十丸生薑湯下不拘時服
[illegible]
蔥白湯　治冷熱風氣發頭痛[illegible]不得者
蔥白　烏頭　甘草　真珠　恒山[illegible]
右㕮咀水[illegible]三升[illegible]每服[illegible]吐即止
桃葉[illegible]
防風散　治痰[illegible]頭痛
防風[illegible]　[illegible]　附子[illegible]　半夏[illegible]　前胡[illegible]
石膏[illegible]
右為散每於食後以生薑茶調下一錢
石膏丸　治痰[illegible]頭痛目眩心膈不利
石膏[illegible]　甘菊花[illegible]　附子[illegible]
防風[illegible]　枳殼[illegible]　葶藶子仁[illegible]　陳皮[illegible]
右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食後及夜臥
[illegible]溫水下二十丸
[illegible]痰湯　治一切痰飲頭目眩運或痰飲留積不散胸膈
痞塞脇肋脹滿項痛嘔吐[illegible]

半夏[illegible]　天南星[illegible]
[illegible]
[illegible]每服一錢水[illegible]食後[illegible]一方
[illegible]
小[illegible]丸　治風痰[illegible]頭痛[illegible]胸膈不利[illegible]食少
半夏[illegible]　白附子[illegible]　天南星[illegible]
[illegible]
右為細末[illegible]丸如[illegible]
大每服[illegible]食後[illegible]
菊花散　治風痰[illegible]頭目眩
菊花[illegible]　白附子[illegible]　枳殼[illegible]
右為散每服一錢以臘茶清調服不拘時候
白附[illegible]治風[illegible]頭目[illegible]
天南星　天麻　半夏[illegible]　川芎[illegible]　白附子[illegible]
右等分為細末入腦麝少許[illegible]合[illegible]清水丸如梧桐子
大每服五七丸加至十丸食後茶[illegible]下服時[illegible]
[illegible]
[illegible]散　[illegible]痰[illegible]
南星[illegible]　半夏[illegible]　白附子[illegible]　白僵蠶[illegible]　牙皂[illegible]
右為末[illegible]如梧桐子大每服三十丸[illegible]
天南星丸　治風痰[illegible]
天南星[illegible]　白附子[illegible]　半夏[illegible]　木香[illegible]
右為末[illegible]丸如[illegible]大每服[illegible]食後生薑湯下
順氣散[illegible]
南星[illegible]　川烏頭[illegible]　附子[illegible]　木香[illegible]
右㕮咀每服三錢水[illegible]生薑[illegible]煎服
治痰厥頭痛嘔吐之方[illegible]
茯苓[illegible]　人參[illegible]　[illegible]
右[illegible]水[illegible]服[illegible]
治[illegible]頭痛[illegible]非中風[illegible]

痛生部考療方

金下星 附子

右為散以冷水服方寸匕適 有桂心一分忌豬肉冷水等物

又方

百山四分 甘草一兩

右切以水七升煮取二升分服 升不可更服 忌生

蔥生菜海藻菘菜

治痰厥頭痛方

旋覆花 寸 茯苓

右為散不計時候以荊芥茶清調下一錢

又方

附子生用 半夏生用

右為末等分以水調如膏用紙花大小塗兩邊太陽穴上

乾痊立驗

白附子散 治風頭痛 及頭痛 如破 非中冷又非中風 每服一字

以上藥十箇取內蓋 以熱酒調下 合頭七分 煎溫服 臨臥

佐烏梅亦可

山芋丸 治厥逆頭痛及齒痛骨寒

山芋 天雄 硫黃 白茯苓 五味子

磁石 熟乾地黃

右為末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸食前溫

酒下

附子湯 治風寒客於頭中 連引腦頂痛 齒痛

附子 桂心 五味子 白茯苓

人參 補骨脂

右剉如麻豆大每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

救附子 治厥逆頭痛 齒痛骨寒

蜀椒 附子 木香

細辛

右為末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服十丸空心日午臨臥溫酒下

三五七散 治厥逆頭痛

丁未十月中從夫人年七十以上 因勞役 氣虛 頭痛 胸中不利大便不

通 而來求治 前醫以寒涼之藥 又作大不能伸 故也 疑其有

熱 服 風藥 大便行 其病不減 恐其有火 服七八十丸 大便復見兩三

行 元證不瘳 增加 吐逆 食不能停 痰唾稠粘 出不止 眼黑頭旋 惡心

煩悶 氣短促上喘 無力 心神顛倒 兀兀不止 目不敢開 如在風雲中

頭苦痛如裂 身重如山 四肢厥冷 不得安臥 先師料前證 是胃氣已損

復兩次重虛 脾胃病名 曰痰厥頭痛 與半夏白朮天麻湯治之

半夏白朮天麻湯

天麻 半夏 黃芪 人參 白朮

蒼朮 橘皮 澤瀉 茯苓 炒麴

麥芽 乾薑 黃柏

此頭 痛甚者 謂之足太陰痰厥頭痛 非半夏不能療 眼黑頭旋 風虛內

作 非天麻不能除 其苗 謂之定風草 獨不為風所動也 亦 治內風之

神藥也 內風者 虛風是也 黃芪甘溫 瀉火 補元氣 實表虛 止自汗 人

參甘溫 瀉火補中益氣 二朮俱苦甘溫 除濕 補中益氣 澤苓利

小便導濕 橘皮苦溫 益氣 調中升陽 麴消食 蕩胃中滯氣 大麥蘗寬

中助胃氣 乾薑辛熱 以滌中寒 黃柏苦大寒 酒洗 以療冬天少火在泉發躁

也

右件每服半兩水二盞 煎至一盞 去滓 帶熱服之 食前

石膏散 治頭疼 熱痰 面赤 胸中煩 吐 上熱 頭痛

石膏 天麻 防風 大青 白附子

羌活 荊芥 甘草

右件為末 每服一錢 以細和 溫酒 調下 丸如彈子大 微火

焙乾 每服一丸 細嚼 茶清 送下

八風丹 治諸虛 有風痰 旋暈 頭目昏重 口眼牽引 狀若重行 屈

伸 諸風 並宜服之

附子 川烏頭 白附子 天麻

天南星 白芷 川芎 細辛 半夏

半兩 珠砂 麝香 研

右件並為細末入白麪五兩同研勻水和為丸每一兩作十二丸
陰乾每服一丸細嚼茶清或溫酒下食後臨臥
十珍丸 治諸風搐搦口眼喎斜半身不遂腰腳疼痛麻木不仁
白附子 天南星 全蝎 二兩
川芎 防風 香白芷 桔梗
羌活 麻黃 細辛
右件為細末煉蜜為丸每一兩作十丸每服一丸細嚼茶酒下食
後
排風丸 治風痰攻頭疼旋暈如在舟車之上
天南星 半夏 藁本 細辛
防風 白芷 獨活 川烏
右件為細末生薑汁煮麪糊丸如梧桐子大每服二十丸生薑湯下
食後
茶調散 治頭風 偏正頭疼 不能
開
[illegible]
[illegible]
右為細末每服一大錢茶清調下不拘時候食後
天麻散 治頭痛項強 [illegible]
附子 天南星 [illegible] 各三錢
附子 烏頭 天南星 川芎
細辛 甘草各等分
天門冬 附子乾 [illegible]
雄黃 [illegible] 頭風
[illegible] 頭痛服 [illegible]
本論 [illegible]
寺院 [illegible] 人
[illegible]

普濟方卷之二十

普濟方卷之四十八

頭門

頭風白屑 附論 白禿

頭風白屑 論 方四十三首

早蓮膏 蓮子膏 甘松膏 龍腦膏 松脂膏
生髮膏 長髮膏 白屑膏 金頂膏 荷花湯
治頭風白屑瘙及下皮時時瘙癢方 防風荊芥散
蔓荊實膏 治頭風頭屑等或有癢極白屑 豬椒根膏
韮子丸 治頭風白屑生蔓荊子 方 木瓜湯
天麻餅 治屑方 治頭風白屑 又方
治風屑極癢痒又行 治頭癢搔之白屑起
治脂 又方
又方 豬牙方 治風屑極癢 治髮落頭白屑千金 鍋子木香
白附風白屑 又方 白人方 又方 去風屑
治頭風白屑 去白屑 治頭風風屑

白禿 論 方

[illegible] 五味子膏 一方
防風丸 [illegible] 松蘿膏方
治白禿 治白禿瘡 桃皮湯 桃皮膏 治白禿瘡
治白禿方 水銀膏 [illegible] 禿頭瘡 治白禿方
治頭白瘡 治白禿瘡 治禿頭方 又方
治熱 [illegible] 治白禿方 又方 [illegible] 治白禿瘡方
治禿方 龍粉散 白禿頭方 又方

蒸髮散 又方 治白禿 治大人小兒禿瘡髮落留瘢
治癩頭 聆瘡 芎辣膏 白禿頭熱紅餅瘡方
治頭禿 又方散 細辛膏 摩白禿方 治禿瘡法
白脚散 治禿瘡 治癬瘡白禿 主理瘡白禿
治白禿瘡 治禿瘡 治鬢禿瘡 治白禿生髮
治白禿瘡 小兒頭瘡白禿 治頭生瘡下痛出瘡
治頭禿白禿殺蟲安治瘡方 白頭瘡白禿

赤禿

論 道方 一十方
伊陽[illegible] 牛羊角灰 馬蹄灰 捜汁方 揪葉汁
治禿髮復生 又方 治鄉禿方 又方 又方

烏髭髮

論 方 一百三十方
烏髭髮方 又方 髭藥散 揩髭髮總論 倒染髭髮
黑髭髮松脂子方 得效染髮方 中字黑髭膏
刷牙烏髭髮法 染髭髮令黑方 摩頂膏
黑髭指畫散 黑髭髮三陣一捋烏方 捋髭髮方
黑髭髮一捋烏方 染髭髮令黑永不白方 長春丸
黑髭指蓋方 染髭髮七寶 扭心丸 丁香散
烏髭藥 烏髭借香 神驗烏髭方 烏頭散
天麻丸 烏金散 烏髭髮方 白烏髭髮神方
治口出百歲髮黑髭髮階生方 黑髭方 烏髭髮揩牙法
卜頭 旭黃丸 駐顏變髭髮令方 回髭髮方
又方 烏髭髮方 又方 黑髮方 染髭方
染白令黑方 川椒散 河黎散 染髭髮藏仙曲
烏髭方 烏髭髮 五靈散 五白玉粉散
揩髭方 烏髭揩牙變髭髮白為黑 治黑髭揩齒
生長髮令黑 白髮變黑 烏黑散 烏龍散
揩牙髭方 黑鴉散 神妙烏髭方 染髭黑方
烏髭方 一炒散 換髭法 烏髭髮常用揩牙藥

甲髭方 御史治白髮生青 烏頭方
烏鬚方 烏髮一捋散 揩牙烏髭方
黑髭方 不老髮方 金髮長方 染髭髮令黑永不白方
換髭髮 又方 染髭髮方 又方
御史制烏髭髮神方 行水染髮方 又方
烏髭膏 烏髭方 烏髭不老 烏髭髮揩牙藥
治頭下白烏髭方 治髮黑 蒼木丸 又方 三方
治髮藥 一撚青 黑髭髭方 治頭下光澤滑髮
治烏髭髮 染髭髮 又方 髮髭多駐顏揩齒散
黑髭髮方 揩白令髮生黑 又方 神仙實金膏
赤白髮方 烏髭髮方 立聖散 五聖不老散
髮白散 烏髭揩牙方 神妙烏髭方
髮白令黑方 換白髮方 烏金石散 烏金散
再生髮 黑松散 染髮髮白令黑方 烏頭髮
生髮仙方 染髮髮方 烏髭髮 染髭髮令永黑

鬢髮黃白

論 道方 六十一方
黑鬢髮
鬢毛髮 烏鬚髮 染髭髮 婦人生髮令黑方
黑髮方 淨髮 染髮留黑 生髮方 烏髭髮七功方
長生不飢黑毛髮方 令人體潤毛髮不白又能成仙
駐顏首烏丸 治府白髮 延齡至寶膏
地骨皮丸 摩頂黑髮方
治血脈虛髮白早白旺脈川芎丸並方
地黃丸 川椒丸 神仙寶方 駐景丸
變白髮神妙揩齒方 地仙丹 五神還童丹 烟子人丸
菟絲子丸 人參丸 補骨丸 絹瓜子散
令白髮還黑方 乾漆丸 治髭髮早白令黑方
駐顏益心神方 胡椒丸 蜀椒丸 地黃丸
三仙丸 變白髮令黑 返首烏丸方 變白不老

治婦人拔髮 治髮鬢黃赤令黑方 又方 治白髮
一醉烏法 治頭髮乾燥及禿方 擦牙散
治髭髮黃赤一染即黑 染鬚髮令白變黑方 少年髮白拔白髮方
又方 染白髮方 揩齒散 變白令黑方
白髮令黑方 治髭髮黃赤令黑方 拔白令黑 又方
染髮鬚黃赤方 揩齒散方 麋角膏 治鬚髮黃白
備急拔白令黑止白方 白髮方 令髮不生 令人髮不白
治拔白髮 變白方 劉君安鬚不白方 變白方
治白髮 又白髮 變白令黑補老明目輕身

○榮養髭髮 論 通方 二十八方

破故紙丸 茯苓石脂丸 地黃長髮令黑丸 [illegible]澤方
治風虛髮白令黑方 木香白令出黃方 搐鼻髮令黑[illegible]散
巨勝七子丸 旋覆花膏 梳頭散 搽髮膏 五味子丸
三枝膏 遊歷散 東垣方 烏金散 變白膏

醫方類聚[illegible]

菝葜散 治髮不落方 金櫻子煎方
又方 治血虛髮落[illegible] 南燭煎
治鬚禿 [illegible]髮黃黑[illegible] 黑烏毛髮 [illegible]
治髮 定四[illegible]方 作香澤塗髮方

○鬢髮墮落 論一道 方[illegible]

生髮膏 治眉髮墮落 蔓荊子膏
[illegible]膏 [illegible]生髮膏 治風髮落[illegible]方 [illegible]
摩膏 [illegible] 茯苓散 [illegible] 治鬢髮禿落
治頭[illegible]髮禿[illegible] 治鬢髮墮落令生長方
三聖膏 治[illegible]髮不落 治鬢髮禿落不生令長
治[illegible] 治髮落[illegible]髮附子方 治髮[illegible]落方
石灰酒 木[illegible]湯 治風[illegible]毛髮落不生方
治髭髮易長而黑 [illegible]髮禿落不生長方
治鬢髮落不生令長方 胡麻散

治髮落 治頭風癢並女人[illegible]

○眉髮鬢須不生 論 方[illegible]

[illegible] 治[illegible] 鍼灸 又方
治眉髮禿不生[illegible] 松脂膏 又方
治生眉毛方 治眉毛不生 治眉[illegible]髮大[illegible]毛不生方
生髮方 治眉髮脫不生方 令[illegible]不生 治鬚髮不生

○生髮令長 論 方 [illegible]方

[illegible] 長髮令香油方 生[illegible] 生髮[illegible] 又方
令髮速長而黑方 治頭風[illegible] 蓮子草膏
[illegible] 生[illegible]散 令髮易長方
人參[illegible] 令髮長 常用長髮[illegible] 紫金油
香[illegible] 搨[illegible] 烏[illegible]方 治髮落不生令長
上[illegible] 生[illegible] 長髮方 生髮

醫方類聚[illegible]

長髮 長髮 生髮[illegible] 生[illegible]
治頭風[illegible]髮

○生眉 論一道 方 [illegible]

治眉毛[illegible]宜用此方 又方 生眉毛方
治眉痒毛落方 又方 生眉髮
又方

○洗髮 方二十四方

[illegible]香散 乾洗頭[illegible] 洗髮菊花散 乾洗頭
[illegible]頭膏 [illegible] 乾洗頭膏 洗頭方
乾洗頭香白芷散 治髮[illegible] [illegible]木髮方
又方 [illegible]方 [illegible]明[illegible]方 洗頭方
木髮方 沐頭長髮方 [illegible]頭方 洗頭長髮方
沐頭及洗身上[illegible] 沐[illegible] 沐髮
沐髮方 沐頭長髮

治鬼舐頭方

○鬼舐頭方　一方　又方　又方　治鬼舐頭

普濟方卷之二十一目錄　畢

[illegible]

普濟方卷之二十一

頭門上

[illegible]

論

夫人生之首乎[illegible]是令人頭痛世[illegible]本[illegible]熱[illegible]五

[illegible]下[illegible]大[illegible]白

[illegible]以[illegible]作[illegible]

[illegible]

芎藭　白芷　[illegible]

[illegible]　[illegible]　[illegible]

杜若　[illegible]荊子　零陵香　甘松　天雄

白朮　升麻　稻米白皮　[illegible]　楓香脂

生地黃[illegible]　烏麻油一升　[illegible]

豬脂一升　蔓荊子[illegible]　桑根白皮一兩

右除脂油外[illegible]剉以運子[illegible]十[illegible]皮一宿取出與脂

油同入大鍋以微火煎候白芷黃色[illegible]好入下[illegible]中[illegible]

[illegible]取桑根白皮二兩細剉以水一斗五

升煮取一升[illegible]一次

運子膏[illegible]頭風白屑[illegible]

運子膏[illegible]　桑根白皮　防風

芎藭　白芷　[illegible]本　零陵香

沉香　秦艽　[illegible]　[illegible]　青竹茹

細辛　[illegible]　杜荊子　[illegible]　甘松香

白朮　天雄　[illegible]　楓香[illegible]　生地黃汁

生[illegible]　馬鬐膏[illegible]　蔓荊子[illegible]

右細剉以運子[illegible]汁[illegible]用脂[illegible]微火煎三上

三下以白芷色黃為度[illegible]中[illegible]安[illegible]

桑白皮剉三升以水一斗煮取五升去滓以沐頭了以此膏塗之

甘松膏 治頭中風癢白屑

甘松香 丁香 白芷 藁本 桑白皮

桑寄生 大麻 藿香 杏仁 牡荊子

辛夷人 芎藭 防風 莽草 零陵香

[illegible] 細辛 蜀椒 竹葉 松葉

指甲 明麻油 臘豬膏 烏雞肪 鵝肪

右以醋漬一宿以油膏中微火煎三上三下白芷色黄膏成

去滓塗頭上日二夜一塗之

龍腦膏 治頭風生白屑又塗令黑

麝香 沉香 白檀香 蘇合香 雞舌香

零陵香 丁香 甘松 木香 藿香

白芷 附子 細辛 當歸 芎藭

天雄 辛夷 甘菊花 烏喙 防風

蔓荊實 杏仁 桑根白皮 烏麻油

右件細剉以醋漬一宿中以油煎候白芷黄色膏成

去滓以瓷合收貯取少許塗擦頭髮

松脂膏 治頭風癢白屑又生令黑

松脂 白芷 天雄 莽草 躑躅花

秦艽 獨活 烏頭 辛夷人 甘松

零陵香 沉香 牛膝 木香 松葉

杏仁 藿香 少許根 甘菊花 蜀椒

芎藭

右件杏仁等細剉以醋三升浸一宿取入大鐺用生

麻油一斗以火煎候白芷黄色膏成去滓

中每日三度以生薑根

生髮膏 治頭中風癢白屑

蔓荊子 附子 細辛 防風 零陵香

皂莢 [illegible] 防風 杏仁 藿香

白芷 松葉 石南 莽草 甘松

豬脂 松脂 熊脂

右以醋以清淹一宿煎以明旦以火煎三上三下

下以白芷色黄膏成以塗髮

長髮膏 治頭風白屑瘙痒

蔓荊子 附子 澤蘭 防風 杏仁

零陵香 藿香 芎藭 天雄 辛夷

沉香 松脂 白芷 馬鬐膏 松葉

熊脂 生麻油

右以醋漬一宿以脂等煎候火三上三下白芷色黄膏成去滓

塗頭髮及風中擦之日三兩度差

白屑膏 治生髮去風痒

烏喙 莽草 細辛 續斷 石南草

辛夷人 皂莢 澤蘭 白朮 防風

白芷 柏葉 竹葉 豬脂 生麻油

右以醋漬一宿以豬脂煎候白芷色黄膏成去滓以塗頭髮

洗不洗須用之妙一方有松葉

塗頭膏 治頭風瘙白屑

烏喙 莽草 石南 細辛 皂莢

續斷 澤蘭 白朮 辛夷

防風 柏葉 松葉 豬脂

右細剉以醋一升漬一宿候出以豬脂煎候白芷黄膏成去滓塗頭

了以塗一日

菊花散 治頭風白屑癢

菊花 獨活 蔓荊 防風 細辛

蜀椒 皂莢 杜蘅 莽草 桂

右為末每用一兩煎湯洗

白頭翁 治頭風白屑

甘菊花 桑根白皮 附子 旱蓮草

蓮子草 蔓荊子 零陵香 桑寄生 松葉

右細剉，每月五日以生絹袋盛，以苦酒十一升漬，而金漿出金頭，得

防風荊芥散　治肺[illegible]諸風氣，沐浴後手乾，頭皮起，多生白屑

荊芥穗　蒲黃根　甘草　甘菊花

川芎　白芷　春[illegible]　防風

右等分細散，每服一錢匕，茶酒任下，不拘時

蔓荊子[illegible]　附子

草[illegible]　犀角　旱蓮子　蘄皂子　零陵香

右麤[illegible]一大升，浸七日，取以塗[illegible]油，[illegible]方黑

右甲風[illegible]香附子[illegible]

右[illegible]白屑[illegible]

蔓荊子　防風　寄生　[illegible]　大麻人

白芷

右切，以水一斗五升，煮一斗，去滓，以洗頭，三四度，差，加芒硝一升亦妙

豬椒根[illegible]治肺熱[illegible]多生頭白屑瘙癢不堪，然肺為五臟之蓋，其氣[illegible]傷肺氣，頭皮便[illegible]，癢，多生白屑，搔之隨手起，人多患此，皆從肺來，世呼為頭風也

豬椒根　麻黃根　防風　細辛

茵芋

右㕮咀，以水一斗，煮取一斗，去滓，温以沐頭

龍腦丸

白龍腦[illegible]

真珠[illegible]

丹砂[illegible]

雄黃[illegible]　琥珀[illegible]

右細[illegible]蒸三兩，每夜臨臥[illegible]

兩，作餅子，飯二張，蒸熟，取出研細，以前藥六兩，煉蜜和搗丸如梧

丸子，大每日空心取[illegible]丸含化，[illegible]五丸，若四十以上更加白龍腦一[illegible]

[illegible]兩，炒熟，搗末，前末，同以水飛[illegible]一兩，大人[illegible]

治頭風白屑，生髮，白令黑方

蔓荊子[illegible]　鐵精[illegible]　零陵香

丁香子[illegible]

右細切，絹袋盛，用麻油三升，浸七日，先以[illegible]每日塗之

木[illegible]，[illegible]熱，[illegible]旋生白屑瘙癢不堪，然肺為五臟之蓋，其[illegible]頭皮多生白屑，搔之隨手起，人多患此，皆從肺來，世呼為頭風也

大麻子　秦椒　皂莢[illegible]

右熟研，[illegible]日中一宿，[illegible]百偏，取[illegible]

別作[illegible]之[illegible]

天麻餅[illegible]治諸風頭多白屑

天麻　芎藭　白芷

右為細末，煉蜜和為餅子，每服一餅，細嚼，茶酒任下，不拘時

治屑方

五倍子　硼砂　黃芩

右為細末，和勻，井花水一大盞同煎，[illegible]

白頭風白屑

附子[illegible]　蔓荊子

右剉細，以水一斗，[illegible]去滓，[illegible]室中沐頭

又方

白芷[illegible]　川芒硝

右以水七升，先煎白芷，取四升，去滓，[illegible]

治風屑極癢，煎[illegible]，蔓荊子[illegible]，[illegible]室中沐頭

香白芷　零陵香

右為末，乾摻頭上，經一五日後，以篦去，再摻三二次，終世不生

治頭痒後生白屑起

大麻人 別錄 秦椒二升

右件兩日大麻人二宿明旦去滓以水木蔓荊用後方白芷

一斤蔓荊子二枚芒硝一升三味以水四升煮取二升去滓停少冷以沐

子青交頭兒令洞更以令熱分為三度澤頭覺痒即作之

不過三度永除

治肺勞熱不問冬夏老少頭生白屑 出千金方

以蔓椒二升以水煮取汁沐之

又方 出聖惠方

以桑灰汁沐去白屑神良一方蔓荊子煮汁以沐即愈

〔[illegible]〕又方

用羌活松脂燒灰淋汁熱沐頭不過五七度

又方 治頭白屑

用烏頭大麻人去皮熬令小兒用乳中調塗之

攝生方 治頭風白屑如麩糠

用皂莢燒灰作沐湯六十日上為新者

〔[illegible]〕

治風頭白屑痒無時此乃風熱之氣上行發於皮表而生也宜用此藥

沐之 出聖濟方

用藜蘆根不問多少為末先洗頭後以藥末好摻滿至十分乾

再用藥摻定夜用藥末入髮至頭方用紙緊縛之兩日夜後日全

無亦不痒如尚有些少可再用一次效

治髮落頭白屑不生

用水蘇燒作灰淋汁以煮十沸頭令髮香白屑不生又去垢膩

兩度者有沐之後

鉤子不痒不用凡頭風痒之白屑起

用蔓荊子一枚以為湯五升煮之使去滓塗子用中理令勻

分為三度沐令髮生去白屑風痒

治頭風白屑 出聖惠方

用荊子一斤以水一斗煮至五升去滓稍熱洗頭一云蔓荊子

又方 出聖惠方

用豬膽化湯以淋頭即效沐先度

又方 出千金方

用蔓荊子燒灰淋取汁熱洗頭完頭

又方 出千金方

用牛蒡汁熬成膏淋頭以令稍熱洗頭令頭目明即以皂莢湯

又方

洗之

又方 出千金方

用羊蹄草根洗淨乾杵爛以米醋以手塗頭上以手指磨頭上永除根

又方 出千金方

用白芷羌活以川芎各等分杵細細末每用三錢煎湯日二三上傳之效

又方 出千金方

以川椒芫花大麻子煮水作湯沐去白屑

去頭白屑 出千金方

以豬膽煎汁沐之

治頭風白屑生髮 出聖惠方

〔[illegible]〕

以桔梗樹花香油傅頭 出普濟方

去白屑 出千金方

以蒿根煎作湯沐頭

治頭風屑 出千金方

以雞蛋清沐之

○白禿

論

夫禿之為病因血氣虛損風邪乘上則能生瘡瘡瘢痛痒無不為也

瘡痂不去而痒發為禿瘡謂此後生髮是為白禿

杜蘅方 一名杜若 治白禿及瘡疽百病 出千金方

杜蘅 雄黃研 木蘭皮 礬石研 大黃 別炒

附子 去皮臍 石膏 秦艽 去苗 土貝珠研 苦參

水銀 松脂 各一兩 豬脂 三五斤

右先將草藥杵爛為細末入將石藥及水銀合研如粉方熱豬脂

松脂化次下諸藥文武火煎令稠稠所以新綿濾去滓磁合盛貯

每用先以米泔水洗淨後塗之方

木蘭皮膏 治小兒頭白禿及白屑

木蘭皮 牡荊子 秦艽去苗 附子去皮臍生用 川大黃

石南 苦參各二兩 白礬 真珠末 雄黃

水銀 松脂各二兩

右先以木蘭皮等七味細剉酢浸令少經宿用鍊了猪脂三斤於

中煎令附子黃黑為度以綿濾去滓後入白礬等五味更和

五物散大效令初發合中盛日三度塗之

五味子膏 出聖惠方 治白禿髮落生白痂終年不瘥

五味子 肉蓯蓉 松脂 蛇牀子 遠志去心各

菟絲子 白蜜 猪脂一斤 雄黃研 雞屎白 雌黃研

右先將草藥細剉以苦酒浸一宿於石器中煎雞子黃白汁研令如粉下猪脂

松脂入銚中同熬化候丁香黃色去火煎候稠以新綿濾去滓澄

合盛每用先於寄灰汁洗頭令淨後塗之每日不過三次髮生

防風丸 出聖惠方 治白禿髮落

防風 黃連去鬚 牛蒡子微炒各四兩 蔓荊實九兩

桑白皮剉 薏苡仁 茯神各三兩 大黃剉微炒 甘草炙微赤剉各二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心粥飲下

升麻膏 出聖惠方 治白禿髮落

升麻 黃芩 莽草 白芷二兩 防風去蘆頭各

蛇蛻皮 馬鬐脂 熊脂 鵝骨髓各半斤

右先將草藥細羅為末後將三味脂熬消候下諸藥以文火煎令

稀稠得所絹濾去滓入盒合收每用先以泔清洗頭令淨塗藥

王不留行散 出聖惠方 治白禿髮及頭癢去痂止痛

王不留行 桃東南枝 東引茱萸根皮各五兩 蛇牀子

牡荊子 苦竹葉 蒺藜子各一升 大麻人一升

右以水二斗煮取一斗先洗頭日再并療癰疽妬乳月蝕

瘡爛皆主之

松瀝煎 方出外臺 治頭瘡及白禿髮不生

松瀝二升 丹砂研 雄黃研 水銀研 黃連各一兩

礬石各一兩研

右件藥內瀝中攪令調以塗之先以泔洗乾然後塗之今與無不瘥

療日三度當作膿膿泡更洗塗之如此三五度作痂以甘草湯去藥

痂可十度許瘥即止

治白禿瘡 出千金方

白礬末 硫黃 膩粉 狗頭骨 巴豆一個生去皮研

右同研令勻以生油調作泥用先以甘草水洗淨用生

甘草水先洗然後刮斷髮剃去瘡痂令盡然後塗之令入肉便生髮

治白禿每日一上三上細研後剃不破皮燒灰細研油調塗之即髮

生如常

治白禿瘡

白礬 松脂 膩粉 五倍子 黃丹

右為末調猪油和香油調藥搽瘡上

桃皮湯 出聖惠方 治白禿髮不生方

桃皮 豉 白芷各一合

右以水一斗煮取八升去滓放溫洗頭每日用之

桃皮膏 出聖惠方 治白禿髮不生

桃皮以水一斗煮取五升 白麵

白禿以桃皮十兩煎取汁和白麵以煎膠漿塗傳之

白禿瘡

黃蜀葵花 大黃 黃芩各等分

右為細末好清油調塗

治禿方

柳細枝 水銀 皂莢一挺

右用醋煎如餳以塗之

水銀膏 出千金方 治白禿瘡不愈

水銀 黃連 細末

右先以黃連為末以水銀於掌中以唾研令盡塗之

塗瘡上即效

治手[illegible]白禿瘡及惡瘡

檳榔[illegible] 硫黃[illegible] 雄黃[illegible]

右為末先以桑白皮湯洗[illegible]子清調[illegible]大小作[illegible]上[illegible]不

可[illegible]覆不[illegible]得[illegible]全入[illegible]

為粉洗拭乾[illegible]油[illegible]調搽

又方

蛇床子[illegible] 苦參[illegible]

右研為細末搽瘡上

治白禿方

雄黃[illegible] 乾枯礬[illegible]

右為細末臘月豬脂調塗瘡上[illegible]子[illegible]先[illegible]

治頭禿頭白瘡

豬頭骨[illegible] 紫草

右用香油煎[illegible]入[illegible]瘡[illegible]即生髮

治白禿瘡

嘉蓮荷葉 藤[illegible]

右件[illegible]煎濃汁洗三五度瘥

治禿瘡方 出[illegible]方

用蕪菁子為末以醋和傅之日三

又方 出千金方

用蔓菁子五升[illegible]為末以豬脂和塗之髮生為度

治禿無髮者方 出千金方

用黑椹二升內罌中日曝三七日化為水塗瘡上三七日髮生神效

治白禿方 出聖惠方

用羊肉[illegible]炙令香以熱搭上不過三四度[illegible]之中[illegible]亦得

又方 出外臺方 療白禿

用熱破豬肚去糞及穢[illegible]搭頭上[illegible]出[illegible]若不[illegible]更[illegible]取[illegible]

[illegible]苦參[illegible]溫湯洗[illegible]日中[illegible]之

又方 出外臺方

用皂莢為末洗淨拭乾以陳久醋[illegible]之日三[illegible]可

又方

用[illegible]一方用[illegible]末和豬脂塗上

又方

用[illegible]為末和[illegible]一方以末[illegible]調傅之

又方

用大黃生炒令黃為末和[illegible]豬脂[illegible]貼上[illegible]見

一方[illegible]末[illegible]豬脂[illegible]之

小兒治禿瘡方

用童子小便[illegible]令[illegible]出[illegible]白[illegible]和[illegible]塗之

即瘥一方[illegible]以[illegible]禿瘡[illegible]和傅之

治禿方

取三月三日桃花[illegible]日[illegible]乾[illegible]為末[illegible]豬脂和以灰汁

洗後塗之瘥

治剃頭[illegible]

用百草霜[illegible]下[illegible]和[illegible]麻油調[illegible]洗[illegible]用[illegible]

剃去[illegible]用[illegible]傅[illegible]亦可

龍骨散 治白禿瘡

用龍骨為細末入輕粉麻油調傅之

白禿瘡方

用麻油[illegible]輕粉調搽

又方

用豬膽汁[illegible]入[illegible]調搽

藜蘆散 治禿瘡

[illegible] 藜蘆[illegible] 雄黃[illegible]

右為細末先[illegible]乾[illegible]上[illegible]油[illegible]塗

又方

用藜蘆為末以臘月豬脂和塗[illegible]先[illegible]灰[illegible]和

便先洗用[illegible]為先少傅

又方

用[illegible]先[illegible]桃花[illegible]不可[illegible]少[illegible]五次[illegible]

又方　治白禿頭上瘡中生蟲

用取桑白傳之

治白禿

用白鴿糞搗細羅為末先以醋米泔洗了傳之立差

治大人小兒白禿制方曾岸

用獨顆肥皂去核用砒填滿中放巴豆二粒將紙裹定鹽泥固之

大燒青煙起存性去泥入檳榔末輕粉五七分研勻用香油調傳先

用皂角灰汁洗淨後用溫水洗去皮屑後傳藥一宿便見效

又方煙筒光

治癩頭

用白礬香豆燒為末入輕粉少許以香油調先用苦參洗去再傳

右五味

搽禿瘡

用取虎骨傳之

苦楝膏　治大人小兒禿毛又惡瘡

附搽瘡灰建灰以猪脂調傳之

治白禿頭熱紅斑瘡方

用生艾白芷大腹皮連根葱各等分煎湯先洗以生艾青葉

以生艾葉細擣水為膏傳前治惡瘡

治頭瘡

用五倍脂白礬白芷等分輕粉少許各一分為末麻油調傳

決効散　治風癬疥瘡

香中　一兩　白芷　一兩

用為細末油調塗之

細辛　去葉

治頭瘡久不瘥白禿

除白禿方

羊蹄草根曾少見八日又研如雞大以三年醋研和如泥生布

拭瘡令赤以傳之

治禿瘡法

黃連　木香　百部　蜀椒　二兩

右為細末更入龍腦少許研令勻用鵝黃水銀各三錢於乳缽內

研令極細以生油塗瘡未傳之

百部散　治大人小兒白禿瘡

全蝎　黑狗脊　蛇床子　馬兜鈴根　各一兩

破故紙　秦艽　百部　各等分

右件為細末生麻油調塗瘡上

治禿瘡　出本草

以象齒燒作灰和油塗之

治頭上剃白禿　出本草

以馬齒莧煎為膏塗之名曰灰傳之亦良

又治小兒頭瘡白禿　出本草

可煎取汁傳之

治白禿瘡　出本草

以羊蹄根煎為汁洗之

治禿瘡　出本草

用山豆根不拘多少以水研傅瘡上

治禿瘡　出本草

以馬蹄骨灰塗頭上

治白禿生髮　出本草

以白鴿糞五兩封瘡上自瘥

治白禿瘡　出本草

以雞子殼為末之名屑數塗之十年瘥

治頭瘡白禿　出本草

以馬尿洗之

治頭生瘡　出本草

用淋淨水煮多少研汁塗之

治頭瘡白禿經年不瘥　出本草

以蒜子四兩月小豆入十餘子同研如泥塗之并協收上便即

更易

□□□白禿□□ 取雞□□中□和□□□□□□□猪脂傅之

○赤禿

論

夫諸陽脈皆在於頭[illegible]之間[illegible]

偏身有白□有汁膿瘡□□□□生□□□□名赤禿

早□□□□ 治赤禿髮落生方

白禿□□□□□□十次入□□□□細入合中□用先以泔

[illegible]

又禿□□□

牛角灰 治赤禿髮落生方

牛羊角灰[illegible]

右研細如粉以猪脂調傅之

馬蹄灰 治赤禿髮落生方

用馬蹄燒灰研如粉用臘月猪脂調塗之

搗汁方 出聖惠方 治赤禿髮落生方

用黑椹二斗內瓷瓶中密封於地窖下埋之一百日知變爲水□□

令洗頭及塗髮即生一方桑灰汁洗頭令生稀髮傅之日中曝頭□

桑葉汁 治赤禿髮落生方

用桑葉一兩搗絞取汁傅之

治禿髮復生方

用香油水各和一□以銀釵攪之便□□用入梳□頭上髮即復生

又方

用取猪脂塗之

治頭赤禿方

用鵝黑椹取汁每服一中盞日三服

又方

用猪七段灰細研以猪脂和傅之

又方

用白□□□□□□

□□亦□禿髮□□

夫足太陽血氣□則眉美足少陽血氣□則鬚美足少陰血氣盛則髮

美手陽明血氣盛則髭美[illegible]所生不同□各有所屬髮

[illegible]曰又知□又□□任人猶水之

□也□髮[illegible]可知矣

○烏髭髮

論

髮本於足少陰□本於手陽明二經血氣□則□□血氣衰則枯槁容

貌之衰實足以貴□則[illegible]發

烏髭髮方

黃□ 南番□ 川楝子 兔絲子 肉蓯蓉

川牛膝 白芍藥 白茯苓 杜仲 石斛

熟地黃 覆盆子 地骨皮 枸杞子 乾山藥

生地黃 五味子 山茱萸 麥門冬 蓮花蕊

生□□ 藿香 當歸 胡蘆巴 川芎

澤瀉 白朮 人參 巴戟 黃耆

羌活 當首 獨活 黃連 廣木香

沉香 吳茱萸

右爲末醋糊爲丸如桐子大每服五十丸空心鹽酒送下

沉香延齡散 烏髭髮牢牙益精氣

沉香 木香 檀香 香附子 白芷

骨□ 甘松 川芎 生地黃 華撥

升麻 何首烏 防風 當歸 □李

青鹽 人參 □□ 白茯苓 白蒺藜

旱蓮草 藿香 熟地黃 細辛

丁香 荊芥穗 菖蒲 槐角子 白殭蠶

天麻 桂心 露蜂房 麝香

柳枝

右爲末每日早晚先刷牙後用藥刷五六十遍爲上

刷□□□□

何首烏 生丁香 白茯苓 地骨皮
白芷 熟地黄 川芎 甘草
赭石 [illegible] 當歸 升麻
覆盆子 細辛 訶子肉 寒水石
没石子 [illegible] 青塩 [illegible]
右件藥為末 [illegible] 合為末 [illegible] 以報[illegible]之 剔上下牙 將藥津一半
嚥了 半[illegible]於髭鬚 [illegible] 如是無髭鬚 [illegible] 之者白者 一日可黑 [illegible]
[illegible] 此藥大[illegible] [illegible] 下元明 白髮水飆
中[illegible]長髮黑髭牙方
[illegible] 青[illegible]一兩 [illegible] 寒石子 [illegible] 訶子 [illegible]
[illegible] 紅[illegible] 醋石榴皮 [illegible]石一分 [illegible]一分
[illegible] 熟乾地黄 [illegible] [illegible] 烏[illegible] [illegible]
胡桃瓤 [illegible]
右為末先 [illegible] 汁取 [illegible] 藥末 [illegible] 入 [illegible] 中以 [illegible] 木 [illegible] 令 [illegible]
後傾入 [illegible] 子中 [illegible] 全 [illegible] 如 [illegible] 中 [illegible]

水[illegible]子三日三夜 [illegible] 水 [illegible] 以熱水 [illegible] 之 [illegible] 出 [illegible]
以[illegible] 數重 [illegible] 五日久 [illegible] 子 [illegible] 手 [illegible] 之 一百下 如烏色 [illegible]
[illegible] 水洗淨 [illegible] 之
[illegible] 方
右[illegible] 水 [illegible] 以水 [illegible] 用 [illegible] 根 [illegible]
[illegible] 内 [illegible] 細 [illegible] 以 [illegible] 成 [illegible] 上
[illegible] 八 [illegible] 末
當歸 [illegible] 石[illegible] 醋石榴 [illegible] 子 一兩
[illegible] 生丁香 白[illegible]
[illegible] 末
生[illegible] 没石子 訶子 [illegible] 百[illegible] 白芷 一錢
右[illegible] 細 [illegible] 合 [illegible] 米 [illegible]
[illegible] 上 [illegible] 早 [illegible]
用[illegible] 日 [illegible] 上 [illegible] 五 [illegible] 中 [illegible]
[illegible]

金[illegible] 訶子 [illegible] 白[illegible] 白茯苓 訶子肉 川芎 [illegible] 没石子 [illegible] 酸石榴皮
五倍子 川椒 [illegible] 仁
右為細末入[illegible] [illegible] 剔牙 [illegible]
[illegible] 日 [illegible]
剔牙 [illegible]
荊芥 [illegible] 香[illegible] 旱蓮 訶子 [illegible]
没石子 [illegible] 防風 百藥煎 川椒 香白芷 一錢
加石膏 [illegible]
右為末每日剔牙 [illegible] 如神
[illegible] 令黑 [illegible]
没石子 烏藥 [illegible] 草 [illegible] 青胡桃皮
[illegible] 石 [illegible] [illegible] 熟乾地黄 [illegible]
[illegible] [illegible] 麝香 [illegible]
[illegible] 水和為 [illegible] 入 [illegible] 子 [illegible]

[illegible] 為 [illegible] 入 [illegible] 入
[illegible] 麝香 [illegible] 如 [illegible] 之 [illegible]
[illegible] 令 [illegible] 黑 [illegible] 白
細辛 [illegible] 石[illegible] 澤蘭
[illegible] 烏[illegible] 白朮 [illegible] 二兩
石仁 [illegible]
右[illegible] 以 [illegible] 以 [illegible] 中 [illegible] 上三
[illegible] 日 [illegible] 十日 [illegible]
黑髮 [illegible]
[illegible] 子 [illegible] 熟乾地黄 [illegible] 醋石榴皮
[illegible] 胡桃皮 [illegible] 丁香
[illegible] 麝香 [illegible]
右[illegible] 大 [illegible] 入 [illegible] 赤
[illegible] 細 [illegible] 每日 [illegible] 時
[illegible] 日 [illegible] 月 [illegible] 有神效

辰砂 細研

定粉 炒黃 尾粉 朴硝 松白霜 各五分 密陀僧

龍骨 各一錢 桂粉 各二錢 膽礬 各一錢 花鹼 各二錢 玉霜 各一兩

右為細末先用以大麥丹傳過後用綠豆磨細在前人用水調再上髭鬚

上用紙裹後少時其髭便黑用新水洗去過則易中

黑髭鬢揩齒一醉烏方 出經驗良方

地黃花 紫石英 槐花 青胡桃穰 紫葵花

麥藍子 各二兩 訶梨勒皮 各二兩 蓮子草 母丁香 醋石榴 大者一枚

[illegible]

右為末煉蜜和為丸如彈子大每服一丸用酒一盞研調空心服

服令盡良若髭注子皆中必變之如黑髮三五兩服三丸五五服五丸

以醉為度便見功也忌蘿蔔蒜五辛

烏髭鬢方

白檀香 一兩 香白芷 半兩 三奈子 滑石 一兩

零陵香 一兩 青黛 百藥煎 白芨 甘松 一錢

右為末用皂角水一大盞藥末一錢攪勻內瓷器內盛如法蒸熟勿令泄氣塗髭

每早晨用皂角搽洗少時擦用畫再合擦髭

黑髭鬢一醉烏方

訶梨勒 醋石榴 生地黃汁 沒石子 綠礬

右部入於瓷瓶內用二味汁煎封口勿令透氣四十九日後取出

其訶子然黑梅子至夜臨睡時含一枚嚼細便嚥以酒一中盞

下之良久更嚥之至醉其髭鬢即三兩日內黑更三

兩日再服之時忌生葱蘿蔔大蒜等一切魚腥一錢沒石子

桂心丸 治髭鬢枯槁

桂 去皮 旱蓮子草 香白芷 菊花 旋覆花

巨勝子 華澄茄 牛膝 各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸鹽湯下不拘時

丁香貫散

母丁香 沒石子 川百藥煎 甘松

[illegible] 白芨 訶子 三奈子 各一錢

右為細末水大盞煎至七分用小瓶盛用鐵釘在藥水內

紙封後三日後取出揩牙後以溫水漱

烏髭丸

八香丸 白烏髭皮

細骨皮 鶴虱 訶子皮 白芷 桂心

杏仁 川椒 旋覆花

右各十兩為末煉蜜丸如桐子大每服五

十丸空心酒下忌葱蒜

黑髭揩齒方

生地黃

茜草根 胡麻子 沒石子 訶梨勒皮

右細剉入瓶中以蓮葉重裹上又以蓮葉封裹用

醋石榴皮

燒為末以生薑一斤同子

搗為散每用揩齒如常三七日內

髭黃者七日內便黑忌蘿蔔葱蒜等

染髭鬚方

母丁香 沒石子 百藥煎 訶子 酒

生 香白芷 訶香 烏

右為末用醋漿水煎七日兩水浸

染髭鬚令黑永不白方

金 訶 生 密陀僧

蓮子草 旱蓮草 黃連 母丁香 訶梨勒皮

右為末用醋漿水一升相和即入瓷瓶中以紙密封頭不令水

入即放室內埋地中百日取出每以藥水洗髭

鬚了然用纸揩令乾以手把之自入

不得當山風前乾以口中含牛乳

含白乳了後以鐵梳梳鬚一時以溫水洗可出入一

年已後永黑 所念只忌大蒜 含牛乳即令黑

無光采

馬□藥

没食子　石斛皮　乾荷葉　五倍子

訶子皮　百藥煎　金絲礬

右為細末炒熟起九六匙入好醋打糊和藥末再塗瘡上又用

荷葉封裹後用皮帽罩之三五時開用再塗黑若更要[illegible]用搽擦

漿水洗瘡如餅

馬瘡藥

蛤粉　鉛粉　海螵蛸　黄丹　膩粉

杏仁　石灰　乳香

右各為末和勻將瘡先用鹽水洗過可用油看白瘡有多少加

減使用可水同藥和滿攤勻重將瘡水塗在瘡上將荷葉作[illegible]

一以竹[illegible]定至三日更使用[illegible]攤瘡上

馬瘡倍香散

封[illegible]　大蓼起　蓼起

右先以漿水洗瘡貧令淨用醋調上件二味藥攤於紙上在瘡上

丙　牛馬[illegible]　五

上用荷葉封裹上更以青[illegible]濕[illegible]時用次日除去以漿水洗淨

時撒用次下藥

没石子　百藥煎　五倍子　何首烏　當歸

右為細末每用半匙入大蓼起藥各半匙調勻湯成糊

瓶盛時塗瘡上依前用荷葉封裹之日早晨用鹽漿水洗

馬瘡撒藥方

百藥煎　訶子皮　蘇枸　荷葉　五倍子

黄蘗　定粉

右為細末用鹽菜一撮[illegible]入文武火煎成膏

[illegible]用先用鹽水洗[illegible]之先抄

天麻丸

天麻　木香　人參　[illegible]

附子　[illegible]　馬頭[illegible]

右為末[illegible]一盞可水一盞一[illegible]和藥丸如

[illegible]足大[illegible]九[illegible]

馬金散

訶子　草本　川芎　没石子　丁香

新子　針砂

右除丁子外余皆為細末水大煎熬至多半碗器內盛之

將前項丁子於藥水內更煎[illegible]百日如漆

馬瘡方

鉛粉　黄丹　蛤粉　密陀僧

輕粉　石灰

右藥和勻[illegible]調得[illegible]子[illegible]用荷葉[illegible]貼荷葉先

以鹽水洗過瘡[illegible]方可塗藥

馬瘡[illegible]

地黄花　葵花　牽牛花　梔子花　桑樹

□石榴花　丁香

右用酒磁一斗封口三日後用擦瘡藥

治口鼻瘡黑瘡藥搽瘡方

丙　牛馬[illegible]　六一

馬蘆薈[illegible]

生乾地黄　牛膝　蒼術　[illegible]　皇黄

[illegible]　荊[illegible]　川升麻

右各細剉以新羊底鍋中先下皂莢次下桃柳枝次下升麻次

下牛膝次下[illegible]次下生地黄[illegible]取一新瓶子盛貯以

[illegible]用[illegible]三日[illegible]子以[illegible]

時以文火[illegible]上[illegible]之[illegible]

用[illegible]

入藥[illegible]

藥[illegible]

敖口但能食日[illegible]

黑瘡方

連翹　没石子　黄石斛皮　胡桃皮

生乾地黄　青鹽

右為散同大豆[illegible]作[illegible]子[illegible]

住大豨今秋出細碎為末合日中又從前可用黃指益極妙

烏髭鬚指南訣

竹脈 [illegible] 皂角 [illegible] [illegible] 棗 [illegible] 合

麻仁末 [illegible] 生熟地黃 [illegible] 川椒 [illegible]

以竹簡 [illegible] 上

右件以瓷罐 [illegible] 入清中 [illegible] 以炭火引出

時中引取 [illegible] 明日 [illegible] 如杏

仁大 [illegible] 以左手指一五指 [illegible] 十數遍

令 [illegible] 以兩手 [illegible] 細研 [illegible] 乾淨

將 [illegible] 鬚 [illegible] 黃 [illegible] 五十日

日用 [illegible] 三十日 [illegible] 之

頭染方

訶子皮　[illegible]　五倍子　[illegible]　百藥煎

醋石榴皮

右末先大麥 [illegible] 各半兩 針砂一兩六錢 先用二氣 [illegible] 醋調數大錢

再入針砂調勻 先用皂角水 [illegible] 淨 候乾上針砂 [illegible]

用前件 [illegible] 包裹一宿

用溫 [illegible] 洗 [illegible]

地黃丸 治鬚髮 [illegible] 烏髭鬚方

生地黃汁　[illegible]　生薑汁五合　巨勝子　熟乾地黃　[illegible]　旋覆花

乾柿子 [illegible]

右除二味汁外為細末 先將二味汁同 [illegible] 為稀 [illegible]

末和丸如梧子大 每 [illegible] 溫酒 [illegible] 下 [illegible]

駐顏黑髭鬚令黑方

蓮子草 [illegible] 杏仁 [illegible] 熟乾地黃

右件 [illegible] 如 [illegible] 丸如梧桐子大 每日空心溫

酒下三十丸 [illegible] 白髮 [illegible] 大 [illegible]

黑髭鬚方

天門冬 [illegible]　熟乾地黃一斤

右為末 煉蜜和搗五七百杵 丸如梧桐子大 每服食前以酒飲任下

三十丸 [illegible] 大 [illegible]

又方

生乾黃 [illegible]　當歸 [illegible]

右將 [illegible] 以水 [illegible] 大 [illegible] 如前三

度取 [illegible] 如 [illegible] 空心服

以溫酒 [illegible] 下 [illegible]

黑髭鬚方

用黃丹三十兩 入 [illegible] 中 [illegible] 大食

一百日 [illegible] 一九十日

又 [illegible]

又方

用 [illegible] 丹 [illegible] 丸 [illegible] 如梧桐子大每日早晨

以 [illegible] 五十丸 [illegible] 之久服佳

染鬚方

石榴柳　柏茶兒　訶子皮　青胡桃皮　[illegible] 烏梅

胡桃油 [illegible]

右為 [illegible] 用 [illegible] 白 [illegible] 一 [illegible] 水紫封在內閉

半月日 [illegible] 七十日黑

染髭方

白石脂 [illegible]　蜜陀僧 [illegible]　紅 [illegible]

石灰 [illegible]

右細末用 [illegible] 調 [illegible] 染髭鬚 [illegible] 黑

染白令黑方

蓮子草 [illegible]　生丁香 [illegible]　訶梨勒一兩

東引桃枝皮 [illegible]　菴摩勒一兩

右為散 [illegible] 和 [illegible]

卻 [illegible]

當令 [illegible]

丁 [illegible] 散 [illegible] 染髭鬚

大訶子 [illegible]　生丁香 [illegible]　百藥煎 [illegible]　高茶末

右為細末用水一大碗煎數沸不得令草收乃盛器中每夜臨臥溫將來洗
頭髮用藥水洗之又一宿以皂莢水淨洗百日其髮黑藥用更
又新針瓦器盛之

訶子散 治[illegible]烏髭髮

訶子 [illegible] 沒食子 [illegible] 百藥煎 [illegible] 金櫻子 [illegible]

針砂 [illegible]

右將針砂[illegible]入針砂[illegible]先夜將針砂[illegible]在鍋上用荷葉包到天明用[illegible]
[illegible]先夜將前藥末四味[illegible]入針砂[illegible]內用[illegible]一[illegible]如[illegible]
[illegible]荷葉包到天明[illegible]數[illegible]
[illegible]黑[illegible]

[illegible] 沒食子 [illegible] 旱蓮[illegible] 側柏葉 [illegible] 黃蘗皮 [illegible]

右細剉[illegible]入[illegible]用[illegible]長髮

烏髭方

晚蠶沙 [illegible] 麻枯心 [illegible] 大栝樓 一枚 肥皂莢 一挺 青鹽

右以栝樓子一枚取藥[illegible]上留一眼子[illegible]用炭十斤燒盡煙
[illegible]取出入芸苔末五兩同[illegible]為末每日[illegible]臨臥時用
一錢揩牙

烏鬚髮

風化石灰 [illegible] 花硫 [illegible] 黃丹 [illegible] 定粉 [illegible] 密陀僧 [illegible]

右合勻水調[illegible]塗之勿犯[illegible]

五物散 [illegible] 白烏髭鬚

針砂 [illegible] 川楝[illegible] 沒石子 [illegible]

白芨 一兩 訶子 [illegible]

右為細末和勻再研[illegible]如泥臨臥先[illegible]水洗[illegible]後用荷葉[illegible]
覆之[illegible]
[illegible]
尤妙

五白玉粉散 [illegible] 烏髭鬚

大灰 [illegible] [illegible]

土粉 [illegible] 硃粉 [illegible] [illegible]

右為細末如前法先淨洗[illegible]水[illegible]塗上如前方點貼裹
[illegible]

摃髮法 [illegible]

黑[illegible] [illegible] 沒石子 [illegible] 旱蓮子 [illegible]

鮎石 [illegible] 母丁香 [illegible]

右件研令細[illegible]
[illegible]一日不得用皂莢水

洗面生黃者

烏鬚髮摻手藥[illegible]

[illegible] 生乾地黃 [illegible] 龍骨 [illegible] 細辛 [illegible] 青鹽 [illegible]

右用大瓜蔞一個[illegible]內將元[illegible]
封蓋泥固[illegible]為度取出[illegible]研為細末早晚揩牙良
久用溫[illegible]之四十九日[illegible]

治黑髮令黑 [illegible]

蓮子 [illegible] 沉香 [illegible] 槐實 [illegible] 旱蓮草 [illegible] 石榴 [illegible]

右搗作[illegible]安於瓦罐子內以紙[illegible]泥[illegible]了便乾先以[illegible]
火焙[illegible]用炭十斤燒令通赤候冷取出研如[illegible]作[illegible]用之

[illegible]用經一月[illegible]白[illegible]黑

生長鬚髮令黑百黃白者皆黑

黃耆 當歸 獨活 芎藭 白芷

芍藥 蔓荊 防風 辛夷 乾地黃

藁本 [illegible] 蒼朮 [illegible] 烏麻油 [illegible] 馬鬐膏 [illegible]

右切以微火煎[illegible]成去滓[illegible]髮[illegible]後塗之

烏雲散 [illegible]

訶子 [illegible] 百藥煎 [illegible] 川芎 [illegible] [illegible]

右為細末[illegible]每用水為[illegible]
得所[illegible]上用荷葉[illegible]

烏龍散 [illegible]

漢方 綠礬 [illegible] 當歸二兩 桑椹子一百箇 大棗黑者

右以瓷罐用麻油十二兩 皮以紙數重密扎定 每夕就上蒸飯 乾熟 受取出埋地下 [illegible] 百日 用以染髭 大效

烏髭方 [illegible]

皮石子 母丁香 香 [illegible]

右以針砂 [illegible] 同研 [illegible] 用竹 [illegible] 水 [illegible]

合多 [illegible] 乾膝 藥在上 每一次用 可黑兩月

黑錫散 [illegible] 白烏髭鬚

黑錫 [illegible]

升麻 細辛 [illegible] 訶子 [illegible]

右以黑豆同煎 [illegible] 每日 [illegible]

揩牙 [illegible] 只一月日 [illegible]

染髭方

訶子 [illegible] 百藥煎 [illegible] 五倍子 [illegible] 石子 [illegible]

右用針砂八兩 [illegible] 醋 [illegible] 用米醋打 蕎麥麪

[illegible] 七六

為細先將髭鬚以皂角水洗去油膩 先將針砂與蕎麥麪調和為糊

敷上用荷葉包裹過一夜 明日取去 却用前藥再用蕎麥麪為糊

敷上即黑

染髭黑方 [illegible]

蕎麥 針砂 [illegible]

右先用醋和 [illegible] 先髭後用藥 [illegible]

烏用便方

馬舍子 訶黎勒皮 [illegible]

右末每用二錢 大麥麪一錢 醋和 [illegible]

烏髭方

旱蓮花 皮石子 荷葉 [illegible]

右 [illegible] 作 [illegible] 汁調

後勻 即蘸水入 [illegible]

卒散 [illegible]

枸杞 [illegible] 蓮子 [illegible]

右用好酒 [illegible] 春五夏三秋七冬十日 每日飲一盞 七日後飲盡

一大醉見効

換髭鬚方 [illegible]

醋石榴根 [illegible] 白芨 [illegible] 硫黃 [illegible] 綠礬 [illegible]

右細和入瓶子中 從今年十二月埋之 至來年十二月內取出用

乾 [illegible]

烏髭鬚 [illegible] 用揩牙藥 [illegible]

青鹽 [illegible] 杏人 [illegible] 乾地黃 [illegible] 鶻鴿烏頭 [illegible]

右為麁末 [illegible] 以麻線扎定用 [illegible]

[illegible] 烟出 [illegible]

[illegible] 揩牙 [illegible] 用 [illegible]

[illegible]

黑髭方

生乾 [illegible] 皂莢 [illegible] 醋石榴皮 [illegible] 硫黃 [illegible]

右為末 內 [illegible] 中 [illegible] 如 [illegible] 大每夜

[illegible] 八二

換用生薑 [illegible] 七日 [illegible]

烏 [illegible] 三聖膏 [illegible]

醋石榴 [illegible] 新胡桃 [illegible] 新柿子 [illegible]

右 [illegible] 分用 [illegible] 黑錫三斤

搗作小餅大棗子 [illegible] 口上用木柏子 [illegible]

密封上用石灰麻 [illegible] 取出看藥

顏色 [illegible] 如用 [illegible]

以 [illegible] 時 [illegible] 之

甚黑 [illegible] 大蒜 [illegible]

刮去內 [illegible] 丁香 [illegible] 使却 [illegible] 皮柿 [illegible]

與 [illegible] 石榴 [illegible] 生石榴 [illegible] 於錫盒

內 [illegible] 十日取出 [illegible]

于 [illegible] 中也 如不黑再 [illegible]

內埋數日取出 如 [illegible]

烏髭 [illegible]

針砂 … 各等分
右前二味入鐵銚內以炒十餘次入烏頭入銚為糊稀調停所溫上
髮鬢用荷葉包或用手帕裹一宿候以米泔水洗淨次用烏和二散
治烏頭方
熟石榴 五倍子 芝麻草
右用共碎用細水銀之於鐵器內水灸掠髮內空
烏髮方
針石 … 蕎麥 … 川百藥煎 …
右用共葉各生搗水調為膏…子鉄拌抹上用荷葉裹之用手帕
護之至天明蘸水洗之黑如漆
烏鬚黑髮
針砂 百藥煎 白及
右用淘淨醋鐵器中炒紅入百藥煎水調抹荷葉包之
醉鬚 烏黑鬚髮
槐子 旱蓮花 生地黃
右為細末無灰酒一瓶浸藥於瓶內密封之浸二十日取酒飲一醉後
覺大驚鬚髮盡黑恐人不信將白雞犬喂試之白毛盡皆變為黑
雞犬也
摺牙烏鬚方
皂莢 生薑自然汁 地黃自然汁
右以二汁和勻塗刷皂莢於火上炙以汁盡為度碾細為末入青
鹽拌勻逐日如牙藥用
染鬚方
麻姑 青蓋 乾生地黃
右將破取地黃十和前件藥於鍋中熬令乾以豬脂子霜之取炭
末和蓋泥固之通赤入了將藥為末每用揩齒了令藥少時以鋪
便嚥並量令一碗欲得速乙飯後五明午後各一度揩之即先從眉黑
一月內白髮變黑矣
染鬚髮方
胡粉 石灰 …

右如炒以綠皮作易和之如粉先以皂莢易洗鬚令人極乾不得令有膩
氣好將藥於夜臥以藥塗鬚髮上令勻訖以荷葉相裹著頭巾上縛以
裹髮夜至早夜取所將米泔洗之淨乃洗鬚髮又以醋甘熱煖洗髮
又取生胡麻苗為取十斤水和煮二斤溫以洗鬚髮訖又用白易畢
之白日乃如舊用雞子白和桑金一方用羨 每夕取金訖用
出衣包裹明日乃去便黑大佳
金髮黑髮方
澤膏 白礬
右為末一匙用以枇杷葉煎水和取汁同研桃核研成膏日十合塗鬚髮黃
九成
染鬢髮令黑不白方
生麻油 乾胡桃
右於油中煎胡桃令焦即取出細研為散卻別入生麻油內拌之塗
髮鬢黑妙
拔白鬢髮方
硇砂一兩 青石榴一兩
右將硇砂內青石榴中心卻蓋封定威於瓷瓶中埋於馬糞內二七
日取出用染之妙
又方
胡桃根皮 一斤 蓮子草
右碎剉入瓷瓮子內以水五十斤煮一月去滓釜中熬至五升入瓷臺
由一日以搓火同煎取五升收貯梳頭時先用炭灰汁先洗頭
髮令之訖即上用此藥 … 如此五七日黑
也常用亦令之為妙
染鬚髮方
用鹽易洗 … 作治白禿
又方
用生麻油浸烏梅 常用傅頭良
側柏油烏鬚髮神方
大訶子十枚 … 水熬調塗在髮

[illegible]

宿蠶蠟入[illegible]四兩[illegible]研入藥[illegible]研極細[illegible]如膏[illegible]

[illegible]

枯之而[illegible]一月可一叉[illegible]之

[illegible]去涼[illegible]方

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

我生[illegible]

[illegible]指甘藥[illegible]

[illegible]不[illegible]用切作[illegible]長寸許先[illegible]銀合[illegible]水[illegible]角以如炭

不可太過恐成灰取出[illegible]研細入鹽少許遂日早晚兩次擦牙已

白者三四[illegible]若更不白

胡桃[illegible]

用新小胡桃三枚和皮[illegible]細[illegible]於銀石[illegible]內文武火[illegible]

[illegible]

烏髭藥方[illegible]

右針砂五兩[illegible]大斤不使只以細者水淘過去泥以[illegible]乾以釅

醋[illegible]數日[illegible]後入銚內炒令針砂通紅為度[illegible]地上以[illegible]出火氣

研細[illegible]研[illegible]時約[illegible]令一錢二三錢[illegible]細和[illegible]

胡[illegible]第一夜[illegible]用溫

[illegible]上油[illegible]二枚[illegible]藥不[illegible]

恐[illegible]之不[illegible]先以[illegible]荷葉[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]第二夜[illegible]上藥又四五日前以[illegible]子不[illegible]

鍬內[illegible]由[illegible]用

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

作[illegible]打[illegible]用[illegible]之

治烏[illegible]不[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]之神效

治[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]研細[illegible]

[illegible]

[illegible]

治髭黑

[illegible]

令[illegible]

[illegible]

令[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

又方

[illegible]

[illegible]

又方 出本草

用茎葉搗取汁合成膏塗髮不白食其子令人好顏色

又方 出本草

用覆盆子葉取汁合成膏塗髮不白食其子令人好顏色

治髮藥

用風化石灰一斤用細柳條一寸長四十九根用麁柳條三根將石灰并柳條一同於砂鍋內慢火炒用麁柳條不住攪炒細柳條如炭黑用夾紙鋪於地上將石灰攤上隔一宿去火氣用瓦粉半斤官粉四兩上粉四兩同為末用新水調令得勻上以荷葉封裹次日洗去如漆

一撚書 出危氏方 烏髭鬚

用酸石榴結成時就枝上將石榴開一小孔傾水銀於中却將元皮封之以麻皮纏定用牛糞泥封了候經霜摘下傾出以塗髭鬚黃者其髭白髮即黑一方用黃泥封固放四十月取用以[illegible]

黑髭鬚方

用蝌蚪四十九條入磁器內研爛置木盒貯之於馬糞內埋藏一月取出以白線頭試染如即黑到尾每入馬糞內埋之待數日再取出試之性緩然後染髭鬚更速使不黑度為

治頭不光黑髭鬚 出肘方

用青木香白芷零陵香甘松草藿香各一分用綿裹以清酒宿內油中煎每宿加鵝脂二上慢火熬即以急煎著少許胡粉烟脂訖又以纖火煎令粘大布作挺以飾髭鬚神効

治烏髭髮 出得生堂

用雞腸草[illegible]蒲公英槐角子於內搗住不以半膽多少於屋內陰乾一月每日早晨服一丸用溫水下

染髭髮 [illegible]

用取八九月經霜桐葉[illegible]子多收搗碎[illegible]生布絞取油先以甘[illegible]

[illegible]

度用[illegible]

又方

用錫鐵打作四十九片如碁子大燒令赤即於漿水中淬之又更燒淬如此四十九遍即將錢入竹瀝中浸三日後用拔撚髭鬚

黑甚妙

變髭髮鬚顏揩齒散 [illegible]

蓮子草 [illegible] 破麻布 各等分

右細剉內於瓷瓶中以鹽泥固濟大火燒半日候冷取出仍於鐵臼中搗為散每日常用揩之旋有黑者生

烏髭鬚方

柏葉 松葉 各四兩 丁香 皮石子 各二兩

右為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每日空心以溫酒下三十丸夜卧時以鼓湯下三十丸

拔白令髮生黑良日 共十四方

正月四日 二月八日 三月十二日 四月十六日 五月二十日

六月二十四日 七月二十八日 八月十九日 九月二十五日 十月十日

十一月十日 十二月十日

右已上並宜[illegible]拔之永不白一方以日正午時拔之

[illegible]五辛一枝黑者更不變

又方 [illegible]

正月[illegible] 二月[illegible] 三月二日 四月十一日 十五日

五月[illegible] 六月[illegible] 七月十八日 十八日

八月[illegible] 九月[illegible] 十月十二日 二十一日 十一月十日

十二月[illegible]

右已上日月並於午時[illegible]拔之了[illegible]用之[illegible]

卯先以水於石上磨丁香汁[illegible]孔中生黑者

神仙[illegible]金膏 [illegible]

生薑[illegible] 皂角[illegible] [illegible]

香白芷 [illegible]

右件搗羅為末用[illegible]水調和得所用鐵銚子先[illegible]脂攪銚子內方入藥以攪其定用瓷瓶塞攪蓋熱後用紙筋泥固濟不令

[illegible]

用枕子挑藥少許於白髮根上熱擦即時去白髮用藥再擦方愈
即止後生黑者永不變白

染髭鬚方〇出今居士選奇方

石灰新者　黄丹　樟腦等分

用桑柴灰汁調濃候乾了即用温水先洗用胡桃松子研細傅之即
黑色

詩曰

秘傳再上神仙訣　妙奪人間造化機
白髮變成黑髮去　健年化作少年時

烏髭藥方〇出今居士選奇方

針砂二兩用醋炒乾　訶子二兩用麵包煨去核

右一味為細末和勻先將用酸醋調成膏用於太陽中曝晒待鉄變
黄元髭變將淨洗髭鬚傳藥向髭鬚上手上嗅不氣可用荷葉包定令勿
透氣次日用米泔水洗盡温洗髭則黑如膠漆然了用核桃松子油
潤之絕妙

五聖散〇出余居士選奇方　烏髭鬚髮

乙卯年見曹郎中云頃見秀陵有意足青髮已白後一年剃
來黃黑如漆和之云一道人教其用藥十子素之以延年反亦性細研
早晚揩用之十年今五十五皆黑健壯日居而色且甫

五聖不老散〇一名五聖還童散居生秘寶方

不蛀皂角五十挺到去黑皮　大石子二對　熟乾地黄　胡桃四十個
地黄二斤大黄燒成灰　白鹽十二兩　川楝子　硼砂　青鹽
地龍去土　香白芷　故石灰　川百藥煎　黑牽牛
烏賊魚骨各二兩皂角只五　前來同醋四升同煮皂角　細辛
威靈仙　藿香葉　當歸　仙靈脾　薑各一兩

右先以皂角入醋搗浸一宿不以後五味並之煎四五日每日
翻皂角一二遍用竹刀刮肥恐醋浸藥不著日足不用地黄只將
皂角用桑柴熟火炙令焙乾再於醋內浸再炙至醋盡焙乾碾
羅為細末每藥一兩用麝香一錢和勻每早晚以刷牙子蘸藥上下
齒再處擦五七十遍或手指蘸藥亦得過宿津液嚥更不漱口如

用藥約　月外若有白者髮自與黑退白頭去如再生出者有黑白變
尖搯鉗盡止以黑者此藥白神驗不可細述一日明目二曰去頭風一
曰補精四曰牢牙五曰烏髭鬚髮換藏方有神效

變白散〇出衛生家寶方　固藥大能烏髭

大黄石榴一個

皮炒煎　細辛　兩川　豬牙皂角　寒水石人附

右為細末更入麝香少許揩牙擦藥方救固齒揩牙勿數取口
中退烏白髮

烏髭揩牙散出衛生家寶方

若參半兩　炒色青者　青鹽二兩

右先以若參為末次研青鹽次研青黛並和勻早晚揩特作
牙藥揩牙徐從火時救之削南劉大夫年老已七十餘知黄州齒白

神宗朝翁大夫白髮皆黑云用此方進麟趾之王

妙烏髭方出衛生家寶方

每日取石榴一箇於上勻鑽小孔鉄釘四十九箇逐夜安頓在露地
數暈上至曉卻收在屋下勿令見日色三夜畢取去釘子每一釘
從內納入丁香一粒取出一箇釘便塞丁香用紙裹石榴以紗系
和黄泥固濟青石榴頓在風道陰乾以火燒煅令通紅多為度
取出炭火熱淨地上候冷取去泥土取燒過者石榴碾為細
末早晚揩牙更令揩牙盡和以停藥方行至千春永黑髭鬚更
無蛀牙若貴人用此藥一世更無白如病白須使以生薑汁擦
蓮生黑者

變白為黑方　出衛生家寶方

針砂醋煮　訶子皮以黑色皮　五倍子炒　百藥煎各末一錢
蕎麥　熱麵特製用大麥麵

右用蕎麥麵同前四味醋煮為糊得所先令先髭鬚了揩拭令
極乾然後用前藥塗命抑用荷葉包裹不黒再染一兩度自黒

變白髮方　出衛生家寶方

香白芷　菊花　旋覆花　桂心　白茯苓
巨勝子各一分　華澄茄　牛膝各二分　覆盆子　蓮花鬚各半分

右為末，用夏[illegible]斛丸桐子大，空心酒下三十九丸，至時更進三十丸，服時須
避[illegible]飲引動藥力乃妙。一日見効，白者初若漸變黑，色比藥
兼治一切風疾。君欲試藥驗，但將藥餅喂飼白犬，一月即為
黑矣。忌蘿蔔、羊肉、生葱。

正月[illegible] 二月[illegible] 三月[illegible] 四月[illegible] 五月[illegible]
六月[illegible] 七月[illegible] 八月[illegible] 九月[illegible] 十月[illegible]
十一月[illegible] 十二月[illegible]

已上逐月並不宜服，但以前月下藥即中。四十二歲頭髮白，忽於山中
遇老人，授此方，依法服食，至趙關時六十九歲，更不生白髮，面[illegible]
如漆，遍進此方

烏髮五花散 [illegible]
香附子 [illegible] 生乾地黃 [illegible]
石[illegible]子 [illegible] 青鹽 [illegible] 石榴皮 [illegible] 細辛 [illegible]
皂角 [illegible] 麝香少許 [illegible]
右為細末，入麝香和勻，臨睡揩牙，不可語話，久久以溫湯漱之，不要

一月如漆矣

烏金散 [illegible] 中牙烏鬚
綠石榴皮 生乾地黃 [illegible]白皮 青鹽 何首烏
細辛 皂角 [illegible] 升麻 [illegible] 細辛 [illegible] 麝香 [illegible]
右件先以前石榴皮等八件剉碎，用瓷瓶一箇入藥在內，鹽泥固
濟，留一竅子出煙，大火煅令赤，候煙盡為度，研細，次入升麻細辛
麝香研和令勻，每日早晚常用揩牙，盥漱。

再黑青 [illegible] 烏髮
胡桃 [illegible]
足粉 [illegible]
右件，夜研如膏，用小瓷合收之，如用少許先塗在白髮根上，眉
捻子捻，其白髮用手捋藥入白髮，藏內，隔次即出黑髮，若三次
用絲子不[illegible]內捋，髮如此，日一遍

黑鉛散 [illegible] 令[illegible]髮光彩，有明日半当牙
用黑鉛半斤，大鍋內鎔成汁，旋入桑條灰，柳木攪，令成沙，令以熟絹

羅為末，每日早晨如常揩牙，後用溫水漱在盂子，在內取用
其水洗眼，治諸般眼疾，兼黃白[illegible]者，用之[illegible]變其色也

染鬚髮白令黑方 [illegible]
用[illegible]醋漿煑豆，以染之，黑如漆色

烏髮 出本草方
以胡桃皮和胡粉為泥，拔去白髭鬢，以內孔中，其毛皆黑

染髮仙方 出本草方
以胡桃青皮壓油，和詹糖香，塗髮，則髮如漆

染白髮方 出本草方
以鉛丹煎膏染之

白髭變黑 出本草方
用蒼耳葉為羹食之

染髭髮令黑 [illegible]
以蠟[illegible]及[illegible]灰末和塗之

髭毛髮 出本草方

以石榴花并葉乾之為末，和鐵丹服之，一年變毛髮，色黑如漆
鐵丹乃飛鐵為丹也

烏髭髮 出本草方
以[illegible]燒灰乾傅，立効，能染髭髮變黑也

染髭髮 出本草方
以瀉[illegible]師與青胡桃上皮和[illegible]，沐之，不變者，師[illegible]十歲也

髮金髮令黑方 [illegible]
以芭蕉[illegible]汁塗之

黑髮方 出本草方
用[illegible]壓取油傅頭，令髮長而黑

令髮 [illegible]
用金櫻花和綠礬研，拔白髮[illegible]之，再出黑者，亦可染髮

染鬚至黑 [illegible]
以針砂及[illegible]和沒食子染鬚至黑

染髮方 出本草方

用大麥炒作粉以子等末之令勞米
以白蜜七兩為丸
以為散一時別其名目米丸后山參一作
并加水咲化細長入放細時用沸和丸丸後者却放取又別愛更放
卵絶卽收先後者外細研仔碎細研筬好作霞入砂
於卵內安置月滿抱數重旋從用後放者卵一齊令雞抱
子出令產其藥在卵內自然結實打破取出熬研如粉用蒸餅丸如
未生大下計時服酒下五七丸十日內變白亦愈瘥矣

長生不飢黑毛髮方 出本草方
取母猪食之
令人髭鬚毛髮黑子白久服成仙 出本草方
以王井水服之

黑髮鬚
雜鈔四月云正月一日取五木煮以洛令人頭不白黃瑞云
道家謂之木為五香一云五木道家多以此洛當是其義也

○變黃白

論
足少陰血氣盛則其髮澤而黑足太陽血氣盛則其髮而美二經血
衰之則髮變白黃白則髮變有傳染之
手如血血補氣為者服則益血氣調適則久影其視傳染之功是矣
默顏色黑髮丸 變白令黑備益主

首烏 杏人 陳皮
細辛一兩 附子 旋覆花 覆盆子
青葙子 秦椒 熟乾地黃 白芷一兩
續斷 秦皮 桂心二兩 生地黃
右為末入地黃汁以少蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每日
空腹以溫酒下二十丸食前服忌生葱蘿蔔大蒜等

治擦白反黑
白 白朮 甘松
細 石

變黃白不果
腮鬚
五倍子 白蒺藜 訶子 青胡桃皮
木瓜皮 何首烏 細辛 酸石榴皮 猪牙皂角
右等分為末和丸如小豆大常於木皮灰內培養勿得離灰
如要烏鬚時用好酸醋磨化開擦鬚

地骨皮丸 出聖惠方
服
地骨皮五兩 生乾地黃 覆盆子一兩 黃耆一兩
五味子一兩
菟絲子
右為末下入蜜和更搗三千杵丸如梧桐子大每日空
心以溫酒下四十丸
十日內黑其妙不可言食肉生葱蘿蔔

摩頂黑髮方 出聖惠方 治髮黃及油
白芷 附子 連翹 防風 卷柏
右細剉用生油二斤浸經三日煎放冷每用塗頂
零陵香 蔓荊子 蓮子 鵝黃 川芒硝
台血髓虛鬢白早宜服烏麻黑髮方 出聖惠方
烏麻一升 白茯苓二兩 熟乾地黃四兩 二兩 卷柏
人參二兩去蘆頭 松脂二兩 桂心一兩
右為散每日空心以溫酒調下二錢漸加至三錢食每服一月

蓮子大麻等
稻子人丸
稻子人二兩 酸石榴皮二兩 秦椒
馬藺花二兩 蓮子草二兩 白芷二兩 旋覆花二兩
右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心以熟水下三
十丸晚食前
再服忌大蒜生葱等

地黄丸 變白令黑補益

熟乾地黄一斤 牛膝 杜仲 茯神

[illegible]

右件藥以地黄汁蒸令乾擣羅為末鍊蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每服以温酒下三十丸日再服忌食生葱大蒜蘿蔔

川椒丸

川椒 當歸 牛膝 茴香

熟乾地黄 覆盆子 牛膝 兔絲子

右為末鍊蜜和擣五七百杵丸如梧桐子大每服以温酒下四十丸

[illegible]川椒[illegible]心生[illegible]大補[illegible]

神[illegible]變白[illegible]氣虛神不安

地骨皮 桂心 熟地黄 白芷 旋覆花

訶梨勒皮 桑椹 杏仁

右為末鍊蜜為丸如梧桐子大每日空心以温酒下四十丸忌生葱

烏髮丸 治男子年少髭髮斑白

土馬騣 石馬騣 半夏 川五倍子

生薑 胡桃 真膠香

右為末和作一塊用袋子盛[illegible]彈子大熟酒水各少許浸下茶

十水洗頭髮一月神效

變白黑神妙揩齒藥方

醋石榴 [illegible] 枳殼 茄子根

[illegible] 石膏 五倍子 熟 川升麻

右為末用揩齒不在變白為黑[illegible]斷手[illegible]也

地仙丹 [illegible]令髮黑延年久服可致如梧桐子齒落重生行如奔馬

夜視有光久服為地仙

遠志 白茯苓 熟乾地黄 地骨皮 麥門冬

菖蒲

右為末以棗肉和末杵千餘杵丸如梧桐子大每日空腹以温酒下四十丸晚食前再服[illegible]忌生葱大蒜蘿蔔等

五神還童丹 詩曰堪嗟髭髮白如霜要黑元來有異方不用擦牙并染髮都來五味配陰陽赤石脂與川椒炒辰砂一味最為良茯神能養心中血乳香分兩要相當棗肉為丸桐子大空心温酒十五丸酒下五服七服之後君休擣管教華髮黑加光兼能明目并延壽毛翁變作少年郎

赤石脂 川椒 辰砂 茯神 乳香

右為末棗肉和丸如梧桐子大每服三十丸空心温酒下

兔絲子丸 [illegible]髮白可變[illegible]又治[illegible]髮禿者不生

兔絲子 地骨皮 [illegible]

生牛膝 生地黄

右件前三味擣篩為末以牛膝地黄汁和作餅子曝乾再擣羅鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸早食後温酒下如心中熱米飲下

生薑為末鍊蜜和丸每日空心生薑湯下三十丸漸加至五十丸久

[illegible]人參丸 [illegible]治[illegible]髮白[illegible]

人參 熟乾地黄 天門冬 白茯苓

胡麻人

右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十丸早食後温酒下

胡麻丸 杏人 桂 黑豆黄 生地黄

右先將地黄汁[illegible]中煎三兩[illegible]次入杏人[illegible]藥並擣羅為末拌入同杵令稠丸如梧桐子大每服十丸早食後温酒下臨臥再服

服之一月大驗

甜瓜子散 治[illegible]血氣虛腦髓空竭諸藏虛乏血氣不足[illegible]髮鬢白[illegible]視[illegible]行風[illegible]手足煩熱恍惚忘誤遠年下

甜瓜子 白芷 當歸 芎藭 甘草

右為散每於食後以[illegible]或温水調下二錢服之方有松子去皮

[illegible]變白[illegible]方

旋覆花　秦椒　地骨白皮各一斤　桂心一尺

右件下篩，以井花水服方寸匕，日二服，十日後髮黑，忌生葱、若

不信，將此藥拌飯喂白犬，一月白毛變黑，此乃神效

誤古傳

乾柹丸　出聖惠總錄　治髭髮白可以變黑

乾柹以酒煮　納于瓷器中　生乾地黃　熟乾地黃

右爲末，研，除末飯和搗一五百杵，合和丸如梧桐子大，每服二十丸

空心溫酒下

令髭髮早白令變爲黑方　出聖惠方

硫黃二兩，細研　　酸石榴皮　一兩　又竹葉

右先以和了，經以竹葉硫黃內於石榴皮中，用鐵器以石榴外，又

瓷中盛，飯內蒸兩遍，取出，曬乾，搗羅爲末，入竹葉硫石等末

相和，更研令勻，煉蜜和丸如菉豆大，每日早晨以溫酒下二十丸

其藥服六七日已來，髭髮應便是效也，白者自然黑，者再生，神效

駐顏益心神方　出聖惠方

[redacted]

熟乾地黃　牛膝　杏仁

更研千二兩，用食二日，曝乾，搗末

右件都研令勻，以煉蜜和搗三五百杵，丸如梧桐子大，每服以溫

酒下四十丸，食前服之，主補心，大驗，補前

秦椒丸　出聖惠方　治髭髮黃白

秦椒　生乾地黃　旋覆花　白芷各一兩

右爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服三十丸，米飲下，不拘時

四聖丸　出聖惠　治髭髮白，令髭髮黑，還其色

蜀椒　去目　　杏人　去皮尖　熟乾地黃一斤

右先判地黃，入瓷器中，以酒一升，浸一宿，取出，與杏人同搗如膏

次用炭火燒地令赤，以醋潑，然後取瓷器覆之，其上以地黃膏

令勻，周圍以炭火燒通風，候令收出，搗羅爲末，入和前藥，入研末，飯一升，同搗三

百杵，丸如梧桐子大，每服三十丸，空心溫酒下

地黃丸　出聖惠方　治人年四十已下，鬚髮白，還黑

生地黃　肥者，判五斤　五加皮　牛膝　酒浸，各五兩

右先將地黃入多瓶中，以酒五升，浸一宿，取出曝乾，入酒，又曝乾，酒盡爲度，後

搗羅爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服二十丸，空心溫酒下，一方無

牛膝，爲散，每日空心以溫酒調下二錢，若欲長服，中宜亦得，此藥

能化白令黑，兼益筋力，忌生葱、蘿蔔、大蒜等

三倍丸　出聖惠方　補益，明目壯氣，延年，令人好顏色，變白髮令黑，其功

不可具述

川椒　出目　牛膝　去苗　生地黃

右爲末，用生地黃汁，研，令盡，取乾，即更拌以地黃汁，以盡爲度，曝乾

搗羅爲末，和如不粘，以搗千餘杵，丸如梧桐子大，每日空心及晚食前

以溫酒下四十丸，忌蘿蔔、大蒜等

熟乾地黃　杏人

變白髮　入黑方　出聖惠方　　熟乾地黃　杏人

右件藥，入研令勻，以煉蜜和搗三百杵，丸如梧桐子大，每

服以溫酒下三十丸，食前服，如至四十九日，慶於燕、野之變白

功效不可具述，切不得令孝子女人見，忌生葱、蘿蔔、大蒜等

[redacted]

變白不老　出事

多收桑椹曝乾，搗末，蜜和爲丸，每日服六十丸

治婦人染髮

用乾柹子五兩，炭煎茅香湯煮，令桐油子得爲末，合和研如

桐子大，每日空心服及臥時，茅香湯下五十丸

治髭髮黃赤令黑方

用羊蹄燒灰，以臘月豬脂和塗之，日三度，一取黑即上

又方

用黑豆二升，以水七升，煮黑豆令極爛，去豆再煎，令稠，當用塗髮良

治髭髮黃　出事

用臘月豬脂和羊屎灰、蒲灰等分，封頭三日一爲之

一醉烏　去白髭髮白再黑方

生地黃汁　一升　訶梨勒

硇砂　銅砂　硫黃　醋石榴

右藥同入瓷瓶，月一朱十度，盛封，刀令鑿透，至四十九日後取出

末研令成若黑痒色変……令一拔……到……下
之三二日後再……

必効拔白髮更生方

熊脂 白馬鬐脂 婆羅勒
生薑 母丁香

右為末，其入馬鐙鐵……之以藥末相和令勻，取一小撮拔左攪白髮……以……即……以指頭熱揩之，令藥入……十餘日便黑髮生
又……

攪拔散 治髮黃白……方
攪拔 胡麻 生乾地黃
兔糞

右剉碎入瓷瓶中，用瓦片蓋瓶口，……如……眼大，候乾，以……黑……為末，每……

治髮黃白赤，染即黑

生薑 生地黃

右用不蛀皂角十莖，去黑皮并筋……同藥……
……為變……入……內用火……

服菊……髮白方

甘菊以三月上寅日採，名曰玉英；六月上寅日採，名曰容成；九月上寅日採，名曰金精；十二月上寅日採，名曰長生。……百日……
……以成日合擣千杵，下篩，和以蜜丸如梧桐子，日三服，七丸。百日身輕潤，一年白髮變黑，二年齒落……復生，三年八十者變童兒。

必効染白髮方
用橡……以……
……
……

又方
……

治口齒之功未易具陳

變白令黑方

生乾地黃 地骨皮

右為末，鍊蜜和擣三五百杵，丸如梧桐子大，每服以温酒下四丸，食前服之，忌生……

白髮令黑方

八角附子 大醋

右以……石大如……許一……
……

治髮變白髮黃赤令黑方

生梧葉 猪膏

右擣梧葉為末，以猪膏和為二十丸，用布……

拔白令黑

取除日白拔白，以……脂……

又方
用大豆五升醋漿水二斗煮取五升染之

治髮黃赤方
用燒梧桐灰以乳汁和塗膚髮及井底泥塗髮即黑方連皮
白但黑方便傳之

揩齒方○治鬚髮黃白令速黑也
用醋石榴五月內於東南枝上揀取生不損而大者 和蒂頂上一助
針 銀子許 丁餘用水銀半兩 雀卵 銀子內不得開 從風日雨露
至十月藥盡 取下 令內盡成水 每用時以魚腦骨 打頭藥揩
之

療髮黃
用熊脂塗髮梳之散頭入床底火一食頃即出便盡黑 不過一升

治年少髮白
用蔓荊松枝名綠桑根經入用 搗利五臟 [illegible] 益氣又服不飢
拔鬚乾擣末蜜和為丸每日服六十丸變白不老 一方取黑椹水漬
之頭沐髮即黑

令拔白毛令黑毛生方
用拔去白毛以好白蜜傅毛孔中即生黑毛 眉中無毛以鍼挑傷傅蜜
亦生眉毛 比見諸人以石子餅丁香十拔白毛 忽患手以傳孔中即
生黑毛 如髮毛不生取梧桐搗汁 上必生黑者 一方用白蜜傅髮
孔即不復生也

治髮黃
剪白甲燒令烟 孔以白出以蜜塗之即生黑毛

治髮不生
以大麥 [illegible] 食之
用蜂窠燒灰 和 [illegible] 毛孔上永不生

令人髮不白

治禿髮
用蔓荊子壓油塗頭能長禿髮

變白方 出千金
用丁香以生薑汁研 拔去白髮 以塗 汁中即異常黑也
又 若要頭不白方
以已髮燒灰令頭 [illegible] 分令服 大豆許 三丸 日可 是精令
頭不白

變白方 出本草
多取烏 [illegible] 子 [illegible] 塗令黑

治白髮 出千金
鑷去白髮 以白蜜塗孔中即生黑者

變白髮 出本草
以桐黑子水吞之

變白令黑 出本草
以龍葵子赤珠者服之 若能生食得者昔不食他菜十
日後則 [illegible] 異不 [illegible] 同敬

○榮養髭髮

論
夫腎主骨髓 腦為髓海 髮者腦之華 髭之所養也 衝脈為
經絡之海 其浮而外者循腹上行 會於咽喉 別絡唇口 血盛則榮
潤 生髭毛 此髭髮所由也 若髭髮不生或生而黃悴 是
衝脈衰 無以榮養故也 須以藥治令潤澤也

方
地黃丸 榮養髭髮 堅齒牙 補血氣 益顏色 延年
生地黃 杏仁 丁香 二兩
胡桃穰 烏麻油 大麻油 一斤
木香 牛膝 人參 白茯苓 無食子
訶梨勒皮 藿香 沉香 安息香
柳枝皮 檀花 一兩 松脂
龍腦 白蜜 一斤 酥 一斤
右將搗研藥令細 同諸藥與地黃汁調如膏 器盛 分三
瓶 每瓶約七分 不滿 令滿生鐵中 上四面用火煨瓶中藥沸 即以
柳枝攪 欲乾 旋添地黃汁 盡為度 時時攪看 可丸乃止 候冷丸以
瓶盛 每日空心以溫酒下 大如梧子 日三夜一 十日見 百日

大效初服藥頭髮俱白月足美顏渴忌蒜芥食少生韭即效

零陵香 白芷 當歸頭

零陵香 馬蘭 香附 蔓荊子 細辛

藁本 白芷 生鐵鏽 旱蓮草 沒石子 一兩

醋石榴皮 生膝 桃李 甘香 地骨皮

芎藭

右細剉以綿裹入油中浸四十九日藥成常用梳頭髮光

驗

染鬚髮令黑光潤方

生麻油 一斤 乾荷葉 一兩 梔子花 一兩 訶黎勒皮 一兩 蓮子草 一兩

細辛 半兩 白芷 半兩 藁本 一兩 零陵香 一兩 白斂 一兩

生鐵 四兩 硝石 一兩 地骨皮 一兩 沒石子 一兩 醋石榴皮 一兩

右細剉并生鐵以綿裹入油中浸經四十九日後藥成常用梳頭經半年乃効

治風癬及令髮不白入油塗頭方

乾蓮子草 蔓荊子 細辛 藁本 柏子人

芎藭 白芷 甘松香 零陵香 白檀香

胡桃 生鐵

右都剉以綿裹用香油五斤於瓷器中浸半月藥成常用金頭一月後甚驗

揩髮神効散

當歸 荊芥 黑牽牛 白芷 威靈仙

側柏葉 訶子 各等分

右為細末用皮袋盛放在髮中次早理之能去風屑垢膩解亂結並髮黃能變白為黑

巨勝七子丸

甘菊花 旋覆花 白芷 二兩 白茯苓 一兩 牛膝 三兩

覆盆子 巨勝子 一兩

右為細末煉蜜和搗杵二三千下丸如梧桐子大每服三十丸空心溫酒下食後再服三十丸臨臥又服少飲酒引藥力如此日進三服

一月後髮黃如黑一切氣益脈補下元忌生蘿蔔猪血

血竹筍蒜忌月日知百日後髮白變黑每月生出白髮服藥止 素疑

右李服此藥壽至七十歲全無白髮若試此藥用白犬一隻食藥六十日分並

正月初四 二月初六 三月十二 四月十六 五月十八

六月二十四 七月二十一 八月十五 九月十六 十月十三

十一月十四 十二月初七

槐桃膏 榮養髭髮

死松 鐵粉 羊蹄根

槐枝 胡桃人 一斤

右除死松等三味外將胡桃人與槐枝搗作一團填入小瓶中令實又取槐枝所長三寸塞拂於瓶中與瓶口齊更取一瓶子須盛得前藥瓶子者勘合熟後穿地坑陷空瓶子與地面齊其向上瓶子即擺為熏火煅一宿候冷開之其向下瓶子滿中有油清則取此油調前三味塗頭每日淨洗再

換藥

柏葉散 常使髭髮黑

側柏葉 四兩 何首烏 地骨皮 白芷 各二兩

右為麄末每用半兩入生薑十片水一大椀煎五七沸去滓

淋洗髭鬢臨臥用

槐實膏 治腎虛髭髮枯悴目暗

槐實 生地黃 馬牙硝

酥油 一兩

右以銀石器盛地黃汁文武火上先下槐實末次下馬牙硝末停手攪若令如稀膏須成手即下酥更煎三二十沸傾出置瓷合中每臨卧以麥棍大內鼻中取去枕仰卧良久

腦中出惡水勿怪

三倍丸 榮養髭髮補益血氣

丹砂 磁石 陳麴

右搗研為末細羅別以猪腎三隻去脂膜用浸酒二升熬腎爛去汁取和藥末丸如梧桐子大空心溫酒或熟水下二十丸

三物膏 染髭髮

柳枝 桑枝 槐枝各剉一升
右以水二斗煮至一斗去滓入好鹽一斤煎成膏磁盒盛臨臥
揩牙
蔴葉散〇出御藥院方 長髮養鬢髮落再生
生薑焙乾二兩 人參一兩
右爲細末每用生薑一塊切斷蘸藥末於髮落處擦之二日一次用
又髮油方〇出聖濟總錄 榮養髭鬢
赤石 乾柿餅乙枚爲末
右以銀三兩作一小盒盛末與柿餅以泥固濟約半指厚
深埋在馬糞中四十九日取出化爲黑油用魚腮作指染時頭少許
撚鬚上其油自然到行至髮根極黑
烏金散〇出聖濟總錄 染髭養髮牙
草烏藥四兩 青鹽二兩
右將青鹽爲末同入瓷瓶內蒸子一斤蓋定上鐵灸外用鹽泥
固濟仍留元孔乾用火煅黑色青煙出爲度以新土埋一宿
取出爲末逐日未洗面前揩牙後洗面如方法日三
蟹乳膏 出御藥院方 令毛髮長革敢剃處不再若從貼之次日處
專藥髮毛除 爭兩不生
乳香一錢 瀝青二兩
右件入同化開入小蟹一處前並硬時所貼臥全書處明白可
後療洗去
茯苓散
右服茯苓末一碗當七月八日熟時收日乾春去剃然後杵爲末每
服三錢新汲水調下日二服勿令中絶斷欲長生服之一年百日復令不
寒夏不熱服之二年老者還少髮白復黑齒落更生服之三年
長生
白髮不落方〇劉君安曰欲髮不脫梳頭滿千遍
用羊脊骨和燭膏傳毛髮宿三宿即生
金陵草煎方 益氣髮變白爲黑
用金陵草一秤六月以後收採揀擇無泥土者不用洗只青摘不雞

枝淋者爛斤研節作絞取汁又以紗絹濾令淨盡內通油器盛之
日中消煎又取生薑一斤絞汁三盞一升合和又煎中以柳木篦攪
勿住中令煎至日中煎之令如稀餳將藥成矣每旦日令
捷吞服一匙以溫酒調服如作日中時用亦可丸大如梧桐子
依前法用服三十丸及時多合製爲佳其功甚速
又方
用東行桑根二尺以甄上蒸之兩頭汁出收之傳髮即長
治血脉虚極鬢髮不得潤澤宜用此方
用桑根白皮剉一升 柏葉剉一升以水三升浸煮五六沸去
滓沐頭數數爲之髮即潤澤
南燭煎 益髭髮及容顏兼補暖方
右於三月三日採南燭葉并莖子入大甕瓶中乾盛以童子
小便浸滿固濟其口置於處經一周年取開每日一兩以溫酒
服之每一匙一盞調煎一匙極有效驗
治病後頭髮不可理通頭去
右以生麻油二升將蔓荊開安銅沙羅中用油淹清之細
細將子頭髮脫自落
剃毛髮骨肌膚益血色
以胡麻葉作湯沐浴良
醫風髮
以白油麻葉搗和漿水絞去滓沐之
治髮一
以木瓜浸油梳頭
長油益髮神效方
蓮花髮 零陵香 卷柏葉 白芷 芎藭
防風
黑潤毛髮
以梧桐枝燒取十兩
右件細切以綿裹入生椒七十粒生麻油半斤浸於新甆中埋地中
七日取出婦人常以油塗頭髮蒂不生極佳

作香澤塗髮方 六味 [illegible]

依臘澤法内煎由裹煎即用塗髮亦綿裹煎之

○鬢髮墮落

論

夫足少陽膽之經也其榮在髭鬚足少陰腎之經也其華在髮衝任之脈為十二經之海謂之血海其別絡上唇口若血盛則榮於頭髮故鬚髮美若血氣衰弱經脈虛竭不能榮潤故令鬚髮禿落也

生髮膏 治熱衝頭髮鬚禿落

松葉 蓮子草 鐵精 馬鬐膏 桑根皮

韭根 蔓荊子 竹瀝 豬脂 防風

白芷 辛夷人 吳藍 升麻 川芎

獨活 寄生 藿香 沉香 零陵香

右以桑根煎汁於鐵器中 [illegible] 以塗頭髮及鬢上日二五度效

治眉髮墮落 [illegible]

白芷 附子 防風 芎藭 莽草

辛夷 細辛 黃芩 當歸 蜀椒

大黃 蔓荊子 馬鬐膏 豬膏 三升

右件十三味以苦酒漬一宿以微火煎白芷色黃膏成光光晚後用膏

傳如常用法勿近面則面生毛也

鬚髮第五 治血盛頭髮 [illegible] 鬢髮禿落不生

蔓荊子 [illegible] 桑寄生 桑根白皮 白芷 韭根

鹿角 [illegible] 馬鬐脂 五鉤 [illegible] 甘松香 零陵香

烏麻油 桑根皮

右細剉以綿裹内豬脂及白桑根汁中浸一宿以慢火煎候白

芷色黃膏成去滓收器中 [illegible] 後即生

治鬢髮禿落生長髮膏

莽草 防風 升麻 白芷 荊芥

蜣蜋 驢脂 熊脂 [illegible] 豬膏

雞脂 [illegible]

右諸膏成煎各半升合煎諸藥末則下停令從 [illegible] 五沸上濾去

滓停頭宿 [illegible] 膏

治頭風髮落并眼暗方

蔓荊實 四兩 桑上寄生 桑根白皮各三兩 韭根切一合 白芷二兩

甘松香 零陵香各一兩 馬鬐膏一合 烏麻油一升 松葉 [illegible]

甘桑根白皮汁三升

右細切諸藥用桑根汁一宿數攪令調匀 [illegible] 日内油脂中鐵火 [illegible] 五日候數十沸白芷黃膏成去滓 [illegible] 日

揩摩 [illegible] 以 [illegible] 臨時以綿 [illegible] 之膏成 [illegible]

漬以新 [illegible] 用 [illegible] 不 [illegible] 勿近手 [illegible]

而 [illegible] 治血 [illegible] 髮禿落不生 [illegible] 黃不 [illegible]

雨蜻 [illegible] 石榴葉 旱蓮子各五斤

右已上三味於端午日内收 [illegible] 中 [illegible] 令密安日中至六月

中旬取出皆細 [illegible] 研之又以生薑五斤 [illegible] 取汁及白蜜五合同

煎上件三味成膏又下諸藥末

地骨皮四兩 熟乾地黃四兩 訶梨勒皮一兩 秦椒 [illegible]

白芷二兩 旋覆花一兩 桂心二兩 杏仁 [illegible]

右搗末入上件膏中用 [illegible] 可丸即丸如梧桐子大每服空腹以溫

酒下三十丸 [illegible] 至四十九日 [illegible] 皆生黑而復光 [illegible]

[illegible]

摩膏 [illegible] 治頭十二年 [illegible] 髮禿落摩之即生 [illegible]

鉛 [illegible]

蜀椒一兩 莽草 [illegible] 兩 乾薑 半兩 桂心

[illegible] 附子 細辛 [illegible]

右細搗篩以生豬脂剉去筋膜 [illegible] 二十兩和前件藥合搗令 [illegible]

脂 [illegible] 成炙先以白米 [illegible] 後 [illegible] 摩之經四五日即毛孔

[illegible] 日 [illegible] 十五日 [illegible] 至一月四十日 [illegible]

髮 [illegible] 以上 [illegible] 五日 [illegible] 生由 [illegible] 亦 [illegible]

[illegible] 摩之 [illegible]

茯苓末散 [illegible] 治 [illegible] 白及 [illegible] 落

白朮（各四兩）　茯苓　甘草（炙）　猪苓（各四兩）　桂心（半斤）

右搗散，服方寸匕，日三，食後井花水調服，方內成米飲送服，後三十

治髮鬢禿落，已出復落方

附子（一兩去皮臍生用）　荊實（二兩）　松葉（二兩）　烏雞脂（一合）

右細切，於新瓷瓶中盛，密封，白日出之，以羅為末，以馬鬐膏和如

膏，塗之，經十日即生

治頭風，一切風，髮禿落，更不生，頭中痒，搔之白屑，頭風，頭中風，以膏塗之方

蔓荊子　附子（各二兩）　細辛　桂心（各四兩）

右搗篩，以猪脂切令中水去上脂，及添脂二十兩，烏雞脂，成

煎，先以研細，其中有脂膜不盡，以布綿搖取，以瓷器貯之，先用泔

洗髮，卻以膏塗，令入肉，每日頭

塗之，非十一月合則[illegible]麻油[illegible]

治髮禿落，令生長方

生柏葉（一斤）　猪膏（三斤）　附子（四枚）

右搗末，以猪膏和，為三十丸，用布裹一丸，內泔汁中煎，沐髮長不落。其

藥密收，勿令泄氣

又聖惠方　治頭髮脫落，能令再生

附子　蔓荊子　柏子人（各三分）

右以烏雞膏和，搗三千杵，貯瓷器中，封百日出，以馬鬐膏和，以

傅頭訖，巾裹之，勿令見風，日三，即生。用後方不用柏子人，以酒漬澤

沐，一方無馬鬐膏，和烏雞脂，塗在髮落處，三五日即生，自然牢

治頭髮不生落

榧子（三箇去皮）　胡桃（二箇去皮）　側柏葉（一兩）

右細研，用雪水一日，取水用梳髮，永不脫落，最妙。潤之

治鬢髮禿落不生，令長方

生薑　半夏　羊蹄

右相和，令勻，使日塗之，十日即生

治髮落不生，令髮長方

麻子（二升炒）　白桐葉（一把）

右以米泔汁二升，煮五六沸，去滓，以洗沐，則髮不落而長

治髮鬢墮落方

麻葉　桑葉

右以泔煮去滓，沐髮，七日長六尺

石灰酒　治頭髮落不止方，及治骨髓

用石灰三升，細篩，水拌令濕，極熱蒸之，以布[illegible]

[illegible]酒三斗[illegible]漬之[illegible]初服半合，日

三四，後二四，漸加至一合，神效。一方[illegible]十四日，春秋七日，夏[illegible]服

[illegible]令酒氣相接，服之一月即新者生也

白楊樹皮[illegible]髮落，令髮不落方

用桑根白皮，切，三升，以水五升，淹浸，煮五六沸，去滓，沐髮，數數

為之，自不復落。一方用長二尺者，剉，以桑柴之灰，取兩頭

以金[illegible]髮，落髮則立愈

治鬚髮禿不生方

用鐵上生衣，研以臘月猪脂和，塗之，日三，亦治眉毛落。一方先以醋

泔清洗禿處，然後以生麻油搽，令大熱，以猪膏和研，更生鐵衣塗

三二度傅之，即生

治髮鬢長而黑

多取烏麻花，磁甕中盛，密蓋，埋，百日出，用之塗髮

令人鬚髮禿落不生長方

用麻子人一升，秦椒二合，置於泔中一宿，去滓，日一沐，一月長

二尺也。一方無秦椒

治髮落不生令長方

用麻子十一升，熬黑，壓取油，以傅頭，長髮妙。三十日後新生

胡麻散

胡麻子　何首烏（二兩）　蔓荊子　威靈仙

苦參　荊芥穗　菊花

火麻　白蒺藜　鼠粘子

右件一十味，[illegible]

每服一錢匕以荷茶酒任下日用五七服不以時候知覺便喫半月
見效以己見半載與服一月乃始也功及五旬可減九服又百
日小至其鬚髮盡生如治皮膚風疥瘡癬疥瘡之類即入下品
味與前藥味乃未以藥前自然汁和酒調下一錢若皆賦風攻
注亦宜服之如喫此藥並三五日以稀粥補其下也

治鬚髮黃方

取黃麻汁煑粥食之

治頭風秃并女人鬢髮落

以油[illegible]油傳之

眉鬚髮不生

論

夫足少陰之血氣其華在髮足少陽之血氣盛則鬚美足少陽之血
氣盛則眉美諸經血氣盛則眉髭鬚髮美澤若血氣虛少枯竭則變
黃白不生若風邪乘其經絡血氣改變則異色惡毛生也則宜
以藥傳之令生也鬚髮也

方

松葉膏 治頭血虛風熱所攻眉鬚髮禿不生

松葉 半斤　蓮子草 半斤　馬鬐膏 [illegible]　韭根 半斤
防風 去叉　蔓荊子 三兩　白芷 一兩　辛夷人 [illegible]　川升麻 半兩
吳藍 [illegible]　芎藭 [illegible]　獨活 半兩　桑寄生 半兩　藿香 半兩
沉香 [illegible]　零陵香 半兩

右[illegible]先以桑根白皮一斤以水八升煎取五升去滓又以竹瀝
一升和和浸潤諸藥一宿後以豬脂二斤[illegible]煎候白芷色黃膏
成濾去滓不盡器中盛每用塗之日三五度妙

治血虛腦虛頭風眉鬚髮[illegible]不生髮薄宜用此方

蔓荊子 [illegible]　白芷　附子　防風 去叉　芎藭
莽草　辛夷　黃芩　細辛 去苗　當歸
漢椒 [illegible]　川大黃 一兩半

右都細剉以馬鬐膏一斤豬脂二斤以慢火同煎候白芷色
黃住火去滓故盆用瓷合盛淨洗塗之日三上良

治眉鬚髮不生羨令黑方 [illegible]

鐵粉 一兩　附子 [illegible]　羊躑躅 一兩　蓮子草 二斤
零陵香 一兩　沒石子 [illegible]　蔓荊子 一兩

右麁擣篩為散以生油五升浸五七日後用慢火煎取一半已下去
滓於瓷合內盛於無眉髮處每日塗之神驗切不得塗著
口鼻恐有毛生

蓮子草膏 [illegible] 治血虛眉鬚髮不生宜用此方

蓮子草汁 [illegible]　生巨勝油 一升　牛乳 一升　甘草 [illegible]

右相和於鐺內以慢火煎之然後以白服沸便攪之勿住手直
至沫盡為飲澄清濾去滓盛於瓷器中每日候夜臥時
低仰臥每鼻孔點三五點如小豆大至六七日上良久乃起看
當須當須唾却勿得嚥之喫少湯飲如此點半年白者却
黑落者重生其藥良驗忌生蔥蒜薑辛辣物

松脂膏 [illegible] 治眉鬚髮秃不生

松脂 一兩　附子 [illegible]　蔓荊子 半斤

右為末以烏雞脂和於瓷器中盛密封頭於屋北陰乾百日應成

細研以馬鬐膏和薄塗於上不生處勿令近面

又方 [illegible]

柏葉 [illegible]　附子 [illegible]

右為末以豬脂和作二十丸每日一丸又米泔中化破洗之每日用
之十日後再生新者餘藥以帛裹密器貯之勿令泄氣

治生眉毛方 [illegible]

鐵生衣 [illegible]　唾上音衣 [illegible]

右為末以水和塗即生

治髮髮薄不生 [illegible]

先以醋泔清淨洗秃處以生布揩令火熱臘月豬脂細研
入生鐵煑沸三二遍傳之滿生

治眉毛髮火燒瘡瘢毛不生方 [illegible]

用浦灰以正月狗腦和傳則生

生髮方 [illegible] 塗頭黑潤頭髮

取側柏葉陰乾作末和油塗之

治髮長不生方 出聖惠方
用羊糞灰以水淋取汁洗之三日一洗不過十洗大生
令白髮不生 出本草
以麻子五升研同葉一握搗捌和之二日去滓沐髮令白髮不生
治髮落不生
用豬脂塗無髮處朝夕而暮生
生髮令長
論
夫足少陰之經血外榮也氣盛則髮長而美若虛則髮不長治以
藥治之
胡麻膏 出聖惠方 長髮令速生及黑潤
胡麻油 一升 臘月豬脂 一升 烏雞脂 一合 丁香 四分 甘松香 四分
零陵香 四分 莽草 一兩 竹葉 二兩 細辛 二兩 川椒 二兩去目
苜蓿香 二兩 白芷 二兩 澤蘭 一兩 大麻仁 二兩 桑根白皮 二兩
辛夷 一兩 桑寄生 二兩 牡荊子 一兩 防風 二兩去芦頭 杏仁
茉莢人 莽草 二兩 柏葉 三兩
右剉細剉以米醋淹一宿漉出內入油脂鍋中以慢火煎候白
芷色焦黃膏成綿濾去滓以瓷合盛每先洗頭塗之日二用三十
日髮生
長髮塗香油方 出聖惠方
滋度 二兩 天雄 四兩去皮 莽草 一兩 秦艽 一兩去苗 獨活 二兩
烏頭 二兩 川椒 二兩去目 白芷 二兩 芎藭 二兩 辛夷 一兩
甘松 一兩 零陵香 一兩 沉香 二兩 華澄茄 二兩 木香 一兩
藿香 一兩 甘菊花 二兩 牛膝 二兩去苗 松葉 半斤 杏仁 二兩
右細剉以醋五升浸一宿漉出以生烏麻油六斤於鐺內微火煎
令香候白芷色焦黃膏成以綿濾去滓於瓷器內盛依塗油之
法任意塗之以髮生爲度
生髮膏 出聖惠方
細辛 防風 續斷 芎藭 皂莢
柏葉 辛夷人 各二兩八銖 寄生 一兩八銖 澤蘭

零陵香 各一兩 蔓荊子 二兩 桑根 十二斤 韭根 十二兩
竹葉 切一合 松葉 切一合 烏麻油 二升 白芷 二兩
右以苦酒韭根十二斤漬一宿以綿裹煎微火三上三下白芷色黃
去滓濾以器盛之用塗頭髮日三兩度一方無苦酒漬
生髮膏
胡麻油 一升 雁脂 一合 丁香 甘松香 各一兩 吳藍香
細辛 椒 各二兩 澤蘭 白芷 牡荊子
苜蓿香 大麻子 各二兩 芎藭 防風
莽草 杏人 去皮尖 竹葉 切五合
右切以醋漬一宿明旦以微火三上三下白芷色黃膏成去滓以
塗髮及頭瘡
又方 令髮速長黑
烏喙 莽草 續斷 皂莢 去皮子 澤蘭
竹葉 細辛 白朮 各二兩 辛夷 防風 各二兩
柏葉 切四兩 杏人 別搗 松葉 各二兩 豬脂 一升
右先以米醋漬一宿以脂煎三上三下膏成去滓塗髮及頂上
藥時塗風
令髮速長而黑方 出聖惠方
烏喙 三兩去皮臍生用 莽草 二兩 續斷 二兩 皂莢 二兩去皮子
澤蘭 一兩 白朮 二兩 細辛 二兩 辛夷 一兩 柏葉 一兩
防風 一兩 竹葉 一兩 杏人 一兩湯浸去皮尖雙仁者別研
右細剉以陳年米醋二升浸一宿漉出以麻油二斤豬脂二斤同煎
候黃藥成去滓以瓷器盛每夜先洗頭了塗之三十日効
治頭風白屑又令髮速長而黑光潤
烏喙 莽草 石南草 續斷 皂莢 去皮子炙
澤蘭 白朮 各二兩 辛夷人 一兩 柏葉 切半升 豬脂 一斤
右以苦酒漬一宿以脂煎於東向竈釜中以葦薪煎之先致三堆
土每三沸即下致一堆上候沸定却上至三堆上三畢成膏
訖去滓置銅器中數北行屋霤從西端至東七霤下埋之三十日
藥成小兒當刮頭日三塗大人數沐日一塗之甚驗

蓮子草膏 治髮白乾落令重生黑且潤

蓮子草汁三斤 熊白脂 猪鬐脂 生麻油 柏白皮

山韭根 瓦衣

右以銅器煎之，候[illegible]成去滓，夜卧時每以塗頭，令頭肌

中髮生又黑

治婦人長髮方 秦皮 白芷 蔓荊子 桑椹

生附子 零陵香各二兩 [illegible]

右㕮咀，綿裹，於瓶內用香油一斤浸，却用紙封口，埋地內半

月取出之

近効生髮方

蔓荊子 青葙葉 蓮子草各一兩 附子二枚 碎頭髮灰二匙

右以酒漬，內瓷器中封閉，經二七日藥成，以烏雞脂和塗之

先以泔洗，然後塗之，數日生長一尺也

生髮搗衣散

搗衣石上[illegible] 鐵精一合 合歡木灰各 水萍末二合

右搗研末，以生油和，以封頭，塗以塗髮不生處，每日

令髮易長方

蓮子草 麻油一升 羊乳一升 猪脂一升

右先煎乳，次入脂，等煎三兩沸，放冷，以瓷合貯之，每日

塗髮七日之後不長盡長

長髮方

蔓荊子 大附子一枚

右以酒一斗二升漬之，以瓷器盛之，封頭二十日藥成，先以灰汁

淨洗髮，然後取烏雞脂，以塗之，一日三遍，凡經七日，然

後以桑葉日三四度，便淨，以汁沐髮，十日長一尺，勿近面塗

毛生一方無烏雞脂

令髮易長

熊膽 蔓荊子一兩末

右相和令勻，以酒調塗之，髮即易長

常用長髮藥

用亂髮洗淨晒乾，以油一斤煎令焦，就鉢內細研如膏，搽甚是長髮

又法：凡婦女禿髮，[illegible]四兩，用[illegible]密室內坐搽之，生髮

白髮長

紫金油

用烏麻二十枚，鐵錢一片，五錢重，[illegible]五枚，[illegible]金二枚

到黃芩半兩，到黑豆一大合，紫草半兩，零陵香半兩，生薑汁一

大合，和勻，生絹袋子盛，取竹瀝油四兩，麻油一十二兩，入藥袋

子於有油瓷合內浸，密封，放冷處半月取出，逐日搽頭，百日內如

漆永不落白髮者

香髮油

治頭風髮落不生

用香椒 白芷 川芎各半兩 蔓荊子 附子 秦皮 零陵香各二錢半 細到

用絹袋，以生麻油半斤，於瓷器內浸三七日，塗髮稀少處

面上去風生髮

栢枝油

用栢枝乾者 椒紅 半夏各三兩 㕮咀，用水二椀，煎至半椀，入蜜

新麻黑一兩 用髮生黃汁水調勻，傅無髮處

去風生髮

烏髮方

用烏[illegible]為灰，沐頭髮，髮即長，陸[illegible]山石上菖蒲者可

治髮落不生令長

用馬脂傅之

生毛髮

以羚麻生油塗頭令人生髮

生髮

以羊屎燒灰和猪脂塗頭上三日生

長髮方

以石荊生水傅作灰汁沐頭生髮

塗毛髮

以白犬乳汁塗孔中，即生黑髮，若欲不生，拔去毛髮，以雞膏塗之

即不生髮

長髮方

用稀嫩十來頭

主生髮 出本草

以水草作湯沐浴又為膏摩傳之

長髮 出本草

用皂莢葉沐頭

長髮 出本草

以松葉子作油傳頭

主生髮去風痒 出本草

取蔓荊子壓取一合鐵粉和油塗頭初塗髮脫後生如膠漆

令腦滿髮不白而長生 出本草

用槐子以相連多者為好十月巳日採之新盆盛合泥百日度取皮水

服如大豆服之

生毛髮 出本草

用金星草根搗研浸油塗頭良

治無頭髮 出本草

用瓜蔕葉生搗汁塗之即生

論 生眉

足太陽之經其脈起於目內眥上額交巔血氣盛則美眉有毫血少則眉惡又眉為風邪所傷則眉脫皆是血氣傷損不能榮養毛髮須以藥生之

烏蛇圓 治癘風毒眉毛墮落宜服

烏蛇肉 白附子 白殭蠶 乾蠍

防風 麝香 兔腦骨

藿香 朧月烏

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每日空心以溫酒下二十丸夜臨臥再服

治眉毛脫落

用蓮子心搗取汁磨生鐵每日可二兩度塗之為妙

又方 出聖惠方

用白礬十兩燒令汁盡細研為末以蒸餅和丸如梧桐子大每日空心以溫水下七丸至四十九丸常服一丸周而復始妙

生眉毛方

用蔓菁子四兩微炒為末以醋和每夜塗之

又方 出聖惠

用七月烏麻花陰乾為末生烏麻油浸每夜傅之

治眉痒毛落方 出聖惠方

用雄黃一兩細研以醋和每夜以眉上塗之

又方 出聖惠方

用垂柳葉陰乾搗羅為末以生薑汁於生鐵器中調夜塗之

以手摩令熱為效

生眉髮 出本草

以鱧腸草汁塗之生速而繁

洗髮

藿香散 去頭風洗髮

藿香葉 零陵香 皂角 檀香 沉香 各二兩

香白芷 白丁香 黃明膠 丁香 龍腦

檳榔

右為細末每日如常使用洗髮手面百日令光悅潤澤

乾洗頭藥

甘松 百藥煎 五倍子 川芎 薄荷

香白芷 草烏頭 藿香 茅香

右為末擦髮上梳櫛木梳櫛之

洗髮香沉散 治頭髮

甘菊花 一兩 蔓荊子 乾柏葉 川芎 白芷

細辛 桑白皮 旱蓮草

右件藥每用藥二兩以水五大碗煎至二兩大碗去滓沐髮

乾洗頭 治頭生垢膩瀝去風

滑石 四兩 川芎 王不留行 白芷 細辛

防風　羌活　獨活各半兩

右爲末先梳髮通細後入藥一五錢於髮內再梳如洗頭法每梳通髮之風屑垢膩自去不患頭風

梳頭藥方○

香白芷　零陵香　王不留行各等分

滑石　防風　荊芥穗　地骨皮

右爲末每用一大錢摻在頭上梳

摩頂膏○出御藥院方 以谷鹿角髮令潤澤洗髮方

小麥麩半升　一兩半　半夏　沉香末半兩　生薑二兩取汁

右用漿水兩鋲入薑二兩和麩細切同煎三兩沸去滓取清汁入龍腦少許攪勻洗髮令潤柔有光

乾洗頭藥方○出同方

香白芷　零陵香　甘松　滑石

右等分爲細末摻於髮內候一二時梳之四味不足

洗頭方

胡餅霜　白蒺藜末　梔子皮末各二兩

右藥合搗令勻以水和丸如彈子大每一丸用灰汁揉洗頭甚妙

乾洗頭白藥散○出御藥院方

香白芷　王不留行各二兩

右爲細末每用乾摻頭髮內良久用篦子篦去垢膩用梳子刮去[illegible]

令髮黑○

用五倍子敷之或炒燥細研或白藥煎皆好

沐髮方○出頭風門

取生柏葉細剉一斗煮取汁沐髮

又方

取香仁烏麻子擣以水投濾取汁沐髮

洗頭光澤訣○

右用猪膽一枚取汁將傾在水中洗頭髮自然光澤訣以乳香

曲淺已日外常將髮上先用凡洪

洗頭明目方出頭部

洗頭吉日

正月七日　二月八日　三月四日　四月五日　五月二日

六月四日　七月七日　八月三日　九月二十日　十月二十三日

十一月二十九日　十二月十四日

洗頭方 令髮香白而不生

以雞蘇燒作灰淋汁洗髮取汁沐之

沐髮方

用無氣木以物於炊飯時入取沐頭令髮長深不能多得則朔望沐之日並好

沐頭長髮方

以烏雞燒灰沐髮令黑

澤頭方

以蘭草葉五月六月採陰乾和油作膏塗髮

洗頭長髮方

取鴈骨燒灰和泔洗頭

沐頭又洗身上瘡疥 出本草

以赤爪實汁洗之

主沐髮長潤 出本草

以麻葉並桐葉搗浸水沐髮則長潤矣

沐髮 出本草

以青葙子生搗十沐髮令黑而長乃胡麻葉也

沐髮長方 出本草

桑胡桃木皮出水取沐頭至黑

主沐頭長髮 出本草

以紫衣燒灰淋取汁沐頭良

畧頭

治鬼舐頭方

用燒猫兒屎以臘月猪脂和傅上

又方 出千金方

用猫兒毛燒灰以膏和傅之

秘寶 出千金方

用煙熏和乳汁傅之日一度

治鬼舐頭

取小兒糞臘月豬脂和傅

普濟方卷之三十一 畢

考證官[illegible]吳[illegible]

[illegible]金子[illegible]

詳校官[illegible]姚[illegible]

[illegible]

[illegible]敬等

[illegible]明等

欽定四庫全書

普濟方卷之三十二目錄

明 周定王朱橚 撰

耳門

耳聾諸疾　風聾　勞聾

暴聾　[illegible]耳聾　久聾

耳虛鳴　耳疼痛　耳腫

耳聤膿　聤耳　耳聾有膿

耳內生瘡　百蟲入耳

耳聾諸疾附論 方[illegible]

磁石散　[illegible]　一[illegible]丸　桑螵蛸湯

礬石膏　[illegible]青丸　三[illegible]散　[illegible]香丸

[illegible]神散　磁石羊腎丸　[illegible]耳聾　治耳聾

菖蒲散　通耳丹　[illegible]丸　[illegible]黃散

磁石丸　黃蠟丸　防風膏　木香丸

菖蒲圓　通神散　松脂膏　地黃散

松蠟膏　菖蒲丸　益腎散　附子散

[illegible]香丸　[illegible]香丸　杏通丸　地黃丸

塞耳筒　治耳聾　燒腎散　明礬黃膏

[illegible]彈丸　蠍半子膏　木通膏　[illegible]香散

安腎丸　[illegible]紗丸　桂心膏　塞耳丸

[illegible]膏　[illegible]甲皂丸　葶藶方　牙硝散

[illegible]砂膏　乾柿餅　附子膏　蝸梢膏

又方　鼠膽丸　治耳聾及通耳

巴豆丸　塞耳[illegible]散　[illegible]麻丸　通耳法

治耳聾[illegible]　菖蒲散　大豆丸

龍骨散　全蝎丸　細辛丸　雞卵方　胡麻油膏

[illegible]散　菖蒲散　川芎湯　治耳聾聤及通耳

治耳聾　又方　[illegible]方　[illegible]散　甘蝎散

杜[illegible]丸　治耳聾方　又方　治耳聾法　豬脂方

治耳聾□方　治大病後耳聾方　治耳聾方　又方二首
治耳聾□去　又方□　□□□　□人方
烏肩方　生□方　□□方　益母草十方
鯽魚膽□　□□根□　□□□　□□□耳聾
又方　□聰方　□□龍□　巴豆方　治耳聾
菖蒲膏　通氣散　□□丸　□□散　附子方
治氣□耳聾□　磁石湯　丹參膏　大黃丸
益智丸　黃耆□□　百靈丸　白龍散　撥耳紙□散
治耳聾□　治勞□耳聾　□□　□靈散　治聤耳中出血
龍腦子丸　□□方　□□□□　治聾
治耳聾　治□□□　□□□□　□耳聾

風聾　論一首　方二十三方
雄黃散　磁石浸酒方　菖蒲湯　山茱萸散
蓯蓉丸　桂星散　黃耆湯　蒼耳酒　杏仁膏
黃耆散　犀角散子　磁石散　魚腦□膏　附子散
天雄散　羊腎□□方　菖蒲散　磁附方　獨活煮散
桂枝方　白鹽方　治風虛耳聾　療耳聾風耳閉並不得聞方

勞聾　論一首　方十五方
補腎石斛丸　肉蓯蓉丸　□菖蒲丸　地黃丸
內補丸　肉蓯蓉丸　補腎磁石湯　龍麻子丸　熟乾地黃散
菖蒲散　又□菖蒲散　塞耳□□散　羊腎附子丸　塞耳□□散
治勞聾□耳

暴聾　論一首　方十八方
菖蒲□□　又方　治□□丸　□□□　治卒耳聾
草□□□　烏□丸　治□□□　又方□方　治暴耳聾
又方　□□方　又方
治卒耳聾及□□耳□□□□□□□□　又方　治□□耳聾

暴熱耳聾　論一首　方□方
犀角散　茯神散　□羊□□　又□□□散　大黃散
磁石散

久聾　論一首　方□□
塞耳磁石丸　塞耳□□□□　□□□□丸　治久□□
磁石丸　麝香丸　□□□□丸　桃人膏
龍腦膏散　天雄□□方　塞耳山茱萸丸
治久聾兩耳　又方　通氣散　治耳久聾
柘根酒　水銀方　麝香膽□　□□方　磁石酒
又方□　□膽□　古□□方　□□方　大□□方
□□神方　治久□耳聾　□□□　□金透□散

耳虛鳴　論一首　方二十□方
□□□丸　保命丸　生地黃汁散　肉蓯蓉丸　芎□散
乾地黃散　地黃丸　□□散　白朮湯　地黃湯
塞耳菖蒲丸　山茱萸丸　麝香丸
治耳鳴□止諸痛　□□湯　□□□　療耳鳴□□
芎鮮散　當□膏　黃耆丸　菖蒲□□　金蝎丸
芎藭膏　巴豆丸　□□下氣丸　巴豆方　磁石酒
菖蒲散　八味丸　治耳中常鳴　生烏頭方　補□丸
磁石散　石斛丸　茯苓丸　補腎□□□湯　桑螵蛸散
補腎虎耳丸

耳疼痛　論一首　方十七方
生犀丸　□□□□　□□散　杏附□□　白龍散
治耳痛　治耳肉痛　又方　白鹽方　百合散
治耳□□□方　塞耳散　木香散　杏人膏
柳根方　治耳卒疼痛

耳腫 論一首 方十二方
木香散 鹽花丸 黃耆丸 三竹散 五倍子方
礬石散 松脂方 治耳卒腫 又方 吉人膏
治耳卒風毒腫起 治耳卒腫
耳聤聹 論一首 方六
葱液膏 豬脂膏 礬石散 黃連散 蚯蚓方
治聤聹耳方
聤耳 論一首 方十一方
通氣散 治聤耳有膿 白斂散 菖蒲散
礬石散 竹蛀散 紅藍散 白礬灰散 如聖散
滑石散 蝎倍散 聤耳方 銀香散 菖蒲散
烏蛇丸 磁石散 又方 立效散 麝香散
治聤耳 治聤耳膿水不止 又方 又麝香散
礬石散 附子散 紅花散 黃連散 塞耳韶粉散
治聤耳方 又方二方 治聤耳有膿出不止 又方二方
香附散 紅綿散 塞耳鯉魚腦方 塞耳黃礬散
塞耳桃仁方 塞耳桂心方 塞耳杏仁方 鉛丹方
又方 車脂膏 治聤耳方 又方三方 生蟲方
又方二方 羊糞方 療聤耳中痛膿血出 治聤耳方
又方七方 治少小聤耳 香礬散 治聤耳
治大小人小兒聤耳熱腫痛有膿 一方
耳聾有膿 論一首 方二十八方
黃耆丸 菖蒲子散 升氣散 磁石丸 醉食散
附子丸 鮮魚腦 附子散 真珠子散 又方
白礬散 治耳熱出汁 治聤耳 鯉魚腦方
胚與散 治聤耳 香附散 礬石散 附龍方
治耳膿 治耳風氣腫 治耳內生瘡 三黃散
礬石散 枯礬白壁散 礬黃散 二聖散 桂膽散
麝香化毒散 紅綿散 立效散 治耳生有膿
竹蛀屑方 治耳內瘡 摻聖散
治耳出膿水不止依時油耳
耳內生瘡 論一首 方十八
苦參散 治凍耳成瘡 麻子膏 香脂膏
曾青散 大黃散 黃連散 杏仁膏 黃丹散
羊糞方 黍粘子湯 治凍耳成瘡 又方二方 一方
治耳月蝕瘡 治耳瘡疼腫
百蟲入耳 論一首 方九十五
立效散 麝香膏 烏頭散 備急散 灌耳散
塞耳黃耆丸 麝香鹽汁方 雄黃熏耳方
黃耆十方 治蚰蜒入耳方 清油膏 硇砂熏耳方
治蟻入耳方 豬脂熊耳方 治百蟲入耳 又方三方
治蚰蜒入耳方 又方 車脂膏 又方
治蚰蜒入耳中 又方 治百蟲入耳 又方一方
治蚰蜒入耳方 又方二方 治百蟲入耳方
治蜘蛛毛蛆咬耳 治諸蟲入耳 治諸蟲及亂蟲入耳
治蚰蜒入耳方 治諸蟲入耳方 治蚰蜒入耳
又方 香油方 又方 治蟻入耳方 又方二方
治百蟲入耳方 又方七方 治蛆蟲入耳方
又方 治百蟲及百蟲入耳方 又方二方 治諸蟲入耳方
治蛾子入耳方 治蚰蜒入耳方 治小蟲蛾入耳耳脫不出者
療百蟲入耳方 又方 治諸蟲蛇入耳方
治惡蟲入耳方 蚯蚓方 追毒膏 治耳內有物
又方 治蚰蜒入耳方 又方二方 治蚊蚋入耳
治飛蛾入耳 諸蟲入耳 又方 治水入耳方

治蚰蜒及百蟲入耳　治百蟲入耳又方二方　蚰蜒入耳方
治百蟲入耳鼻中　治蟲入耳　治白頸蚰蜒并蟻入耳
治馬陸蚰蜒入耳及諸蟲入中　治黃龍耳膏
治百蟲入耳不出

普濟方卷之五十三目錄畢

普濟方卷之五十三

耳門

總論

夫耳屬足少陰之經腎家之寄竅於耳也腎通乎耳所主者精精氣調和腎氣充足則耳聞而聰若勞傷氣血兼受風邪損於腎藏而精脫則耳轉而聾又有氣厥而聾者有挾風而聾者有勞損而聾者蓋十二經脈上絡於耳其陰陽諸經適有交并則臟氣逆而為厥厥氣搏入於耳是為厥聾必有時乎眩暈之證耳者宗脈之所附脈虛而風邪乘之風入於耳之脈使經氣痞而不宣是為風聾必有時乎頭痛之證勞役傷於血氣淫欲耗其精元瘦悴力疲昏昏瞶瞶是為勞聾有能將適得所血氣和平則其聾暫輕其或日就勞傷風邪停滯則為久聾之證矣此又有耳觸風邪與氣相搏其聲嘈嘈眼見光謂之虛鳴熱氣乘虛隨脈入耳聚熱不散膿汁出焉謂之膿耳人耳間有津液輕則不能為害若風熱搏之津液結鞕成核塞耳亦令暴聾謂之耵耳前是數者腎脈可推風則浮而盛熱則洪而實虛則濇而濡風為之疏散熱為之清利虛為之調養邪氣屏退然後以通耳調氣安腎之劑主之於此得耳中三昧耳亦有聾聵耳鳴耳痛耳癢耳內生瘡或為聤耳或為停膿六淫傷之調乎腎七情所感治乎心醫療之法寧心順氣欲其氣順心寧則耳為之聰矣宜用局方妙香散以石菖蒲煎湯調服以順心氣兼用辰砂以寧心君調腎之劑前方所載猶從察是也諸有一方為之佐使兼更閑之可也耳聾論云耳為腎之官五臟閉塞理可詳勿重噫呵欠咽嗽同用微針心為辛熱內塞不聞聲音僕墮虛生雜嘈耳鳴膿血出風熱暑濕襲於外耵聹耳底耳證多端用意消詳不一或實或虛隨證療百蟲入耳別為一方五臟六腑十二經脈有絡於耳者其陰陽經氣有相并時并則有臟氣逆名之為厥厥氣相搏入於耳之脈則令聾其有為卒暴聾者其候頰顴色黑手少陽之脈動而氣厥逆而耳聾者其候耳內渾渾焞焞也手太陽厥而耳聾者其候聾而耳內氣滿養生方云勿塞故井及水瀆令人耳聾目盲

耳聾諸症

註

五臟[illegible]耳是少陰之經 手[illegible]脈所會也 若精氣調和 元氣充盛 則耳

聰[illegible]症不生 或勞傷[illegible] 損於腎臟而[illegible]耳聾[illegible] 精水

而耳聾者[illegible] 脂[illegible]成耵聹 耳塢而耳聾者

[illegible]耳聾者 皆[illegible]通於耳也[illegible]經

[illegible]者其候面色黑[illegible]入於

[illegible]耳中氣[illegible]也[illegible]之

[illegible]耳中[illegible]

[illegible]耳聾[illegible]此說[illegible]也

[illegible]耳聾[illegible]

方

磁石散 出千金方 治耳聾耳

磁石四兩　天門冬　地骨皮　生薑各四兩　山茱萸

[illegible]　牡荊子　茯苓　菖蒲　[illegible]

[illegible]　白芷　[illegible]　川芎　[illegible]

右㕮咀 以水八升 煮取二升 分三服 五日一劑 三

日乃[illegible]耳中[illegible]方

梔子人湯 治腎[illegible] 耳聾不足

梔子人　[illegible]　白朮　人參

乾薑　[illegible]　防風　烏頭

厚朴　[illegible]　山芋　磁石

芍藥　[illegible]　白茯苓　桂

右㕮咀 每服三錢 [illegible]水二盞 煮[illegible]取汁一盞 去[illegible]下

[illegible]大[illegible]至七分 去滓[illegible]服之

肉蓯蓉丸 治[illegible]耳聾

肉蓯蓉　[illegible]　山芋

人參　桂　[illegible]　白茯苓

菖蒲　[illegible]　防風　[illegible]　芍藥

右為細末 煉蜜和丸 如梧桐子大 每服三十丸 [illegible]下

[illegible]湯 治[illegible]耳聾

[illegible]　牡丹皮　白茯苓　菖蒲

桂　牡荊子　[illegible]　附子

菖蒲　[illegible]　大黃

細辛　[illegible]

右㕮咀 每服三錢 已先以水三盞 煮豬腎一隻 取汁一盞 去腎下藥

煎至七分 去滓 食前服

磁石丸 治耳聾

磁石　[illegible]　菖蒲

防風　白芷　細辛

皂莢　巴豆十四枚　附子

右[illegible]三升[illegible]一[illegible]以不中水鵝脂[illegible]九合 煎[illegible]上三下 以[illegible]黃

蠟[illegible]耳中[illegible]之 日三易

黃耆丸 治耳聾

黃耆　梔子人　羚羊角　木通　升麻

人參　[illegible]　木香　乾薑　黃芩

芍藥　[illegible]

右為細末 煉蜜和丸 如梧桐子大 每服三十丸 煎枸杞根

湯下 加至三十丸 食後服

追風散 治耳聾閉塞不通

藜蘆　雄黃　川芎　白芷　石菖蒲

全蠍　藿香　薄荷　[illegible]

丁香　[illegible]

右為細末 吹[illegible]耳中[illegible]

麝香丸 治耳聾 [illegible]塞耳

麝香　杏人　蓖麻子　附子

磁石 木通 𧏡人 巴豆

松脂 菖蒲

右先將磁石木通菖蒲附子為末……研為膏入末同搗一二百杵緜裹如棗核大中心通一孔子以塞耳中一日三換有三日重者七日愈

清神散 治氣壅於上頭目不清耳常重聽

乾菊花 白殭蚕 荊芥穗 羌活

木通 川芎 防風 木香 甘草

石菖蒲

右為末每服三錢食後臨臥茶清調下

磁石羊腎丸 治以虛不足時有重聽或耳內腫疼之狀並皆治之

磁石末 川椒

石菖蒲 防風 白朮 茯苓 北細辛

山藥 川芎 遠志 大川烏 木香

當歸 菟絲子 黃芪 鹿茸

肉桂 熟地黃 石菖蒲

右為末用羊腎兩對去皮膜以酒煮爛研以酒煮羊腎酒攪糊為丸如梧桐子大每服五十丸空心溫酒鹽湯任下仍服清神散羊腎丸二方相間服忌生冷熱物

聤耳 龍骨

以……蚯蚓汁內耳中

治耳聾

斑猫 土狗 石菖蒲 巴豆

川山甲 麝香 蓖麻子

右研細為丸棗核大綿裹塞耳

菖蒲散 治耳聾

石菖蒲 磁石 白芷 牡丹皮 山茱萸

牛膝 土瓜根

右為細末綿裹塞耳日一易之仍服大三五七散住

通耳丹 治耳聾

全蝎 安息香 阿魏 硇砂 大蒜

蓖麻子 巴豆

右為細末入巴豆蓖麻子同研爛為丸如棗核大每服一丸綿裹內耳中如覺微痛即取出

蓖麻丸 治耳聾

蓖麻子 乳香 杏仁 巴豆 松脂

右搗爛如膏加……如……大……挫一大針刺兩三孔子……用……水出即愈

雄黃散 治耳聾

雄黃 防風 菖蒲 大……礬石 烏頭

右為末以……

以藥二錢乜蓋艾上火燒向耳薰之

磁石丸 聤耳 治耳聾

磁石 菖蒲 通草 薰陸香

杏仁 蓖麻子 松脂

右搗篩以蠟及鵝脂和丸稍長作以鐵如棗核子中心為孔先去耳中脫然後內於耳……

又方

黃蠟丸 治耳聾

蠟 松脂 薰陸香 蓖麻 石鹽

亂髮灰

右等分為末作丸綿裹入塞耳時易之

防風……

木香丸 治耳聾

香附子 蒼朮 木賊

川烏 木香

右為細末……

二分一……

每用一錢葱白酒吞下[illegible]服之

菖蒲湯 治耳聾[illegible]

木通 菖蒲 磁石

防風 桂 羌活

右㕮咀如麻豆以[illegible]七日[illegible]三日[illegible]空腹服三兩[illegible]

度為度一方無羌活

通神散 治耳聾

全蝎 土狗 地龍 雄黃 麝香

明礬

右研細以白引藥入耳門[illegible]面壁坐一時三日一次

松脂膏 療耳聾不聞人語聲方

松脂 巴豆 麻子人 蠟 薰陸香

石鹽

右搗如膏丸棗核大內耳三日一易取瘥一方無蠟

地黃散 治耳聾

巴豆 杏人 生地黃 鹽

[illegible]

右治下篩以綿裹[illegible]耳中一日[illegible]

耳中黃水及膿出[illegible]不瘥者更為一日一夜八度一方[illegible]

膏為丸以綿裹塞耳中名地黃丸

松脂膏 治耳聾

松脂 杏人 巴豆 椒目末 葱汁

右搗爛如膏和如棗核大綿裹塞耳中

菖蒲丸 [illegible]

菖蒲 蜀椒

羊腎 皂莢

右為末煉蜜丸如桐子大每服二十丸空心溫酒下日三服

此藥臨睡時先服[illegible]

小兒安耳內[illegible]

磨塗耳下[illegible]

益腎散 治腎虛耳聾

磁石 巴戟 大川椒

沉香 石菖蒲

右為細末每服二錢用豬腎一隻[illegible]

[illegible]

附子散 治耳聾[illegible]

附子 磁石 菖蒲

右為散[illegible]塞耳中

羌活丸 治耳聾塞耳

羌活 玄參 木通 烏頭 防風

右為末[illegible]塞耳中日三次

椒目丸 療耳聾

木香丸

磁石 石菖蒲 麝香 [illegible]

木通 麝香

右為細末用葱白汁煮糊為丸如梧桐子大每服三十丸至四十丸煎通草湯送下食前

地黃丸 治耳聾塞耳

治耳聾[illegible]

椒目 巴豆 菖蒲 松脂

右為末[illegible]作筒子塞耳內一日一易神效一方用川椒

以蠟為丸如棗核大塞耳中一方無松脂

治耳聾

一豆三箇不出油 麝香少許用真[illegible]

煉蜜為丸麥粒大 綿裹[illegible]子耳中

[illegible]腎散 治耳聾

磁石 附子 巴戟 川椒

右為末每服[illegible]

錢[illegible]

用[illegible]送下十日大効

明礬黃膏 出聖惠 治耳聾
明礬黃 桂心 乾地黃 巴豆
右為細末 以白蠟熬入蜜少許和 以綿裹入耳
蟲蟬丸 治腎虛耳聾
白茯苓 蟲螢 山藥 杏人
右為末 鍊蜜和丸如彈子大 含一丸 温酒下 不拘時候 一方
蝸牛子膏 治耳聾
蝸牛子 石膽 鐘乳 龍腦
右將龍腦同研為細末 一處 以瓷器盛之 令蓋 取出研 入龍腦少許 每用 調筆一 入耳中 不痊
木通膏 出聖惠 治耳聾
木通 燈心 細辛 龍腦 鵝毛 甘草
右相和 研 每用 以生油調 入耳中 使用綿子塞耳 且側臥良久 如此三度
麝香散 治耳聾吸鼻
麝香 細辛 乾薑 黃連
右為散 患左耳吸入右鼻 患右耳吸入左鼻 不拘時
安腎丸 治虛弱耳聾
大安腎丸 磁石 石菖蒲 羌活
右為末 混合為丸 梧桐大 每服四五十丸 鹽湯溫酒任下
硇砂丸 治耳聾
硇砂 信 巴豆 蝎娘子
右為細末 為丸如粟米大 用新綿裹一丸 塞入耳內 一丸可治
仍忌食日吉之
桂心膏 出聖惠 治耳聾
桂心 野葛 成煎豬肪
右吹咀 於銅器中 微火煎 三上三下 去滓 以葦筒盛 如棗核大
又 以綿裹 塞耳 日三四 十日 耳中出 大如指 長一寸
又 不過三十日 以差 莫使風 五日乃出之 千金
又 云治二十年耳聾

塞耳丸 治耳聾 耳痛 耳鳴
石菖蒲 巴豆 全蝎
右為細末 以蠟和為丸 如棗核 綿裹內耳中
乾棗膏 治耳聾
乾棗 松脂 巴豆
右同搗 棗塞耳中 以痊為度
麝香豆丸 治耳聾
麝香 巴豆 石菖蒲
右先研 去皮研 以蜜和丸 如梧桐子大 用綿子 塞耳中 二十粒
芥子塞方 治耳中常有聲 塞耳
芥子
牙硝散 治耳聾塞耳
馬牙硝 龍腦 杏人
右為散 入黃蠟二錢 溶和 綿裹一棗核大 塞耳中
鯽魚膽膏 治耳聾
鯽魚膽 烏驢脂 生油
右和勻 納樓蔥管中 七日 滴於耳內
乾柿飲 治耳聾
乾柿 粳米 豉
右以乾柿空心食之
附子 治耳聾
附子
右搗碎 以綿裹塞耳中
鵝脂膏 治耳聾
鵝脂 巴豆
右末研 二味 研 成膏 以綿裹 塞耳中 入蜜 一粒 在內
如小棗 取孔 以筆
以時置在耳中 取出 以蓮為度
又方 治耳聾

右□□□末□□研生研細入聾耳孔別用針砂末入不聾耳孔自然通青鈍後須出

鯽卵丸 治老年近日耳聾不聞人聲

曾青 [illegible] 龍腦 [illegible] 消石 [illegible]

右為細末用一字吹入耳內 [illegible] 入耳內 [illegible] 用綿子塞 [illegible] 大

治耳聾 [illegible]

藜蘆 [illegible] 巴豆 [illegible]

右同研令 [illegible] 綿裹塞耳中三日一 [illegible]

巴豆丸 治耳聾耳鳴塞不聞音聲者 [illegible]

右為末丸如棗核大綿裹以箸頭著耳中日一易 [illegible] 之以汗出乃愈一方生用松脂

塞耳硫黃散 [illegible]

硫黃 雌黃各等分

右為細末綿裹內耳中數日聞人語聲

蓖麻丸 治耳聾不聞音聲者

蓖麻子 [illegible] 熟棗七枚

右同搗丸如棗子大更入小兒乳汁和 [illegible] 綿裹內耳內覺熱為度一日一易如 [illegible] 一方不用乳汁

通耳法 治耳聾

磁石 [illegible] 穿山甲 [illegible]

右用新綿裹了塞所患耳內口中銜少生鐵 [illegible] 覺耳內如風雨聲

[illegible]

治耳聾

石菖蒲 [illegible] 合歡 [illegible]

右 [illegible]

於 [illegible] 三兩特取出焙乾為細末每服二錢 [illegible] 下

日進三服 [illegible] 大 [illegible] 中時時 [illegible]

[illegible]

菖蒲散 治耳中 [illegible]

川椒 [illegible]

右為末以綿裹半錢塞耳中日五易之一方 [illegible]

大豆酒 治耳聾

大豆 [illegible]

右先炒大豆 [illegible] 投入酒 [illegible] 五升 [illegible] 八 [illegible]

大豆取 [illegible]

龍骨散 治聾 [illegible]

龍骨 [illegible] 杏人 [illegible]

右每日 [illegible] 杏人許入耳中 [illegible]

食鹽丸 治耳聾塞耳

食鹽 杏人 [illegible]

右 [illegible] 如棗核大塞耳中 [illegible] 乾即易之至七日二七日耳中有聲漸入 [illegible] 以 [illegible] 中四時以麵封之 [illegible] 出以薄 [illegible] 餅子裹 [illegible] 上以艾灸三壯耳內即有 [illegible]

以杏人分作三分各以綿裹 [illegible] 如小豆大以 [illegible] 上

[illegible] 取一粒 [illegible] 耳中日再

椒目丸 治耳聾塞耳

椒目 [illegible] 巴豆 [illegible]

右同研勻入 [illegible] 丸如棗核綿裹 [illegible] 在 [illegible] 耳內

鵝脂方 治耳聾滴耳

新鵝脂一枚 巴豆 [illegible]

右先以 [illegible] 上 [illegible] 巴豆 [illegible] 中 [illegible] 兩 [illegible]

為 [illegible] 其餘 [illegible] 出為度 [illegible] 耳內日三兩次五七日瘥

萆麻油 [illegible] 治耳聾 [illegible] 耳

萆麻油一合 [illegible]

右 [illegible] 三五 [illegible] 綿 [illegible] 耳中以瘥為度

[illegible] 飲 治 [illegible] 耳聾

鹿 [illegible]

右切……以十入棗子二合如……入立味之……和空煎食之作

羹又同食之

菖蒲散 療耳聾耳痛不聞

菖蒲二兩 附子二兩

右搗篩以苦酒和丸如棗核大綿裹卧即塞耳中夜一易之十日有

黄水出差一方用麻油……耳一蒜……末每一錢綿裹塞兩耳中

則……治耳聾不聞

小……烏頭……

右為末每服二三……日……

三服立効

治耳聾又……

人中白 地龍

右為末取……一合和調以……合塞之……許在耳中立差

治耳聾

右蒼朮一塊長七分將一頭削尖一頭截平將尖頭插入耳內於平

頭上安艾灸之輕者灸七壯重者灸一十四壯覺耳內

有熱氣者効

又方

用……[illegible]……塞之以……耳中一方生用鯉魚膽……

包入耳中一方用鯉魚膽滴耳中差

又方燒鐵令赤投酒中飲之仍以磁石塞耳中日一易夜去之至旦

別著

又方用芥子搗碎以男兒乳和綿裹內之

又方取柴胡苗汁滴耳中再度差

又方

作一坑可容二升許著炭火其中坑似壺形以磚覆口上作一孔子

容小指搗孔上著……黄一……以……盆……之以……下勿……令……上

餅一小孔可容……其孔上有三重布以耳孔當……上……又……去

苦水……之不過二三……神効

又方

搗取作餅……耳……以……一頭……大……耳中以……餅

於……餅上……以艾……灸之……三壯

又方

作……子……如……耳上……當耳孔上

以……作一……孔……上以艾灸之……耳中……不

可……即上……苦水出即差……乾……易之

又方

截箭簳二寸內耳中以麪擁四畔勿令泄氣灸筒上七壯

又方

口……耳草一枚耳中……二……用……立通

驅宣方 治耳聾

用皂角不蛀者去皮弦子……於……水中……成……

分……之口中……兩……出

透……散 治耳聾

用全蝎一箇去毒……生薄荷葉……上……為末……末入在

開……內……以……薄荷……一宿……聾……當……

入所……耳中

全蝎散 治耳聾……塞……

用全蝎四十九箇去……以……米……於大……

蝎……米上焙令米黄……去米不用……四十九

片……焙……去……不用……為細末三

三五日……服……服……

……服時……人……

勿令人……人……不……

湯一碗令飲耳中鳴……耳中聞百十……自此

聞聲一方……

雄黄酒 治耳聾

用……七日……三日……

飲之……耳聾……差

治耳聾方

用蠟紙一張剪為小片每一片於筯上卷捲抽却筯以蠟
紙作筒子安耳中以火炷之待火欲至耳邊剪去當有惡物出在
紙上日一易之[illegible]了以蠟塞定
又方
用鐵杵口內含之[illegible]耳左右以磁石[illegible]枕之同[illegible]
氣通則止
又方
以綿裹鐵砂入耳中口含磁石立瘥
又方
以生猪取脂用綿裹入耳
治耳聾法
用甘遂各半寸綿裹兩枚內兩耳中以甘草口中嚼之
聖惠
雞脂方 出聖惠 治耳聾耳鳴
用雞脂和生薑汁搗綿裹塞耳數次能聽一方有椒

普濟方卷五十四 十七

用生薑有人耳痒一日一作可畏重挑則出血稍愈此乃
腎臟虛致浮毒上攻未易以常法治也宜服透冰丹勿飲
酒啖濕麵雞豬之屬能盡一月為佳不能亦無效
治耳聾方
用烏頭燒為末吹入耳中數日瘥
治大病後耳聾方
用生薑[illegible]擣汁滴耳即効
治耳聾方
用骨碎補削作細條火炮乘熱塞耳良
又方
取烏蛇膏以綿裹內耳中神効
又方
以蚯蚓和生韭研一處塞耳
治耳[illegible]去
以[illegible]取石膏一塊上[illegible]子大[illegible]磁石[illegible]石膏

如[illegible]以[illegible]之後火燒盡[illegible]二合[illegible]灰火中燒熱去
[illegible]入[illegible]子[illegible]於耳中自然[illegible]
如此二次又[illegible]三次生
又方 治耳聾十年[illegible]不瘥
服天門冬百日瘥
又方 治耳聾十年不瘥
取[illegible]少許以蔥葉[illegible]入耳中
附子方 治耳聾塞耳良
用附子以醋[illegible]如[illegible]塞耳中一方治耳聾
以[illegible]上二七壯令氣通耳中即瘥
真珠粉方 出聖惠 治耳聾塞耳
用真珠末一分研入粉以綿裹一錢匕塞耳中
[illegible]人方 出聖惠 治耳聾塞耳
用[illegible]人湯[illegible]半分[illegible]以綿裹塞耳
中一方治聤耳有膿血用[illegible]塞耳中三日三易以
瘥為度

普濟方卷五十四 十七

雀膏方 出聖惠 治耳聾塞耳
用雀膏一合每用少許滴耳中立瘥
生油方 出聖惠 治耳聾塞耳
用生油一合滴入耳中日三五次候其塞出即瘥一方治聤耳以油
納魚膽內隔宿取出滴耳中立瘥
蟹汁方 出聖惠 治耳聾滴耳
用蟹一枚搗絞取汁以少許滴耳中
龜尿方 出聖惠 治耳聾滴耳
用龜一枚安於合中[illegible]上[illegible]取尿滴耳中一方
用桑[illegible]以[illegible]中[illegible]之於[illegible]以鏡[illegible]中影
[illegible]物[illegible]取用之又一法以[illegible]火上[illegible]以點
其[illegible]尿
益母草方 [illegible] 治耳聾[illegible]耳
用益母草一握先手研取汁少[illegible]耳中瘥

鯽魚膽方 治耳聾癢耳

用鯽魚膽一合以竹筒子盛之入耳中

黃蔥根方 治耳聾耳

用黃蔥根塞耳

鵝脂方 治耳聾痛不止

以鵝脂塞耳中

救急療耳聾

又方 療耳聾

耳中塞或痒取瘥可入耳中

鼠膽方 出外臺 治耳聾

用鼠膽二枚取汁滴入耳中三次立効又老人云側臥一膽盡

更膽汁從下邊出初出益聾半日須乃差治三十年老聾一方

用膽塞耳中取自出

乾地龍方 治耳聾立効

以乾地龍入鹽貯在蔥葉內為水點之一方

塞耳中三五日即瘥一方用白頸者

水滴耳中

巴豆方 出聖濟 治耳聾

巴豆十四枚搗爛和取如小豆綿裹內耳中瘥

日一易及三十年聾

治耳聾

用石菖蒲根節分調

黃耆湯 治五聾鳴閙不聞人聲出黃

黃耆 附子 磁石

菖蒲 木通 白茯苓

五味子 熟乾地黃 玄參 人參

右剉如麻豆每服五錢匕以水一盞半生薑半分同煎大棗二枚擘

破同煎至一盞去滓溫服不拘時候

通氣散 治耳聾氣閉不通

茴香 木香 全蝎 陳皮 玄胡

川芎 羌活 殭蠶 川芎 蟬蛻

菖蒲 甘草

右為細末每服二錢溫酒調下

燒腎丸

蠶蛻散 治耳聾

附子方 治耳聾

用生附子尖一枚削作棗核大以綿裹置耳內

治氣閉耳聾

用松加石菖蒲大

磁石湯 治耳聾及風氣

磁石 石上菖蒲 防風 山茱萸

白朮 獨活 芍藥 薯蕷 甘草

附子 桂心 生薑 杏仁

茯神 人參 蔓荊子 白芷

石膏

右切以水一斗四升煮取三升去滓分三服日向暮服之

丹參膏 治耳聾痛

丹參 蜀椒 大黃 白朮 細辛

芎藭 大附子 乾薑 巴豆 桂心

右以豬脂三斤三上三下

耳聾者綿裹

以

大黃丸

大黃 朴硝 升麻

黃連

右為末丸如梧桐子大每服三十丸空心溫水下

益智丸 治精竭耳聾
益智　故紙　防風　黃連
人參　菖蒲　茯苓
右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心溫酒下
黃耆散 治耳內塞如有物
黃耆　升麻　大黃　芍藥　細辛
右為末以生麻油五合調勻量大小二合綿裹以瓷合盛
用少許滴耳中日三
百靈丸 治耳聾
芫花　蓖麻子　地龍　杏仁
右為末以醋和為丸如梧桐子大空心鹽湯下五丸
白龍散 耳者宗脈之所聚腎氣之所通小兒腎脈有熱氣
上衝於耳中以結聚則生膿有出水入耳內水亦停積
氣聚結攻搏令耳膿汁出謂之聤耳久而不瘥則變成聾
白礬　黃丹　麝香　龍骨
右研極細以綿裹子點藥耳中膿出用藥一字分摻兩耳內日二
次勿令風入
摻耳抵聖散 治耳聾
瓜蒂　麝香　地龍　地丁
右為散每以少許摻耳內
治耳疾
蓖麻子　巴豆　蓖麻子
右同炒令烟黃然去巴豆只用蓖麻子為末麝香少許每用
少許鵝毛管吹入耳中側臥良久黃水出便效
治摻藥耳中出膿
用頭髮入罐子鹽泥固濟火煅過為細末以所摻耳中兩灰
須定以軟綿塞定
聖散 治耳聾
用皮石灰子如紙裹者搗研細散每服一錢冷水調下
治諸耳中出血
用龍骨為末吹入耳中立愈以丸出血皆
可吹入
蓖麻子丸 治耳聾
蓖麻仁　杏仁　菖蒲　桃仁
石鹽　巴豆　磁石
松脂　蔓荊子　黃蠟
右先搗石令極細入松脂合數十杵令可丸即丸如棗核大
綿裹塞耳一日四五度出之如於不過三四日易之
通草方
葛根　巴豆
右件研分為七丸每服一丸以即綿裹塞耳中一方入麝香少許使易
之十日立愈黃汁立瘥一方用蠟一分為丸子以綿裹塞耳
日一易之
鴉膏 治耳聾
取鵝膏滴耳中
治聾
以承狗膽青滴耳中令左右耳徹
治耳聾
以杏仁七枚去皮拍碎為三分以綿裹於中着鹽如小豆
許以器盛於飯甑中蒸之候飯熟出一裹令患人
側臥和綿捻一裹以油汁滴入耳中又以一裹依前
法
治耳聾
以蠟豬脂生耳中
治耳聾
以附子醋浸削入小指大內耳中
導引法
坐地交叉兩腳以兩手從曲腳中入低頭叉項上治久寒不
自溫耳不聞聲之云頭頂上不息十二通必愈大寒不
覺又頭患耳聾目眩

風聾

治

夫風聾者本以足少陰之經腎之所養其氣通於耳其經脉虛風邪乘之風入於耳之脉使經氣否塞不宣故爲風聾耳內作鳴氣脉行於頭

是以聾而頭痛故謂之風聾

方

雄黃散 治風聾

雄黃 硃砂 丁香 桂 乾蝎

烏蛇 硫黃 天麻 人參 山子

天南星 白附子 麝香 檳榔 木香

麝黃

右爲散再研令勻每服二錢匕溫酒調服

磁石浸酒方 治風邪之氣入於耳中又耳不聞聲[illegible]

宣利使人耳中壯[illegible]或作旋運

磁石 山茱萸 木通 防風

薯蕷 菖蒲 遠志 天雄

蔓荊子 甘菊花 茯苓 細辛 肉桂

熟乾地黃 乾薑 白茯苓

右細剉拌和用生絹袋盛以酒二斗浸經七日後每日任性飲之以瘥爲度

菖蒲湯 出聖惠 治風聾

木通 當歸 白朮 菖蒲

當歸 山芋 甘草 附子

桂去皮 杏人 茯神 人參三兩

前胡 石膏 磁石

右剉如麻豆每服三錢匕以水一盞半入生薑[illegible]

葱白一寸同煎至七分去滓溫服

山茱萸散 治風虛耳聾頭腦旋悶四肢不利

山茱萸 薯蕷 菖蒲 甘菊花

木通 防風 白茯苓 天雄

牛膝 [illegible] 甘草 [illegible]

生乾地黃 蔓荊子

右件藥每服五錢水一大盞入生薑半分煎至五分去滓食前溫服

蓯蓉丸 治腎虛耳聾[illegible]

腰脊強直耳聾虛鳴

肉蓯蓉 磁石 鹿茸

山茱萸 石斛 石菖蒲 巴戟

杜仲 附子 兔絲子

熟乾地黃 菖蒲 天麻 蛇牀

右爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服空心鹽湯下

三十丸

桂星散 治風虛耳聾

辣桂 川芎 當歸 細辛 石菖蒲

木通 木香 白蒺藜 麻黃 甘草

天南星 白芷梢

右剉散每三錢水盞半蔥白二莖紫蘇五葉薑五片食後煎服

食服以加全蝎服則風易去可用

黃芪湯 治風聾[illegible]如風雨鍾聲或時出清水或出膿汁

生薑

蒼耳酒 治腎間風熱[illegible]耳聾及皆中[illegible]

蒼耳 防風 獨活 木通

生地黃 人參 薏苡人 [illegible]

白茯苓

右細剉以酒一斗浸七日空心飲之初一盞日再漸加至二三盞

杏人膏 治風聾久不瘥者

杏人 蓖麻子 巴豆

食鹽 附子 桃人

松脂 木通 磁石 蠟

菖蒲

右除別研外搗羅為末後入諸藥同和搗勻如棗核大綿裹

耳中日四五度

黄耆散 治風虛耳聾

黄耆　當歸　桂心　杏人

白朮　石菖蒲　蔓荊子　白蒺藜

白芍藥

右爲散每服五錢以水一大盞內羊腎一隻去脂膜切入生薑

分同煎至六分去滓空心溫服

犀角飲子 治風熱上壅耳內聾閉腫痛膿血流出

犀角　菖蒲　木通　玄參　赤芍藥

赤小豆　甘菊花　甘草

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去滓溫服不拘時候

磁石散 治風虛耳聾無聞

魚腦膏 治風聾耳久及耳鳴

生鯉魚腦　當歸　細辛　白芷　附子

菖蒲

右除魚腦搗羅爲末以魚腦置銀器中入藥在內微火上煎候香

去滓入麝香合中候凝如棗核大綿裹塞耳中一方無菖蒲有羊腎

脂同魚腦先熬後下諸藥

附子散 治風虛耳聾頭腦旋悶四肢不利

附子　桂心　五味子　木香　杏人

白蒺藜

右爲散每服二錢空心以溫酒調服夜臥臨時再服

天雄散 治風聾頭目痛

細辛　山茱萸　乾薑　天雄　山茱萸

右搗爲散每服一錢匕空心溫酒調下日二服

羊腎羹方 治風虛耳聾

黃耆　羊腎　杜仲　磁石

肉蓯蓉

右以水三大盞先煮磁石取汁二大盞去磁石下黃耆等又煎取

一盞半去滓入羊腎米一合鹽醋一如作羹法空心服

之磁石重墜用之無妨

菖蒲散 治風聾積久及耳鳴

鵝附方 治耳風聾耳內鳴常不得聞

獨活羹散 治風聾

用獨活去蘆頭一兩地黃爲散每服二錢匕以水酒各半盞煎至七

分去滓空心服以鹿腎用水煮今和以布裹之

治耳卒得風覺耳中洪洪聾

活鼠方

削栝樓根令可入耳以臘月豬脂煎三沸出塞耳每用三七日即愈

一方用驢鬐膏不用豬脂

白鹽方 治卒得風虛覺耳中恍恍者

急取鹽五升甑上蒸熱以耳枕之冷即換之一方用軟布裹

鹽之以青布裹鹽亦可

治風虛耳聾

取楮木白皮及東行根白皮煮汁釀酒服

療耳聾風不聞急不得聞方

取八角附子一枚醋漬之三宿令潤微刺一頭內耳中炙上十四壯

令氣通耳中即瘥

勞聾耳

論

夫勞聾者腎氣虛勞所致也足少陰腎經宗脈之所聚其氣通於耳腎氣

虛弱宗脈枯憊則氣之所通受得耿耿而不聰故有勞聾因勞則甚是

當節嗜欲慎起居而無勞聾矣

方

補腎石斛丸 治勞聾及耳中聵聵

石斛　附子　肉蓯蓉　山茱萸

菟絲子　桂　萆薢　當歸

蛇床子　巴豆　白茯苓　乾薑

熟乾地黃　芎藭　細辛

遠志　黃耆　防風

右除菟絲子外爲末再入菟絲子末煉蜜丸如梧桐子大每服

十五丸温酒下日三

肉蓯蓉丸 治勞聾腎虚損腰脚無力面黒[illegible]小便[illegible]數

肉蓯蓉 [illegible] 附子 一兩

磁石 [illegible] 巴戟 一兩 鹿茸 [illegible]

兎絲子 [illegible] 石斛 [illegible] 遠志 [illegible] 山茱萸 [illegible]

杜仲 [illegible] 蛇床子 [illegible] 熟乾地黄 一兩

右爲末鍊蜜爲丸如梧桐子大每服五十丸空心以温酒下

三十丸晩食前再服

薯蕷丸 治腎氣虚損耳聾 又主腎氣不足耳鳴腰痛脚弱無力

薯蕷 一兩 熟乾地黄 一兩 附子 [illegible] 桂心 一兩

天門冬 [illegible] 石斛 [illegible] 人參 一兩 [illegible]

肉蓯蓉 [illegible] 鹿茸 [illegible] 白茯苓 一分

鍾乳粉 二兩 兎絲子 [illegible] 磁石 [illegible]

右爲末入研了藥令匀鍊蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每日空

心以温酒下三十丸晩食前再服

地黄丸 治勞損耳聾

大熟地黄 當歸 川芎 辣桂 大川椒

兎絲子 [illegible] 獨活 [illegible] 白蒺藜 [illegible] 羌活 [illegible]

杜仲 [illegible] 白芷 石菖蒲 [illegible] 磁石 [illegible]

右爲細末鍊蜜爲丸如梧桐子大每服五十丸以葱白温酒空

心呑下晩食前又服

肉蓯丸 治腎虚勞聾

熟乾地黄 附子 [illegible] 桂 [illegible] 肉蓯蓉 [illegible]

兎絲子 [illegible] 人參 [illegible] 山芋 [illegible] 菟明 [illegible]

黄耆 [illegible] 遠志 [illegible] 甘草 [illegible] 白茯苓 [illegible]

[illegible]

右爲細末[illegible]丸如梧桐子大空心温酒

下二十丸

肉蓯蓉丸 [illegible] 人耳[illegible]

補腎磁石丸 治勞聾耳中暗暗[illegible]

磁石 [illegible] 山茱萸 [illegible] 菖蒲 [illegible]

杜仲子 茯神 [illegible] 白芷 [illegible]

[illegible] 陳橘皮 [illegible] 天門冬 [illegible]

地骨皮 [illegible]

右爲[illegible]每服[illegible]入生薑[illegible]同煎[illegible]去滓温服

[illegible]

鹿茸丸 治勞聾[illegible]

熟乾地黄 [illegible] 治勞聾[illegible]

[illegible] 一兩 磁石 [illegible]

人參 [illegible] 附子 [illegible] 黄耆 [illegible]

[illegible] 白茯苓 一兩 牡蠣 [illegible]

右爲[illegible]每服[illegible]入[illegible]

分兩[illegible]去滓食前服

[illegible] 治勞聾[illegible]

菖蒲 [illegible] 山茱萸 [illegible] 土瓜根 [illegible] 牡丹皮 [illegible] 牛膝 [illegible]

附子 [illegible] 磁石 [illegible]

右爲末[illegible]服[illegible]

又方 [illegible] 治勞聾[illegible]

菖蒲 [illegible] 菟絲子 [illegible] 附子 [illegible] 山茱萸

桂心 [illegible]

右爲散每服[illegible]温酒調下[illegible]

[illegible]治勞聾[illegible]

附子 [illegible] 磁石 [illegible]

菟絲子 [illegible]

右爲細末[illegible]

[illegible] 遠志 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 治勞聾[illegible]

治勞聾方

以棗子大綿裹入耳中日一易

夫卒耳聾者由腎氣虛而風邪乘之入於耳正

氣與邪氣相搏故令耳卒聾也

方

蒼黃膏 治卒耳聾

細辛 菖蒲 杏人 麵皮

右細搗為丸如棗核大綿裹納耳中日一易小差二

日一易夜去旦塞之一方有菖蒲無麵不用猪脂亦可

又方

龍腦 一錢 硝石 一錢 蓖麻 [illegible] 巴豆 [illegible]

右藥并蓖麻同研內入蓖麻子中搗定勿令泄氣以紙上蒸

一次搗取汁滴入耳中

菖蒲丸 治卒聾不聞香臭

石菖蒲 巴豆人 附子

右等分為末蓖麻為丸如棗子大綿裹塞耳中日二次

通耳 治耳鳴暴聾

治卒耳聾

龍腦 敲目 杏人 一分

右研令勻綿裹如棗核大塞耳中日二易之

筆連丹 治大飢胃虛及風熱使耳暴聾或耳塞閉氣

閉氣之復塞令人頂悶

烏頭 [illegible]

右為末餅盛學坐水中浸火煮令烏頭透取出細切研為末

煮麵糊丸如梧桐子大每服十五丸空心溫酒下

菖蒲丸 治耳卒聾及聾久不聞

治耳暴聾

雄黃 [illegible] 巴豆 [illegible]

右為末同菖蒲和作一錠子綿裹塞耳中

又方

巴豆 [illegible] 斑猫 [illegible]

又方

右同研令勻綿裹塞耳中立效

又方

細辛 [illegible]

右以鵝脂和研如棗核大綿裹塞耳中以差為度亦佳

治卒耳聾

用菖蒲不拘多少和茯苓末炙下

又方

用巴豆一粒蠟裹以針刺令內透塞耳中耳內即聽

結署末大入之一方不用結署

麝香方 治耳卒聾

又方

以鳧雀葉搗汁自然汁灌耳內

又方

以醋浸蛇皮淹脂良

治卒聾耳內作風水聲鈴聲

穿山甲 [illegible] 蠍梢 [illegible] 麝香 少許

末以蠟丸入耳內一塊綿裹內耳內

又方

治暴耳聾

右用雞心擣一筒以刀子從脚剜取一眼子如錢眼大實以麝香坐一孔所

患耳內從上以艾炷灸之不過三二次効

暴熱耳聾

論

夫耳者腎之候也若腎氣實則生熱熱則上衝塞耳聾

若腎氣虛邪氣乘之又入於耳脈則令四肢不利急腹脅拘急切痛

志不安耳無所聞也

方

犀角散 治風毒攻[illegible]耳聾心中煩悶[illegible]

甘草 甘菊花 [illegible] 前胡

麥門冬 [illegible] 人參 大青 生地黄

甘草

右為散每服五錢水一中盞煎至五分去滓食後温服

茯神散 治上焦熱耳中[illegible]閉不利宜服

茯神 [illegible] 羚羊角 防風

石菖蒲 [illegible]

甘草

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至五分去滓食後温服

羚羊角散 治耳聾不聞言語[illegible]

羚羊角屑 玄參 木通 桑根白皮

[illegible] 菊花 石菖蒲 蔓荊子

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至五分去滓食後温服

又方[illegible]散 治腎臟虚[illegible]風壅耳聾[illegible]

羚羊角屑 防風 黄耆 玄參

[illegible] 甘草

右件為散每服四錢以水一中盞入生地黄一兩竹葉二七片同煎至六分去滓食後服

大黄丸 治風熱毒氣攻耳聾由腎氣虚所致

川大黄 枳殼 川升麻 磁石

黄連 生乾地黄 玄參

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服食後以温水下二十丸以利為度

磁石散 治腎虚[illegible]氣閉[illegible]此方

磁石 木通 防風

菊花 生乾地黄

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓空腹温服

又方

夫久聾者[illegible]腎[illegible]不[illegible]故也[illegible]其氣[illegible]不[illegible]

[illegible]

磁石丸 治久聾方

磁石 菖蒲

食鹽 松脂 木通

巴豆 乾地黄 杏人

右先搗末[illegible]同研[illegible]百杵可丸即丸如棗核大綿裹塞耳中日一易

塞耳木通丸 治久聾不瘥

木通 菖蒲 磁石

杏人 巴豆 鹽

附子 薰陸香

右除研外搗羅為末次將諸藥入鉢內同研可丸即丸如棗核大綿裹塞耳中日一易

蓖麻子丸 治久聾方

蓖麻子 遠志 乳香

[illegible] 金[illegible] 磁石 皂角

右為細末入蠟搗為丸入耳中

治久聾[illegible]方

松脂 食鹽 巴豆 蓖麻子 薰陸香

杏人 磁石

右為末以猪脂一兩[illegible]一兩先於銚子中鎔令鎔後下諸藥攪令勻稔如棗核大中心通孔如末粒許以薄綿裹內耳中三日一易

磁石丸 治[illegible]多時不瘥塞耳

磁石 菖蒲 木通 薰陸香 杏人

松脂

右為末用黄蠟和丸如棗子大長半寸可入耳門以細針子穿透

塞耳中

楓香丸 治耳聾二十年不瘥者

楓香　松脂　石鹽

安息香　杏人　巴豆

右搗楓香巴豆了松脂又搗次纔碎下乏搗令相和後丁香桂蜜胡

桃人熟搗 丸如棗核大 以綿裹 日三易 內耳中 有汁出盡

即愈 一方有大麻油無胡桃人

塞耳蠟丸 治耳聾

柏松　松脂　巴豆

右細蜜丸如棗核大 以綿裹 更塞耳中 有汁出即以紙去別著新綿

更塞耳 如此風差為度

胡人塞耳 治耳聾

松脂　杏人

桃人　巴豆

右研如膏 如棗核中穿一孔 以綿裹塞耳中 一日一易

鐵香散 治耳聾久不瘥

楚紙　烏賊魚骨　斗膝脂　麝香

右搗研為散 滿塞耳中不動 復自落 未瘥再用

天雄鷄子方 治三十年耳聾久不瘥

天雄　鷄子　附子

右搗末 取鷄子開一孔 取黃和藥 卻內鷄子中 封合其頭 更令鷄抱

之 候成 以綿裹塞耳中 取瘥為度

塞耳山茱萸丸 治久聾

山茱萸　乾薑　巴豆

右先搗前二味為末 入巴豆同研令勻 取蔥汁和丸如棗核大 綿裹

塞耳中 食頃乾即易新藥塞 氣五日當小 日聞人聲 瘥即

止 常以塞耳孔 避風 一方用吳茱萸

治久聾耳閉

鼠膽　青鹽　蚯蚓

右以鼠膽 青鹽 以綿裹 於耳中 塞耳孔

即差

又方

烏頭丸 治耳聾

右搗和於內鐵缺 丸如麻子大 用安耳中一宿

至來日看之 有物下來在耳門中 即取卻 再用一兩度即瘥

通氣散 治久聾 鼓崇不動

穿山甲　螻蛄　麝香

右 入耳中 少許 盛 放耳中仍

以耳聾卻返

治耳久聾

芫青　巴豆　蓖麻子

右細研以棗二兩 文武火 日 即不堪用 可為三丸

以綿裹塞耳 一綫 在外 中 出 便可聞聲 用

之令為妙

鉛根 治耳聾 出 二十年不瘥

鉛根　菖蒲　磁鐵

右合石五斗 石 如常 一月封頭開清

用磁石三斤 酒中浸二宿 取小斛

耳聞人語方止

水銀丸 治聾滴耳

水銀一分

右 內以一 去火頭入水銀 即 令傾

出候 化為水 即取滴耳中 立愈

楓香脂丸 治耳久聾

三膽方 治耳久聾

鯉膽　鼠膽

右和 滴入耳中 日一兩度 瘥

磁石酒 治三十年久聾

用磁鐵三十斤 以水七斗 入麴 如常造酒法

假 取石一斤 三日乃可飲 取醉 以綿裹磁石內耳

中 去磁石即瘥

又方治耳[illegible]

用菖蒲一[illegible]巴豆[illegible]丸如棗核大日[illegible]

綿裹塞耳中

又方[illegible]

用烏[illegible]八根削長半寸塞耳中向上以艾炷灸七壯每日[illegible]一度

亦瘥

鹽脂方治積年耳聾[illegible]

右鹽脂方[illegible]治久聾無聞年歲[illegible]不瘥者

用石下脂[illegible]每日一度聾甚者入

入耳中此方極驗此物出南海福建有之梔子者不着[illegible]

耳即當通聽

[illegible]方[illegible]治耳聾無所聞年老[illegible]並治之

用[illegible]打[illegible]日[illegible]中以[illegible]用

然以[illegible]乳子[illegible]少許[illegible]所患耳內[illegible]則[illegible]不

待[illegible]一兩度如新患[illegible]一上便有効[illegible]

[illegible]為上一方用[illegible]一合用水二合煎十日[illegible]水少許[illegible]

二味和[illegible]用少許滴在耳中用半滴[illegible]用[illegible]

之[illegible]石[illegible]一兩[illegible]在上[illegible]如此三度瘥

大蒜方[illegible]治耳聾久不効者

用大蒜一瓣一頭劃一坑子以巴豆一粒去皮[illegible]入在

綿[illegible]內用[illegible]塞耳中不過三四次効

[illegible]根方[illegible]二三年耳聾方

用[illegible]根[illegible]切三十斤水[illegible]服之甚効

治久年耳聾

用磁石打作細塊[illegible]塞耳中[illegible]燒紅[illegible]入酒內[illegible]飲之

羊腎湯[illegible]治腎虛有水耳聾[illegible]年不瘥

羊腎一兩[illegible] 乾地黃[illegible] 五味子 丹參

玄參 防風 桂[illegible] 人參 當歸[illegible]

白茯苓[illegible] 石斛[illegible] 地骨皮[illegible] 磁石[illegible]

牛膝[illegible] 甘草[illegible] 黃芩[illegible] 菖蒲[illegible]

右[illegible]石[illegible]三錢匕先以水三[illegible]煎[illegible]去[illegible]

下藥入生薑一[illegible]大棗三枚去核同煎[illegible]七分去滓食前溫服

腎[illegible]藥[illegible]多年[illegible]耳聾不可治者服此十日內見効

除根本

[illegible] 華澄[illegible] 蝎[illegible]

[illegible]

右[illegible]入麝香[illegible]用蔥管吹

入耳中[illegible]口含[illegible]少時

耳[illegible]

論

夫耳者心之寄竅[illegible]也[illegible]和平則[illegible]通[illegible]

[illegible]邪[illegible]之[illegible]以[illegible]不得[illegible]則耳[illegible]相[illegible]

[illegible]如[illegible]皆[illegible]

之[illegible]之所[illegible]血不足[illegible]則虛風邪[illegible]隨脉

入耳與氣相[illegible]故令耳[illegible]其左手[illegible]寸口名曰人迎以前[illegible]

[illegible]手[illegible]太陽[illegible]也[illegible]陰陽俱虛者此為[illegible]

[illegible]脉不足[illegible]耳[illegible]左手尺

中名曰神門其脉浮[illegible]太陰[illegible]

合[illegible]耳[illegible]不[illegible]則三[illegible]

若三焦實則[illegible]故[illegible]也耳[illegible]不止則[illegible]

方

牛膝[illegible]治[illegible]腎[illegible]風邪[illegible]之上攻於耳常[illegible]以至重聽

牛膝[illegible] [illegible] 蘿[illegible]子[illegible]

當歸[illegible] 赤芍[illegible] 五加皮[illegible] 青[illegible]藥 桂[illegible]

麻黃[illegible] 地龍[illegible] 木香 [illegible] 沒藥[illegible]

乳香[illegible] 防風[illegible] 骨碎補 [illegible] 沉香[illegible]

乾蝎[illegible] [illegible] [illegible] 烏頭[illegible]

[illegible] 虎腦骨[illegible]

右[illegible]二十四味[illegible]入[illegible]和[illegible]三千杵丸如梧桐子大每服十

丸至十五丸空心溫酒或鹽湯下

保命丸 治耳內虛鳴

熟乾地黃　白茯苓　山茱萸　附子　丁香

菟絲子　人參　山藥　木香　檳榔

甘草　肉桂　白茯苓　遠志　蔓荊子

右十二味為末入丹砂煉白蜜丸如梧桐子大每服

十五丸空心溫酒下漸加丸數

生地黃汁散 治腎經虛熱耳內作聲

生地黃　生天門冬　白术

麥門冬　甘草　當歸　地骨皮　桂心

杜仲　黃耆　五味子

右為末以中取三錢火上更研日曝乾常研

入方寸匕日再

白茯苓丸 治耳內虛鳴腎經虛風食欲無味

白茯苓　石斛　白术　五味子　桂

巴戟　防風　人參　白茯苓　澤瀉

山茱萸　熟乾地黃　磁石

右搗羅為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心食前溫酒下

芎藭散 治風入耳虛鳴

白芷　石菖蒲　蒼术　陳皮　細辛

厚朴　半夏　桂枝　木通　紫蘇莖葉

甘草　川芎一分

右剉散每服三錢薑五片葱白一根水煎食後臨臥服

乾地黃散 治耳中嘈鳴

熟乾地黃　防風　羌活　枳殼

芎藭　杏人　木通　當歸

檳榔　茯神　甘草

右為散每服二錢水一盞生薑三分煎至五分去滓食前溫服

地黃丸 治腎虛耳鳴

熟乾地黃　山茱萸　桑根白皮

黃連　桂　當歸　代赭

天雄

右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心溫酒下

龍齒散 治腎虛致耳內常鳴如蟬聲不可奇服補

藥宜用此方

龍齒　人參　白茯苓

麥門冬　丹砂　鐵粉　龍腦

生薑　麝香

右件研為散同再研令細每服一錢匕食後夜臥溫酒調下

日三病愈而已

白术散 治胃氣百骨節疼耳聾四肢疼

痛腰背相引小便黃赤

白术　生薑　桑白皮　羊腎

竹葉　竹茹　茯苓　生地黃

右以水二斗煮羊腎竹葉取一斗去羊腎下藥煮取三升

分三服不已三日更服一劑

地黃丸 治男子二十歲因病後胃經熱右耳聾事不每心中

不意則虛重或為疼痛

生乾地黃　桑白皮　磁石

枳殼　羌活　防風　茯苓　木通

甘草

右為末每服四錢水一盞半煎七分去滓日二三服不拘時候輕

方 磁石一味

塞耳菖蒲丸 治耳聾塞耳水入耳

菖蒲　礬石　細辛

桂心　附子　木通　當歸　甘草

右搗羅為末以葱汁同白鵝膏和丸如棗核大以綿裹納耳

中日三易之一方不用礬石

山芋丸 治耳聾耳鳴

山芋　熟乾地黃　磁石　菊花　黃耆

茯神　遠志　羚羊角

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸[illegible]加至三十丸

塞耳丸[illegible]治耳內虛鳴

[illegible]青 [illegible] 麝香 [illegible]

右為細末以蔥汁搓作挺子塞耳內[illegible]

治耳鳴[illegible]

用[illegible]至[illegible]用[illegible]

補腎安心丸

腎氣湯[illegible]治腎虛不足耳聾[illegible]

[illegible] 黃耆[illegible] 山藥[illegible] 芎藭

人參 木通[illegible] 磁石[illegible]

右每服三錢水二盞先煮[illegible]至[illegible]

下藥同至七分去滓食前服

白膠香[illegible]治耳聾[illegible]

紅[illegible] 當歸 防風 細辛 附子去皮臍

芎藭 白芷各一分

右除魚腦外剉碎銀器中和魚腦煎成膏去滓傾入合中候凝每以

棗核大綿裹塞耳中一方無當歸白芷一方有菖蒲一分

療耳鳴耳閉[illegible]

吳茱萸　巴豆去皮心　乾薑　右上各等分　磁石

細辛各等分

右搗末以綿裹如小豆許以綿裹塞耳中以鹽五升布裹蒸之以熨耳

門令其氣通入耳內冷復易之如此數用瘥後常以亂髮裹以塞

耳中慎風一方無磁石

芎歸飲 治[illegible]耳鳴

川芎　當歸　細辛各[illegible]　肉桂

石菖蒲　白芷各[illegible]

右剉細每服三錢水一盞[illegible]加生附子[illegible]

腎虛者[illegible]加[illegible]隨脈入耳

氣耳之[illegible]五苓散加[illegible]枳殼橘皮紫蘇生薑

小[illegible]合青木香丸散[illegible]氣丁香[illegible]以芎歸飲和蓄之

治耳[illegible]

蒼朮[illegible]　細辛[illegible]　防風[illegible]　[illegible]

白芷[illegible]

右為末以[illegible]前三上一下[illegible]以綿裹棗核許塞耳中以

綿裹之[illegible]人後之

聾者先以治腎為本耳鳴夜間[illegible]有如打鼓[illegible]耳內風吹更四肢抽掣

疼痛

黃耆[illegible]　[illegible]　羌活[illegible]

[illegible]附子[illegible]　獨活[illegible]

右細末用糊丸如梧桐子大每服二四十丸空心晚食前各一服溫酒鹽湯下

一方有破故紙無白蒺藜

菖蒲[illegible]治耳聾[illegible]

全蝎丸 治腎氣虛耳中如風水鳴或如鐘磬聲或卒暴聾者

全蝎　川椒　巴豆去皮　菖蒲　[illegible]脂[illegible]

右為細末熔蠟和丸如棗核大塞耳中一日一易妙

芎藭膏 治耳鳴耳聾塞耳

芎藭　當歸　細辛[illegible]　白芷各一分

右細剉以雄魚腦大合和於銀器中煎成膏去滓傾入合中候凝以

棗核大綿裹塞耳中[illegible]

巴豆丸 治耳聾塞耳

巴豆[illegible]　桃仁[illegible]　松脂[illegible]

右搗作二丸綿裹塞耳中

[illegible]丸 治[illegible]上耳鳴耳聾

蓖[illegible]　木香　[illegible]茄

右等分為末外以[illegible]末入棗肉為丸如梧桐子大鹽湯下每

服三四十丸

巴豆方 治[illegible]塞耳內如風水鳴或如鐘磬聲卒患耳聾

巴豆　菖蒲[illegible]

右以[illegible]綿裹子[illegible]耳內[illegible]之神效

治石[illegible]耳聾耳鳴常如風水聲

右㕮咀以絹囊盛用酒一斗浸冬七日每服一合日二

菖蒲散治耳聾

八味丸治耳鳴及虛鳴

附子四十九枚炒微黃為末每服一錢調併下八味丸百粒

空心溫酒鹽湯下

治耳中常鳴

用生地黃截塞耳日十數易之以瘥為度一云以紙裹微煨塞耳中

生烏頭方治耳聾鳴如流水聲久不治成聾

用生烏頭淨洗削如棗核大塞耳中日一易之三日愈古今錄驗

及卒風聾一方治耳中痛出用生薑十顆塞耳中元良

補腎丸治腎虛耳聾或當頭偏及中風耳搐腎之

而不聰耳內虛鳴

山茱萸　乾薑　巴戟　芍藥　澤瀉

菟絲子　遠志　桂心　黃耆　石斛

熟地黃　細辛　附子　當歸　牡丹皮

蛇床子　甘草　蓯蓉　人參　菖蒲

防風　茯苓　羊腎一雙

右為末以羊腎細細切研煮爛為丸如梧桐子大食前鹽酒任下三

十丸至五十丸一方除菟絲子外為細末再入菟絲子末煉蜜為丸

如梧桐子大食後鹽酒服之治緣腎虛補腎又作丸

[illegible]即集

磁石散治腎虛耳聾作聲則成聾

磁石　熟地黃　牡丹皮　當歸

白朮　山茱萸　白茯苓　人參　芍藥

大棗　杜仲　桂　當歸　桑螵蛸

木香

右為散每服一錢空心加至不[illegible]

右[illegible]丸作[illegible]如水之聲[illegible]其

左手尺脈微而細右手脈浮而大其證也

石斛　菖蒲　地骨皮　鹿茸

芎藭　補骨脂　防風

遠志　熟地黃

桂　玄參

右件十二味為末入子末和煉蜜為丸如梧桐子大每服

二十丸空心[illegible]食後[illegible]加[illegible]二分丹

蓯蓉丸治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴

肉蓯蓉　山茱萸　石龍芮　菟絲子

鹿茸　石斛　磁石　附子　全蝎

麝香　川羌活

右為末煉蜜丸梧子大每七十丸至百丸空心鹽酒或鹽湯下

方山茱萸

補腎治腎虛耳聾鳴兩耳

黃耆　人參　紫菀　甘草　防風

當歸　麥門冬　五味子　乾薑　桂

芎藭

右件每服五錢以水二盞羊腎一隻至一盞去腎下藥入

三寸切大棗三枚至八分去滓空心食前溫服

治腎氣虛損兩耳聾

羊腎　附子　人參　白茯苓　當歸

桂　熟地黃　牡丹皮

右搗羅為散每服二錢空心食前下日二加至三錢亦為佳

補腎治腎勞耳常聞風雨之聲

磁石　鹿茸

附子　山茱萸　五味子　白茯苓

巴戟天　補骨脂

右將丸為末入煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸至

三十丸空心下一方無[illegible]有[illegible]

耳疾論

夫足少陰腎之經，宗脈之所聚，其氣通於耳，風入於腎之經也，不能入胃則卒於變為強背直

也。若因病不能……足少陰為腎之經

宗脈之所聚，其氣通於耳上，……相擊，故耳中痛。耳為

腎候，其氣……則痛，痛則身強背直也

方

生犀丸 治……耳中……疼痛

生犀……　生黃……

天南星　……

龍腦……

右為細末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服二十丸

菖蒲……治諸耳疾疼痛不可忍者

防風　大黃　地丈人　黃芩　黃連

杏人　石菖蒲　當歸　白芷　赤茯苓

右為麄散，每服一錢，……水一中盞，煎……

已為度，去滓，……

芍藥散 治……耳內痛……膿血出

赤芍藥　白芍藥　川芎　當歸

大黃　木鱉子　甘草

右剉散，每服四錢，食後臨臥服

香附膏 治耳中疼痛

附子　菖蒲　礬石

杏人　麻……　蓖麻子

右先搗附子菖蒲礬石為細末，次將蓖麻杏人搗膏，次研……

……於耳中，日再用之

白龍散 治耳中……痛……生肌止痛

滑石　……　寒水石

……

右為……入耳中……

治耳論

右細末，每服一錢……

治耳內疼

川山甲　土狗子

右將土狗子……山甲……為細末，吹入一字許於耳中……

又方

以草烏……

又方

用……散……入耳內……

……治耳痛……

百合散 治耳聾疼痛

用百合不拘多少，焙乾為細散，食後溫水調下二錢，日三服為妙

治耳內疼痛方

用……金末研細，每用一字，以薄水調傾入耳內，卻急傾出

桑耳散 治耳卒疼痛不可忍

木香散 治耳風疼痛久不差

用木香搗羅為細散，用……香油……

耳中……痛止……時……去，日二五上

杏人膏 治耳中……出……痛有膿

用杏人炒令赤黑為末，研成膏……

……之亦妙。一方治耳卒痛或有水出，用杏人炒焦為末……

丸以綿裹塞耳中……耳亦可，又治耳中腫……有膿

柳根方 治耳痛有膿不出……

以柳根細切熟搗封之……

治耳……以鹽……灸之

耳腫論

夫耳者，腎之候，心之寄竅，若其經為風邪所……血脈而上至於耳中……

[illegible]散佈熱氣乘虛隨脈入耳聚熱不散膿汁出而爲耳膿之病也

方

木香散 治[illegible]耳膿

木香 [illegible] 白斂

大黃 [illegible] 黃芩 [illegible] 黃蘗 [illegible]

右搗羅爲散每取[illegible]以少許[illegible]耳中[illegible]

礬花丸 治耳膿[illegible]

礬花 細辛

右件[illegible]研[illegible]如棗核大以綿裹納耳中日一易[illegible]

[illegible]治耳聾膿水出不聞人語聲

三[illegible]散 治耳膿疼痛及暴聾

赤小豆 大黃 木鼈子

右爲末每用[illegible]少許以生[illegible]捉調塗耳[illegible]

[illegible]方 治耳聾膿出并耳疼痛或生瘡

用五倍子爲細末以水調塗頭[illegible]

礬石散 治耳卒膿出膿并底耳

用礬石燒令汁盡研細每一以葦管吹少許入耳中日三四度或以綿裹如棗核大塞耳中亦得一方先以乾[illegible]

中[illegible]以礬石末粉耳中[illegible]以石鹽末粉其上[illegible]不過再度

[illegible]鹽一方不用鹽

治耳卒腫[illegible]

用棟實五合搗爛每用綿裹如棗核大塞耳中亦治耳內生瘡

又方[illegible]用商陸生者先以刀子削如棗核綿裹耳中日二易之

治人卒患耳腫或痛有膿[illegible]

治耳卒風毒腫起

用杏仁[illegible]以化[illegible]少許[illegible]入耳中[illegible]

治耳卒腫[illegible]

用牛蒡根[illegible]先細切絞汁一升於銀鍋中熬成膏塗於腫上

聤耳

論

夫耳者腎之候心之寄竅風熱搏於經絡則耳中津液結聚如麩片之狀久則結不消或似蟲蟲致氣不通耳聤爲聾

方

菖蒲[illegible]治耳聤塞耳聾不可[illegible]

菖蒲 [illegible] 細辛 附子 [illegible]

右將細辛附子爲末以菖蒲汁調合綿裹入耳中

[illegible]治耳聤塞耳聾強堅不可挑塞耳

生豬脂 釜下墨

右細和成膏捻如棗核大綿裹塞耳中

礬石散 治耳聤塞耳

黃連散 治耳聤塞耳聾強堅不得出耳中痛膿血

黃連 附子

右爲散每以少許捻入耳中每著先拭惡物然後吹之

[illegible]治耳聤[illegible]不可出

搗自死白項蚯蚓安蔥葉中用麵封頭蒸令熟並化爲水以汁滴入耳中滿即止

不過數度即挑易出[illegible]以[illegible]塞之一方[illegible]入耳立效一方

以蚯蚓五七條研取汁數滴入耳中[illegible]

[illegible]治耳聤耳膿[illegible]治耳中[illegible]

[illegible]

[illegible] 乾地黃[illegible] 當歸 人參

右件除三味爲細末入生[illegible]三斤水二盞煎至一盞去滓稍熱頻下三味[illegible]

[illegible]細末耳上火前[illegible]消熱[illegible]食後

聤耳

論

夫[illegible]耳者宗脈之所聚腎氣之所通足少陰腎之經[illegible]氣[illegible]結於耳中以至膿汁[illegible]

[illegible]

[illegible]故謂之聤耳也

通氣散 治氣閉耳聾 方

郁李人 [illegible] 木香 [illegible] 陳皮 [illegible]

[illegible] 柴胡 [illegible]

甘草 [illegible] 川芎 [illegible] 桂心

右爲細末 每服二錢 [illegible] 食後 [illegible] 調下

治聤耳有膿

龍骨 [illegible] 枯礬 [illegible] 麝香少許

右爲細末 先以綿杖子 [illegible] 摻耳中

白斂散 治聤耳出膿血

白斂 [illegible] 黃連 [illegible] 龍骨 [illegible] 烏賊魚骨

右爲細末 [illegible] 乾摻 塞耳中

菖蒲散 治聤耳 [illegible] 汁不止 塞耳

菖蒲 [illegible] 狼毒 [illegible] 磁石 [illegible] 附子 [illegible] 礬石

醫方類聚卷之七十五

右爲細末 [illegible] 和少許 [illegible] 塞耳中

礬石散 治聤耳出膿汁

礬石 [illegible] 黃連 [illegible] 烏賊骨 [illegible] 赤石脂

右各等分爲末 以綿裹如棗核大 納耳中 日二 一方不用赤石脂

又方 龍骨一兩

竹蛀散 治聤耳

竹蛀末 [illegible] 白礬 [illegible] 胭脂 [illegible] 麝香

右先以綿杖 [illegible] 以紙撚 [illegible] 吹一字入耳中 一方加麻勃

紅綿散 治聤耳出膿 及耳中 [illegible] 赤白 [illegible] 耳

枯礬 [illegible] 爐甘石 [illegible] 麝香少許

右爲細末 [illegible] 或乾吹少許入耳中可

[illegible] 一方無爐甘石 [illegible]

[illegible]

白礬灰散 治聤耳出膿水久不絕

白礬灰 [illegible] 白龍骨 [illegible] 烏賊魚骨 [illegible] 黃丹

右研細散 每 [illegible] 半錢 [illegible] 塞耳 日 易之

蚯蚓散 [illegible] 治 [illegible] 水入耳 [illegible] 痛不止

[illegible] 蚯蚓 [illegible]

右研細 先以 [illegible] 耳子 [illegible] 塞 [illegible] 如覺 [illegible] 即

是惡物 [illegible] 出 [illegible] 三度 [illegible] 以事 [illegible] 立效

文蛤散 治聤耳

[illegible] 石 [illegible]

右爲細末 [illegible] 半字 吹入耳中

蛇蛻散 治聤耳 膿出不止

五倍子 [illegible] 全蝎 [illegible]

右爲末 入麝少許 吹耳中 [illegible] 效 一方加 [illegible] 吹入耳

中 [illegible]

聤耳方 [illegible]

生猪脂 [illegible] 生地龍 [illegible] 釜下墨

右細研 以葱汁和 如棗核大 薄綿包入耳 令 [illegible] 即挑出

醫方類聚卷之七十五

狼牙散 治聤耳出膿水

狼牙 白斂 竹中蛀屑

右爲散 以少許摻入耳中

菖蒲散 治聤耳塞耳

菖蒲 [illegible] 杏仁 [illegible]

右爲散 以雀腦髓和 [illegible] 如棗核大 先灸耳中 [illegible] 後用藥塞

耳中 日一易

烏龍丸 治 [illegible] 聤耳有膿水塞耳

[illegible] 附子 [illegible] 伏龍肝

右件藥搗爲末 以 [illegible] 如 [illegible] 用耳中 日再易之 如不瘥者 [illegible]

有蟲也

磁石散 治 [illegible] 耳 [illegible] 水出 日夜不止方

磁石 [illegible]

右爲細散 [illegible] 和 [illegible] 如棗核大 [illegible] 度易之

又方 出普濟方
白礬 [illegible] 杏仁 [illegible]
右爲末取麻子肉自然汁和爲丸如棗核大塞耳中
立効散 治聤耳底耳有膿不止
真蚌粉 [illegible] 麝香
右和勻每用少許先用綿撚子展去膿水後摻藥
麝香散 治聤耳底耳耳內膿出
麝香 海螵蛸
右爲細末研和勻每服半字摻入耳內如有膿先用綿杖子捲令乾次
用藥摻之
治聤耳 出澹寮方
麝香 蟬殼
右同研如塵用綿先展耳內膿令淨次入藥在耳門不得動過出惡
物即愈
治聤耳膿水不止 出聖惠方

狗膽一枚 白礬一錢
右以狗膽汁調和納耳中以綿塞之不過三兩上永除本根
又方 出聖惠方
麻子 一分 花胭脂 一分
右爲末滿塞耳中綿裹
又麝香散 治聤耳底耳耳內膿出
桑螵蛸 麝香
右爲末研令勻每用半字摻耳內如有膿先用綿撚紙以桑搓之一
法用赤經枯礬等分爲末以葦管吹入耳中即愈或入麝尤佳殺
少許
又礬石散 治聤耳出膿汁
附子散 治聤耳耳中痛
紅花散 治聤耳出膿水
紅藍花 礬石
右爲散以少許摻耳中

黃連散 治聤耳出膿水
黃連 [illegible] 附子 [illegible]
右爲散以少許摻耳中
塞耳細辛散 治聤耳耳中痛膿血出
細辛 [illegible] 附子 [illegible]
右爲散以蔥汁和一錢匕綿裹塞耳中
治聤耳方
白礬灰 [illegible] 花胭脂 [illegible]
右爲末以綿裹塞耳中
又方 出聖惠方
桃木一分或入花胭脂 一分
右細研爲散每取少許內於耳中
又方 出聖惠方
龍骨 烏賊魚骨 各等分
右爲末每取半錢用綿裹塞耳中

治聤耳有膿出不止 經驗良方
用五倍子焙乾一兩及全蝎燒灰存性三錢爲末摻耳中
又方 百一選方
以鷄腸草擣汁滴耳中
又方 海上名方
胡桃肉燒爲末狗膽汁爲丸如桐子大綿裹塞耳中尤妙
香附散 經驗良方 治膿耳
用香附子去毛爲末以綿杖送入耳中或先摻立効蔡邦度知府屢
用皆効
紅綿散 治聤耳出膿
用白礬煅成白灰每用一錢入臙脂一字研勻用綿杖子纏去耳中
膿及黃水盡即用別綿杖子引藥入耳中令到底摻之即乾如壯盛
之人積熱上攻耳出膿水不瘥用無憂散雄黃丸瀉三五行即瘥一
方枯白礬爲末摻耳中立効
塞耳鯉魚腸方 治聤耳出膿又不瘥者有蟲

用經鼠膽一具細切罨之合搗布裹交和大塞耳中食頃痛即有
蟲出爲佳即拔之更易勿有蟲盡爲度
塞耳黃蘗散（出聖濟總錄）治聤耳及卒腫出膿
用黃蘗半兩爲細末少許入龍腦研勻每用一錢匕塞耳中或
以葦管吹耳中 一方用白礬爲末塞耳並瘥
塞耳桃人方（出聖濟總錄）治聤耳出膿血（一方出千金方用棗核大綿裹入耳）
塞耳桂膏（出聖濟總錄）治聤耳中痛膿血出
用桂去粗皮半兩爲末以鯉魚腦和研如棗核大塞耳中
塞耳雀腦方（出聖濟總錄）治聤耳
用五月五日蚯蚓以綿裹少許塞耳中
雞卵方（出聖濟總錄）治聤耳
又方（出聖濟總錄）
用伏龍肝細研半兩以豬膏和如棗核大綿裹塞耳中日再易從
一易
雄黃膏（出[illegible]）治聤耳（方見[illegible]）

治聤耳方（出聖濟總錄）
搗活鼠取肝一具棗許大時以棗核大塞耳中
又方（出千金方）治聤耳膿及膿血出
用蜘蛛細研先手拭去耳中膿掠耳中 一方取釜月下灰吹耳中日
三易掠以籠子去之母著
又方（出聖惠方）
用蒼耳上蚌屑半兩細研掠著耳中
又方（出聖惠方）
用青黛細研以一豆大掠耳中
生油方 治聤耳（方見耳聾門）
又方（出聖惠方）
用桃仁烏梅研爲末掠耳中暖止即瘥
又方（出聖惠方）
用石首魚腦中枕子爲末掠耳中即瘥
羊糞方 治聤耳（[illegible]）

塞聤耳耳中痛膿血出（[illegible]）
用附子炮以葱汁和塞耳中取瘥[illegible]令入耳中甚良
治聤耳方
用白礬研細納之耳中
又方（[illegible]）
用青桃皮燒灰研以綿裹塞耳中日三四易
又方（一方治聤耳方）
用紅花末吹入耳中以筆管吹之
又方（[illegible]）
用烏龍末吹入耳中
又方（出聖惠方）
用地龍末及白礬灰綿裹內耳中
又方（[illegible]）
用青蒿搗末綿裹內耳中
又方（出聖惠方）

用故綿燒灰爲末綿裹內耳中
又方（出本草）
取菟絲苗汁如豆滴耳中 一方用子汁滴耳中無傷外毒傳之妙
治少小聤耳（出本草）
用桃人熟末以綿裹塞耳
麝香散（[illegible]）治凡患聤耳膿血出時發疼痛
白礬 輕粉 紅花（[illegible]） 麝香（少許） 蛇蛻（[illegible]）
右件爲細末用藥少許先以筋綿纏細撚展令乾淨然後用藥入耳
藥入耳中明日用紙撚子撚去以日藥再用如前法以瘥爲度
治大人小兒聤耳無膿有瘡（[illegible]）
穿山甲（[illegible]） 麝香（[illegible]）
爲末燒色同灰入三日後乾愈
一方（[illegible]）治同前
用蛇蛻燒灰爲末吹入耳妙一方燒灰爲末吹入亦妙
治聤耳
用五倍子先以綿展乾後爲末半字摻耳中

耳聾有膿

夫耳聾有膿者為腎虛傷於血氣與風相搏熱氣乘之則結聚不
耳中為化膿汁須不聞故致人聾

方

黃耆丸 治耳聾出膿

黃耆 升麻 附子 羚羊角 玄參
芒硝 乾薑 芍藥 人參 大黃
木香 黃芩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸煎枸杞根湯下
食後良久服 一方治耳膿水出去有乾薑無乾薑

麥門冬散 治內熱耳出膿汁

川升麻 木通 赤芍藥 桑白皮 麥門冬
生地黃 前胡 甘菊 赤茯苓 蔓荊子
甘草

右剉散每服三錢薑棗煎食後臨卧服

昇氣散 治氣不升降九竅閉塞耳痛膿血聤耳膿出

川芎 白芷 香附 紫蘇葉 陳皮
菖蒲 當歸 防風 甘草

右為㕮咀每服五錢薑葱煎食後服

磁石湯 治腎熱背急攣痛耳膿血出或生肉塞之不聞人聲

磁石 白朮 牡蠣 甘草 葱白
生地黃汁 芍藥 大棗 生麥門冬

右㕮咀以水九升煮取三升分三服

解食散 治氣壅熱壅或失飢冒暑熱上衝耳內閉痛膿血流出

赤芍藥 白芍藥 當歸 甘草
大黃 黃芩 大黃 防風

右㕮咀每服五錢水煎食後臨卧服

附子丸 治耳聾出膿疼痛耳聤塞耳

附子 菖蒲 礬石

松脂 杏人 羊髓脂

右為末熔黃蠟和搓如棗核大針穿一孔子令透塞耳中日一換之
方 治耳聤不用黃蠟搗成膏以綿裹如棗核大塞耳中亦瘥

蘇合飲子 治氣虛熱壅或失飢冒暑風熱上壅耳內聾閉徹
痛膿血流出

赤芍藥 白芍藥 當歸 甘草 木鼈子
大黃

右為剉散每服四錢水一盞煎七分食後臨卧服

附子散 治耳聾有膿

附子 烏蛇 伏龍肝 龍骨 釜底墨
烏賊骨

右為末取如皂莢子大綿裹納耳中日一易取瘥不瘥者有為加麝
香一豆大

真龍骨散 治聤耳方

真龍骨 白礬 赤小豆 黃丹 烏賊骨
胭脂

右為細末摻耳

又方

明礬 黃丹 真蚌粉
真龍骨 海螵蛸 爛石膏

右為細末用綿裹竹簽拭耳換綿蘸藥入耳

白礬散 治聤耳膿水不絕方

白礬 麝香 木香 松脂 花臙脂

右為細末每用時先以綿子拭膿淨滿耳填藥効

治耳膿出汁

礬石 爛石膏 天花粉 防風 腦子

右為末摻耳立止

治膿耳

明白礬 黃龍丹 龍骨 胭脂 麝香

右研為細末用綿杖子撚乾換綿杖蘸藥入耳入麝香輕粉少許摻

入耳

鯉魚膽方 治出背熱耳嘍血出溜日夜不止
鯉魚膽 鯉魚腸 鯉魚腦 烏麻子
右先擣麻子碎次下餘藥擣爲一家以器中微火煖暖布裹塞耳得
兩食頃開之有白蟲出更作塞若兩耳並膿出用此爲一劑以塞兩
耳若止一耳分藥爲兩劑不過二三度便瘥慎風冷一方無鯉魚腦

肚蠻散 治耳中膿出
白礬 龍骨 烏賊骨 麝香
右爲末吹耳內次用緜杖纏乾十一方不用烏賊骨研細用緜杖纏
藥搽之即瘥

治膿耳 出五指方
蝎梢 胭脂 乳香 麝香
右爲細末以絟子挑入耳

香附散 治耳內有膿水不乾
香附子末 乾胭脂 密陀僧 輕粉

醫方類聚卷之七十三 [illegible]

右爲細末每用少許吹入耳中

礬石散 療耳膿水塞耳
吳白礬 麻勃一分 青木香一分 松脂四分
右擣末先消松脂入藥末可丸如棗核爭以塞耳中取瘥

肉蓯蓉方 治耳聾有膿水不絕兼鳴
肉蓯蓉 龍腦 [illegible]
右共燒爲灰研細以少量和令勻後入鯉魚膽十三枚攪令稀即以
緜裹取汁點入耳中其患乾痒捻作挺子以薄緜裹塞耳不過三兩
上愈

治耳膿 出仁存方
密陀僧一錢 輕粉少許 麝香少許
右爲末先以緜撚耳內膿却摻入藥末

治耳臭爛
杏人炒 麝香 青布燒灰
右搗杏人作一丸用新緜子緜厚竹篾作纓裹入耳熏前膿二

未去耳內一看見可先用濃緜撚子傳之

治耳內出膿
竹蛀蟲 胭脂 麝香
右爲末吹耳內

三黃散 治耳內流膿
雄黃 硫黃 雌黃
右爲細末吹入耳內膿自止

礬石散 治耳聾有膿水不止
礬石 黃丹
右爲末每半字摻入耳中

蛇骨皮散
蛇骨皮 五倍子
右爲末每用少許摻入耳中

礬黃散 治耳內膿水每旬不止
礬石 雄黃

醫方類聚卷之七十三 [illegible]

右研細勻用手指甲挑半字先以緜杖子拭耳內令乾卻着生麻油
一二點入耳內乃以緜杖子蘸藥末在耳中不拘久近只一二度瘥

二聖散 治耳內出膿水
白附子 羌活
右爲細散用豬羊腎各一隻切開每隻入藥末半錢不得着鹽濕紙
裹煨熟五更溫酒嚼下以粥壓

桂骨散 治耳聾有膿
桂 烏魚骨
右搗爲散摻入耳中瘥

麝香佛手散 治五般耳出膿血水者
人牙 麝香
右爲細末吹耳內少許即乾亦治小兒痘瘡出現後者用調一字服
之即出

紅綿散 療通耳膿水

速効散 治耳膿出久不瘥

用地龍一條盛在白葱葉內化為水點耳中少許研為細散搽
在耳內
治耳聾有膿
擣蚯蚓脂納耳內不過三四度差
竹蛀屑方 治耳內出膿不以男子婦人小兒皆可用之効
以竹蛀屑入麝香少許用紙子撚入耳中或加胭脂子即胭脂膏少許
一方白礬為末同用
治耳瘡黃膿出
右燒白礬灰研細桃油調塗
抵聖散 治耳中膿經年不愈又兼之為患干攻臟腑疼痛瘡疽痛要
筆瘡
白礬灰 烏賊骨 胭脂 輕粉 乳香
麝香
右為細末或摻或紙撚以事點之如有耳膿者用一字摻耳中
治耳出膿水不止俗呼為聤耳

右白礬枯過摻耳中令知耳孔內膿出自出妙
紅藍散 治膿耳定疼瘡
蝸殼 麝香
右件並研令勻每用以綿耳子挑少許入耳中日夜三四次用之
治膿耳
右用桑末炒黃為度研入麝香少許先以綿杖子展乾摻
耳內生瘡
論
夫足少陰為腎之經腎氣虛則風熱邪氣乘之與津液相搏故耳內生瘡
世俗治耳瘡多以塗搽塞耳等藥以消邪氣出外蓋為外實殊不知膿
藥以治腎經之為甚也
菖蒲湯 治耳內生瘡
治東耳成瘡
栢葉 杏人 亂髮
乳香 青肉

右件藥先用油令沸即下亂髮以消盡為度後下諸藥同煎令色焦
黃漉去滓更以綿重濾過仍以慢火煎之然後入乳香黃蠟攪令
稀稠得所於瓷器中盛以鵝翎旋取塗之
蛇床子膏 治耳生瘡痒不効
蛇床子 枯白礬 五倍子 陳橘皮 釉上硫黃
黃柏 雄黃 輕粉 杏仁 麻黃
右各等分為細末用麻油調傅瘡上一方無雄黃
香脂膏 治耳疳生耳中連與腫疼不可忍
黃蠟 烏賊骨皮一枚 礬石 龍腦
右為細末用豬月脂同調塗之若用真麻油調更佳
曾青散 治耳有惡瘡 雄黃 曾青 黃芩
右細研為末每用少許撚耳中有汁出即以綿子搌乾用之
大黃散 治耳有惡瘡塞耳
大黃 黃連
龍骨

右為細散每用少許綿裹棗核大塞耳中
黃連散 治耳有惡瘡
黃連 礬石
右搗研為細散每以少許綿裹納耳中無聤耳痛有膿
土馬鬃方 治耳瘡
土馬鬃 井中苔
右為末以豬脂調塗之
黃馬散 治耳內外惡瘡及頭瘡口邊肥瘡瘡瘍
黃蘗 馬齒莧
右為細末每用少許綿裹納入耳中耳外傅之
羊糞方 治耳有瘡
用羊糞燒為末每以少許綿裹塞耳中
蔓荊子湯 治耳痛生瘡
桔梗 柴胡 連翹 蔓荊子 當歸
黃芩 生地黃 生乾地黃 甘草根 三分

黃連一兩 草龍膽一分 昆布 黃芩 鐵粉
桃人 紅花 生耳草根
白礬如麻豆大每服 水三盞煎至一盞去滓稍熱食後服忌
寒涼之藥利其大便一兩 黑牽牛 黃
治聤耳成瘡
枯白礬 黃柏 杏人 胭脂
右細剉以羊髓煎令黃熬去滓於瓷器中盛用綿裹藥塞之

又方
取死蝸蝓塞之

又方 治聤耳
杏人一分為末去皮炒令黃取白塞之

又方
以桑葉傳之後用麥莖煮水洗之

一方 治耳中出血
用赤腳蜈蚣燒為末隨左右吹之俟痛再之

治耳內蟲痛
用麥門冬末和油塗之妙也

治耳痛潰爛 用黑鶏鵜膽傳之日三次傳

百蟲入耳

論

夫百蟲入耳其證不一古方或灌以藥或掌以物皆以引出之也獨羅乳牛酪二物最為良者蟲之入耳者灌之即化為水其入腹者亦連服攻剿取瘥

方

五靈散 治蚰蜒入耳
天南星 白芷 夜明沙 猪牙皂角
白丁香 百部 藜蘆 草烏頭
海金沙 地龍 草撥
右為散研令細每服用塞如蚰蜒入

耳取少許用醋一兩調化以細絹塞入耳吹令藥氣行立出不得即化蚰蜒成水不出如蝎少醋在藥

麝香膏 治蚰蜒入耳
藥辛令熱劫
麝香 阿魏 硇砂 乾漆 白芨
膩粉 石 生鐵屑
右研細末以豬膽汁生薑汁每少許相和令稀得所每用少許點入耳中其蟲化為水立效

烏頭散 治蚰蜒入耳
烏頭 木鱉子 寒水石 白丁香 夜明沙
烏鶏 硼砂 猪牙皂角 小兒衣帶
右為散每服一字置入耳內少時出

備急散 治蚰蜒百蟲入耳
花 金星石
斑猫 銀星石
柳蠹 綠
右為散每用一字以少許入耳立出

灌耳散 治蚰蜒諸蟲入耳
椒黃 蒿苣子 燕芙 綠礬 枚藍根
沒心草 麝香
右於五月五日午時合和中燒為灰入麝香研勻每用藥一字生薑一塊如棗大蔥白一莖同研取汁入藥末攪和勻更用青油一合調藥灌入耳中其蟲者自出深者自死如入腹內者以羊肉半斤作炙油不用以前藥入在炙盆內和勻令人於盆一飯時其蟲自出

塞耳黃蠟丸 治諸蟲入耳耳聾不聞語聲有膿血
黃蠟 當歸 乾蠍 蜀椒
右為末入生地黃和丸以棗核大綿裹塞耳中日夜易之

治百蟲諸方 蚰蜒入耳

葱 白礬 麝 蛇乳汁
右細和勻十以一塊綻少許滴入耳須臾耳傾出蟲化爲水唯存
蜘子在爲驗
雄黃花耳方 治蚰蜒入耳
雄黃 硃砂 磁石 半夏
右爲末以醋調一字灌入耳其蟲仰諸蟲入耳
青香汁方 春夏入耳腫不聞人語聲有出
青香 乾生 蜀椒
右搗末以生地黃搗取汁和用綿裹裹大塞耳中日三夜一以瘥止
治蚰蜒入耳方
白礬 黃丹 麝香
右相和於蒸內同熬成膏如有不覺蚰蜒入耳者以杏人一枚和
皮尖金膏於上綿裹塞耳門中其蟲聞藥香即奔耳門便急捕藥
以物鉤出
清油膏 治蚰蜒百蟲入耳痛不可忍

清油 大蒜
右加膩麝香少許煎
硇砂吹耳方 治蚰蜒入耳
硇砂 膽礬
右研細用鵝翎管子吹一字入耳蟲化爲水
治蜈蚣入耳方
桑葉 鹽
右以桑葉裹鹽炙令熱掩耳上冷即易
豬脂枕耳方 治蜈蚣入耳
豬脂 豬肉
右將豬脂煎豬肉令香安耳孔邊枕即出
治耳蟲入耳
桃葉心 胡麻
右先以桃心葉塞耳中其蟲必出未出將胡麻以篋盛枕耳
自出

又方
油麻
右將葱與油麻搗勻餅子塗出耳門史令新向耳蟲人之偏側
蟲從耳中出至餅子內即去之
又方
草烏 大 磁石
右爲末用醋調灌耳中立出
又方
豬膏 青龍
右以鐵鍋豬膏中煎之去滓以豬膏少少灌入耳中
治蚰蜒入耳方
雞
右以油煎雞令黃以帛作孔枕之
又方
萵苣葉一分 雄黃一分

右爲末用麵糊和丸如皂莢子大以生油少許化破一丸傾在耳中
其蟲自出
又 豬膽膏 治百蟲入耳
取車轄脂塗耳孔蟲自出後以麝香耳塞血出綿裹塞耳中
又方
以葱管灌耳中蟲即出一方用生葱汁亦可
治蚰蜒入耳中
用貓尿灌耳中立出取貓尿用盆盛貓以生薑擦鼻
又方
以濕生蟲研爛塗於耳邊自出一方攤紙上撚作撚安耳中
治百蟲入耳
用雞冠血滴入耳即出
又方
以稻少許從耳中卻行
又方

用生油調鐵粉少滴耳中

治蚰蜒入耳方
用鹽葵為末水調灌耳立出

又方 出聖惠方
用[illegible]耳中立出

又方
用蚯蚓十一條全以[illegible]於耳邊即出一方去泥研爛為水五七點耳
研以灌耳之以氣無[illegible]亦可一方為末吹耳中紙捻耳
其蟲自出

治百蟲入耳方 出[illegible]
搗韭菜汁和醋灌耳中須臾出

治蠍蛛咬耳
用香油和鹽調塗擦立效

治蟲入耳 出本草方
用韭莢擣汁灌入耳即出

治諸蟲及蟻等入耳 出本事方
用白膠香燒煙熏耳中令知耳孔內暖蟲自出妙

治蚰蜒入耳方 出本事方
用半夏生為末麻油調塗耳門外蟲聞香自出

治飛蟲入耳方 出本事方
用好酸醋一味滴入耳內蟲必出不出即死

治蚰蜒入耳 出聖惠方
用牛乳一盞少少灌入耳內即出若入腹者飲一二升當化為黃水
出未出更飲一方用羊酪

又方 出聖惠方
用驢乳三合側灌入耳中其蟲從左耳入向右耳出之一方用黑驢
乳即出

香油方 出[illegible]
用生油三合少少灌入耳中若入腹者全腹服酪一升不出更服
以[illegible]和[illegible]即出

又方 出聖惠方
用水銀一豆大傾入耳中敧耳孔向下於耳上擊銅器物數聲其蟲
即出

又方 出聖惠方
用小便半盞少少灌入耳中即出

又方 出聖惠方
用百部切焙搗羅為末以一字生油調塗於耳門上其蟲自出

又方 出聖惠方
用胡麻半升炒令香搗碎以葛袋盛傾側枕耳邊聞香即自出

又方 出[illegible]
用麻油作煎餅側臥以耳枕之須臾即出李元淳尚書在河陽日蚰
蜒入耳無計可為半月後腦中洪洪有聲腦悶不可堪至以頭自擊
門柱奏疾狀危極聞御藥以療之無瘥者乃愛藥不念生命忽有
人獻此方及愈

治蟻入耳方 出聖濟總錄

用薑汁一兩合灌中即出

又方 出聖濟總錄
用小蒜三兩擣研取汁灌入耳中理一切蟲入耳皆同妙

又方 出聖惠方
用蠟燭一兩燒為灰以水調塵過滴入耳中即出

治百蟲入耳方 出聖惠方
以火照之即向明出

又方 出聖惠方
用葛葉一握研取汁少少灌入耳中

又方 出聖惠方
用桃葉搓熟塞耳中或搗爛以綿裹捲之其蟲自出或若
藏與細捲之一方用桃葉火熨令熱用塞耳令即易之立佳

又方 出聖濟總錄

又方 出聖惠方
用鱔魚頭燒灰取末以綿裹塞耳中立出

用生薑汁一合少少灌入耳中立出
又方 出千金方
以刀兩口於耳上相擊作聲蟲即走出也
治蜈蚣入耳方 出千金方
取炙豬肉掩耳從開取令出若死耳中條條以物鉤出之若積久
不出者取新熱豬肉安耳邊上即出
又方 出聖惠方
華帶鉤向耳孔諸蟲皆出別令鉤頭耳竅內蟲或死在耳中即取之
治飛蛾及百蟲入耳方 出千金方
先大吸氣仍閉口掩鼻呼出氣蟲即隨氣出
又方 出聖惠方
以葦管吹之即走出或剛柔令人以葦管亦可
又方 出聖惠方
以豬脂塗蓋左右耳
又方 出聖惠方
以雞冠血塞耳中立出 出聖惠方

治飛蟲入耳方 出聖惠方
以石膽數條去根如筯子粗一邊耳竅中四畔以蠟塞以火炷石
熱盡則止其石耳即蟲從左耳出未出再作
治蟻子入耳方 亦治蛾子入耳 出聖濟總錄
用豬羊脂炙令香安耳孔自出 一方單用豬脂塗耳門
治蚰蜒入耳方
以羊乳灌耳中即成水
治小蟲蟻入耳執不出者 出聖濟
以燈心草浸油釣出蟲
療百蟲入耳方 出千金方
以蔥汁和醋少許灌之即出
又方
以溫湯灌耳中
治蒼蠅入耳方

一包用千金研爛用生蜂蜜近渴灌入耳中
治惡蟲入耳方 出危氏方
用香油稀桃灰十灌耳
蚰蜒方 治蚰蜒入耳 方見耳門條
追蟲膏 治百蟲入耳不出
用白礬麻黃各半兩細研以香油調和成膏每用一皂子大塞耳中
蟲出即止
治耳內有物 及百節蚰蜒諸蟲入耳或乾耵聹不出 出千金方
取雕三年者釀之最良又用蜂蜜半日許少有物出
又方 出聖惠方
以麻繩剪令頭散傳好膠著耳中使其物黏之徐徐引出設用弓
弦亦可但以膠香合於耳門內吸之即出為度
治蚰蜒入耳方 出聖惠方
用蔓菁於耳門上打作聲蟲聞其聲即出
又方 出聖惠方

用銅器於耳邊打即蟲自出或銅器亦可
又方 出聖惠方
用地龍一條內蔥葉中化為水滴耳中其蚰蜒亦可化為水
治蜈蚣入耳 出聖惠方
又炙豬肉令香掩耳即出
治蟻蟲入耳 出聖惠方
用青十滴入耳即出 一方擊銅器於耳傍即出
諸蟲入耳
用桃葉為枕蟲自鼻出形為蠼螋者人莫知其名有人蠼螋入耳遂
其人痛時以頭撞柱至血流不知其痒不可忍蠼螋入耳往往食腦者
蓋人必隨手生瘡出麻油灌妙
又方 出聖惠方
用桃葉火熨之捲而塞耳蟲立出 一方絞汁滴入耳內不一時愈
方熱按塞兩耳中即出
治水入耳方

以薄荷汁點立効

治蚰蜒及百蟲入耳

用雞心血以生油和滴入耳內蚰蜒即出

治百蟲入耳 出危氏方

以川椒為末一錢醋半盞浸一宿良久少少灌耳蟲自耳出

又方 出本草 治百蟲入耳

以油調香物着向耳門蟲自出

又方 出千金方 治百蟲入耳

右以火頭一箇燒雄黃少許以燻之

蚰蜒入耳方 出經驗方

鹽根

右以雞血烏雞乳各少許同入角中如是蚰蜒入左耳緊塞右耳向左耳乃置藥少許如經半日內有蚰蜒出者先去耳內藥少許後以手從額指至頂然令患子立從自定其蚰蜒化為黃水自出即瘥

治百蟲入人耳鼻中 出本草

將古銅錢燒紅放耳其蟲即出

治蟲入耳 出本草

以烏臣汁滴耳中蟲出以其心置耳中蟲出蟲亦出

治耳卽蚰蜒等蟲入耳 出本草

以苦醋注之走行即出

治馬陸蚰蜒入耳及諸竅中 出本草

以牛乳灌之化為水

治風蟲耳痛 出本草

以菖蒲作末炒承熱裹罨甚驗

治百蟲入耳不出

用車缸脂塗耳孔中自出

普濟方卷之二十三

普濟方卷之二十四目錄

鼻門 論十一道 方二百三十七

鼻塞不聞香臭 鼻痛 鼻中生瘡 鼻乾 鼻中生息肉

○鼻塞氣息不通 論一道 方二十四方

寄松湯 柳金散 辛夷湯 芎藭散 通鼻膏
納散 人參湯 人參丸 當歸膏 一見香
增損防風通聖散 補肺香散
通關散
皂莢散 木通丸 蓽澄茄丸 菖蒲散
治鼻久中窒塞氣息不通者 蹄墨散 拂菉湯
治鼻窒塞不通煎治明效 寒水湯 治鼻塞
治酒後熱毒鼻塞身熱利大小腸 治鼻塞

○鼻塞不聞香臭 論一道 方十八方

秋三花丸 菝葜丸 如神膏 防風湯 排風散
天門冬丸 通頂散 百部散 芎藭散 通草膏
瓜蒂散 治鼻塞多年不聞香臭 治鼻不聞香臭
醍醐通氣湯 温肺湯 温衛湯 温衛補血湯
治鼻塞不聞香臭

鼽鼻 論一道 方二十方

羚羊角丸 茯神散 前胡散 芎藭散 山茱萸丸

甘遂丸 赤龍散 通頂散 雄黃散 雄黃丸
細辛散 黃白散 治鼻中瘜肉 又方 塞鼻瓜蒂散
又方二方 辛細散 [illegible]

鼻中生瘜肉 論一道 方四十二方

雄黃散 治瘜肉方 羊肺散 取鼻方 二丁散
消鼻痔 白礬散 白礬散 六龍散 金散
礬石丸 ？翹丸 通草散 吹鼻散
地膽膏 治鼻痔 治鼻中 治鼻中瘜肉壅塞不通 ？門
又方 瓜丁散 地龍散 [illegible]
治鼻中瘜肉不聞香臭 又方二方 八帶膏 地膽汁
雄黃散 治鼻塞 治鼻中瘜肉 又方 導引法 又方
礬黃散 雄黃散 又方二方 鬱金散 治鼻內生瘡 治鼻中瘜肉

鼻痛 論一道 方十四方

五參散 消藥散 羚羊角湯 白鮮皮湯 [illegible]湯
桑白皮湯 治鼻壅塞 治鼻塞眼昏夫痛腦悶 由金方
治鼻氣方 治許食物從鼻中痛入腦中 白芷散 治鼻痛
又傳金藥

鼻淵 論一道 方十六方

川烏散 川芎防風散 [illegible]丸 荊芥散 防風湯
前胡湯 細辛湯 神効[illegible]腦散 蒼耳散 芎藭散
川芎丸 南星飲 治鼻出不止并治腦漏
[illegible]鼻淵 白鼻淵腦湯 川芎茶調散

鼻流清涕 論一道 方十六方

五味子湯 辛夷散 細辛膏 訶梨勒散 細辛散
川椒散 回[illegible]散 芎[illegible]散 甘遂丸 芎藭膏
塞鼻桂膏 杏人膏 [illegible]散 治鼻黃濁汁

治鼻流清涕不止 治寒鼻塞清涕不止

鼻中生瘡 論一道 方十二方

烏犀丸 白蘞湯 升麻湯 辛夷膏
地黃煎 十奇[illegible] 治[illegible] 黃芩石[illegible] 人黃散
又方 又方 治鼻中生瘡 又方 方
杞龜散 [illegible]散 黃蘗散 治鼻中生瘡又治[illegible]
治鼻中瘡出 止鼻共[illegible]瘡

疳䘌蝕鼻生瘡 論一道 方十方

椿根湯 治鼻上赤瘡 如聖散 [illegible]香散 [illegible]金散
白府蟲蝕鼻生瘡 銀[illegible]方 又方 又方
治[illegible]蟲蝕鼻生瘡 治鼻[illegible]

鼻乾 論一道 方六方

神明膏 鼻用散 木通散 天門冬散 桑根白皮散
吹鼻散

鼻齄酒瘡 論一道 方四十八方

硫黃膏 木蘭皮膏 何首烏丸 治紅鼻 梔子丸
冬瓜子散 石[illegible]散 白龍丸 肺風丸 皂角丸
肺風赤鼻 木香膏 治酒瘡鼻 白附子散 治鼻皰
粉黃膏 又方 治酒瘡鼻 治赤鼻及諸般面上風瘡
又方 治酒瘡鼻及婦人鼻上生黑粉刺者 又方
治赤鼻 [illegible]御散 又方 治酒瘡鼻 治鼻赤風
又方 五風散 梔子仁丸 又方
治鼻面酒皶及粉刺 [illegible]瘡鼻方 治鼻中外查瘤膿水血出 又方
若鼻中外查瘤膿血 治鼻中外查瘤膿血出者
治酒查面部生瘡 治酒查鼻神効
治赤鼻 治酒查鼻 [illegible]芥散 赤龍散 越桃散

蓖麻子膏 紫菀散 治鼻面瘡癬起

治酒齄鼻上赤 神效白面瘡

普濟方卷之二十四目錄

普濟方卷之二十四

鼻門

總論

夫肺為五臟華蓋，開竅於鼻，肺和則鼻亦和。肺感風冷則為清涕，為鼽，為息肉，為不聞香臭；肺實熱則為瘡，為癰，為痔，移熱於腦則濁涕不已，謂之鼻淵。又鼻為肺之竅，肺為氣之主，通竅於鼻。鼻者，清氣出入之道路也。陰陽升降，然後平和。一或榮衛不調，為其或七情內擾，六氣外傷，則清濁不分，日久謂之送結。夫血之與氣相隨而行，若臟腑生熱，走於血氣，故熱氣自血妄行，自鼻孔出，謂之鼻衄。則鼻中乾，冷則鼻流清涕，風冷隨氣乘於鼻腦，則津液交滯不能自收，謂之鼻淵。肺為氣所傷，令鼻氣不宣，香臭不聞，於是壅作鼻齆。冷氣停聚血脈，陰致凝，日久延時加壅結，於是變生息肉。或風邪入鼻，搏於正氣，邪正相擊，鼻道不通，則為鼻痛；或痰血壅滯上焦，生熱邪熱之氣留伏不散，則為鼻瘡。是數證者，皆由六氣所傷，其感受之原，因其有寒熱之可辨，故方藥亦隨之，有所寄也。此外更有血瘀一證，鼻頞十臭下部生瘡，鼻衄名為傷衄，名為食衄，方書所載打撲傷損致血壅盛。

[illegible]

○鼻室塞氣息不通

論

夫鼻室塞氣息不通者，以肺虛風寒，其氣壅滯不行，室塞然甚而息不能出入也。義又謂息肉生長，致氣室塞不通，蓋有未嘗生息肉而氣息不通者。蓋肺氣通於鼻，若其臟為冷所傷，故鼻氣不通。所歸也，外令寒結聚於鼻，氣主肉，以其盛者日癰，肉生長，氣息室塞不通也。

方

白鼻散 治肺寒氣息不通

蜀椒湯

[illegible]

桂二錢 [illegible] 山茱萸 [illegible]

[illegible]

右剉如麻豆大每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

一字金散 治肺熱鼻塞 [illegible]

細辛 [illegible] 防風 羌活 [illegible] 桔梗 [illegible]

一錢半分 [illegible] 和劑 二錢 [illegible]

辛夷湯 治肺氣不利頭目昏眩鼻塞聲重咯痰稠粘

辛夷去毛 甘菊花 [illegible] 川芎 前胡

薄荷葉 石膏 白朮 生乾地黃 赤茯苓去皮

陳橘皮去白 甘草炙二兩

右為麤末每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服食後日三服

芎藭散 治外傷風冷鼻塞氣息不通悶悶

芎藭 檳榔 人參 赤茯苓 杏人 [illegible]

[illegible] 白朮 麻黃去根節 肉桂去皮 郁李仁 [illegible]

[illegible]

右為散每服五錢水一大盞生薑三片 [illegible] 煎至七分去滓食後服

通草膏 治鼻塞不聞香臭 [illegible]

白芷 芎藭 通草 當歸 細辛

[illegible] 辛夷 [illegible]

右㕮咀以苦酒漬一宿以不中水豬肪一升煎三上三下以白芷色黃膏成去滓綿裹棗核大內鼻中日 [illegible]

辛夷散 治傷風鼻塞身重

川芎 藁本 甘草 白芷 [illegible] 川芎一兩

細辛 龍腦薄荷 [illegible]

右為細末每服一大錢蔥白茶清調下 [illegible]

人參湯 治肺風上攻鼻塞不通

人參 白茯苓 黃芩 陳橘皮 [illegible]

[illegible]

右麤搗篩每服三錢水一盞半煎至七分去滓食後溫服

人參丸 治肺風上攻鼻塞不通

人參 防風 細辛 黃芩 [illegible]

木通 甘菊花 [illegible]

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十丸 [illegible] 水下日三

當歸膏 治鼻塞不利不聞香臭 [illegible]

當歸 地黃 [illegible] 木通 細辛 [illegible]

芎藭 白芷 [illegible]

右細剉以 [illegible] 入諸藥 [illegible] 三上三下候白芷黃色 [illegible] 膏成 [illegible]

[illegible]

通關散 治 [illegible] 鼻不聞香臭 [illegible]

[illegible] 頭目昏痛 [illegible]

[illegible] 白附子 [illegible] 蒼朮 [illegible]

荊芥穗 [illegible]

右為散每服三錢 [illegible] 溫酒調下不拘時服

宣肺防風通聖散 [illegible] 治肺氣不和鼻不利 [illegible]

桑白皮 桔梗 [illegible] 紫苑 [illegible]

荊芥穗 [illegible] 甘草 [illegible]

右麤末防風通聖散各一兩 [illegible] 每服八錢水一盞半 [illegible] 生薑三片同煎去 [illegible]

[illegible]

補肺杏人湯 治肺虛寒氣 [illegible] 鼻塞氣息不通

杏人 [illegible] 蘇 [illegible] 白蜜 [illegible]

生薑汁 [illegible] 蜜一升

右合和於銀器中微火煎 [illegible] 每服一匙頭溫酒調下食後服

皂莢散 [illegible] 治鼻塞不通

皂莢 [illegible] 細辛 [illegible] 辛夷 [illegible] 蜀椒

附子 [illegible]

右為散 [illegible] 入鼻中 [illegible]

木通丸 [illegible] 治鼻塞 [illegible] 不聞香臭並有息肉及鼻中瘡

木通 [illegible] 細辛 [illegible] 附子 [illegible] 已上各一兩

右為末煉蜜和丸如棗核大每夜綿裹內一丸於鼻中良

菖蒲丸 治鼻塞不通

草亭茄二兩 菖蒲 桑葉 各三 芥末 礬石 各一兩

右為細末煉蜜和丸如棗核大每服一丸時時以絹裹塞鼻

菖蒲散 治鼻窒塞不通不得喘息

菖蒲 皂角 各一兩

右為散每服一錢綿裹塞鼻中 仰臥少時

治鼻中窒塞氣息不通者皆已有効 桂枝若不 不能 辛夷 通利旋復生長宜服此 去

白礬 大膽 地膽

右先搗羅地膽為細散內大膽中 以線繫定三日又六日出時令病人面南向日中庭 入鼻孔向日偃臥 以藥摻入鼻孔中 一日一度至五六日當覺鼻柱痛 此是鼻中息肉欲落 更後三四日 傳之即落取將擲於四通道上 柱落後急以綿塞之慎風

瓜蒂散 治鼻窒塞氣息不通赤治鼻中息肉不聞香臭者

瓜蒂 半兩 即百草霜 為散 每服二錢 溫水調下 冷水亦得

搖葉湯 治鼻窒塞氣息不通

用搖葉一兩 以水三盞煮取二盞 去搖葉 下蔥白一寸 豉一合 更煎 五七沸 去滓分溫二服 不拘時

治鼻窒塞不通 兼治鼻血出方

用小薊一把 水三升 煮取一升 去滓分服 自古人陰令斬取令鼻入 陰囊腫痛恐能作痛 恐不能服者 大薊根汁服之 又一方為末用

調服

通竅湯 治鼻窒塞 感寒邪傷於皮毛 令人鼻塞聲重 咳嗽上喘

黃芪一兩 人參 各半兩 炙甘草 一分 蒼耳子 一分 款冬花

黃連 二錢 升麻 半兩 白芷 二分 黃柏 一分 防風

羌活 二分 蒼朮 七分 蜀椒 去目 五分

右㕮咀 都作一服 水二大盞 煎至一盞 去滓 稍熱服

治鼻塞

用燒麻鞋灰吹鼻中 立通 一名千里馬 即麻鞋也

白蓮湯 治鼻塞不聞香臭 兼治大小腸 水不通

以水於鼻嗅之 取汁服之

治鼻塞 二兩

以乾柿三枚 細切 使末三分之二 以少許黃丹 空心食之

二鼻塞不聞香臭

論

夫鼻者肺之竅也 肺和則鼻能知香臭 若肺有風冷 則鼻氣不利 不知香臭 或生息肉 不知香臭 已見前論 鼻為肺竅 肺氣通於鼻 其氣和 則能知香臭 若風冷傷於肺 肺氣不和 而鼻塞 甚或氣壅 則不知香臭 名曰鼻齆 治宜溫肺散寒 令氣宣暢 其候自愈 此其大略也

方

款冬花丸 治鼻塞不聞香臭

款冬花 檳榔 各一兩 百合 麥門冬 去心 桔梗 炒

天門冬 去心 地骨皮 羚羊角 屑 貝母 大黃 剉炒

青蒿 去苗 山梔子仁 防風 去叉 杏人 去皮尖 炒 各二兩 人參

人參 半兩 郁李人 去皮 炒 一兩 山芋 前胡 去蘆頭 各一兩半

百部 甘草 炙 當歸 各一兩 桑根白皮 剉 旋覆花 各一兩

牛黃 研 木香 各一兩 蛤蚧 酥炙 各一分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸食後溫熟水下

從蓉丸 治頭旋鼻塞不知香臭

肉蓯蓉 酒浸切焙 石鍾乳 研 五味子 菟絲子 酒浸別擣

蛇床子 炒 山芋 兩一 澤瀉 石斛 去根 甘菊花

細辛 去苗 續斷 鹿茸 去毛 酥炙 防風 去叉 秦艽 去苗土

黃耆 剉 乾薑 炮 栢子人 別研 各一兩

右除別研外 搗羅為末 同和勻 煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸 空心溫酒下日再 不飲酒 棗湯下 服藥三日後灸百會穴三七壯 即點

如神膏

如神膏

蓖麻子 去皮 杏人 去皮尖 芎藭 白芷 鹽 防風 去叉

治鼻 蠟 各二兩 油一斤

右先入油於銀器中 次將諸藥作㕮咀散入油中 微火上煎成膏 審去

□□嘉盛年因□又小腦之□一膜

防風湯 治□□鼻塞不聞香臭

防風 梔子 □□ 石膏 一兩 麻黃

桂枝 木通

右搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓空心食後服日二

排風散 治鼻塞不通不聞香臭或生息肉生瘡

防風 秦艽 山芋 吳茱萸

天雄 乾薑 □□

右為散每服二錢空心溫酒調下

天門冬丸 治鼻塞不聞香臭

天門冬 白茯苓

甘草 桔梗 枳實

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸食後茶下日三服以

牛□下

通頂散 治鼻塞不聞香臭

滑石 胡黃連 瓜蒂 麝香 蟾酥 一錢

右同研勻每以少許吹入鼻中即效

百部散 治肺實鼻塞不聞香臭

百部 二兩 款冬花 貝母

右為散每服一錢米飲調下

芎藭散 治鼻塞不聞香臭

芎藭 辛夷 細辛 木通

右為散每以少許綿裹塞鼻中□日易之五七日瘥

通草散 治鼻齆氣息不通不聞香臭并有息肉

通草 細辛 附子 辛夷 一兩

右為末蜜和綿裹少許內鼻中 方□辛夷

瓜蒂散 治鼻塞不聞香臭

瓜蒂 藜蘆

右為散每以一錢綿裹塞鼻中日一易 □綿裹塞鼻中

治鼻塞多年不聞香臭清水出不止用蔥莖汁方

又方 通草 □□ 一把 水二升 取 □□ 使人含口含

飲取一合 □□ 不過 □ 出一兩 □□ 以末□

又一方 □□ 分□

治鼻不聞香臭多年 每用三五日 □□ 香□

用生蔥一味分作三段 □□ 年 □□ 管中 □□

取塞入鼻中令透東方□

麗澤通氣湯 治鼻不聞香臭

羌活 獨活 防風 升麻 葛根

麻黃 川椒 蒼朮 炙甘草

黃芪 白芷

每服 □□ 水二大盞生薑三片棗二枚蔥白三寸同煎至一盞去

滓稍熱□□ 忌一切冷物及風寒 □□ 臥 □ 立

溫肺湯 治鼻不聞香臭 □□ 多 □□

升麻 黃芪 丁香 葛根 羌活

炙甘草 防風根 麻黃

右為粗末作二服水二盞蔥白二根同煎至一盞去滓稍熱食後服

溫衛湯 治鼻不聞香臭目中 □□ 人 □□ 血 □ 多 □ 下

□□多麻□

黃芪 蒼朮 升麻 知母 柴胡

羌活 陳皮 青皮 黃連 木香

人參 炙甘草 白芷 防風 黃柏

澤瀉 當歸身

右都作一服水二盞煎至一盞去滓食前溫服 □□ 服之

溫衛補血湯 治耳鳴鼻不聞香臭口不知五穀味氣不快四

肢困倦不欲行步 □□ 食不下 □□ 咽中 □□ 不

得 □□ 乾 □□ 頭不可回顧 □□ 頭痛

升麻 柴胡 人參 熟甘草 橘皮

桔梗 牡丹皮 蒼朮 王瓜根 吳茱萸

當歸身 生地黃 白朮 黃柏 黃芪

丁香二錢　藁本　桂心三分　桃人三錢　甘草炙

旋花

右㕮咀若作一服各二大錢水一盞半煎去滓食前稍熱服

治鼻塞不聞香臭出聖惠方

取大棗十五枚去皮核蓖麻子三百顆去皮二味和搗綿裹塞鼻

日一度易之　經日聞知香臭

鼽鼻　論

夫鼻和則知香臭矣乃肺之竅也以肺氣通於鼻

因而香臭可知者也然肺藏不和則其竅亦無以窒塞故

為齆鼻此乃內經所謂心肺有病則鼻為之不利者也

冷而寒之邪則鼻氣結滯於竅而塞鼻不通故

不知香臭塞而為齆也

方

羚羊角丸出聖惠方　治鼻齆窒塞不通氣息　五味子

羚羊角屑一兩　通草　漢防己　麥門冬去心　薯蕷

蜀椒　茯神　白鮮皮　人參　羌活

細辛　白芷　當歸　黃耆　防風

旋覆花　枳殼

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每於食後以溫水下三十丸

茯神散　治肺氣壅塞鼻齆不聞香臭

茯神　山芋　人參　赤茯苓　防風

防己　山茱萸　蜀椒　甘菊花

桂心　細辛　芎藭　黃耆　白朮

乾薑　甘草

右為散每服二錢空心溫酒調下日再

貴香散　治齆鼻肺氣四時服食

黃香　人參　防己　桔梗

芍藥　黃芩　生乾地黃　石斛

華苑　白朮　甘草　半夏

赤茯苓

右為散每服一錢溫酒調下如要丸煉蜜丸如梧桐子大每服三十

丸溫酒下

芎藭散　治鼻塞不聞香臭

芎藭　蜀椒　麻黃去節　肉桂　防己

木通　細辛　白芷　石菖蒲　木香

川椒　甘草

右剉每服二錢入生薑三片紫蘇葉七許水煎服

山茱萸丸　治齆鼻

山茱萸　菊花　大黃

甘草　防風　秦艽　羌活

梔子　附子　朴硝　獨活

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心溫水下老人亦宜服

姚服者附子加細辛等分

甘遂丸　治鼻齆及鼻塞不聞香臭

甘遂　通草　細辛　附子等分

右為末以白雄犬膽和為丸如棗核大綿裹內鼻中辛熱涕出四五

升瘥亦治息肉　一方無甘遂有甘草用羊膽汁和丸　一方為末用名

甘遂散　一方無甘遂綿裹少許塞鼻中

赤龍散　治鼻齆大抵鼻者由肺主氣於鼻上若頭面若上焦壅滯風

冷客於頭腦則氣不通令氣停滯搏於津液膿涕結聚則鼻不聞香

臭遂成齆也

龍腦　瓜蒂　黃連　赤小豆

右為細末研勻以菉豆許吹入鼻中出水愈

通頂散　治鼻齆

瓜蒂　藜蘆　皂角

右為末吹少入鼻中

雄黃散　治鼻齆

雄黃　瓜蒂　綠礬　麝香少許

右為細末搐少入鼻中亦治息肉

雄黃丸 治齆鼻
雄黃 一分 甘草 附子
右為末用羊腦中和丸如棗核大以綿裹納鼻中移時出惡物即差
細辛散 治鼻齆不聞香臭宜塞鼻中
細辛 甘草
一方用熊膽和丸
右為散以羊髓中和如棗核大塞鼻中 一方用雄犬膽和丸服之
蜀白散 治鼻齆
瓜蒂 明礬 雄黃 華陰細辛
右為末以雄犬膽汁和丸綿裹塞鼻 一方只末搐入鼻中
白礬散 治鼻中結肉
青封瓜蒂 雄黃 麝香
右為細末時時用少許指甲挑點鼻中肉然後吹藥在上日三用之
又方 治鼻齆
用皂莢為末如小豆大以竹筒吹入鼻中

又方 用乾薑末蜜和塞鼻中吹亦佳亦治衄血
又方 用鐵鏽磨石取末以豬脂和綿裹內之經日肉出瘥
塞鼻瓜蒂散 治鼻齆不聞香臭塞鼻不通
用瓜蒂一分為散以半錢綿裹夜卧塞鼻中旦即去之先以滴入病人伏
面用散及冷水浸王枕上後用藥一方以少許吹鼻中
又方
用瓜蒂為末以豬脂和搓如棗核大綿裹塞鼻中經日
再易之以差為度
又方 以馬新屎汁令滿以灌鼻中
細辛散 治鼻齆不聞香臭
蜀鎮法 治鼻齆如息肉者
右取雄雞腎一對并肉令與七粒並於新瓦上焙

乾研為細末又以豬中和丁香在鼻內出 戒子忌食人雞犬

鼻中生息肉

論

夫鼻者肺之竅鼻和而知香臭風寒客於肺經則鼻氣不利致津液壅
遏血氣搏結附著鼻間生若贅有音謂之鼻息肉

方

雄黃散 治鼻中息肉傳漏
雄黃 細辛 木通 甜瓜蒂 皂莢
白礬 礬石 藁本
一分 白芷 地膽 地榆 巴豆
右為散細末白芷以為度
白鼻淘方
甘遂 明礬 朱砂 雄黃
藜蘆 瓜蒂 雌黃
右為末清傳鼻二藥通

羊肺散 治鼻中息肉氣壅塞不聞香臭
羊肺 一具 白术 乾薑 肉蓯蓉 木通 芎藭
右為散每服一錢米飲調下日二 一方以水調藥灌入鼻中
貫熱細切焙乾為末每服二錢
吹鼻方
金蠍 一个 巴豆 丁香 白丁香
螺螄 一字
右為末用入上件藥和丸如龍眼大用一丸
安鼻內其鼻瘡肉化
二丁散 治鼻中生息肉
丁香 赤小豆 粟米 苦丁香 石膏
右研為細末吹入鼻中鼻不聞香臭亦可吹之或有偏
頭風亦可吹
消鼻痔 北方如可用一方

瓜蒂 甘遂 枯白礬 螺青 草烏尖

右為末用真麻油搜和成劑令硬丸子不可嘴旋丸如小豆大入鼻中令達痔上其痔化為水肉皆爛下每日一次妙

真珠散 治鼻中瘜肉不通

真珠 白礬 枯之 細辛 木通

右為細散每服半錢綿裹內鼻中日二易之 一方無桂心

礬石散 治鼻中息肉不得息

礬石 藜蘆 瓜蒂 附子

右各搗篩合和以小竹管吹藥如小豆許入鼻中 以綿塞鼻中日再以愈為度

赤龍散 治鼻中瘜肉

赤龍爪 苦丁香 苦瓠 薑子

麝香

右為末用紙撚點藥末用之

青金散 治鼻息肉附塞痔

芒硝 青黛 乳香 沒藥

右為細末鼻內嗅之

礬石丸 治鼻生息肉

礬石 木通 細辛 丹砂

右為末如門對糊為丸如小豆大每用一丸綿裹內鼻中一日一易取下息肉則止 一方蜜和丸 一方撚綿如棗核大點藥如小豆許綿

納鼻中

羊躑躅丸 治鼻塞鼻中生瘜肉不通利

羊躑躅花 白礬 礬石 肉蓯蓉

右為細末以青羊脂和綿裹如棗核大內鼻中日夜四五度

新消即差

通草散 治鼻中息肉不通利

通草 礬石 真珠

右為末撚綿如棗核大取藥如小豆著綿內鼻中日三易之 一方有桂心細辛各一兩同前搗末和使之

瓜蒂痔

巴豆 陽起石 石蓮心

右為末每用半字許搐入鼻內又用綿塊子蘸藥塞入鼻中其痔自化爛出

吹鼻散 治鼻中息肉

苦丁香 赤小豆 丁香

右件為末入口內含水以小竹管吹藥入鼻中

地膽膏

生地膽 細辛 白芷

右等分先搗羅白芷細辛為散後地膽壓取汁和成膏用少許塗瘜息肉上取消為度亦單以地膽汁於竹管中當上塗之即自無生

著涌煮汁用之

治鼻痔

白礬 瓜蒂 細辛

右為細末入麝香少許每用一字點在鼻內痔上一日三次不過二日即愈

治鼻痔

明礬一兩 蓖麻七粒 鹽梅 麝香

右為一處入麝香少許搗杵為丸綿子包塞于鼻內令著息肉清水出四邊自然其息肉自下

治鼻中瘜肉漸大氣息不通妨悶

藜蘆 雄黃 雌黃

右同研令勻每用時以蜜調散用紙撚展藥點於瘜肉上每日三度則自消化不得塗藥在兩畔恐多於藥上

又方

細辛 釜底墨

右為末水和服方寸匕

入丁散

至盡不三四日

右等分為末以綿裹如豆許塞鼻中須臾涕出息肉俗謂之鼻痔
痔熱右……吹鼻……以此取効
地龍散 治鼻中息肉
地龍……
右燒灰羅細先以鼻內令人以鉗之傳單少許在內出清水盡即
息肉自除
胡粉膏 治鼻中息肉不通
胡粉炒 白礬
右為末用青羊脂和成膏以少許塗傳息肉上
治鼻中息肉鼻塞
用蚯蚓為末綿裹塞之三日
治鼻中息肉不聞香臭
用礬石末以麵脂和綿裹著鼻中數日息肉隨藥消落
又方
用狗頭骨灰方寸匕苦丁香半錢研細吹鼻中痔化為水一方細辛
以豬脂和點之
又方
或黃柏苦參檳榔等為末以豬脂研傳
又方
或青蒿燒灰存性研傳
瓜蒂膏 治鼻中息肉不聞香臭
用瓜蒂一分為末以羊脂和時以少許傳之一方為末少許吹鼻
中又有加北三四度或以綿裹末塞鼻中
地膽丹 治鼻中息肉不通
用生地膽一枚研汁塗息肉上
傳之
雄黃散 治鼻中息肉
用雄黃五錢 硇砂 膽礬 …… 先過夜露晒收之
臨細研和勻……

治鼻塞不聞香臭
以細辛末少許吹入鼻中
治鼻中息肉鼻塞
用青蒿燒灰和石灰淋汁……
又方
用……十數向竹筒中以刀削去……
中四十九日取出曝乾入麝香少許……為散塗痔肉上當化為水
導引法
……以鼻內氣以右手捻鼻……閉目吐出
除捻鼻兩孔治鼻中息肉
以鼻中息肉耳聾不能食……
又方
用蚕沙……水調之三五日瘥
輕黃散 治鼻中息肉
輕粉一分 杏仁 雄黃 麝香少許
右件四味淨乳鉢內先研杏仁如泥次入輕粉雄黃麝香同研極細勻
合于合定每有患者不問年深日近夜臥用骨簪子或竹簪點藥米
大在鼻中痔肉上隔一日夜臥點一次……見効
雄黃散 治鼻痔
雄黃 北細辛各一錢 麝香少許
右三味為末搐入鼻中
又方
用人中白新瓦上火煅以溫湯調服即止
又方
用好香白芷……入鼻中
蜘蛛金散 治鼻中息肉
蜘蛛 ……
右用水……火煎……焙乾為末
北細辛半兩為末入……
茶子大食後……
治鼻內生息肉

右須京化交　研砂少許　去刺者半錢

皂角炒灰末

治鼻中肉結　右用一二香文　俱內鼻中

○鼻痛

論

夫九竅者六通也，六腑之所瘴矣。以鼻之所竅，肺氣所時以出納，若肺受風邪，與正氣相搏，故氣加之不得宣通，則為出納者塞，是其宜號寒而氣之竅，作無所以乾燥而痛也

方

五參散　治風熱，頭目昏暗，鼻塞不知香臭

人參　沙參　丹參　玄參　苦參

山羊　茯神去木一兩　獨活去蘆　細辛去苗　麻黃去節

木通剉　羚羊角　防風去叉　白鮮皮各一兩

山茱萸　甘菊花　芎藭各二兩

右為散，每服二錢，食後溫酒調下，早晚各一服

普濟方卷一百　鼻門

烏蛇散　治風冷搏於肺臟，上攻於鼻，則令鼻痛

沒藥研一分　烏蛇酒浸去皮骨炙　乾蝎去土炒　天南星炮

雄黃別研　當歸切焙　白附子炮　丹砂別研　牛黃別研

胡黃連　白芷　麝香別研　丁香炒　甘草各

桂去粗皮

右除別研外，等羅為散，再同研勻，每服半錢，溫酒調下，早晚食後臥時

羚羊角湯　治肺風面色乾白，鼻燥塞痛

羚羊角鎊　桂去粗皮　白茯苓去黑皮　細辛去苗葉　麻黃去根節

防風去叉　防己　杏仁去皮尖　麥門冬去心焙

右粗搗篩，每服三錢，水一盞，煎至七分，去滓溫服

百散　治肺受風面色枯白，頰時赤，皮膚乾燥，鼻塞乾痛，虛風

白鮮皮　麥門冬　白茯苓　白芷　桑白皮剉

石膏　細辛去苗葉　杏仁

右粗搗篩，每服三錢，水三盞，煎至七分，三合，取汁一盞，去滓，下藥煎取七分，去滓，早晚食後臨臥溫服

秦艽湯　治因高聲呼喚，令風或冷及寒氣或吹，食熱氣所傷，皆致傷肺，使氣喘促，皮膚風痒，及腹痰逆，漸至鼻乾痛

秦艽去苗土　石膏研　甘草炙　杏根皮　升麻

六甘　杏仁炒　知母　紫蘇葉各二分

右麤搗篩，每服三錢，水一盞，入竹葉，煎至七分，去滓溫服

桑白皮湯　治肺壅氣促，四肢少力，疼，鼻塞乾痛

桑根白皮剉　升麻　甘草炒　秦艽去苗土　大黃剉炒各一兩

石膏研　當歸各三兩

右麤搗篩，每服五錢，水一盞半，入竹葉一合，煎至一盞，去滓，早晚食後臨臥溫服

治鼻藥塞

金蛤蟆　川芎二兩　燈心　麝香

右為末，用紙捻子蘸藥入鼻內，打嚏噴三五遍，俟一二日，依法

治鼻塞鼻痛

用皆莨菪子研，以酢酒半升漬之，夏一日，冬七日，少少內鼻中，一方用童子小便浸之

普濟方卷一百　鼻門　二

油金方　治鼻塞乾痛

用生油一盞，常以雞翎掃塗鼻內外，酥亦得

治鼻乾方

以石亭脂，以紫色為上，紅色次之，黃色可用，先研令極細，丹湯水數點和研半日許，臨臥逐多少，以冷水調勻，用塗之，覺明早洗去，用之半月可絕除根

治鼻食物從鼻中縮入腦中，介介痛不出

以牛脂若羊脂如指頭大，內鼻中，以鼻吸取，脂須臾脂消，則物逐脂俱出也。雁鴨脂亦可用

白芷散　治鼻痛

香人　細辛　白芷　全蝎

右為末麻油

治鼻痛

右以杏仁五箇去皮，置日乾之

入傳金鑑 右用嘉禾香為末令水調塗鼻上夜間用傳免嬉見人也

○鼻淵

論

夫內經謂膽移熱於腦則辛頞鼻淵鼻淵者濁涕下不止也夫膽為清淨之府

每皆蘊於濁故與而不寧令膽移熱也上入於腦則腦系不固而穢者

鬱臭鼻竅下入於鼻其流涕上不已者水之有淵源也治或失時

傳為鼻衄腦目之患

方

川烏散 治腦漏

防風　白附子　北細辛　白茯苓　川烏

蒿本　乾薑　香白芷　川芎　甘草節

右各等分為末每服三錢薄荷葱白湯調下食後服

川芎防風散 治積年鼻淵 此方治此疾多年服一料而愈

川芎　防風　羌活　乾薑　荊芥 已上各一兩

甘草　甘松 各三錢　白芷 半兩

右為末食後酒服不能飲者茶清湯服

雞蘇丸 治腦熱腦漏鼻淵多涕

雞蘇葉　麥門冬　川芎　桑根白皮　黃耆

甘草　生乾地黃 各二兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食後臨卧人參湯下

荊芥散 治肺壅腦熱鼻淵不止

荊芥穗　藿香葉　川芎 二兩　龍腦 一兩　石膏 [illegible]

薄荷根 炒去毛 一兩

右為細末每服三錢食後荊芥湯調下

防風湯 治大人小兒鼻淵腦熱滲下濁涕不止久而成血

防風　人參　黃芩　麥門冬　甘草

川芎 各一兩

右為末每服二錢沸湯調服食後日三服 一方用天門冬代麥門冬

前胡散 治鼻熱鼻衄

前胡　木通　石膏 [illegible]　黃芩 [illegible]　甘草 [illegible]

入傳

右㕮咀每服二錢水一盞煎七分 [illegible] 二十粒 [illegible] 棗大煎至

七分去滓溫服不拘時

細辛湯 治肺虛不足鼻塞多涕咽中有涎而喘項強筋急或痛

細辛　半夏麴　茯苓　桔梗　桂枝

甘草

右為麄末每服四錢水二盞生薑四片蜜半匙同煎至七分溫服日三

神効宣腦散 取黃水鼻中下立効

川鬱金　川芎　青黛　薄荷　小黃米

右為細末每服少許令水噙之

蒼耳散 治鼻流濁涕者名鼻淵

辛夷仁　蒼耳子　白芷　薄荷葉

右並日乾為細末每服二錢用葱茶清食後調服

芎藭散 治腦熱鼻淵多涕

芎藭　薄荷根　石膏　龍腦

右為散每服二錢食後荊芥臘茶清調下

川芎丸 治腦瀉臭穢 服藥後忌一時久執食

草烏　蒼术　川芎

右為細末麵糊為丸如梧桐子食後茶清下十丸

南星飲 治風邪入腦宿冷不消鼻內結硬物室塞腦不宜

濁

用上等大白南星切成片用沸湯蕩兩次焙乾每服二錢棗七箇甘

草少許同煎食後服三四服後其硬物自出腦氣流轉髓濁自收

仍以大蒜葷撥末杵作餅用紗襯炙熱貼顖前熨十次髮達或香附

子葷撥末入鼻中

治鼻淵不已并治腦漏

用藕節川芎焙乾為末每服二錢米飲調下

嗅流鼻涕

用蓖麻 [illegible] 塞之 [illegible] 二更 [illegible] 之不止 [illegible]

治鼻淵腦漏

風虫…

川芎茶調散 …名無附

薄荷八兩 川芎四兩 羌活 甘草各 白芷各二兩

防風一兩半 細辛一兩 荊芥 兩

右為末茶清調服如鼻塞加辛夷

○鼻不入清涕

論

夫五臟化液過熱則乾…鼻流清涕至於不止以肺臟虛寒寒氣上逹故其液不能收制如此且涕泣涎皆寒液也以纖注肺而以尘於肺則口油而甚口鼻乃得言而與室明五臭喜肺為涕…

方

五味子湯 治鼻出清涕

五味子 山茱萸 鹿茸 白朮

附子 甘草 檳榔

乾薑 白豆蔻 木香 丁香各一分

白茯苓三分

右為末每服 錢水一盞…至七分去滓空心溫服

辛夷散 治肺虛風寒濕熱之氣加之鼻內壅塞涕出不已或氣息不通或不聞香臭

辛夷仁 細辛 藁本 升麻 川芎

木通 防風 羌活 甘草 白芷各等分

右為細末每服二錢食後茶清調下 方有蒼耳子…和服

細辛膏 治鼻塞腦冷常有清涕出不已

細辛 蜀椒 乾薑 川芎 吳茱萸

附子 桂心一兩 皂莢 豬膏

右㕮咀以綿裹…取豬膏…以附子色黃為度去滓綿裹

內鼻孔中并摩鼻上 方無桂心

蓽撥散 治…腦風冷…鼻塞…頭目昏疼四肢不利

訶梨勒 … 細辛 前胡各…

木通 附子一兩 … 麻黃 … 甘草

右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分食後溫服

細辛散 治肺傷風冷鼻流清涕頭目疼痛胸膈不利

細辛一兩 附子 白朮 桂心 蔓荊子

芎藭 訶梨勒 枳殼 甘草

右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分去滓食後溫服

川椒散 治清涕

大紅開口川椒 訶子 辣桂

川芎 細辛 淨白朮

右為末每服二錢溫酒調下

白朮散 治鼻流清涕日夜不止昏悶時擾心胸痞悶頭目不利

白朮一兩 丁香 桂心

附子 細辛

乾… 吳茱萸

右為細末每服…食後溫酒下一錢

芎藭散 治鼻中常有清涕…所致

芎藭 通草 辛夷仁 甘遂 細辛 桂心

右為末蜜丸杏子大綿裹納鼻中塞…如麻子…

加大棗…

者亦有…

之夜…

甘遂丸 治鼻多清涕

甘遂一兩 細辛 附子 木通 桂 吳茱萸

右為末蜜丸…

芎藭膏 治鼻塞…

芎藭 細辛 吳茱萸 蜀椒

乾薑炮裂 皂莢去皮子炙
右細剉，以醋浸一宿，次入青脂，以銀器中煎，候至七過，去滓，傾入合中，
澄凝，以綿裹少許，內鼻中。一方有附子一味。
〔塞鼻桂膏〕出聖惠 治鼻常有清涕
桂心　細辛　乾薑炮　川椒去目及閉口者微炒出汗
皂莢一分
右為末，以青羊脂和成膏，每用如棗核大，綿裹塞鼻中。
〔杏人膏〕出聖惠 治鼻久塞清涕不止
杏人湯浸去皮尖雙人　蜀椒去目及閉口者微炒出汗　附子炮裂　細辛各一兩
右細剉，以醋浸一宿，明旦緩火煎之，候附子黃
色，去滓，傾入合中澄凝，以綿裹少許，內鼻中，日三易之。一名塗頂膏
方然蜀椒
〔二黃散〕治鼻痛流臭水，氣腦冷漏下
[illegible]
硫黃　黃丹少　白芷
右等分為末，少許吹鼻中，三五次即愈。

〔灌鼻黃連散〕治鼻塞不通，鼻衄出不止
黃連二兩去鬚　蘆根剉二兩
右細剉，以水一升，煎至一升，取一合灌鼻中，不過再度大效差。
〔治鼻塞清涕不止〕
用白芷末，蔥白搗爛和為丸，小豆大，每服二十丸，茶清下。
〔治鼻風寒清涕不止〕右用白芷一兩，生附子炮，研細，以一錢白末，茶清調下。
○鼻中生瘡
論
夫心肺有病，鼻為之不利。蓋心肺在膈上，肺氣通於鼻，心肺熱，氣上
冲鼻，竅閉塞不能其嗅，乾噪而瘡，甚則成瘡也。惟能取調心火以利肺
經，則瘡自已。〔夫鼻者，肺之候，肺氣通於鼻也。若肺臟不和，為陽否
塞，氣血壅滯，生瘡，遂致上焦生熱，熱攻之，風伏留不散，上攻於鼻，故
令鼻中生瘡也。〕
万

〔烏犀丸〕治鼻中生瘡
烏犀角屑一兩　羚羊角屑一兩　黃連去鬚一兩　貝母煨　知母焙各一兩
麥門冬去心焙一分　天門冬去心焙　甘草炙一分
黃芩　人參各一兩　丹砂研　柴胡去苗各一兩
右除外搗羅為末，入研了藥，研勻，煉蜜和丸，如梧桐子大，
每服二十丸，空心溫酒下。
〔前胡湯〕出聖濟總錄 治鼻中生瘡，咽喉閉塞，乾嘔，頭痛，飲食不下
前胡去蘆頭　升麻　木通剉　黃藥　玄參各一兩
大青各一分　芒硝一兩　麥門冬去心焙各半兩　青竹茹
右麄搗篩，每服三錢，水一盞，煎七分，去滓，溫服，食後臨臥。
〔白鮮皮湯〕治肺風壅熱，鼻中生瘡，喘息促急，時復寒熱
白鮮皮　玄參　葛根剉　白前　大黃剉炒
知母焙　鱉甲醋炙　秦艽去苗土
右麄搗篩，每服三錢，以水一盞，入童子小便少許，同煎至七分，去滓，
溫服，如人行四五里再服。

〔升麻湯〕治鼻乾瘡，生瘡，咽喉不下飲食
升麻　桔梗炒　黃芩去黑心　犀角屑　貝母煨去心
龍腦研各半兩　甘草炙一兩
右麄搗篩，每服三錢，以水一盞，煎至七分，去滓，溫服，不拘時候，日三。
〔辛夷膏〕治鼻中生瘡，疼痛多涕
辛夷一分　白芷半兩　藁本去苗土　甘草　當歸洗切焙
右細剉，以清酒六合，羊髓十二兩，銀石器盛，入上件，三五沸，去滓，傾
入合中，澄凝，以大豆許內鼻中，日夜各一。
〔地黃煎〕治鼻中生瘡痛不止
生地黃汁三合　苦參一兩　醍醐三合　鹽花　生薑汁
右以地黃、生薑汁浸苦參一宿，以醍醐和，於銀石器中煎九上九下，候
汁入醍醐盡，去滓，傾入合中，每以少許滴於瘡上，諸風熱瘡亦宜其塗。
花蜜即下
〔辛夷膏〕出聖濟總錄 治鼻內生瘡，及疼痛，或鼻中窒塞不通，利鼻氣不
宣通，並宜塗用之甚效。

辛夷葉一兩 細辛 木香 木通 香白芷
杏人 各半兩
右用羊髓猪脂各二兩同諸藥和於石器中慢火煎成膏至白芷黃
冷入龍腦麝香各一錢為丸綿裹塞鼻中數日肉消即愈
梔子煎 出聖惠方 治肺氣風熱鼻內生瘡
山梔子 苦參 木通 各三兩
右細剉以四兩酥同煎令香熟去滓候冷入合中每以少許滴入鼻中
礬石煎 治鼻中熱氣生瘡有膿臭并有蟲痛
礬石 一兩 生地黃
右為末以地黃汁半水一盞煎至三合絞去滓少少滴鼻中三五
度瘥
大黃散 出聖惠方 治肺壅鼻中生瘡腫痛
川大黃 黃連 麝香
右為細散研入麝香令勻以生油旋調塗鼻中
又方
杏人 川大黃
右和令勻以猪脂調塗鼻中
又方
黃蘗 檳榔 各等分
右為末以猪脂調傅之
治鼻中生瘡
喰孝子帽以拭之
又方
以牛鼻津傅之
又方
以杏人乳汁和傅之亦燒核壓取油傅之
又方
右燒牛狗骨灰以臘月猪脂和傅之
枇杷葉散 治鼻中生瘡
用枇杷葉不拘多少焙乾為末 散以生油調塗傅之一方無香油

馬鮮紀散 治鼻中生瘡傅鼻
用馬鮮紀一條燒令灰研細羅以少許傅瘡上
黃蘗散 治鼻中熱氣生瘡有膿臭有蟲
用黃蘗二兩去粗皮以冷水浸一兩日絞取濃汁一盞服之
治鼻中生瘡及治疳蟲蝕鼻
用烏牛耳中垢傅之
治鼻中生瘡
以生雞子一顆開頭取白去黃着米醋拌攪勻文武火燉沸起擎下沸定更
煎三度成膏熱塗不過二度瘥
止鼻洪并瘡
以[illegible]錢搗自然汁滴鼻中亦塗瘡上
□瘡蟲蝕鼻生瘡
論
夫五臟皆有蟲蟲傳風則化為蟲入蝕人臟腑經絡皆蟲耳鼻蟲之所舍
塞不傳宣通則瘡蟲因得侵蝕瘡生鼻間
方
松根湯 治瘡蟲蝕人口鼻
松根 切一升 鹽 半合 蔥白
豉 半升
右合和以醋漿水各三升煮十數沸去滓細末一升分作三服有
惡物下即效小兒量大小加減
治鼻上赤瘡
石膏脂 輕粉 雞心檳榔 各一兩 片腦 半錢
右為細末相合用生油調於面上臨臥塗之大有神效
如聖散 治面瘡鼻生瘡及鼻下赤爛
胡粉 半兩 麝香 研一字 甜瓜蒂 七枚為末入麝研勻
右再同研勻用蜂酥少許浸一宿次日取蜂水先和胡粉次同和丸
如菉豆大每用二丸水化傅瘡上鼻下赤爛者塗赤爛處小兒每用
一丸
烏香散 治鼻瘡疼痛鼻柱
草烏頭 炒 麝香 各等分

右同研細以少許貼於瘡上

青金散 治疳蟲蝕鼻生瘡及鼻下赤爛

銅青 白礬 生 各等分

右同研為散每用少許貼瘡上小兒亦可用

治疳蟲蝕鼻生瘡 出十便良方

用燒鐵釘頭以醋淬之數過取醋傅之

鐵精方 治疳蟲蝕人口內并齊(?)作瘡 出千金翼方 急者先灸

鐵精十兩 水三升煎取一升一日二四度洗瘡仍於銅器中煎用

又方 出十便良方

右以繒裹人屎灰夜則着之

又方 出十便良方

右燒牛骨灰末以臘月猪脂和傅之瘥

治疳蟲蝕鼻生瘡 出本草

燒杏核壓取油傅之

治鼻口急疳蝕欲死 用藍澱傅之令遍日十度夜四度立瘥

○鼻乾 論

夫鼻乾無涕者由臟腑壅滯內有積熱攻於上焦之所致也凡肺氣通於鼻主於涕若其臟挾於風熱則津液不通皮毛枯燥兩頰時赤頭痛鼻乾故令無涕也

方

神明膏 出聖惠方 治鼻中乾痛之升摩服

蜀椒 五合 皂莢 黃芩 石南 黃連

[illegible] 桂心 藜蘆 各二銖 白朮 芎藭

大黃 澤瀉 各七銖 烏頭 莽草 續斷

人參 各五銖 半夏 當歸 各十銖 乾地黃 一兩 蔓荊

細辛 各十銖 附子 桔梗 各一銖 乾薑 六銖 戎鹽 二兩

右㕮咀以苦酒一斗漬之再宿臘月豬脂一斤為東南三隅灶內諸藥炊以葦

薪作三聚新好土擁則下置土聚上三沸三下藥成以新布絞

去滓病在外火炙摩之在內溫酒服如棗核日三後稍益以知為度

犀角散 出聖惠方 治肺熱鼻乾無涕心神煩悶

犀角屑 木通 銼 赤茯苓 川升麻 黃芩 各一兩

馬牙硝 杏人 湯浸去皮尖雙人麩炒微黃 麥門冬 一兩半去心焙

朱砂 細研 龍腦 細研 各一分 甘草 炙微赤銼 半兩

右件藥搗細羅為散入研了藥令勻每服以竹葉湯調下一錢

木通散 出聖惠方 治肺臟積熱兩頰時赤皮膚結燥鼻乾無涕頭目多疼

木通 銼 麥門冬 去心 赤茯苓 石膏 一兩 犀角屑 半兩

桑根白皮 一兩 杏人 湯浸去皮尖麩炒微黃 甘草 炙微赤銼 各半兩

白前 一兩

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓食後溫服

天門冬散 治肺壅腦熱鼻乾無涕大腸秘澀眠臥心躁

天門冬 大黃 升麻 桑白皮 枳殼

甘草 荊芥 一兩

右㕮咀每服三錢水一盞半煎至八分去滓分作五服

桑根白皮散 治肺壅積熱上攻鼻乾無涕頭疼心悶

桑根白皮 木通 銼 川大黃 銼碎微炒 甘草 炙赤銼

川升麻 一兩 石膏 二兩 蘆根 各一兩

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓食後溫服

吹鼻散 治鼻乾無涕

龍腦 半錢 馬牙硝 一錢 瓜蒂 十四枚

右同細研每用一豆大吹入鼻中

○鼻皶面瘡 論

夫面生皶者由飲酒熱勢衝面而遇風冷之氣相搏所生也故令鼻面生皶赤皰匝匝然也

方

硫黃膏 專治面瘡鼻皶

生硫黃 香白芷 瓜蔞根 膩粉 已上各半錢

芫青 七箇去翅足 全蝎 一箇 蟬退 五箇去足

右為細末麻油黃蠟約度如合面油法多少於火上取下候凝入諸藥

在內每用少許臨臥先洗淨面油用之近服藥勿令數日間看[illegible]

白牙赤消再服後藥

何首烏 防風 黑豆 藁本 荊芥穗

地骨皮 天仙藤 苦參 赤土

右細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三四十丸食後茶清送下

木通散 治肺毒赤鼻

木通 防風 白芷 木香 牛膝

赤芍藥 獨活 杜衝 當歸 白附子

細辛 芎藭 麝香

右細剉以臘月猪脂一斤微火熬以白芷黃為度濾去滓入麝香攪

令勻瓷合中盛每夜塗之

何首烏丸 治肺風面赤鼻赤

何首烏 防風 黑豆 荊芥穗 地骨皮

桑白皮 天仙藤 苦參 赤土

右為末煉蜜丸如梧桐子每服三四十丸食後茶清下 方見上

醫林撮要 十八

治紅鼻

細辛 硫黃 天仙子 小椒 雄黃 梧[illegible]

三柰子 麝香 輕粉少許

右為細末以油調搽患上

梔子丸 治酒渣鼻及面皰

梔子人 大黃 木通

右為末蜜和丸如梧桐子大每服十丸日三加至十五丸

甘草

冬瓜子散 治鼻面酒皶如麻豆及疼痛搔之黃水出宜服

冬瓜子 梔子人 白茯苓 黃芩

柏子仁 枳實

右為散每於食後以粥飲調下一錢

石膏散 治赤鼻

石膏 當歸 [illegible] 檳榔

右為細末[illegible]

[illegible]先去藥仍以倉耳草五月五日午時採取陰乾用酒

浸九蒸九曝研為末煉蜜丸如梧桐子大每服一丸食後臨臥白湯下日

進三服

白龍丸 治面瘡

川芎 藁本 細辛 甘草 白芷

右各等分為末[illegible]

貼只作一服不半月[illegible]

上項所服龍虎丹方見諸瘡類

肺風丸 治面鼻風瘡

苦參 細辛

右為細末飯和丸如梧桐子大每服五十丸

皂角丸 治飲酒過多鼻赤

皂角 甘草

防風 牛蒡子

右為末入皂莢煎和丸如梧桐子大每於食後茶清下

醫林撮要 二十九

肺風赤鼻

草烏尖 牙皂莢 麝香 大楓油

右為末和勻[illegible]

之一日三次無不效

木香膏 治[illegible]面上風瘡

硫黃 牛蒡 木香

朱粉 杏人

右為末入杏人朱粉硫黃細研令勻以臘日面脂調如稀膏每夜欲

臥時以漿水洗面拭乾以藥塗所患處平明即以溫水洗之

[illegible]以米泔洗了塗藥三五上亦瘥

治酒渣鼻

三硫黃 黃連 白礬 乳香 輕粉

右為末[illegible]

百部子散 治肺臟風毒及酒皶鼻

白附子 細辛 木香 由跋 麝香

右爲末入膏內和勻入磁[illegible]

治鼻[illegible]

蕤仁[illegible]

大[illegible]火收貯[illegible]

[illegible]

右研[illegible]

又方

乳香　砒黃　胭脂　輕粉

右爲細末用水調傳

治鼻瘡[illegible]

黃丹　明礬　銅綠　巴豆[illegible]

右同如餅纔手中暖天放三兩半取下傳入研細生蟲灰蒸鷄

子青調勻看瘡鼻用鷄毛掃在紅處一日一次上藥追出毒物病退

即止次服育風散樺皮散之類五七貼崔子[illegible]

惡瘡才見微腫即須去不免去恐力太猛趙君[illegible]所傳云二娘趙[illegible]

可知潤州時與一詩僧相善而僧患酒瘡鼻頰生赤贅粒大者如

橘小者如梅李下蓋鼻口飲食言語皆妨艱且自厭惡之即有一小

兵事刀鑷人但聞其善取蠹識不知其能治酒瘡也一旦自言於僧

請醫此疾即以藥傳之凡半月餘每日取惡物如浪血自更青出

者甚多其贅從悉戊痂落去鼻面瑩然遂以十千爲謝且語

二鄉得直齋聞而求得其方以傳秀卿治人良驗

治赤鼻及諸般面上風瘡

大風油　草烏頭　輕粉　麝香

右將草烏頭爲末入油內熬令勻取出少時後入輕粉麝香先令碎

細研和得所頻頻用少許以手塗擦患處令熱何日即瘥一方無

輕粉用生薑擦患處傳藥

又方

明礬　治膽乱酒瘡[illegible]

[illegible]

右等分研爲細末以指蘸[illegible]

治面瘡[illegible]鼻上生[illegible]

生硫黃　杏仁　輕粉

右爲細末用餅藥調臥時塗上早則洗去數次能除

又方　治肺風酒查鼻

生硫黃　乳香　白礬

右研如粉每用手指蘸[illegible]動患處以[illegible]之可月餘必愈

治赤鼻

石膏脂　雄黃　白礬

右件等分爲末[illegible]

黃蠟溶取出待冷後和入輕粉和勻香油調傳

救鄉散　治鼻頭赤

鶏心檳榔　硫黃　片腦

右爲細末用絹羅帛包裹時時於鼻上擦揩鼻聞其臭亦可又加草蔴

子肉爲末酥油調臨臥少擦入鼻上臥夜得驗

又方

枇杷葉　山梔子

右爲細末每服二三錢茶酒調下早晨服先去皮臨臥服去毛

勒如神

治酒瘡鼻[illegible]人服之愈[illegible]

凌霄花　山梔子

右等分爲細末每服二錢食後茶調下日進三服　一方[illegible]

[illegible]

治鼻赤風

詩曰

肺風鼻赤最堪憎　我有良方付與伊　但有硫黃爲細末

研汁調塗妙是奇

又方

用白風散何首烏散各五錢一處用茶清或酒　又下苦參丸不拘時

服忠平酒一月

五味散（[illegible]）治酒齄[illegible]

右用小烏沉湯五貼小青黛散五貼和勻以為粉采

梔子仁丸（出本草）治肺熱鼻發赤瘡（俗名酒齄）鼻

用梔子仁不以多少為細末黃蠟為丸如彈子大每服二十丸食後以茶湯任下

又方（出本草）治酒齄鼻

用南番硫石子有如數者水研成膏手指蘸塗甚效

治鼻面酒皶及䵟黯（出仁存方）

用蜀葵花一合研細蠟月豬脂調傳每夜用之

治酒齄鼻方（出直指方）

用白鹽常擦妙

鼻中外瘡膿水血出（出危氏方）

用蓽茇香一兩以大麥麩為末用[illegible]下方寸匕每日三服

又方（出本草）治酒齄瘡鼻赤皰注上面餘者

用鷓子不以多少其殼調塗傳之不以度數用之即瘥

治鼻中外瘡皆膿血

用桃葉灰丸以牙膏貫摘葉取汁洗患處內又瘡中良

治鼻中外瘡皆膿血出者（出直指方）

用取正月鼠頭燒作灰以臘月豬脂傳之瘡上

治面瘡面部生瘡俗呼酒齄鼻

用使君子去皮不以多少用香油一兩浸三五個臨臥時細嚼香油送下

治酒齄鼻神效

用牛黃末水調傳之

治赤鼻

用豬肝一付入[illegible]散一貼如桑白皮同煮肝熟將與單吃心留吃

治酒齄鼻

用刺荊子為末入生薑汁調塗上入麝香輕粉少許為頭首小蕨兒

荊芥散（[illegible]）治肺風瘡疱

疏風調榜大有神效

荊芥穗（四兩） 防風（[illegible]） 白蒺藜（炒去刺） [illegible]

杏仁（去皮） 甘草（炙各半兩） 木香一兩

右件為細末每服二錢青茶調下食後

赤龍散（[illegible]）治肺風[illegible]治鼻生瘡疱

赤土（一兩） 防風 [illegible] 地骨皮 何首烏

當歸 山梔子（[illegible]） 甘草（一兩各）

右件為細末每服二錢白湯調下茶清亦得食後

越桃散（[illegible]）[illegible]風肺風生瘡疱

川芎 [illegible] 防風 [illegible] 甘草 白蒺藜

甘草（[illegible]） 山梔子仁（[illegible]）

右件為細末每服二錢茶清調下食後

蓖麻子膏（[illegible]）治鼻上瘡肺風面赤生瘡并面瘡止瘡

麝香 黃蠟 輕粉 硫黃 蓖麻子（[illegible]）

上五味 麻油一兩

右件為細末將油燒同文武火熬令蠟溶入前件藥末攪成膏子瓶盛

用瓷合子盛之每用少許於患處搽之

紫蘇散（[illegible]）治肺有風熱鼻上瘡疱

紫背浮萍花（半兩） 防風（一兩） 滑石（一錢） 硼砂（[illegible]）

右件先將前三味和勻後入明礬同研如膏子用生絹蘸藥頻頻揩之

治鼻面上皰（出本草）

用雞卵黃一合研以臘月豬脂和每夜傳之

治酒齄風鼻上赤（出本草）

用梔子微炒為末每用一錢匕研明礬一錢同以溫酒調服以知為度

神功治酒齄

枇杷葉（[illegible]）

右用[illegible]拭去毛焙乾為末每服一二錢如茶點日三服

普濟方卷之五十四

考證官 [illegible]
對方乙士 [illegible]
寫書 于喜寺
刊字匠 王和寺

普濟方卷之二十五目錄

口門

論三道　方二十八方

類三類

總論

類

口乾

口臭

脣口面皴

口乾

論一道　方二十二方

葛根湯　杏人散　牛黄丸　乾地黄湯

茯苓湯　麻黄根散　括樓根湯

甘草丸　黄明散　杏仁煎　甘草丸　乾棗杏人丸

含化丸　又方　治口乾除熱下氣方　麥門冬湯

治口乾方　治虛勞口乾　玄明粉　主口乾

口臭

論一道　方五十四方

含香丸　升麻散　五香丸　鷄舌香丸　青黛散

玉香丸　含香丸　豆蔻丸　甘露飲　含香丸 一名丁香丸

治口香去臭方　泥香散　藁本散　七寶散

芎藭散　抵聖散　升麻散　治脾臟蘊熱上熏發為口臭

治口臭方 一名香附丸　又方 一方　細辛散　丁香丸

又方 三方　細辛散　口香去臭方 一名芎藭散

又方　丁香散　治口臭穢　礬石散　治心氣不足口臭

治口三孔　芎藭膏　治口中臭方　又方

生香膏　治口臭方　香薷方　又方 八方

治口瘡　治口瘡及惡心痰壅膈　赤有成膏　鷄蘇丸

脂熱口臭口中如瘡　升麻黄連丸

治口臭　治口氣臭

脣口面皴

論一道　方一方

生地黄煎 一名潤肌膏　治脣面皴　治走行脣口面皴 一名潤肌膏

治冬月脣乾折血出方 八字丸　治緊脣面皴　治脣曆緊方

普濟方卷之二十五目錄 畢

普濟方卷之五十五

口門

總論

夫口者足太陰之經脾之所主五味之所入也蓋五味入口藏於脾胃為之運化津液以養五氣五氣者五臟之氣也五臟之氣偏勝則是為病焉生於口脾熱則口甘肝熱則口酸心熱則口苦腎熱則口鹹肺熱則口辛若脾胃不和則口淡有寒熱之不同虛實之[illegible]而生焉其證各異所謂口之病也若風寒濕熱之氣[illegible]於口也其病不同治療之法各隨其所因而治之

口乾

論

夫手少陰心之經也其氣通於舌足太陰脾之經也其氣通於口腑臟虛熱熱氣乘心脾津液竭燥故令口舌乾燥也診其右手寸口脈名曰氣口以前脈浮為陰手太陰肺之經也其脈虛者病苦少氣不足以息嗌乾無津液故也又右手關上脈浮為陽足少陽膽之經也其脈實者病苦腹中滿飲食不下咽乾燥也

方

葛根湯 治口舌乾燥

葛根 甘草 炙 人參 赤茯苓 黃芪

天門冬 去心 桂 去皮 羚羊角 生乾地黃

芎藭 麻黃 去節 牛黃 地骨皮 麥門冬 去心

右麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

杏人散 治心胸中客熱口乾燥生瘡

杏人 赤茯苓 黃連

天人人 人參 麥門冬 去心 羚羊角

甘草 黃芩 地骨皮 麥門冬 去心

右為散每服一錢入生地黃汁二合水煎至六分去滓每於食後溫服

牛黃丸 治心脾熱口舌乾燥

牛黃 黃連 黃芩

馬牙硝 甘草 犀角 芍藥 梔子人

川大黃 麝香 研 麥門冬 去心 焙

右為末同研令勻鍊蜜和丸如彈子大每於食後及臥時煎竹葉湯化下一丸

乾棗湯 治口舌乾燥

乾棗 去核 貝母 去心 生乾地黃 胡桃穰

牛膝 烏梅 麥門冬 桑根白皮 陳橘皮

右粗擣篩每服五錢匕水一盞半煎一盞去滓溫不拘時

鹿棗丸 治虛勞口乾

酸棗 酸石榴子 烏梅 柏楊實

甘草 炙 麥門冬 覆盆子 葛根

右為末以蜜丸含如棗大以潤為度

茯苓湯 治心熱舌乾煩躁

白茯苓 大黃 升麻 麥門冬 遠志

人參 葛根 甘草 炙

右粗擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

茯苓根散 治風熱口中乾燥舌裂生瘡

茯苓根 牛黃 白殭蠶 白鮮皮 川大黃

枳殼 子芩 胡黃連 雲石

右為細散入牛黃研令勻每服不拘時以竹葉湯調下二錢

甘草丸 治口中熱乾

甘草 人參 半夏 生薑 烏梅肉

右為末蜜丸如彈子大含化咽津日三

栝樓根湯 治口乾舌燥

栝樓根 白薑 桂心 赤石脂 白石脂

右粗擣篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓入胡粉半錢溫服不拘時

甘草丸 治口舌乾燥煩熱

甘草[illegible] 人參[illegible] 烏梅肉[illegible] 麥門冬[illegible]

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服含一丸嚥津

鐵粉 寒水石

黃芪散 治口中乾燥心神煩熱

黃芪 地骨皮 赤茯苓 枳殼 旋覆花

右為散每服二錢生薑[illegible] 日三服不拘時

杏人煎 治口熱舌乾

杏仁[illegible] 生薑汁[illegible] 甘草[illegible] 蜜[illegible]

右先下薑汁杏[illegible]如餳每取一丸如棗顆大含化一散日宜四五丸

甘露丸 治解煩毒及風熱口舌乾燥

寒水石[illegible] 龍腦[illegible]

甘草[illegible]

右為末入乳缽內研令極細用煉蜜和丸如彈子大每服一丸含化後以新汲水磨下半丸

乾棗杏人丸 治口舌乾燥

乾棗肉[illegible] 杏人[illegible] 烏梅肉[illegible] 甘草[illegible]

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸不拘時候含化

含化丸 治[illegible]上焦壅熱口舌乾燥心神煩悶不利宜服

石膏[illegible] 寒水石[illegible]

右以水四大盞煎取一大盞半[illegible]過入蜜同煎令稠丸如雞頭實大常含一丸嚥津

又方 出聖惠方

麥門冬[illegible] 黃[illegible] 棗肉[illegible]

右細剉內瓷瓶中於飯甑上蒸[illegible]取出每服一匙含嚥津一方

右[illegible]口乾[illegible]二升和合任意服

治口乾燥方

石膏[illegible] 蜜[illegible]

右以水三升煮石膏取三升[illegible]再煮取二升去滓含如棗核大嚥汁

麥門冬湯 治口舌乾燥心熱

麥門冬[illegible] 桔梗[illegible]

右㕮咀每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治口乾方

用羊脂若豬脂雞子大擘之內半升酢中漬一宿絞取汁含之

治虛勞口乾

用羊脂如雞子大淳酒半升棗七枚擘合漬七日取棗食之立愈

金明散 治實熱煩渴口乾喜作煩者及乾眠[illegible]之功

用朴硝十斤防風一斤煎水泡[illegible]布攤上鋪[illegible]

卸於[illegible]下露一夜卸取[illegible]

[illegible]入[illegible]內用[illegible]

研為末每一斤用甘草三兩每服一字[illegible]

乾燥作渴者可暑加龍腦子入口噙化

主口乾

以棗[illegible]蜜[illegible]含之

口臭論

夫口臭者由五臟六腑不調壅而之氣上攻胃脇熱[illegible]

[illegible]脾之間而生熱[illegible]發於口故令臭也[illegible]子云[illegible]平一男年二十[illegible]病

口中氣出臭甚[illegible]其音與語[illegible]人曰肺金本主[illegible]

[illegible]火[illegible]如是久則成膿瘍者[illegible]

上宜通之先以茶調散通而去[illegible]之分以[illegible]

而臭止人有口臭且[illegible]世以為[illegible]而[illegible]相[illegible]

方

含香丸 治口臭去穢[illegible]調和臟腑

雞舌香 藿香 甘松[illegible]

桂心 白芷 青桂香 零陵香 木香

香附子 甘草 白檀 丁香 麝香

右為末入麝香研[illegible]和丸如梧桐實大常含一丸嚥津

升麻散 治口氣

川升麻 甘草 藁本 白芷 芎藭

甘松香 百藥煎 丁香

當歸 細辛 地骨皮 東引桃枝

右爲細散 每服一錢 以綿裹含

五香丸 治口臭 脾之候 心肺氣 胃 足爲

脾胃之氣 上出 口故令臭也

丁香 桂心 藿香 木香

檀香 零陵香 甘草 白芷

黃芩 黃連

右爲末 鍊蜜和丸如梧桐子大 每服七丸 下 日二服 加至十丸

雞舌香丸 治口臭去熱毒

雞舌香 藿香 木香 草豆蔻人 白芷

零陵香 甘松香 甘草 當歸

桂心 芎藭 檳榔

右爲末 鍊蜜和丸如雞頭大 綿裹含化嚥津 以差爲度

青金散 治口臭 齒齦腫

青黛 雄黃 苦參 細辛

丹砂 黃芩子 青礬石 白礬石 附子

麝香

右爲散 先以綿拭令淨 後用藥貼之

五香丸 治口及身臭 令香 止煩散氣

豆蔻 丁香 藿香 零陵香 青木香

白芷 桂心 香附子 檳榔 甘松香

當歸

右爲末 蜜和丸 常含一丸如大豆許 咽汁 日三夜一 亦可常含咽之

五日口香 十日體香 二七日衣被香 三七日下風人聞香 四七日

洗手水落地香 五七日把他人手亦香 …

麝香 甘松

含香丸 治口臭 辟除邪惡

零陵香 甘松 沉香 乳香 木香 五兩

草豆蔻人 檳榔 桂 白茯苓 甘草

右爲末 鍊蜜爲丸如小彈子大 臨臥及五更初 含化一丸 下主丹田

能生津液 潤音聲 爽頭目 化痰 … 明目 益智 補虛

勞 除邪氣 久服一生無患

三香丸 治口臭

白豆蔻 草豆蔻 丁香

甘草 人參 赤茯苓 細辛

桂

右爲末 鍊蜜和丸如雞頭大 每服一丸 含化嚥津

甘露飲 治男子婦人小兒 胃中客熱 口臭牙宣 齒齦腫血 目瞼

但飢 不思飲食 或飢煩不欲食 赤腫口舌 咽中有瘡 及瘡疹已發未發

皆可服

熟乾地黃 生乾地黃 枇杷葉 山茵蔯

天門冬 麥門冬 枳殼 黃芩 石斛

甘草

右爲末 每服二錢 水一盞 煎至七分 去滓 食後臨臥溫服 小兒一服

分二服 仍量歲數加減與之 此方得自一名之私 其家用犀角一味

蓋有道理 百發百中 有一僕 患宣口臭 牙齒腐 甚至頓落 予與

二服 飲食服之 不効 右本事方前集內未載此方 得之不易 令

不欲爲之己有 不能廣利一切證 附於此 二明證 有見之必加

噴 一方有犀角 無麥門冬

含香丸 治口氣臭穢 宜常服之

丁香 甘草 芎 細辛

右爲末 蜜丸如 大 臨臥服二丸 一方如梧桐子大 每服不計時

候 煎竹葉湯下二十丸

治口香去臭方

瓜子人 芎藭 藁本 當歸 杜衡

細辛 防風

右各等分 爲細末 食後飲服方寸匕 日三服 五日口香 十日身香 二十日肉

香二十日下香五十日遠聞香一万四日芝十八銖

沉香散

沉香　升麻　白芷　藁本 各二兩　細辛 去苗

丁香 各半兩　寒水石 研二兩

右為散每日早取柳枝咬頭令軟揩藥揩齒達大效後以鹽若令淨

藁本散　治口臭生瘡

藁本 去苗　芎藭 各半兩　細辛 去苗　桂 去皮　當歸 切焙

杏仁 湯浸去皮尖雙仁生用　雄黃 一分研

右為散每用一錢匕傅瘡上日三度

七寶散　治口臭揩齒令香

鍾乳 研　丹砂 研　海水沫 研　白石英 研　真珠末 研

麝香 研　硼砂 研一分各

右為散再研細以柳木篦子咬頭令軟蘸藥揩齒

芎藭散　治心虛熱口臭齒齦腫痛

芎藭　白芷 各一兩　甘草 炙　桂 去皮　杜蘅 去苗

當歸 切焙三分

右為散食前煖酒調下一錢匕日二服三十日體皆香即差

拭聖散　治口臭齒齦腫出血不止

銅綠　膽礬 各一　雄黃 七分　鉛粉 研　鉛丹 半錢

砒霜 一錢

右研勻先以熱水漱口又以一字夾藥抹之涎出吐別用鹽湯漱口

升麻散　治口臭及齒痛

川升麻　細辛　藁本　防風 去蘆　芎藭

甘草 炙各一兩

右為末每用少許揩齒上以手

治狐臊藏器云上焦熱口臭 五十丸

用芎藭不以多少剉小塊子含化咽津

治口臭方

用香附子炒去毛為末每早晚揩少許牙上一方為末一半豬胰為

之一半白湯調下

又方　治口臭

棗肉 一兩　芎藭　白芷　橘皮　桂心 各四兩

右為末以棗肉和丸如大豆許日三服十丸食前食後常

含之忌五辛七日大香

又方

桂心　木蘭皮　沉香 各一兩　芎藭 一兩　陳橘皮 半兩湯浸

右為細散每於食前以溫酒調下一錢

細辛散　治口臭血不止

細辛 去苗　鷄舌香 一兩　菖蒲 三分　乾薑 炮　黃肉 湯浸

右為末每用半錢綿裹如杏仁含嚥津日三日

丁香丸　治口臭

丁香 三錢　甘草 一兩炙　芎藭 二兩　白芷 半兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大綿裹一丸含嚥津

又方　治口臭

桂心　甘草　細辛　橘皮

右等分治下篩以酒服一錢匕瘥

又方

橘皮 二十銖　桂心 十八銖　木蘭皮 一兩　大棗 二十枚

右為下篩酒服方寸匕日三久服身香亦可以棗肉丸服二十丸如

梧桐子大稍加至三十丸一方有芎藭十八銖

又方

芎藭　白芷　陳橘皮 去白各　桂心 各一

右為末以棗肉入少蜜和丸如梧桐子大每於食前以溫

水下二十丸

細辛散　治口臭

細辛　甘草 各等　桂心 一

右為細散每不計時候以熟水調下一錢一方有樓酒服一錢匕瘥

口香去臭方

甘草　白芷　芎藭

右治下篩以酒服方寸匕日三服三十日口香一方為末以綿裹含

藥中羹一方煉蜜丸如彈子大含嚥

又方

大棗　瓜子人　松根白皮

右治下篩以酒服方寸匕日二服一百日衣被香

丁香丸 治口臭

丁香　白薟　香附子

右為散先用指蘸汁以散一錢傅之一方用篦搭齒後用藥

治口臭

甘草　松根皮　瓜子人

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服以熟水下二十丸

石膏散 治口瘡臭

石膏　白薟　麝香少許

右細研為散貼患處日三五上一方用青鹽少許調揩吐出涎為度

治心氣不足口臭

益智子　甘草少許

右為末時服乾嚥熱之更以湯為調服立效

治口氣臭

香白芷　甘草

右為細末食後井花水調下一錢

芎芷膏 治口氣熱臭

香白芷　川芎

右為細末煉蜜丸如雞頭大每服一丸噙化

治口中臭方

桂心　甘草

右為末以三指撮酒服二十日香

又方

藁本

右為末酒服三指撮許

生香膏 治口齒熱臭

右乾甜瓜子去殼一味研細蜜少許調成膏食後含化或傅在齒上

一方空心洗漱訖含一丸如棗核大亦用傅齒

治口臭方

用蜀椒每夜和水研少許唱黑貼齒縫上每夜含之平明暖水洗口

如此三五度差一方用干

香薷方 治口臭

用香薷一把水一斗煎取三升稍稍含之

又方 治口臭

常以月旦日未出時從東壁取步七步回頭面壁立含水噀壁七遍

雞舌香

又方

用細辛豆蔻含之甚良

又方

用濃煮細辛汁含之久乃吐之

又方

用井花水三升正朝含之以口吐廁中良

又方

用熟大豆令焦及熱酢沃取汁含之

又方

用蜜陀僧為末每服一錢用醋半盞調勻漱口

治口瘡

用高脚地調盤馬蹄香赤根蜜稱藥以酒煎取汁雞毛刷取

治口臭及患齒腫痛

出延命

用乾酥飯子搗羅為末蜜和丸如梧子大每日空心中漱口了含

一丸嚼不少許含之在齒上

凡寄食口臭

漱口咽唾不知口苦乾燥以加減瀉白散治之

桑白皮二錢　甘草炙一錢半　炙甘草一錢　知母七分　黄芩五分

五味子二十箇　麥門冬五錢　桔梗

右以㕮咀都作一服水二盞煎至一盞去滓溫服食後每日二服忌酒濕麵及辛辣之物○難經云心主五臭入肺為腥臭此其一也因其散火熱之氣内侵為病故令火剋金以桑白皮地骨皮苦微寒降肺中伏火而補氣故以為君以黄芩知母苦寒治氣腥臭清利肺氣為臣口臭欲食飲之無以(?)酸味五味子之酸寒以收肺氣麥門冬甘苦寒治口臭為佐桔梗辛溫體輕浮治痰逆利咽喉為使已

蘇先生治口臭一方

柴胡二錢　麥門冬　黄芩　阿膠　生地黄各錢

當歸微炒　烏梅去核焙乾　甘草炙　人參各二兩

右三兩同柴胡為末每二錢(?)

右除別研後入外並搗羅為細末拌好蜜二斤先煉三兩沸後下生地黄末不住手攪轉入竹盛出者不過柴胡　阿膠

含化丸　食後含化一丸如彈子大每服二十丸食後熟水下

肺熱口臭口中如膠黏乾欲飲水小便多　出聖濟總錄方

地骨皮　桑白皮　生黄芩　山梔子　馬兜鈴

升麻黄連丸　出東垣試效方　治多食肉人口臭不欲聞其穢惡氣左右不不得近

升麻半兩　黄連去鬚二兩　生甘草三錢　生薑半兩

青皮半兩　黄芩二兩去黑心　白檀二錢　藿香一兩(?)

右同為極細末水浸蒸餅為丸如彈子大每服一丸或二丸細嚼白湯下

治口臭

以梅寒乾生脂含之可以香口

治口氣臭

以雞舌香含之○說郛丁香即雞舌香中年老口臭帝賜雞舌香含之○因其子云雞舌香口氣所以三省故事郎官日含雞舌　三白

香欲其奏事對答其氣芬芳也

口唇口面皴

論

夫唇口面皴者為風冷所襲寒溫不常其皮膚故令皴劈經絡之氣損傷之會皆在于面其脈行上循於口者若血氣實者則澤勁又其性虛受不能傳之表則陰陽間而冷風邪故得風冷而皴劈也陰陽流面又向火外假熱氣動於肌理而乾澀冷之病然也

方

生地黄煎　出聖惠方　治唇面皴

生地黄汁　生天門冬汁　萎蕤

細辛　甘草炙剉　芎藭　白术各一兩

黄耆一兩半　升麻一兩半　生麥門冬去心一兩

右細剉綿裹酒浸一宿以豬脂二斤煎令藥色焦黄棉濾去滓内鐺中後下地黄天門冬汁熬令稠攪勿停手漸稠磁器中盛候冷塗

治唇面皴　出聖惠方

羊脂　朱砂細研　甲煎一合　紫草末各半分

右先將脂於銅鍋中煎之慢火熬消下羊脂次下甲煎紫草末令藥煎三四沸濾去滓以竹筒貯之候凝任意使用也

治逆行唇口面皴　出千金方　名豬脂膏

用豬脂煎以合熟密塗每夜臨睡塗唇及面上或赤路宿臘

唇面不皴

治冬月唇乾坼血出方　出海上方　名桃人膏

用桃人搗爛以豬脂調服　塗上效

治紫唇面皴　出海上方

以馬齒莧汁煎之

治唇緊方

以紫蘇燒灰作末以傅之

普濟方卷之二十五

考論官審理官臣吳

對方譯士臣姚觀等

寫書手臣原等

刊字匠臣徐榕等

普濟方卷之三十六目錄

舌門

論六道　頭舌類
總方　一道
總論
重舌　木舌　舌腫強
舌本縮口噤　舌上出血

○重舌

論一道　方二十四

紅雪煎　石膏散　牛黃散　朴硝散
之涼方　消藥湯　治重舌　治重舌口中涎出方
蒲黃散　治重舌　朴硝散　又方　又方
治重舌木舌　治重舌口中涎出不收
又方　又方　治重舌口中涎出方　杏仁膏
薄荷蜜方　治大人小兒重舌腫起舌下　重舌極驗
半夏湯

普濟方卷三十六　一

○木舌

論一道　方一十八方

大黃散　馬牙硝丸　治脾熱攻心脾致生木舌腫痛
一捻金　治熱毒攻心脾致生木舌腫痛
治木舌腫滿口中氣不得出　治木舌

○舌腫強

論一道　方四十二方

白茯苓湯　射干湯　牛黃散　柴胡散　金沸草散
黃連湯　治心脾壅熱生木舌腫脹　玄參散　牡蠣散
上舌散　柴胡散　蒲黃散　治木舌刺腫大痛
飛黃散　□散　礬石散　犀角散　麝香散
舌腫強方　治舌腫宜此藥方　白草霜散　又蒜散子
治舌腫強滿口方　蒲黃散　治舌腫脹　又方

半夏湯　點掛方　甘草湯　又方　又方
出舌　治狹側舌因牙誤齦破者
治舌根腫痛不可忍者
治舌忽然腫硬遠出塞閉殺人方又血出如湧　名蒲黃散
縮舌方　又方　巴豆方　治舌本腫起
又方　又方　舌縮不語　如神散

○舌本縮口噤

論一道　方一十方

又生　又噤八方　礬石散
龍腦解毒丸
大硼散

○舌上出血

論一道　方二十四方

治舌上黑有數孔大如箸出血　香參丸　乳麝方
寸金散　文蛤散　阿膠散　熟艾方　家雞丸
治舌上出血如箸孔方　聖金散　鬱金散　地黃散

普濟方卷三十六　二

必勝散　治舌破忽出血不止　清心散　黃藥散
治舌上忽出血如箸孔者　治舌上出血如針孔
治舌上出血如箸孔　治舌出血不止
治自行殺割穿斷舌心血出不止　治舌上出血如箸孔方
治舌上出血如泉方　治舌上出血如泉

普濟方卷之三十六目錄　畢

普濟方卷之二十六

舌門

總論

夫舌者心主小腸之候也舌重十兩長七寸廣二寸半[illegible]能
知五味也凡有所啖若多食甜則舌[illegible]而生瘡多食苦則舌[illegible]
外毛焦枯舌[illegible]則舌強[illegible]舌本[illegible]
則舌[illegible]而[illegible]心[illegible]舌[illegible]甘[illegible]
味四合五臟之氣也若[illegible]則舌生瘡[illegible]則舌本[illegible]
[illegible]寒宜[illegible]之故宜[illegible]之不[illegible]不[illegible]舌縮口中[illegible]
亦[illegible]之○舌者心之[illegible]舌[illegible]分[illegible]
分五臟[illegible]入[illegible]脈[illegible]
于舌本凡此三經[illegible]不能言
[illegible]則舌強[illegible]而不得[illegible]則[illegible]

[illegible]如[illegible]有方○舌者心脈之所[illegible]心氣之所生[illegible]
則知味[illegible]脾[illegible]也二臟不和風寒中之則舌強而不能
[illegible]之則舌[illegible]而不得語更有重舌木舌舌腫出血等證
[illegible]熱[illegible]可更有傷寒舌出[illegible]比[illegible]熱攻心也但舌[illegible]
[illegible]因[illegible]有[illegible]攻而[illegible]卻不可[illegible]用[illegible]藥[illegible]
[illegible]已居方所載[illegible]以[illegible]水送下用之多效

○重舌

論

夫大人小兒重舌[illegible]脾有熱故也心候於舌而主血脾之絡脈又
出舌下心火脾土二臟子母也若[illegible]則血氣俱盛其狀附舌下近舌根
[illegible]令舌下血[illegible]如[illegible]之重舌[illegible]於舌是太陰之
[illegible]舌本[illegible]也

方

【紅雪煎】出聖濟總錄　治心脾有熱生重舌

羚羊角[illegible]　升麻　黃芩[illegible]　黃芩[illegible]　芍藥

[illegible]

人參　大黃　竹葉[illegible]　[illegible]
木通[illegible]　山梔子[illegible]　升麻[illegible]　蘇枋木[illegible]　葛根[illegible]
朴硝[illegible]　[illegible]根白皮[illegible]　[illegible]　甘草[illegible]
右除朴硝[illegible]將木香[illegible]香[illegible]如麻豆大以水二斗
五升煎至[illegible]去滓下朴硝[illegible]入[illegible]麝香丹砂
[illegible]麻[illegible]不[illegible]之

【石膏煎】[illegible]治心脾[illegible]生重舌[illegible]
[illegible]每服一錢[illegible]良[illegible]

石膏[illegible]　寒水石[illegible]　升麻[illegible]　犀角[illegible]
黃芩[illegible]　[illegible]　梔子[illegible]　黃連[illegible]

[illegible]　馬牙硝[illegible]
右先將石膏[illegible]寒水石[illegible]用水三斗[illegible]入金十兩無金入銀十兩
亦得先煎金石藥汁至一斗[illegible]次入犀角[illegible]
再煎至七升去滓再煎先下[illegible]
[illegible]新汲水[illegible]一兩已[illegible]服一錢用新汲水調下大人小
兒以意加減服

【牛黃散】出聖濟總錄　治重舌
黃芩　人參各半兩　白茯苓[illegible]　大黃[illegible]
[illegible]　甘草[illegible]　丹砂[illegible]　麝香[illegible]
右[illegible]散每服半錢[illegible]水調下[illegible]加至一錢食後服

【朴硝散】出聖濟總錄　治重舌及天行[illegible]黃丹石[illegible]動一切風毒
朴硝[illegible]　麝香[illegible]　黃芩[illegible]　山梔子[illegible]
甘草[illegible]　[illegible]葉[illegible]　[illegible]
右[illegible]五味如[illegible]豆大入[illegible]研末二大[illegible]以新汲水三升將藥入[illegible]中[illegible]
[illegible]去[illegible]重舌[illegible]後[illegible]
[illegible]慢火[illegible]去火[illegible]以[illegible]在水中[illegible]
[illegible]口[illegible]至明日[illegible]如金色研如細散每服
半錢冷水調[illegible]津[illegible]

【牛黃散】出聖濟總錄　治重舌口中[illegible]不收
牛黃[illegible]　龍腦[illegible]　朱砂[illegible]　太陰玄精石一兩

右四味為散每服半錢先於重舌上以鈹針刺出血用塩湯
漱口然後以藥傅於舌上治重舌神效

芝蔽方 出聖惠方治重舌或木舌

乾姜　蒲黃

右等分為末以竹瀝調塗舌上宋孝宗舌腫御醫
不愈一醫以此藥口不以令御醫進此方立効因此知為

黃藥湯 治舌腫及重舌

黃藥　甘草炙各等分

右麁末每服二錢水一盞煎至七分去滓食後溫服

治重舌

黃蘗　竹瀝浸之

右以竹瀝浸黃蘗點舌上下時時點舌上下佳

治重舌口中涎出方 出聖惠方

鍾乳 半兩　硝砂 一分

右相和煎至半升不計時候服半盞

黃散 出危氏方 治重舌上腫疼痛不能言口中流涎

用新蒲黃細研傅之又傅之立愈
上治小兒重舌用黃蘗竹瀝漬點之治舌腫傳舌上不過數
舌大腫急氣欲塞絕此方立七傳即愈一方以蒲黃末傅之

治重舌 出經驗良方

用竹瀝浸黃蘗時時點舌上

朴硝散 出經驗 治重舌喉痺

用朴硝研細傳重舌上竹筒吹入喉中即破吐涎而愈
甚者不過兩次

又方 出經驗良方

用五靈脂一兩去砂石為細末用米醋一大碗煎逐旋含漱口即
安

又方 出經驗良方

用皂角四五莖不蛀者去皮弦炙令乾燒灰存性入荊芥穗少許二
味為細末以醋調塗舌頰車即消

治重舌木舌 出良方

用川烏尖生研為末米醋調塗舌下實即効木舌須先服蕩金散隨
散

治重舌口中涎出不收 出聖惠方

用蛇蛻燒為灰細研以溫酒調下一錢

又方 出聖惠方

用伏龍肝研為末以牛蒡汁調塗之効

又方 出聖惠方

用蛇蛻燒灰研令細以少許傳之効一方治小兒重舌燒蛇皮灰為
末塗和塗舌上

治重舌口中涎出方 出聖惠方

右用田中蚯蚓燒灰細研以好酒和傳舌上立愈

杏仁膏 出聖惠方 治口舌生瘡乾燥舌上生瘡語不真

杏仁 去皮　甘草 炙各一兩　黑豆 半升去皮

右為細末入白蜜五合生地黃汁五合慢火熬成膏丸如雞頭大
含一丸徐徐嚥津舌上生瘡立用冷水浸之

薄荷蜜 出危氏方 治舌生白胎乾澀語話不真

白蜜　薄荷自然汁 各等分

右以生薑片先蘸水揩洗後用朱砂雄黃硼砂為末
以蜜調塗一方先以生薑蘸水揩洗用蜜調塗
服之

治大人小兒重舌腫起舌下 出經驗方

用地龍和薄荷研以帛包於舌一時

重舌極驗 出經驗方

用指甲先於舌下紫上將手指入如此二次又用指頭
水取兩傍小便中助入如此二次

收氣湯 即病去哭

半夏湯 治重舌 出口

右用半夏二十枚水煮過再於水中包片時冷熱用好酒一升漬
密封良久以酒熱含冷即吐又含熱者以盡為度

中服此至差此解和而得居湧人為邪氣[illegible]汗則俗而為病若傷寒若
血若痰若水若風若寒若暑若濕[illegible]表實令熱虛實各有受病之証
用藥之法必先其[illegible]而後可以起病否則[illegible]不知先[illegible]
惜棄雖異一人服之[illegible]可以人試役[illegible]一方用[illegible]
歸荊湯 [illegible]治風痓[illegible]產後中痓通用
當歸 荊芥穗各等分
右為末每二錢水一盞酒少許煎七分[illegible]
羽蘭藥入口或用童便調下[illegible]
〇風角弓反張
論
大率角弓反張之世[illegible]不能[illegible]也由風邪客於[illegible]之經[illegible]
相[illegible]肢體[illegible]背反折如弓之形也
方
天麻丸 [illegible] 治中風角弓反張口噤不語四肢搐急身背強
攻注手足頑麻一切急風
天麻 白附子炮裂 附子炮[illegible] 牛膝[illegible] 白僵蠶炒
羌活 獨活 羚羊角屑 防風 天南星炮裂
蟬蛻 硃砂 [illegible] 麝香 乾蝎炒
[illegible] 膩粉
右為末入研了藥令勻煉蜜和搗三二百杵丸如雞頭實大每服
以竹葉[illegible]薄荷汁各少許入熱酒二合相和研下一丸不計時候頻
服 一方無薄荷汁
犀角散 [illegible]治風中角弓反張心神煩亂口噤不語
犀角屑 麻黃 羌活 附子炮裂 杏仁[illegible]
人參 防風 生薑 白术 人參
芎藭 白茯苓 甘草 當歸 石膏二兩
甘草炙各半兩
右搗羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓入竹
瀝一合更煎一兩沸不計時候溫服
龍精丸 [illegible]治中風身如角弓反張不語昏悶

以[illegible]吐出[illegible]
舌[illegible] 論
夫舌乃[illegible]為心之經也[illegible]太陰[illegible]其氣[illegible]
之脈[illegible]大[illegible]入[illegible]舌本[illegible]即隨[illegible]
[illegible]於心血氣[illegible]故舌[illegible]則[illegible]舌[illegible]
脈使[illegible]舌本[illegible]下心[illegible]
熱[illegible]如之則腫[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
日[illegible]
[illegible]
以大[illegible]何[illegible]也
方
白茯苓湯 [illegible]治舌強
白茯苓去皮 牛黃研各三分 犀角屑三分 甘草炙
人參 羚羊角屑 白朮 桂去粗皮
麥[illegible] 生乾地黃焙各半兩
右[illegible]服三錢以水一盞煎至七分去滓溫服日三
射干散 [illegible]治木舌[illegible]及天行病[illegible]石[illegible]一切熱毒
射干 木通剉 大黃剉炒 馬牙硝各一兩 [illegible]
升麻 當歸 桂去粗皮 甘草炙各一兩
右[illegible]每服五錢以水一盞半煎至八分去滓分溫二服日三夜一
牛黃散 [illegible]治舌[illegible]
牛黃[illegible] [illegible] 甘草[illegible] 人參[illegible] 羚羊角屑
生乾地黃 牛蒡子微炒 [illegible]各一兩 犀角屑一分
右為散入牛黃研令勻每服三錢水一中盞煎至六分和滓不計
時候溫服
柴胡散 [illegible]治[illegible]中熱舌本強[illegible]
食不得

柴胡去苗 川升麻 梔子仁 赤芍藥 木通各一兩剉
黃芩 人參 杏人去皮尖 寒水石 一兩
右為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至五分去滓於食後溫服
金沸草散 治風寒傷於心脾令人憎寒發熱齒浮舌腫
荊芥穗四兩 旋覆花 前胡 麻黃去節各三兩 甘草半兩炙
赤芍藥 半夏湯洗七次各一兩
右剉散每服四大錢水一盞半薑三片棗二枚煎七分去滓熱口吐
一半吃一半 此加杏仁五味子治咳嗽
舌腫牙疼 有人患舌腫如吹滿口其中刺草不
入 其 為大 以熱 之即愈
黃連湯 治傷寒舌腫
黃連去鬚 大黃各半兩 大青 升麻 黃芩各半兩
甘草炙半分
右麁搗篩每服五錢匕水一盞煎至六分去滓
服病未退每服更加芒硝末半錢匕以微利為度

七

治心脾壅熱生舌腫脹
玄參 升麻 大黃 犀角屑各一分 甘草半兩
右為末每服三錢水一盞煎五分溫服
牡蠣散 治舌腫不能轉
牡蠣 伏龍肝 附子 白礬各半兩
右為散以酒和如泥一錢塗舌下吐津
正舌散 治中風舌本強語言不正神妙
蝎梢去毒一分 茯神木 龍腦薄荷二兩
右為細末每服二錢溫酒調下或以擦牙頰間亦得
柴胡散 治舌本強兩邊痛
柴胡去苗 升麻各二兩 梔子仁半兩
右為散每服一錢匕熟水調下日三
蒲黃散 治舌血出
蒲黃 海螵蛸各等分
右為細末每用少許生舌上

治大舌出硬大腫口舌不急治即殺人方
大蒼耳 竹瀝
右件以竹瀝和之時時滴入口中
飛礬散
白礬 百草霜各等分
右為末用自然水調口之效
二聖散 治舌根腫硬咽喉不利
紅芍藥 甘草各等分
右以細銼每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服仍之
碧石散 治舌強不能言語
白礬 桂心
右為散每用一錢匕以安舌下立瘥
鹿角散
右細研為散以水二盞煎十餘沸去滓熱含冷吐以差為度

八

麝香散 治舌腫不語
麝香 皂莢各半兩
右為散每用半錢擦舌腫上吐津
舌腫方
地 金各等分
右為末少許傳之
治舌暴腫宜擦藥方
蒲黃 半夏各等分
右為散擦在舌上以差為度
百草霜散 治舌腫起如豬胞方
用釜下墨末以醋調傳舌下
才多傳之
舌下
舌頭上
一方

舌上生瘡

治舌腫滿口方

蒲黃口含細嚼少許 頻頻 退即止

蒲黃膏 治舌腫滿口不能 [illegible]

用蒲黃細末 乾摻舌上 [illegible] 研碎 [illegible] 少許 [illegible]

舌口腫脹

用好蜘蛛 [illegible] 土 [illegible] 半 [illegible] 腫 [illegible] 少許 即是

又方

用蛇蛻一枚焙乾燒為末傳舌上有涎吐之

半夏酒 治舌腫滿口氣不通 [illegible] 令人 [illegible] 以手 [illegible] 刺 [illegible] 去惡血

亦可用鍼刺 [illegible] 人用此方

用半夏十二枚以酒一升煮取八合 [illegible] 熱含 [illegible] 吐 [illegible] 動人

傷 [illegible] 以薑汁解之 [illegible] 方 [illegible] 針 [illegible] 取出 [illegible] 之

蛇蛻方 治舌腫滿塞喉欲死

用蛇蛻 [illegible] 以少許 [illegible] 燒為末以 [illegible] 咽喉舌上 [illegible] 消

[illegible] 治舌卒腫起滿口塞喉氣息不通頃刻殺人以針決舌下兩邊第一大脈出血以鐵 [illegible] 燒 [illegible] 令赤 [illegible] 烙 [illegible] 令血絶

用蒲黃末 [illegible] 多少 [illegible] 煎湯熱含 [illegible]

又方 治大人小兒重舌腫起舌下

用朴硝研末敷 [illegible] 者 [illegible] 出 [illegible]

又方

用地龍和 [illegible] 研汁 [illegible] 舌下腫者

治舌

用蓖麻葉 [illegible] 舌下令 [illegible] 出目黃 [illegible] 腫

治跌倒舌因牙缺 [illegible] 破者

用生姜 [illegible] 片貼之

治舌根腫痛不可忍者

用 [illegible] 加 [illegible] 梔子用水二 [illegible] 煎至一盞去 [illegible] 服之立効

舌 [illegible] 熱 [illegible] 腫 [illegible] 名 [illegible] 散

用烏賊魚骨 [illegible] 等分為末每用少許塗舌上 [illegible] 用 [illegible]

治舌 [illegible] 舌腫 [illegible] 許 [illegible] 心 [illegible] 數 [illegible]

[illegible] 上 [illegible]

又方

用草麻 [illegible] 三四十粒 [illegible] 研 [illegible] 紙上 [illegible] 上 [illegible] 一條

[illegible] 舌上 [illegible] 又 [illegible] 取 [illegible] 用 [illegible] 愈 [illegible]

[illegible] 舌出 [illegible] 黃 [illegible] 草麻子燒 [illegible] 其舌竟入

巴豆方 [illegible] 治傷寒 [illegible] 不能 [illegible] 舌出不收者

用巴豆一粒去油取霜用紙捲之 [illegible] 鼻中其舌即收

舌卒腫起 如吹 [illegible] 如 [illegible] 形 [illegible] 塞 [illegible] 得通須臾不治

殺人 [illegible] 以指刺破舌兩邊 [illegible] 出 [illegible] 可以 [illegible] 破 [illegible]

[illegible] 之

又方

以舌下 [illegible] 大脈 [illegible] 出 [illegible] 使 [illegible] 血出下上 殺人 如上治

不 [illegible] 或 [illegible] 出 [illegible] 則 [illegible] 敷之以絶 [illegible] 也

又方 治舌忽然腫破

用 [illegible] 下 [illegible] 和 [illegible] 舌上下 [illegible] 當安

舌腫不消 [illegible]

用白礬桂心 [illegible] 之 [illegible] 舌 [illegible] 上 [illegible] 和 [illegible] 為末 [illegible] 之

赤小豆 [illegible]

如神散 [illegible] 治舌腫強 [illegible] 不消

[illegible] 青鹽 [illegible]

右件每用 [illegible] 一錢 [illegible] 用水一盞半煎至八分去滓熱 [illegible] 之

[illegible] 盡為度

舌本縮口噤

論

夫心 [illegible] 若 [illegible] 脾 [illegible] 腎 [illegible] 此五味 [illegible] 令五臟之氣也若

臟熱則生瘡 [illegible] 若 [illegible] 寒則舌本縮而口噤 [illegible] 寒宜補之熱

瀉之不寒不熱依 [illegible] 調之

方

[illegible] 治舌小 [illegible] 舌本縮口噤 [illegible] 青

滑石　芎藭　石膏各壹兩　天雄　防風
細辛　桂心各二　茯苓　黃芩十兩　栝樓三兩
右以水五升煎取一升去滓以竹瀝微火煎之去滓青紙[illegible]
數數許口含於一處之取瘥日三夜再易之
天生艾葉傳法
凡生艾葉者取乾者搗之以水四一升煎以帛蘸之塞於舌上裹之
龍石散 治大人小兒上焦壅熱口舌生瘡咽喉腫塞或時悶每用少許
擦貼患處咽津小兒[illegible]以蜜一丸入口吞化用兩　以氣[illegible]
用以藥承之動
朱砂[illegible]　[illegible]　生[illegible]子研
右為末每日三次用[illegible]
吹喉散 治三焦大熱口舌生瘡咽喉腫塞[illegible]
蒲黃一兩　盆硝一兩　青黛一兩
右用[illegible]荷汁一升拌盆硝青黛[illegible]
細研用一字或半錢摻於口內[illegible]或咽中腫痛用
簡子入藥[illegible]許用力吹之無不立效一[illegible]
舌上出血
論
夫心主血在竅為舌若心臟有熱則血得熱而妄行亦溢於心之竅故有
舌上出血之證甚者出如湧泉
治舌上忽有數孔大如簪出血如湧泉此心臟病方
戎鹽　黃芩一作黃芩子　黃蘗　大黃　人參
桂心　甘草各二兩
右為末蜜丸如梧子大以飲服十丸日三亦燒鐵烙之
香參丸 治心臟熱舌上出血
人參　赤茯苓　麥門冬去心焙　當歸切焙各等分
甘草　生乾地黃焙各兩
右為末煉蜜丸小彈子大每服一丸細嚼化下日三四服
升麻湯 治心臟有熱舌上血如湧泉

升麻剉　茅根剉　小薊根剉各一　艾葉去梗　[illegible]水石各三兩
右粗搗篩每服三錢匕水一盞同煎至七分入生地黃汁一合更煎一二
沸去滓溫服
寸金散 治心經煩熱血妄行舌上血出不止
新蒲黃三錢　新白麵二錢　牛黃研　龍腦研各半錢
右研極細生藕汁調下一錢匕食後臨臥服日二
文蛤散 治熱壅舌上出血如泉方
五倍子　白膠香　牡蠣粉各等分
右為末每用少許摻[illegible]或燒灰亦妙[illegible]
阿膠散 治舌上血出不止
阿膠炒　蒲黃　黃芩各一兩
右為細末每服一錢匕生地黃汁調下併二服
熱艾湯 治心經蘊熱舌上血出及鼻衄大衄
熟艾[illegible]　[illegible]　[illegible]
右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候
[illegible]丸 治舌上出血竅如針孔
[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]
右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服一丸水七分一盞化開[illegible]至五分溫服
止血[illegible]每服一匕[illegible]
治舌上血如箸孔方
黃連[illegible]　黃蘗三兩　梔子[illegible]
右以酒二升漬一宿[illegible]二沸[illegible]服
聖金散 治舌上忽然血出不止
黃藥子一兩　青黛[illegible]
右為細末每服一錢匕食後新汲水調下日二服
蒲金散 治心臟積熱血脈壅盛舌上血出
蒲黃一兩　當歸[illegible]
右為末每服一錢匕[illegible]
地黃散 治舌出血如簪孔者
生乾地黃[illegible]　鹿角膠[illegible]

右為散每服二錢匕食後糯米飲調下
以醋散 又方治舌腫
真蒲黃 黃連
右為末每用少許敷舌上以溫水漱之
治舌上出血 用木賊煎湯漱之
清心散 治舌上出血
用香附 麩炒研 以溫酒調下
一二錢匕 治舌大
黃藥散 治心脾熱壅舌上出血
用黃藥 二兩 青黛 一分 右為散每服二錢匕溫糯米飲調下
治舌上出血如溝 出聖惠方
用倉蒲汁一升日三服 一方 研如泥塗即止 一方作香茂
治舌上出血如針孔 三聖惠方
用蒲黃三錢水一盞煎之 治舌出血 一日三服 一方用鼓 合水 煎灌
肝臟壅熱治下血
治舌上出血如針孔 出聖惠方
用赤小豆一升杵碎水三升和攪取汁飲之 又用馬蘭和塗舌上
治舌出血不止 故出血仍有小竅此為舌衄 出良方
用槐花為末摻舌上
治舌衄 右斷舌心血出不止
以米醋調釜墨敷 止 仍用黃芩煎湯
少許研為細末 摻舌上
治舌上出血如簪孔方
用巴豆一枚 作膏 貼之 以綿裹 貼眉間 即止之
治舌上出血如泉 方
以烙鐵篦烙之中良
治舌上出血如泉
用文蛤瓊 肯故 煙 炒末 以之 飲 腦 搽 其孔

普濟方卷之二十六

咽喉門 論一十五道 類一十四類
方九百一十八方 去二道

喉痹　咽喉生瘡
咽喉　咽喉
喉中如有物妨悶
咽喉腫痛　語聲不出
咽喉不利　骨鯁
咽喉生瘡
咽喉生瘡
咽喉壅塞
咽乾
誤吞諸物

喉痹
論一道 方三百方
去一道

峰雪散　菖蒲湯　玳喉風　治喉嚨痛及喉痹
治喉痹腫痛　治喉痹　又方　開關利喉透來雪
奪命無憂散　龍腦散　利咽湯　生犀丸
龍腦丸　治纏喉風腫痛　大聖分散　金肖丸
天門冬丸　橘皮湯　仙方奪命丹　木通散　治喉痹咽喉腫痛
咽喉中延　開喉閉　搖合風　龍腦破毒散　生鈞丸
射干湯　除根湯　如聖勝金錠　治喉痹腫痛　如聖勝金錠
射干丸　七聖散　治喉痹急痛咽閉不通方　黃芩湯
如神散　鵬砂散　金鎖匙　南星防風散　二砂丸
牛角湯　玉屑丸　牛角散　碧雪　治咽喉堵痰
通氣湯　又開喉閉方　宣利方　治咽喉腫痛堵塞不通
治喉閉及喉中水穀　治喉痹　治喉痹　一字散
治急喉痹　烏頭散　如聖丸　治馬喉痹頰咽痛
一拈金散　治咽喉痛　奪命散　龍腦散　消毒寬喉散
銅青丸　牛膽青散　纏喉散　白梅丸
麝香散　治喉痹咽喉孔　治喉痹孔喉風
瓜青散　烏龍膏　又方　奪命朝頂散　王鑰匙

雄黃散　玄參丸　開關散　八龍針散　治喉痺方
四聖散　如聖湯　龍腦丹　治喉閉方
治喉痺咽喉腫痛　一捻金散　如聖丸　又方
通氣補肺一切痺　吹喉散　地龍膏　一捻金散
治喉痺治喉風　治急喉痺　半夏桂甘湯　山豆根方
又喉閉方　解毒雄黃丸　又吹喉針丸　比金丸　胡黃連散
賊水石散　奪命散　治口喉風　又方　白礬散
馬牙硝散　硼砂散　治咽喉　治喉中毒百發百中又咽喉一切疾
治喉痺　又方　保安散　去涎方
千金療喉痺諸炎方　金鎖匙　三聖膏　治喉風
治咽喉生瘡　吹喉散　治喉痺方　礬硝散
治急喉腫閉　五香丸　一字散　鹽香散　治急喉閉
治走馬喉閉　治咽喉風　又方　二聖散　燒香散
神効散　治喉痺方　塞鼻　治喉痺方　硬方
急喉痺急疾以吹藥不入方　升麻散　治喉痺立効方

治咽喉牙關緊閉　治飲食不入欲死者　治咽喉不得用針者
開關利膈　剝汁方　壷塞丸　又方　治喉閉卒不得語方
又方　又方　治喉痺腫　又方　治走馬咽痺
又方　治纏喉風　治喉風牙關乳蛾　急治喉風
治喉痺方　又方　治纏喉風　又方　一方
又方　治喉閉　吐涎散　治纏喉風　治喉閉
又方　喉痺散　治喉閉卒不語　治急喉風喉閉纏喉風
治喉痺　纏喉風咽中氣不得出　金銀頭子　追涎散
咽閉方　治熱閉方　治喉痺　治咽喉閉塞　萬根丸方
治喉風壅塞不通方　治喉閉纏喉風方一名奪命散
治急喉閉逡巡不救者　治喉痺方　治咽喉風及喉痺
治喉痺咽喉疾病卒不通　治尺寸喉痺方　治喉痺卒不語方
治喉痺及咽喉腫痛口瘡方　朴硝方　治纏喉風方　紫苑方
治喉痺　治喉痺方　治卒喉痺飲食不通　杏仁方
治喉痺　半夏散　治咽喉痺卒不語方　治熱喉痺并蠱毒方

治急喉閉方　如聖丸　治急喉痺方　治喉痺方
又方　治喉痺水漿不入方　射干方　又方
青艾方　治喉痺卒去　治喉風　又方　治咽喉
治喉閉方　治聖餅　救生丸　治喉痺　又方
一方　奪命丹　奪命丹　喉痺頭邪氣惡毒入腹
治喉痺卒不得語方　丈仲奉喝喉舌濃方　又方
治急喉痺咽喉舌者方　又方　治喉痺喉風　又方
治咽喉痺　又方　治喉卒入毒氣　治喉痺卒不得語
含香丸　治急喉塞閉方　又方　奪命散
白礬散　奪命湯　治急喉閉及喉風　吹藥散
朴硝散　解毒五香散　一字散　治喉痺纏喉風　一點雪
治喉閉　治急喉閉口不得者　牙硝散　又方
治喉痺咽喉塞　治喉痺　治咽喉痺又名朴蛇痺
治朴蛇痺　又方　治走馬喉痺　治卒喉痺　又方
治痺已死者有餘氣　治急喉閉氣欲絶　絳雪治喉閉

治喉痺方　又方　奪命丹　青金丸　烏龍膏
犀角散　獨附散　又方　防風立効散　治人種喉氣不來
一捻金散　佛用神効方　治喉風　治喉閉　治急喉閉
治喉痺　又方　治喉痺　刺喉咽去喉痺　治喉痺
治喉痺及咽喉生瘡　治喉痺　又方　又方
治纏喉風　治喉中但物　治喉痺　治喉痺腫脹　治喉痺咽喉塞
治纏喉風咽中如寒氣不通　導引法

咽喉生瘡論 一道

方二十五方

天門冬煎　治風散　治懸癰咽中生息肉舌腫　射干湯
治懸癰腫痛咽閉不利　玄參散　破毒妙方　喉痺刺方
治懸癰垂長咽中妨悶　咽喉中懸癰垂長咽中妨悶　啄閉散
馬牙硝散　又方　治懸癰腫痛咽喉不利　犀角散
治咽喉卒生癰瘡　治懸癰腫長數寸隨喉出入　硼砂散
鉛霜散　治咽喉中生息肉方擣方　治喉閉生瘡　治喉卒癰腫

纏喉鎖舌腫　舌腫風即喉閉舌腫　聖烟筒
治咽喉閉塞口瘡稍盛　治喉痹方　治喉痛方
治勾臆咬牢　半夏等分法　雄黃散　吮毒丹　白丁香丸
治舌喉中生肉

咽喉生瘡 論一道 方四十四方

半夏湯　甘香散　治喉中有瘡吐血不下食
療喉中及舌生瘡爛方　附治喉舌生瘡方　療喉口中及舌生瘡爛方
黃膏湯　去毒收瘡丸　皂角散　龍腦煎　桃紅散
琥珀犀角膏　赤硼湯　地黃湯　白藥丸　牛黃金露丸
救命散　治咽喉疼腫以氣閉喉痹　乾地黃散
治咽喉內熱毒所攻　治熱病口瘡咽喉生瘡　小麒麟散
薔薇根散　升麻湯　蒸豆湯　治咽喉内生瘡及痛
杏仁丸　療口中塞及咽喉不利生瘡　麥門冬丸　千金地黃丸
含瘡口方　治喉中瘡腫方　治咽中瘡腫方
治咽喉及舌生瘡爛方　治重舌飲腫咽喉腫舌上生瘡
咽喉生瘡冷閉塞不出聲　硼砂散　龍腦散　梅瘡散
南星散　半夏金藥　咽喉上瘡　治喉中及口舌生瘡爛
治喉腫瘡方

尸咽喉 論一道 方一十二方

蕃藜湯　金露丸　治尸咽喉痒痛治聲不出　蛇蛻散
治尸咽喉痛方　一捻金散　香仁散　治尸咽喉痒痛　治尸咽方
治咽喉中痛痒吐之不出咽之不入似得蠱毒方　又方　治尸咽方
治乘尸進蟲喉中有物吞吐不出方

狗咽 論一道 方一十三方

皂荚丸　烏犀角散　石六散　牛蒡湯　一灰散
如聖散　石膽散　鷄子法　治狗咽喉方
治咽喉如有物氣塞喘急不通　延胡散　如神丸　黃白散

咽喉生穀賊 論一道 方一十三方

蒙子散　五味子湯　射干湯　治咽喉生穀賊腫痛方
乳香丸　皂莢散　治穀賊方　麻仁散　治穀賊衝咽喉
又方　升麻湯　殺鬼散　穀賊方　如神丸　又曰黑丸

咽喉中如有物妨悶 論一道 方三十二方

防風散　杏仁丸　射干散　木香湯　半夏散
射干散　含化丸　又方　桔梗丸　山豆根湯
木香散　射干湯　黃芩湯　絡石湯　黃耆甘草湯
訶梨勒散　半夏散　半夏木香湯　麥門冬湯　桔梗湯
人參丸　四味湯　厚朴湯　杏仁丸
治咽喉中如有物吞之不下吐之不出　石蓮湯　大黃散
桔梗湯　杵糠丸　薄荷方
治飛絲生於喉舌之間　玄參升麻湯

咽喉腫塞 論一道 方七十方

會仙救苦丹　二參湯　天門冬煎丸　烏翣膏　硇砂散　升麻散
半夏散　麝香朱砂丸　奪命丹　升麻湯　小升麻散　犀角丸
皂莢煎　玄參散　無比散　萬靈散　乳香散　茯苓湯
治咽閉塞不通　射干丸　治咽喉閉塞口噤　五香散　通氣散
黃芩散　龍腦散　升麻丸　治咽喉閉塞口噤　射干丸　甘豆黃散
四神散　救生散　山豆根丸　姜黃湯　如聖散　立通散
清金散　治咽喉閉塞不通含嚥　治咽喉閉不通　膽礬散
化金散　硼砂散　又方　治咽喉閉塞口噤　去毒丸
治風熱閉塞咽喉遍身浮腫方　治咽喉閉塞口噤方　治咽喉閉塞不通
治咽喉閉塞不通　治咽喉氣塞腫痛水漿不下　治喉氣塞命不絕人　治咽喉氣塞喘急不通
又方　治咽閉　又方　治咽喉痛　治喉風腫　青金散　治咽喉塞并中瘡出
治喉咽閉塞不通　咽喉碧玉散　如聖散　大青散　治喉閉咽痛　治咽喉閉塞
治咽喉閉塞腫痛　碧香散　治一切重熱咽喉腫閉　治喉中塞

咽喉腫痛 論一道 方一百五十二方 法一道

龍麝聚聖丹　至寶丹　味毒牛黃丸　元霜丹　牛砂伏理丸
開關散　治咽喉腫　大青湯　參朮散　玉靈散
大青丸　鵝翎散　三合湯　治喉閉　治咽喉腫痛口舌生瘡
治咽喉中痛方　治咽喉外腫重舌方　絡石桑飲
人參消膈散　消毒丸　麻黃湯　奪金散　蓮黃飲
治喉中腫痛腸上吞物　治風熱上壅咽喉腫痛　牢利散　射干散
治咽喉重舌頸頷腫痛　金鎖匙散　牛黃一湯　知母飲
丹砂半夏丸　人參消毒飲　桔梗散　鉛霜散　龍腦散
治咽喉痰壅不語丸　馬兜鈴散　馬牙硝丸
治風毒咽喉不下及腹重腫方　勝金散　天門冬散
雪黃散　天門冬丸　射干丸　乳香丸
杏仁升麻丸　射干散　絡石散　牛黃散

治咽喉腫痛急慢喉痹懸癰乳蛾咽物不下

硼砂丸　龍腦散　龍膽飲　碧玉散　烏犀膏
絡石射干湯　五香散　春黃湯　馬兜鈴散
治咽喉風熱腫塞疼痛　治咽喉內卒腫痛
龍腦丸　治咽喉頸外腫痛　天壽餅子
治咽喉重塞頸頷腫痛　蜂雪散　生犀飲
黃膏湯　金鎖甘露丸　白龍散　青龍散
如聖丸　掃藥斬邪散　神效破棺散　荳砂丸
一捻金散　鼠粘子散　利膈散　治風散
四味如聖散　青黛毒丸　千金湯　真珠丸
龍膽膏　附子散　通喉散 一名如聖散　地黃煎
治咽喉閉塞　治傷風後喉痛　治風毒攻咽喉
治咽喉腫痛　又方　白藥散　蛇蛻散
丹砂散　龍栓丸　治咽喉內卒腫痛　治咽喉頸外腫
又方　如聖散　乳香湯　治喉痹
治咽喉腫痛　如聖散

治喉腫痛飲食不下者　又方　治傷寒毒攻咽喉腫方
治喉中痛　治熱咽喉腫痛方　治咽喉腫痛方
治咽喉腫痛語言不出　治卒風咽腫面腫方　又方
鵲頂丹　治咽喉卒腫不下食方　治咽喉卒腫痛不下食方
治咽喉卒腫痛不下食方　治咽喉卒腫痛不下食方
治咽喉卒腫飲食不通　拾藥膏　治咽喉內卒腫痛
治咽喉頸外腫及咽乾痛方　治風毒咽水不下　又方　通砂散　治風散
治咽喉腫痛生瘡方　射干膏　蜂雪散 一名代赭散
杏仁丸　治喉卒腫不下食　治卒咽痛　發聲散
鬱金散　鉛霜散　菖蒲大丸　犀角散
治大人小兒咽喉腫痛　桔梗湯　治咽喉腫痛　治咽喉生瘡
治咽喉腫痛　又方　黃芩湯　龍腦丹砂丸
治咽喉閉塞不通　治卒咽痛　代赭散 一名清雪散
秘傳解毒丸　治喉閉　又方
治一切咽頷腫毒　治咽喉痹痛失音不語

語音不出 論一道 方四十三方

苦參丸　通聲散　治肺脾氣實風冷所傷咽喉腫痛語聲不出
五靈膏方　黃芩湯　杏仁煎　小續命湯
又方　治咽喉腫痛解神重毒語聲不出　射干湯
發聲散　治咽喉腫痛聲嘶不出　治咽傷語聲不徹方
治語音不出　菖蒲丸　荊芥湯
治咽傷語聲不徹 一名出聲散　發聲散　出聲散
杏仁丸　治喉痹腫痛語聲不出方　槐花方
桂心散　白芷散　治風冷失聲咽喉不利方　治卒失音方
橘皮湯　治咽喉痹痛失音不語　治卒感風失音不語方
治嗽聲啞方　治語聲不出如有物　增損如聖散
治咽喉腫痛語聲不出　天竹方　通聲丸　玉粉丸
甘桔湯　治瘖啞　出聲音方　治瘂病　治卒瘂
治喉痹卒不語　治咽喉痹痛失音不語

咽乾 論一道 方一十六方

絡石煎丸 龍腦雞蘇丸 升麻散 犀角丸
甘草湯 射干膏 治咽喉乾燥熱毒乾痛 貝母湯
雞蘇人參湯 龍腦散 乾地黃丸 李科湯 如聖湯
桔梗湯 貝母丸 治咽喉中乾如有刺

咽喉不利 論一道 方一十四方

犀角湯 紫蘇湯 牛蒡子涼膈丸 玉屑無憂散 龍腦丸
茯苓湯 射干湯 犀角散 射干丸 真珠丸
調中人參丸 治咽喉不利下氣方 消毒犀角飲子
甘桔湯 治咽喉 夢口中咽喉不利 秘傳防風散
治上膈壅滯風痰攻傷致咽喉不利 治咽喉不利腫塞
治咽喉逆氣不能食方 犀角散 川芎丸 王醫師表
百靈圓

骨鯁 論一道 方一百四方

神仙化鐵丹又名化鐵丸 硃砂散 附子丸 磁石丸
麝灰散 放骨散 象牙丸 楮實丸 棗灰丸
玉錯散 桂香散 二白散 半夏散 半夏白芷散
治諸骨方 又方 治骨鯁在喉 又方 二方 治魚骨鯁
治骨鯁 治鯁 治魚雞骨鯁 治骨鯁 骨鯁
鯁骨方 又方 治魚骨入喉方 蜥蜴散 治諸魚骨鯁在喉中方
南夏散 煩骨方 魚鱗散 魚骨引方 鵜鶘散
鵝翅散 艾蒿湯方 鵝翎散 百合散 魚尾引方
立竹湯 鵝灰散 瓦骨散 鵝翎散 縷結散
紅糟圓方 治諸骨鯁人吞錢 治魚骨鯁方 諸鯁方
治雞魚諸骨鯁經日不下者 治骨鯁入喉 又方 二方
治骨鯁不下 治魚骨鯁 又方 治魚骨鯁並喉痺
治食魚肉為骨所鯁 治魚鯁 玉屑無憂散 [illegible]

神效解毒丸 取骨鯁及咽中刺 治魚骨鯁不出
治魚骨在腹中刺痛 治骨鯁沖喉一二日已 治魚骨鯁在喉中
治骨鯁 又方 治骨鯁在喉刺痛 麻角丸
清化骨鯁 軍師傳治魚骨鯁方 治鐵棘竹木諸刺在肉中折不出
千金療鯁方 立主所刺不出 治咽喉魚骨鯁刺
二聖散 治骨鯁 又方 一方
治雜物鯁方 骨雪散 療鯁方 又方 治骨鯁散牒去
又方 草豆丸 治骨鯁方 神效解毒丸
硇砂散 玉屑無憂散 神效膏 白龍散
取鯁骨丸 治人誤吞刺鯁喉久而不出 咽中骨鯁 治骨鯁散
主骨鯁 治魚骨在人腹中刺痛 治魚骨鯁不可出者
治鯁及魚骨入肉不可出痛甚者 治食諸魚骨鯁刺鯁散
治魚骨鯁 治鯁 治草芒沙石顆喉中不出 治魚鯁百日散

誤吞諸物 論一道 方五十七方

治誤吞銅鐵金石竹木刺鍼鉤魚諸骨鯁 如聖散
通氣散 治誤吞竹木魚骨所鯁噎物不下咽處方 治誤吞錢
治誤吞鐵石骨刺等不下危急者 治誤吞金銀物或錢在腹內不下方
血餘散 治誤吞金銀環及釵方 為治誤吞錢及桃核竹木
誤吞錢又指環方 誤吞釘針及箭鏃等方 誤吞錢釘
誤吞錢閉氣不通方 治誤食桐油 一名疏什方
治誤吞鉤繩在喉中不出方 治誤吞鐵蛇 誤吞銅物不能化者
治誤食物吞鼻中及入眼不出 治誤吞釣線方
治誤吞竹木入咽喉出入不得 治誤吞桃核竹木
治誤吞環及釵 治誤吞鉤 又方 治誤吞水蛭
又方 三方 誤吞銅鐵陳宮鐵而鯁者方 誤吞錢 誤吞釵方
誤吞錢不出及誤吞針方 治誤吞銅錢 又方 治誤吞錢
治誤吞稻麥芒不下 治誤吞鉤線方 治吞錢方
治一切諸雜骨木竹刺 治一切竹木簽刺諸骨鯁喉
治喉中物鯁欲死 又方 二方 治誤吞錢及骨鯁

普濟方卷之二十七目錄

治誤吞鐵錢及骨　治[illegible]咽喉[illegible]方
治骨鯁[illegible]類雜方
治咽喉卒然吞入口　治誤食[illegible]
治誤吞錢諸物
鉤物等與其[illegible]　[illegible]之[illegible]
又方
治誤吞下錢

普濟方卷之二十七

咽喉門

總論

夫咽者，人五臟六腑往來[illegible]之道也。喉嚨[illegible]吞五味之氣[illegible]也，胃[illegible]之候也。與重十兩，廣二寸五分，至胃長一尺六寸，主通五臟六腑[illegible]神氣[illegible]十二節。若臟熱則咽門閉而氣塞，若腑寒則咽門破而聲[illegible]，[illegible]主之。[illegible]門通之，寒則諸之，若寒熱調和，不生疾。[illegible]喉嚨者，肺之候也。[illegible]十二重[illegible]十二環，長一尺二寸，廣二寸，其層[illegible]十二重[illegible]十二節，主引小穀之道，往來神氣。若臟熱，喉則腫塞，氣不通，而[illegible]上之。若腑寒，喉則[illegible]，欬秋如[illegible]，骨[illegible]室[illegible]。則閒之[illegible]，則通之，不熱不寒，依[illegible]調之。○咽者胃之系，喉者肺氣之所通。咽以嚥物，喉以候氣[illegible]。

[illegible]風邪客於喉間，氣[illegible]

[illegible]而熱則壅遏而爲咽[illegible]熱氣生於肺胃，風毒[illegible]塞則腫結而爲喉痹。尸咽者，陰陽不和，脾肺壅盛，風熱毒氣不能宣通，故令尸蟲發動，上蝕於喉，或癢或痛，如[illegible]之狀也。[illegible]鼓[illegible]者，[illegible]熱毒氣結於咽門，不能傳化，故風熱所聚，與血氣搏，逆令腫，刺如哽之狀。其生於[illegible]，胃脘實熱，燻發上焦，發爲白頭，赤根因有咽瘡之[illegible]，臟腑傳寒[illegible]則[illegible]，如[illegible]塞於其間，亦有喉閉之證。若[illegible]瘡生於上膈，雖不關於咽喉，所以[illegible]亦熱氣使然也。咽喉[illegible]痛，則要所[illegible]病，至急療，皆[illegible]故。凡咽喉病，毒氣歸心，[illegible]而腫甚，氣順下部，則[illegible]不上者，死候也。○一十八種喉風，蜀詩曰：一單鵝風，其形如小筋頭大，生於咽喉關上，或左或右，關下難治。二雙鵝風，有兩枚在喉間兩邊，亦如小筋頭大。[illegible]下難治。三蟬舌風，[illegible]舌下，再生一舌[illegible]是也。[illegible]舌[illegible]，其舌頭上[illegible]，或[illegible]，[illegible]五[illegible]舌[illegible]其舌相似，又熱[illegible]舌，不能轉動[illegible]者，六[illegible]舌，[illegible]自舌上[illegible]，[illegible]七[illegible]才[illegible]口風[illegible]才[illegible]頭作聲，口[illegible]不[illegible]八[illegible]口[illegible]如[illegible]，以水[illegible]不[illegible]，[illegible]塞，咽[illegible]喉閉，[illegible]如[illegible]聲，[illegible]分上下三[illegible]，[illegible]下關難治，十[illegible]者[illegible]

氣上逆心…[illegible]…者十二經…[illegible]…一名喉痹口中或食
[illegible]…成頁要
[illegible]…是也方有…[illegible]…甚者
舌入…[illegible]…如清…[illegible]…塞飲食不能
者是…[illegible]…則…[illegible]…則不食…五…[illegible]…甘口
是自舌上…[illegible]…上下拄舌口…[illegible]…甚…亦能…[illegible]
發十六…[illegible]…上作…[illegible]…作一筍以至三五七九者
者是十七…[illegible]…如…[illegible]…刺…者是
十八…[illegible]…五七…[illegible]…作…[illegible]…與…會
飲與舌…[illegible]…一…[illegible]…以納…[illegible]…於天…以納
兒故喉氣…[illegible]…也會厭…手其上以可開…[illegible]…其…不…之
其喉錯…[illegible]…舌心上…[illegible]…能…[illegible]…曰…相…則…[illegible]…食
麻而死…故難經…[illegible]…之下…[illegible]…其…也一言可
不一…者…以大…經曰一陰一陽結為之喉痹王太僕云一陰者
手少陰君火心主之脈氣也手少陽相火三焦之脈氣也二火皆主

脈並絡於喉氣熱則內結結甚則腫脹腫脹甚則氣痹甚而不通則
死矣夫足少陰循喉嚨挾舌本少陰上俠咽此二者孰是也至於足
陽明下人迎循喉嚨足太陰俠咽連舌本手太陽循咽下膈足厥
陰循喉嚨之後此數經皆言咽喉獨少陽不言咽喉而內經言一
陰一陽謂之喉痹何也王太僕謂十二經多不讀靈樞經中別一
篇其載十一經之正其文云足少陽之正繞髀入毛際合於厥陰
別者入季脇之間循胸裏屬膽散上之肝貫心以上俠咽出頤頷中
散於面繫目系合少陽於外眥也又手心主之正別下淵腋三寸入
胸中別屬三焦出循喉嚨出耳後合少陽完骨之下是手少陽
三焦之氣與手心主少陰之氣相合而行於喉嚨也推十二經推
足太陽則下項其餘皆湊於喉嚨然內經何為獨言一陰一陽結
為喉痹蓋君相二火獨勝則熱結正絡故痛且速也故曰一言可
了者火是也故十二經中言嗌乾嗌痛咽腫頷腫舌本強皆君火
為之也惟喉痹急速相火之所為也夫君火者猶人火也相火者猶龍
火也人火焚木其勢緩龍火焚木其勢暴…[illegible]…喉痹則咽與舌在其

間耳以其病同是火故不分也淨之當者各詳其狀強立八名曰單乳
蛾雙乳蛾單閉喉雙閉喉子舌脹木舌脹…[illegible]…纏喉風走馬喉痹熱氣上行
結…[illegible]…以其形似…[illegible]…為單二為雙也其比
乳蛾差小者名閉喉…[illegible]…熱結於舌下復生一小舌子名曰子舌脹熱結於
舌中舌為之腫名曰木舌脹木者強而不柔和也熱結於咽喉腫繞於
外且麻且痒腫而大者名曰纏喉風喉痹暴發暴死者名曰走馬喉痹
此八種之名雖殊者不離之火則相之速…[illegible]…者可以…[illegible]…之而大
者以辛散之…[illegible]…皆…其作…[illegible]…頭白…[illegible]
則…[illegible]…之數也至於走馬喉痹…[illegible]…此乎其…[illegible]…之間耳其最不誤
人者無如砭針出血血出則病已…[illegible]…一婦人木舌脹其舌滿口
諸醫不…[illegible]…者…[illegible]…五七度…[illegible]…三日方平計所出
血幾至盈斗又治一男子纏喉風腫表裏皆作藥不能下余以涼藥
灌於鼻中下十余行又以拔毒散傅之陽起石燒赤與伏龍肝各等分
細末之日以新水掃百遍三日熱始退腫始消又嘗治一貴婦喉痹蓋
龍火也雖用涼劑而不可使冷服為龍火宜以火逐之人人…[illegible]…之大是

也乃使爆於烈日之中登於高堂之上令侍婢搖大扇揚之藥銚於上
使藥極熱不至大沸通口時時呷之百餘次龍火自散此法…[illegible]
熱藥…[illegible]…故也大抵治喉痹用針出血最為上策但人畏針委曲傍求
瞬息喪命凡用針而有針創者宜搗生薑一塊調以熱白湯時時呷
之則創口易合銅人中亦有灸法然痛微者可…[illegible]…則…[illegible]
治喉痹之火與救火同不容少待內經火鬱發之發謂發汗然咽喉中
豈能發汗故出血者乃發汗之一端也…[illegible]…君子毋執小方而曰吾藥
不動…[illegible]…又妙於出血…[illegible]…而死矣○用
…[illegible]…氣歸心…[illegible]…不止此死候也○
實熱論一用吹藥…[illegible]
者加石膏…[illegible]
天明…[illegible]…用針刺…[illegible]…攻作…[illegible]
風…[illegible]
…[illegible]…白术…服三用…[illegible]…散…[illegible]

辟[illegible]散 治十種喉痺為風熱加[illegible]黃[illegible]何風[illegible]用秘傳降氣湯加[illegible]

更[illegible]

衣附子理中加[illegible]用桑白皮[illegible]亦可○喉痺者[illegible]於咽[illegible]

積而生熱故咽腫塞而痺痛[illegible]

腐俱[illegible]者是喉痺之候也[illegible]七八日不治則死

喉痺

論

夫咽痺者非素體蘊熱氣不得入也入陰陽之氣出於臟腑而咽喉而上下也風熱客於喉間氣結蘊積而生熱故咽喉腫塞而痺痛脈洪數者[illegible]者是謂痺之候也亦令人壯熱而惡寒七八日不治則死[illegible]

喉痺之病[illegible]咽喉腫痛[illegible]

凡五臟肺不利熱毒攻衝發於咽喉可見○狗咽者咽中如有結塞不通如喉痺狀是也陰陽之氣出於臟腑循咽喉而上下若風熱毒氣塞於咽喉之間皆屬積而生熱故有結塞之狀俗云此疾由說出病[illegible]所致治法當有將欲與飲食即嘔吐[illegible]之法也

方

絳雪散 治熱結咽喉腫痛不可咽心胸煩熱

木通 桔梗 枳殼 犀角

紫胡 升麻 木香 赤茯苓 人參

桑根白皮 山梔子 桂皮 蘇枋木

河梨勒 朴硝 丹砂 麝香

右除朴硝丹砂麝香外各細剉以水二斗[illegible]煎至七升[illegible]去滓再煎至五升下朴硝以柳木篦攪勿住手候稍凝即去火傾入盆內將丹砂麝香末拌令勻[illegible]瓷器盛之每服一錢或二錢以冷蜜湯調下[illegible]

萬病丹 治咽喉痺口噤水漿不下風邪攻[illegible]如有神鬼牙齒緊[illegible]目更色

萬清 秦艽 桂 烏蛇根 人參

當歸 甘草 附子 黃芩 遠志

防風 龍骨 赤石脂 芎藭 赤芍藥

赤茯苓 防己

右剉如麻豆大每服三錢匕水一盞煎至七分去滓空腹日再服

乾咽風[illegible]

朴硝 川烏 當歸 半夏 麝香

梔子 硼砂 荊芥 薄荷 甘草

馬牙硝 全蝎

右為末用甘草調膏[illegible]如不能吞用[illegible]初如茶子大[illegible]入口內含化或新汲水[illegible]調下立效

治咽喉痛及喉痺咽塞腫之

以通草煎服之痛亦便愈即含之

治喉痺腫痛

取[illegible]花皮根共十二分以水一升煮取六合去滓含之細細嚥下立差

治喉痺

以天雄炮含之

又方

以無患子研內喉中立開

開關散 治喉閉[illegible]

梅花腦子 生麝香 硼砂 朴硝 薄荷葉

百藥煎 全蝎 防風 粉草

明乳香 皮硝

右為末每服少許以筆挑吹入喉間及唇上如在關下[illegible]以薄荷桔梗甘草煎水嚥嗽或用生薄荷汁自然汁調[illegible]入口噙化為妙

奪命無憂散 治纏喉風咽喉疼痛風痰壅盛口舌生瘡心腹脹滿脾積癥塊小兒奶癖誤吞骨屑硬塞不下熱毒咽閉邪氣攻衝至悶亂不省人事並療之

寒水石 玄參 貫衆 滑石 縮砂仁

黃連 茯苓 甘草 山豆根 荊芥

鵬砂 一錢

右為細末，每服一錢，乾摻舌上，後以新水嚥之，不拘時候，並是百毒破
竹可以除化，如嚥毒下，立吐出。右須識者，蘇棘針尾尖子，亭掃凡
諸藥毒，大毒不可救，此藥每服半錢，能開喉口，有五般，除三尸，去八
邪，除九蟲，避惡受害，疑可處，並治如神，當直金宣玉寶不

龍腦散 又 治喉痹頰咽痛

白龍腦 一兩 牛黃 一兩 犀角屑 羚羊角屑 馬牙硝 細研
玄參 沉香 朱砂 甘草
升麻 鵬砂

右除龍腦牛黃研藥，為散，每服三錢匕，水一盞，竹葉七片，煎至六分，
去滓，旦入龍腦牛黃一錢，放令溫，細細含嚥。

利咽湯 治咽喉諸疾

桔梗 枳殼 牛蒡子 荊芥 甘草
升麻 玄參 大黃 紫蘇 人參 各等分

右㕮咀，每服五錢，水二盞，煎服。

生犀丸 治熱衝咽喉閉塞頰腫，致出氣煩悶

犀角 枳實 射干 海藻 升麻 各一兩
杏仁 湯浸去皮尖 百合 胡黃連 牛蒡子
白附子 炮 各半兩

右為末，煉蜜丸如彈子大，每服一丸，綿裹嚥汁，不計時。

龍腦丸 治咽喉連頰頷腫，日數深遠，嚥津疼痛，夜臥煩燥氣痛

龍腦 研 升麻 甘草 馬牙硝 研 玄明粉 研
麝香 研 石膏 研 大黃 黃芩 生地黃

右除地黃汁外，搗羅為末，以地黃汁和，如乾，更入煉過蜜少許，為丸
如小彈子大，用綿裹含化嚥津，日四五次，不計時。

治纏喉風腫痛

黃芩 升麻 麻黃 荊芥 薄荷
防風 惡粘子 炒 上甘草 各三錢 大黃

右㕮咀，以水一碗，煎至七分，去滓，稍溫服，食後逐口嚥之。

大鵬砂散 治伏熱咽喉腫痛，水米難下

鵬砂 沒藥 甘草 馬牙硝 金硝
蟬殼 薄荷葉 白姜蠶 蛇蛻 一條

右為細末，每用半錢，和前藥，乾摻喉內，一錢綿裹含津。

金消丸 治咽喉痛，不能嚥，自汗水不得入

鬱金 馬牙硝 甘草 山梔子 去皮 桔梗 各二兩
大黃 玄參 白礬 鵬砂 研，各一分

右研為末，煉蜜和丸如雞頭實大，每服一丸，噙化嚥津。

天門冬丸 治咽喉氣閉，嗌澁，言語不出，舌乾頰顋重腫

天門冬 去心 玄參 懸藥 百藥煎 紫蘇葉 各半兩
甘草 炙 人參 鵬砂 研 龍腦 一分

右為細末，煉蜜和丸如芡子大，每服一丸，食後臨臥，細嚼，溫熱水下。

橘皮湯 治咽喉痹塞，如有物，腫痛煩悶，數數吐氣

陳橘皮 湯浸去白 青竹茹 生地黃 各半兩 黃芩 去黑心
白朮 山梔子仁 各半兩 赤茯苓 去皮 桂 去粗皮
芒硝 研細

右除芒硝外，麤搗篩，每服三錢匕，水一盞，入生姜半分，拍碎，棗二枚
擘破，煎至五分，去滓，下芒硝末一錢匕，攪勻，溫服，食後，日三。

仙方奪命丹 治纏喉風，木舌腫脹，單乳蛾，雙乳蛾，或誤吞雞魚
骨刺竹木簽刺，一切咽喉急症

白茯苓 番陀僧 另研 紫荷車 白姜蠶 炒 貫仲
縮砂仁 甘草節 烏賊骨 去皮 射香 另研

右細末，卻入射香研勻，同研，餅已白麪，煮熟，四兩，和藥，又新井水丸
如皂豆大，以粉為衣，放乾，十年不壞。每服一丸，用瓷器研碎，新水中
盞更一盃，睡化開用，赴桃栗徐徐入喉中，切忌風取藥冬為愈。

木通散 治喉痹，心胸氣悶，咽喉妨塞不通

木通 赤茯苓 川芒硝 前胡 去蘆
羚羊角屑 川升麻 川大黃 剉碎炒 桑白皮 剉 馬蘭根 一兩

右為麤散，每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓，不計時候溫服。

治喉痹咽喉腫竄上熱風氣結喉，痰塞不利 方

川升麻 射香 白藥 絡石 甘草 剉

黃藥子 白礬 天竺黃 馬牙硝各二兩
右為細末同研令勻每服以新綿裹二錢含嚥津
取喉中疋 二三分方
草烏尖 姜蚕 紫貝根 秋蝴 紅椒
白礬 山豆根 皂角
右為細末用青梅肉搗藥為丸如指頭大含化一丸取下涎然後用鹽湯
灌嗽吐出不可嚥
開喉閑 二三分方
蟾酥 山豆根 射香 猫子 朱砂
甘草 青黛 川烏
右為末入各用半錢攬月內收來十夏月黃昏採水或為水調如
噙調羚用芭蕉水調下或審丸指頭大含化
搶食風 三四五方
桔梗 川烏 草烏 防風 甘草
大青根 金蜻蛉 紫河車
右為末每服用酒一盞連根蔥一根紅椒七粒燈心七莖同煎三四
木食後熱服如不安再用酒一盞入茱萸五粒同煎少時熱服之木
設用熱湯調下如落心肺間剌痛用苎藥利下如久不治則變為飛
絲膂毒和龍傷人命
龍腦破毒散 治不則急接喉痹咽喉腫塞不通
盆硝 白僵蚕 甘草 青黛
馬勃 蒲黃 腦子 射香
右研令勻細用瓷合子收如有病證每用藥一錢用新汲水少半盞
調勻細細呷嚥如是喉痹即破出血便愈如不是喉痹自然消散
也若是諸般舌脹用藥半錢以指蘸藥擦在舌上下嚥津如是小
兒一錢作四五服亦如前法用並不計時候
生銀丸 治口乾咽腫喉頰脹痛
人參 井砂 鉛霜 鵬膽
升麻 遼砂 龍腦 朴硝
右為末和以煉蜜為丸如兔子大每服一丸含化嚥津

射干湯 治喉痹腫塞不通及痛不下飲食并治毒氣攻
射干 當歸 升麻 山豆 甘草
犀角 杏仁
右件為粗末每服三錢匕以水一盞煎至七分去滓溫服日三服
禹餘粮湯 治喉痹若胃中虛乏氣不足以息四肢泄注腹脹
善噫食則欲嘔世病吾下即乾回後重拙不欲聞人聲診其脉右手
關上浮滑但重者脾胃虛也
禹餘粮 大麻仁 桑根白皮 乾薑
黃連 白朮 人參
右為粗末每服三錢匕水一盞煎至五分去滓溫服日三服
如聖勝金鋌 治喉痹服鋌其鋌如聖勝金鋌以品味小異
朴硝 川芎 硼砂 薄荷葉
荊芥穗 臘茶
右為末製生蔥自然汁搜和為鋌根藥煮如後方同前如聖
勝金鋌法同
治喉痹并時疫
桔梗 甘草 升麻 連翹 蒺藜子
防風 酒製黃芩
右㕮咀每服五錢水煎細嚥
如聖勝金鋌 治急喉閉纏喉風飛蛾雙蛾結喉重舌木舌腮
頷腫痛及屢經用藥不能吞水粥者
硼砂 川芎 薄荷葉 臘茶 川烏炮
硝石 生地黃
右為細末以生蔥汁搜和為鋌每服先用新汲水灌漱吐出次嚼生
薄荷五七葉微爛用一鋌同嚼極爛以井水送下甚者連進三服即
愈重舌腮腫先服一鋌次以一鋌安患處使消其伏熱不省人事
薄荷水調研一鋌灌下即蘇若行路常備一鋌路無者熱之患口舌生瘡
不能合口并食熱物如上法服若用冰雪薄荷十葉如泥吐出
再以水漱一鋌含之如是過方吐出如此服三鋌後
能食酒醋食魚熱喉中生泡指破吐無方者

蒲黃散未以一錢可嚥井花水吞下少林熱淋小便出血用車前
草七葉生薑小塊同研開水調去滓嚥藥一錢以水送下亦治膀胱熱
風熱化血為尿化延為水帶隨身備急一錢可治一人小兒只服半
錢一方去川烏可加裝入礶茶代調茶

射干丸 治喉痺腫痛
射干 兩　牛蒡子 二分　杏仁　芎藭
犀角屑 各半　升麻 兩　甘草 炙各半兩
右為末煉蜜和丸如小彈丸大每服一丸含化嚥津日可三五服立愈

海藻粘氣

七聖散 治馬喉痺咽喉腫痛不下
白礬 二錢　馬牙硝 一兩　硝石 一兩　鉛丹 二錢　硼砂 一錢
蛇蛻 一條　巴豆 去殼去油
右先研白礬牙硝硼砂三味入罐子內次入硝石次將鉛丹於上后
只用平瓦一小片蓋定炭火燒候用竹夾子夾蛇蛻燒五七度又入巴
豆更燒五七遍取出候冷研為散如小可咽喉腫痛吹喉中即破立
口瘡只須挑一字或大段喉痺及馬喉痺或頸腫生瘡閉使咽喉
即就挑半錢安穩仰臥其喉痛腫處自破立痊

喉痺急疼悶防不通方
馬藺根 一兩　升麻 一兩　貝母
通草 兩　玄參 二兩　射干　犀角 一兩半
右切以水八升煮取二升去滓細細含嚥一日令盡得破膿再服

又內藥

黃芩湯 治喉痺腫痛喧塞不通
黃芩　升麻　射干　木通　甘草
犀角
右麤搗篩每服五錢以水二盞煎至一盞去滓下芒硝一錢匕細
呷

如神散 治咽喉一切急患不得開
白姜蠶　白礬　藜蘆　玄參　牛黃
乳香

右為細末和勻每一字分兩鼻內搐之口含水咽吞下搐嚏立效立
愈

硼砂散 治大人小兒卒患喉痺閉塞不通腫痛生瘡語聲不出風
壅痰盛鼻衄出血
山豆根　膽礬　牙硝　麝香　甘草
硼砂
右為細末每服半錢加茶點服

金鎖匙 凡人卒中喉痺口禁咽喉腫痛不可言者以此藥治
之
豬牙皂角　大黃　草烏　鬱金
南星　巴豆
右為末上每用少許以竹管吹入喉中已死者用此當吹入
須臾眼熱後用藥半錢調灌以吐為效

南星防風散 治風壅頭項腫生結核纏喉風等症
當歸　天麻　白姜蠶　南星
防風　豬牙皂角
右為末每服二錢水一盞薑三片入荊芥少許同煎至七分溫服食
後日進三服忌熱及毒物如腫不散者加透明硼砂三錢同前藥一
處為末煎服

三砂丸 治喉痺咽塞熱痛
沙參　朱砂　硼砂　人參　玄參
丹參
右為末煉蜜丸如雞頭實大食後臨臥含化一丸

犀角湯 治馬喉痺喉中達頰腫
犀角　甘草　升麻　射干
馬藺根　桔梗
右麤搗篩每服三錢水一盞入竹葉七片煎至七分去滓入馬
牙硝末二錢匕攪令勻細細呷服

玉液丸 治毒氣壅塞咽喉不利頰頷壅腫
百藥煎　麝香　朴硝　丹砂　龍腦

甘草七分

右各研為末，再同研勻細，以水浸蒸餅心為丸，如梧桐子大，丹砂為衣，每服一丸，含化。

牽牛散　治喉痺氣隔，清咽膈

犀角屑　馬藺根　枳殼 去瓤麩炒　甘草 各等分

射干　馬牙硝 各一兩半

右為散，每服三錢，水一中盞，入竹葉二七片，煎至六分，去滓，不計時候，溫含咽。

碧雪　治一切壅熱，咽喉閉腫，不能咽物，口舌生瘡，舌根緊強，言語不正，腮項腫痛。

蒲黃　青黛　硼砂　焰硝　甘草 各等分

右為細末，每服半指甲許，於喉中吹，或以冷水下，頻頻用之。

治咽喉諸病

朴硝 一兩　甘草 七錢　蒲黃　薄荷　[illegible]

右為細末，每用一字，吹入口內。

通氣散　出聖惠　治喉痺氣隔，咽膈生瘡

犀角　射干　桔梗　馬藺　甘草

右麤搗篩，每服三錢匕，以水一盞，入竹葉七片，煎至七分，去滓，下馬牙硝一錢匕，攪令勻，細細呷。

又開喉閉方　出危氏方

南星　半夏　川烏　草烏　甘草 各等分

右為末，用豬胰煎，或囊盛，傳喉上。

巨利方　出危氏方

巴豆 去殼　雄黃　鬱金　豬牙皂角　大黃 各二錢

右為末，飯丸如綠豆大，每服七丸，五更三點，以冷茶清吞下，如未利，再下四五丸。

治咽喉閉，元垣噎塞，不通氣，水米難下，至危急者

辛牛　荊芥　防風　甘草

枳殼

右為細末，每服五錢，沸湯點服，不拘時候。

治喉痺，又於中熱甚，以車轄燒令赤，投酒中，乘熱飲之。

治咽痛，以紫蘇煮汁漱。

治喉痺，取鼠粘子，打碎為粉，以水服一二匕。

一字散　治喉痺

雄黃　蝎梢　白礬　豬牙皂角　藜蘆

右為末，每用一字，吹入鼻中，吐出涎即愈。亦治中風口噤，牙關緊閉。一方無蝎梢。

治急喉痺

大青　白姜蠶　白礬　白藥子

右為細末，再以乳鉢和研，每用半錢，吹入咽喉立愈。若病重以薄荷白梅肉細切，入前藥同研為丸，如彈子大，每服一丸，含化咽津，如白梅乾便用，香蒸軟取肉細切用。

通關散　出[illegible]方

白礬　直姜蠶　南星 生　藜蘆　全蝎

右為末，以小竹挑一字，吹入鼻中，吐涎喉通。

如聖丸　治纏喉風及喉痺

大黃　蝸牛　白礬　陳白梅皮　烏鉛

右於五月五日午時，用白梅皮、蝸牛同研，和丸如綠豆大，如患者開口不得，即以水磨，用竹管子吹下，入喉中，立愈。如輕者，以綿裹含化一丸。

治馬喉痺咽痛

五倍子　黃藥　川升麻　甘草　射干

右為散，每服三錢匕，水一小盞，煎至四分，去滓，不計時候溫服。

一捻金散　治喉閉救死，又治牙痛

金蝎　鬱金　白姜蠶　甘草　地龍

右為細末，入麝香少許，每一字吹入喉內，舌根下，數次即愈。

治咽喉[illegible]

百藥煎　硼砂　甘草　白礬

右等分為細末每服一錢食後米飲調細細呷之

李人行散 治咽喉

白礬　　牙硝　　甘草　　青黛各一錢

右每用少許吹入喉中立效

龍腦丸 治喉痺

龍腦　　十味　　皂角　　麝香一錢

右細研為末用糯米糊和丸如雞頭大每用一丸含化

嚥津見出立

妙散 治急慢喉痺喉閉腫痛或舌木強咽喉

生瘡

馬牙硝　　朴硝各一兩　　青黛半兩　　寒水石一兩

右為極細末每服二錢竹管吹入喉中或以新汲水調咽喉內亦能效嚥

不效不計時候日用三五次

銅青丸 不問虛實新久如急病內外腫塞飲食不下用之

能起死回生治纏喉風

車前草　　銅青二錢　　大黃　　皂角各二兩

右為末以白梅肉同研成膏每兩作十五丸用時以薄綿裹一丸含

口中以線繫定在外口中含化或不必線只如此含化亦可嚥津吐

出涎右兩日後則無閉矣

牛膽青 治鎖喉風神效

青黛　　白僵蠶　　朴硝　　甘草

右為末用臘月黃牛膽裝藥在內當風掛百日取出入研射香少許

每服半錢或調服或研碎吹入喉中一方不用牛膽作散嚥下吹喉

內一方不用射香一方各等分

喜春散 治喉閉

白僵蠶　　馬勃　　白礬　　天南星

右為末大人一錢小兒半錢生薑自然汁調下一方無馬勃

白梅丸 治喉痺

白梅　　白礬　　甘草　　生草麻

右同研入和丸如雞頭大以綿裹之含化

射香散 吹乳蛾即破

白礬　　巴豆　　輕粉　　射香少許

右為末先以礬飛過入巴豆在上礬枯去巴豆不用為細末三味

合吹喉

咽喉小蛾方

枯香　　白礬　　膽礬

右為極細末吹入喉中立能言語

治喉痺乳蛾喉風

硼砂　　膽礬　　芒硝　　硃砂

右為細末吹喉中

碧青散 治咽喉單雙乳蛾及治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉

塞水漿不下或喉痛重舌木舌腫脹並宜服

蒼耳　　薄荷　　芒硝　　甘草二錢

右為細末每服一錢以冷茶清調下細細嚥之吞不下雞翎蘸藥

喉內掃之立效一方砂糖和丸每兩作五十丸每服一丸噙化亦可

烏龍膏 治急喉痺纏喉風

皂角　　草烏頭　　天南星　　大黃

右並入皂角水內煎取二升去渣不用再熬或煮入新瓷器內候

冷入朴硝末一兩攪勻候冷入白僵蠶末一兩攪勻如用以半匙甘草

湯或茶清化下灌入口內立愈如乾以水調之不拘時候

又方

膽礬　　銅青　　輕粉　　明礬

右各一字江茶半錢吹入喉中即愈

奪命丹頭散 治喉閉咽喉生瘡痰塞氣不得息欲死者

真僵蠶　　草烏　　硼礬　　雄黃

右為細末每服一錢

玉鑰匙 治風熱喉痺纏喉風

焰硝　　硼砂　　腦子　　白僵蠶

右為末研勻，以竹管吹少許入喉中，立愈。

雄黃散 治纏喉風，喉閉，先兩日胸膈氣緊，取氣短促，忽然咽喉腫痛，手足厥冷，氣閉不通，頃刻不治。

巴豆 乾朱黃 如雄黃

鬱金

右再研勻，每服半字，茶清少許下。如口禁咽塞，用小竹管納藥吹入喉中，須臾吐利即醒。一方無乾朱黃。

玉參丸 治纏喉風

玉參 白姜蠶 白礬 一兩 甘草

右為細散，用鯉魚膽汁和丸，如赤小豆大，每服十丸，食後生薑湯下，日三服。

開關散 治走馬纏喉風，入喉水

硝石 一兩 鉛丹 四兩 白礬 硼砂 各十兩

右細研，用瓷罐子一箇，先入硝石二兩，次入白礬，次下硼砂，又入硝石二兩，方下白礬，又入硝石一兩，方下鉛丹，便用瓦一片蓋口於罐子口上，用方磚一片壓藥罐子，以炭火五斤煅令通赤，罐子內藥鎔成水，以炭條子撥令徹底，勻去火，放冷，於地上經宿，打罐子取藥研如粉。患者用此藥頂著舌下，令水慢慢深熟咽喉內漸漸消津至吞，不過三兩度愈。

伏龍肝散 治喉痺

伏龍肝 一兩 白礬 白姜蠶 一兩 甘草

右為散，每服一錢匕，如茶點服，吐出涎立效，未吐更一服。

治喉痺方

蛇蛻 白梅 白姜蠶 甘草 各等分

右為末，綿裹含化嚥津。

四聖散 治咽喉口舌腫閉乳蛾

荊芥穗 牛蒡子 紫河車 大黃

右㕮咀，每服五錢，水一盞，煎八分，食後臨臥，先嗽後嚥。

如聖散 治痰壅熱，利咽喉中有痰涎，物不下，及嗽咯血，肺痿，痰壅氣促，并小兒急驚，毒攻咽喉腫痛。

桔梗 一兩 甘草 五錢 牛蒡子 一兩 麥門冬

右為細末，每服一錢，細細服，入竹葉，食後服。

龍腦丹 治纏喉風

白礬 雄蛇 硼砂

射干

右研勻，用牛蒡子自然汁為丸，如皂子大，以紅綿包含化。如牛蒡子汁稀，入麪少許。

治喉閉方

猪牙皂角 葛根粉 青黛 乾荷葉 一錢

右為細末，吹入喉中即愈。

治喉痺咽喉腫痛，上膈風熱，痰壅涎不利

烏蛇皮 白梅 甘草 一分 桂心

右為細散，每服以新綿裹二錢，含津立效。

一捻金散

銅綠 黃藥 香白芷 各等分

右為極細末，入麝香少許，每用一字，吹入喉中。

如聖丸 治九種咽喉

姜蠶 南星 馬屁勃 各等分

右為細末，用鹽梅生薑汁為丸，如彈子大，噙化。

又方

姜蠶 百藥煎 大黃 各等分

右為細末，鹽梅為丸，如彈子大，噙化。

通喉散

紫蘇 藿香 甘草 各等分

右剉散，每服四錢，水煎，空心服。

治喉痺

大黃 朴硝 白姜蠶 各等分

右為細末，水煎，量虛實加用，以利為度。

吹喉散 治喉痺，水漿不下

白礬 一兩 半夏 巴豆

右將白礬研半夏巴豆在汁中候乾研細吹入喉中

地龍膏 治纏喉風

右地龍 [illegible]　白梅肉 [illegible]　朴硝 [illegible]

右同研爲膏拈入喉中含化

一拈金散 治乳蛾及風熱上攻咽喉腫痛

白姜蠶 [illegible]　防風 [illegible]　白礬 [illegible]

右爲細末用竹筒吹入喉內立愈

治喉痺

豬牙皂角 [illegible]　白礬 [illegible]　雄黃 [illegible]

右和勻 [illegible]

見效 [illegible] 如聖藥用之

治纏喉風

膽礬　白礬　雄黃 [illegible]

右同研細以天氣 [illegible]

捻成餅子陰乾每用時取少許爲末以指蘸藥如雞頭大小用

綿裹含口中勿令咽去候涎出咽喉以吐風涎盡爲度

治急喉腫閉

藜蘆　瓜蒂　雄黃

右等分爲末吹入鼻中立通閉效也

半夏桂甘湯 治冷證無陽咽喉閉

辣桂　甘草 炙　半夏 泡

右等分剉碎每服三錢水一大盞煎半候令少呷

山豆根方 治熱閉

山豆根　射干　升麻 各等分

右以咽用井水二盞煎至一盞去滓通口時時呷之

又喉閉方

牙硝 [illegible]　胭脂 [illegible]　鹽梅肉 一錢

右同研以雞羽 [illegible]

解毒雄黃丸 治纏喉風急喉痺卒然倒仆失音不語牙關緊急不

省人事膈熱痰涎咽喉腫痛赤眼癰腫一切毒熱諸證

[illegible]

雄黃 [illegible]　鬱金 [illegible]

右爲末醋糊丸菉豆大 [illegible] 下七丸吐出 [illegible] 未吐再服如木

至死心頭尚溫灌藥下喉即 [illegible] 吐 [illegible] 小兒喉 [illegible]

蠶 [illegible] 三丸量大小用一 [illegible] 散 [illegible] 調下如喉閉不 [illegible] 用筒吹入得吐則驗

比金丸 治喉痹

鉛白霜 [illegible]　青黛 [illegible]　甘草 [illegible]

右爲末糯粥爲丸如 [illegible] 大含化嚥津 [illegible]

胡黃連散 治咽喉中生瘡 [illegible]

胡黃連 [illegible]　升麻 [illegible]　鉛霜 [illegible]

右除鉛霜外搗羅爲散再同和勻每服半錢以蜜水含化嚥津日

三五度不計時候

凝水石散 治纏喉風卒然喉痺 [illegible] 腫名爲馬喉痺

凝水石　甜硝 [illegible]

白姜蠶 [illegible]

右同研令勻每取少許搽咽喉中病甚每服二錢以蜜水調下若

牙關緊急只於鼻中吹入

奪命散 治急喉風等證

枯白礬　南硼砂　豬牙皂角 [illegible]

右爲細末吹喉中痰出即愈

喉風方

明礬　膽礬 [illegible]　馬牙硝 [illegible]

右爲細末用竹筒吹入喉中未效從鼻孔一時牙關緊急吹入鼻

孔中

又方

豬牙皂角 [illegible]　硼砂　五倍子 [illegible]

右爲末用醋蜜調勻頻點入口中嗽出痰

白礬散

白礬　硼砂　馬牙硝 [illegible]

右於瓷合子內盛用鹽泥固濟 [illegible] 炭火煅令 [illegible] 取出細研用

紙兩重乃粗氈於並地上以物盖之一夜出火毒後再細研為散
服半錢於竹筒中吹入喉內少更卻通如是咽門腫只以荖子
抄藥貼於腫處咽下即愈

馬牙硝散 治喉痺腫氣欲絕

馬牙硝　硼石　點砂

右以瓷瓶子盛用鹽泥固濟候乾以炭火煅成汁良久取出待
冷於地坑子內先以甘草水灑後用紙三重裹藥以土蓋之三宿
出火毒後取出細研為散每服半錢用荖子吹內咽中咽津更
以竹管吹入喉中差

硼石散 治喉痺熱毒氣壅痛

硝石　白礬　硇砂

右同細研於瓷合中盛鹽泥固濟候乾安火中燒令通赤取出向地
坑中三日出火毒細研如粉吹喉腫閉處點少許便破

治咽喉

牛膝根　搗末

右用水二盞煎服或生用乾用俱妙如治便毒以帶皮生薑末
醋調傅之

治喉中毒百發百中及咽喉一切病

皂角　高良薑

右為末搐鼻或已甚先頁含香由一口不可吞就後搐之如已結
成膿少頃惡物膿血隨涎而出輕者只含水如前法一用管子吹
入喉中涎出愈神效不可言

治喉痹

以牛角燒灰為末酒服方寸匕

又方

取黃藥根以水研汁含之

保安散

石膽　硇砂

右研細以竹筒吹之或以筯頭蘸點之

吉人方

草烏尖　鴨嘴膽礬

右為末先用釅醋煮皂角調藥以刷傅赤腫處開口出血即將
綿纏一指頭大以布絞繫定蘸藥末吞嚥至腫處毒血即抽
出凡如此一二次其毒即破開口出血去盡逐血部以後合瘡口
藥點上傅又溫鹽水漱後便食亦可合瘡口藥方用白礬
黃丹射香等分為末以調河點瘡口上

千金療喉舌諸病方

松子　苦芥子

右搗以苦酒和貼上

金鎖匙 治咽喉腫

雄黃末　巴豆

右作一服生薑自然汁調灌下或吐或下皆愈一方細研每用薑汁
患不可針藥者用酒或薑汁調灌下米大一丸吞之候吐
將雄黃入一管鼻中用紙塞緩口盡之

立聖膏 治纏喉風

巴豆　齊州半夏

右將半夏輕搗分作四片巴豆刺去心膜銀銅石器內用米
醋三碗文武火熬至盡為度用清醋微洗研為膏子每患纏
喉風或喉閉或諸病用一粒耳以生薑自然汁一茶匙化下甚者
灌藥少時吐出惡涎如魚凍相似立愈極有神效

治喉風

皂角　飛礬

右為末帷內去精之一二次大効用管子吹之

治咽喉紫舌脹

生明粉　枯白礬

右為細末吹在口內立效

吹喉散 治喉痺乳蛾喉風

明礬　膽礬

右為極細吹喉內立效

吹喉痺方

青礬　牡牛膝草
右一研看患處以筆蘸少許令吐膿血及不即愈
礬膚散　治急喉痺纏喉風并主重舌咽喉腫塞難咽
白礬　朴硝
右等分為末搽入口中其效如神或搐鼻中一方
無□痛如膏硬則用酢
治急喉痺閉
藜蘆　猪牙皂角
右等分為末吹入喉中
立患丸　治纏喉風　白姜蚕
南星
右挫南星心空作孔子入姜蚕於孔直就表又以大紙擦取出等分
為末糊飯丸如梧子大如不丸只用綿裹藥末含之亦得如開
口不得擂為上亦妙又為末每一字以生薑汁調下如開喉不得
以小竹管搐口噴之候自出少少以全於唇上後用大蒜一瓣令來通
含之一方用桑白皮調藥竹瀝毛翎掃入喉口内有涎吐出
鹽礬散　治喉中乳蛾長及喉痺并治懸癰長大咽
中妨悶
白礬　鹽
右研細用箸頭點乳蛾上即愈破而愈切不可點破後有根膜
再發
治急喉痺
馬屁勃　焰硝
右為末每用一字吹入喉内出涎血出立愈
治走馬喉閉
白姜蚕　甘草
右為細末每服一錢生姜汁調下吐出立愈
治纏喉風
白礬　鵝膽
右等分為末用一字吹鼻内搐之

又方
生川烏尖　白礬
右等分為末每服一字用生姜湯服如口不開灌之
二聖散　治纏喉風急喉痺
鴨嘴膽礬　白姜蚕
右為細末每服少許以竹管吹入喉中立愈
追風散　治喉痺纏喉風
白姜蚕　白礬
右等分為末每服一錢取生姜自然汁調下小兒入薪
荷少許同薑汁調更加生蜜少許同調半錢服藥後不可飲湯
水醉藥散得藥力往膈上少許也一方白梅和丸皂子大綿裹
入喉咽出愈一方蜜丸含化
神功散　治喉閉腫語聲不出
荊芥穗　蓽麻
右入生蜜少許丸如皂子大以綿裹含化急則嚼化一法用朴硝
不用荊芥
治喉痺方
牛蒡子　馬蘭子
右搗為散每空心煖水調服方寸匕漸加至一匕半日再服
勝金散　治咽喉卒腫喉痺
戎鹽　青黛
右同研勻每服半錢匕或一字用小竹筒吹入咽喉嚥津
治喉痺方
白礬　白附子
右研令勻塗在舌上嚥津有涎即吐之
煙方
白姜蚕　乳香
右為末每用一錢匕香爐上燒開口令煙熏入喉中涎出愈
療喉痺急疼悶不通者
射干　當歸

右切以水三升煮取一升技稍含之吐去更含

升麻散 出聖惠方 治咽喉痒腫熱痛悶

川升麻一兩 馬蘭子一兩

右搗細為散每服以蜜水調下一錢

治喉痒立効方 出聖惠方

蝎牛七枚 白梅二七枚

右同爛研綿裹如棗核大含咽津即差

治咽喉牙閉緊 出聖惠方

用巴豆去殼以紙包巴豆肉用竹管壓出巴豆油在紙上以此紙作撚子點燈吹滅以烟熏入鼻中即時口鼻涎流牙關自開矣一方

用熱爐刺入口內即出血或瘥

治飲食不通欲死者

用臘月蠱煎脫陰乾為末點喉中藥至即瘥病深則水調灌之一方用懸鉤子莖葉搗爛為末服方寸匕或取汁服

治咽喉不得開封者

以小口瓶內燒蛇床子烟張口受烟一兩次

煎關住疾 出危氏方

用生薄荷研蜜調成膏送入喉咽下立効如延多未退再用如更不開可急須又用蔥頭兩箇搗碎安牙於頭處立開妙

荊汁方 出聖惠方 治喉痒

用荊瀝稍稍嚥之又以水三升煮荊一握取一升分三服

薑蜜煎 出聖惠方 治喉痒及毒氣方

用生薑二斤搗取汁蜜五合微火煎相和每服一合日五服

又方 出肘後方

用刺大蒜塞耳鼻孔中日二易

治喉痒卒不得語方 出肘後方

用濃煮桂汁服一升亦可末桂 著舌下漸咽之良

又方 出肘後方

煮大豆汁含之無豆用豉亦佳

又方

用酒五合和人乳汁半升分二服

又方 出肘後方

用燒炊箄作灰三指撮水服之一方用炊箄燒為末以漿水服一匕

又方 出聖惠方

用芥子末水和傅之乾則易一方以蜜水和傅於外喉下傅之乾即易之

治喉痒生腫連頰吐氣數者名馬喉痒治之之方 出聖惠方

用馬鞭一具水二升煮取四分三服

又方 出聖惠方

取鼠中膏耳三七枚末水調服之

又方 出聖惠方 治馬喉痒喉腫連頰吐氣數

用馬鞭草根一握勿中風截去兩頭搗取汁服

又方 出聖惠方

燒髮灰酒服之立破

治走馬咽痒 出得效方

用生白礬研細塗於綿針上按於喉中立破綿針用榆條上以綿纏作棗大是也一方白礬為末化灌之

又方 出聖惠方

以馬勃吹咽喉中立止一方蒸用汁炙之

治纏喉風 出拔萃方 又治咽喉生瘡藥不下及喉閉等證

用皂角刺不以多少刮皮炙去麻皮以干柴為度異末以由角在口中或吐或嗽即安一方無麻由

治喉風暴喉乳蛾

用牆上土蜂窠一箇張蛇細先以猪鬃將病人舌用筆擦破微令血出將蜂窠上用醋調成泥七錢塗於喉中燕之仍令涎出為效後用角竹根搗爛調冷水與病者只服三口刺三次即食成服用令牀欲□

立愈

急喉風 出得效方

灯草 用一把燒灰存性

右將新采用新瓦一箇盛之又用新瓦一箇合之以火焚燒成灰存性搗塩一大匙頂燒於瓦上炒存性一撚和合抓用筆筒一箇用

藥一捻吹於喉中，延出為効，吹兩三次立愈

治喉痺方

用[illegible]頭草[illegible]入[illegible]

秋間開白花，有餘[illegible]似木香[illegible]

又方

用白梅肉包生白礬末作丸，綿裹噙化下。一方用江茶和為丸噙化下

治纏喉風[illegible]

用白礬末以蓖麻油[illegible]吐即愈

又方

用冰酒合[illegible]共作一[illegible]打[illegible]於病人鼻

內[illegible]入於喉嚨，出風痰，時即愈

二方 [illegible]喉痺

用[illegible]食[illegible]取[illegible]服之立效

又方 [illegible]

數[illegible]加[illegible]服尤驗

治喉閉

用[illegible]草燒灰[illegible]取細研，醋調吹入鼻中[illegible]

[illegible]下少頃打噴嚏出延立愈

吐涎散 治喉風[illegible]不得不能飲食

用鷄[illegible]二錢[illegible]少許同[illegible]吐[illegible]

治纏喉風[illegible]

用蒼耳草根[illegible]同[illegible]

治喉閉[illegible]

用[illegible]土牛膝[illegible]二味生[illegible]下[illegible]中得吐即[illegible]

為愈。一方[illegible]根[illegible]細[illegible]出汁[illegible]之

又方 [illegible]

用土[illegible]即[illegible]以[illegible]醋[illegible]煎一[illegible]先[illegible]吐出[illegible]

涎為愈

喉[illegible]不能[illegible]大[illegible]且得

喉閉[illegible]

[illegible]白礬[illegible]

治喉痺

用射干[illegible]取[illegible]服[illegible]大[illegible]

即[illegible]用[illegible]醋同研取汁[illegible]更[illegible]

纏喉風[illegible]不得[illegible]

用白蚯蚓一條，[illegible]以當歸等分為末，温酒[illegible]一錢，得吐愈

急喉[illegible]

金銀鎖[illegible]乳蛾喉閉

用白礬[illegible]巴豆[illegible]下[illegible]

然後[illegible]子[illegible]

治咽喉乳蛾白色者[illegible]

細服之如[illegible]指甲[illegible]入喉中[illegible]竹筒吹入

[illegible]散[illegible]

用[illegible]入喉[illegible]

出而愈

咽[illegible]

用[illegible]

[illegible]

即[illegible]

一方[illegible]

治[illegible]閉方[illegible]咽喉[illegible]腫毒
之屬
用[illegible]半[illegible]井水[illegible]方[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]方[illegible]
用[illegible]
治喉痺壅塞不通方
用紅藍花[illegible]
者[illegible]
[illegible]喉[illegible]
用巴豆[illegible]紙[illegible]頭[illegible]
作孔子[illegible]鼻中[illegible]即瘥一方用[illegible]
七粒[illegible]上燒存性[illegible]含一枚即止如痺已死有餘氣者[illegible]

内[illegible]鼻孔約至肩間毒[illegible]又大喘勿[illegible]吐則[illegible]去之
治急喉閉[illegible]不[illegible]者
以[illegible]去皮[illegible]生半兩[illegible]不每用少許以[illegible]頭[illegible]以[illegible]
華[illegible]傳項下[illegible]破少血出即愈[illegible]一方[illegible]水
一盞[illegible]下或吐或不吐即安
治喉痺方
用[illegible]汁[illegible]喉中下即[illegible]
治纏喉風及喉痺牙宣牙癰口瘡并小兒走馬疳方
用蠶退紙不計多少燒成灰存性煉蜜和丸如雞頭大含化[illegible]
牙宣牙癰揩齦上口瘡[illegible]傅患處小兒走馬疳入麝香少
許貼患處[illegible]
治喉痺咽喉疼[illegible]不[illegible]便[illegible]神驗[illegible]
用絡石草二兩[illegible]一升半煎取一盞去滓細細吃須臾即通一方
絡石[illegible]
治[illegible]痺方

一用蓖草濃煎[illegible]及治風[illegible]牙痺喉痺[illegible]含從垂數口
治喉痺卒不語方
用豉煮汁一升服覆取汗亦可一方少[illegible]末含之差
治喉痺及咽喉腫痛[illegible]方
用[illegible]末一升揀去[illegible]末入瓷盒內於端午前四十九日以冷水浸之
一日兩度換水經四十九日[illegible]去水勿令犯[illegible]至端午日取出陰
乾生[illegible]通風[illegible]取火[illegible]為末令水調如膏[illegible]
用[illegible]下[illegible]一方生研[illegible]末入[illegible]飲之
針[illegible]方[illegible]喉痺[illegible]方
用[illegible]一兩細細合[illegible]頃刻立瘥一方為末吹入喉中一方用鹽
硝以草管吹入立愈
治纏喉風方[illegible]
用[illegible]一兩及[illegible]水煮[illegible]吐下差一方加[illegible]
或下
紫花方[illegible]治[illegible]喉[illegible]飲食不通欲死者

用[illegible]草根一莖即將[illegible]入喉中待取患[illegible]出即瘥如患乳
蛾針破後更以草[illegible]下更以馬牙硝末[illegible]一錢入喉即
愈一名紫花又[illegible]中[illegible]是也
治喉痺[illegible]此去甚[illegible]知名喉中偏一傍痛即[illegible]痛處含之勿
嚥也[illegible]即[illegible]也
用[illegible]入[illegible]醋[illegible]通三物同研[illegible]之立瘥
治喉痺方[illegible]
用半夏末方寸匕雞子一枚去黃[illegible]半夏末[illegible]
中攪和雞子內以[illegible]子[illegible]炭上煎[illegible]成置杯中[illegible]之[illegible]
治卒喉痺腫飲食不通[illegible]方
用黃芩切[illegible]升[illegible]一斗[illegible]
愈一[illegible]上[illegible]
杏仁方[illegible]
用杏仁[illegible]
之每服一丸

虚

治喉痺，咽喉塞，喘息不通，須臾欲絕方

用生薑汁一升，以一斤米，煮取一盞去滓，細細咽，立效。一方用

根一握，升水，煮取汁四合。一方用根搗爛，以汁，與牛蒡濾汁，調下一錢。

牛蒡散 治喉痺塞喉痛

用牛蒡子，微炒，取灰，細研，如粉，每服半錢，大人一錢，亦吹。

治咽喉中生不語方

用羊蹄根，煮，切，兒蕃，及猪人肉，大人二年，醋，如花生布裹

含亦得之

治馬喉痺，并毒氣塞喉方 出聖惠方

用馬蹄一兩，燒灰，以水二大盞，煎至一盞，不計時，分溫三服。

治急喉閉方

用蛇蛻，燒灰，研細，如豆粉，時吹入喉中，良久，吐惡涎，未即

瘥，再吹。臘月取之。一方用青黛，緒亦佳

如聖散 出十便良方 治纏喉風一切咽喉急症，吃人不驗

用白礬半兩，以巴豆二箇，去皮，同於銚內熬，白礬枯，去巴豆，研為末，用生薑自然汁，和丸，如雞頭

頭實大合化，患者，生薑汁調一大錢，以竹筒子灌入喉中，立效。使吐

出頑痰，半食許，再服。再吐，將大黃一兩搗，大一分，含口內，含咽，半食

間，再將大黃合生三片，含食。若語不得，被不省，扶起坐，用鵝從鼻入

治急喉痺方

用生白礬一合，患者立欲死，未走，要令嚴尚須之，取方寸匕，急

投，療延之，以頭盡頭，如更急，則喉下當開，口，灸一壯，如麥粒大，火

至即差，氣雖似絕，但心下煖，着可救，此救無不神驗

治喉痺方

用黃顆，不計多少，燒灰，以火氣少許，溫酒調下一錢匕

又方 出聖惠方

用大鹽，燒，火研為末，以牛糖為丸，如彈子大，含之

治喉痺水漿不通方

用石膽，以水磨，飲之，蓋立除上

射干湯 治喉痺

用射干切片，每服五錢，水一盞，煎七分，去滓，入蜜少許，放

枯

豚膏用一斤，合蜜一大斤，大煎以生絹濾方耳

又方

用生地黃汁，蜜二升，合微火煎之，取二升，徐徐含之

又方

用剝蛇皮，燒灰，細研，以竹筒吹之，有效

又方

用馬根，冬取，研，絞汁，含，咽一盃，當即出吐，不止，又之

青艾方 出聖惠 治喉痺

用夏日青艾一束，搗爛，入水煎之，候冷，如不得，以冬月蛇床子以青

嘗，乾蛇退汁，以蛇床子，用生艾果汁，含咽

灰，為一方，青艾和

治喉痺法

用燈中紅小豆，吹入喉，用猪脂，取十粒，與病人食，并在喉內

即出惡血三二盞，便使飲食，即進，神效

治喉風

用甘草一根，穿入，取出研細為

末

又方 出聖惠 治喉閉

用蓖麻子，去殼，研如泥，紙上，下，咽中立效

不可將汁，咽下

治喉咽

用蝸牛，研，入麝香，溫水化下

治喉閉方 出聖惠方

用明礬，細研，與心草燒灰，調和，塗於布上，每用一錢，吹入喉中，一方

蠶蛻之研細吹入喉中，臘月方至

吹中即愈

治喉痺

用芥菜子一合，研細，用好醋，取十湯，用鵝毛掃入喉內，待喉

內，以雷吐涎，入，立愈

吹生丸 出 治纏喉風 神效

用蚵蚾草又名皺面草研細生蜜和丸彈子大噙化一二丸即愈
如無新者只用乾者為末以生蜜為丸不必太硬但如彈子大一
塊此方有奇效

治喉痹出聖惠方
用地龍一條細研用白梅去核以皮裹之重者再添三含嚥津
立效

又方
取蚯蚓十條搗爛為末以赤蜜和丸如半棗大含嚥半

一方治急喉閉
詩曰急喉腫閉最堪憂只用水漿嚥下由是者不過三五呷此方元
是聖人留

奪命丹 出於 治大頭瘟爛喉治五種喉痹
詩曰人間治疫有仙方一兩殭蠶二大黃薑汁為丸如彈大井花調
蜜便清涼一方為末生薑汁蜜水調服名五痺散

奪命丹治纏喉風急喉閉牙閉不能開重舌木舌便兒蛾并諸骨竹木
鯁魚骨刺並皆治之
白殭蠶 炒去絲嘴　寒水石 煅　山豆根　紫河車　膽礬
管仲　縮砂仁　馬屁勃 各一兩　地栗 一兩　木鱉 一兩
金星鳳尾草　麝香
右為末滴水為丸每服一兩作一十五丸蛤粉為衣每丸令水半盞
放藥在水中其藥漸有水沫腳起不用藥只服水半盞一丸可救數
人不拘時候服之大青葉為衣亦妙

喉痹頸邪氣悶毒入腹
川升麻　犀角　射干　並解之

治喉痹卒不得語方
用桂心如棗核大綿裹著舌下須臾瘥

又喉痹喉舌喑方
以耳下張口對脣以大指甲爪勿止而三發又以針刺喉閉者口服便愈

又方
隨病所近左右刺手中指甲下令血出如指甲後令血紫黑刺之甘

須慎用麵毒物

治急心痛并喉咽舌病等方
隨病所近左右以刀鋒截刺手大指甲後爪也令出血即愈

又方
病人臥急以手其頭心隨病所近左右以差為度

治喉痹纏喉風　右用艾烟薰心自然破

又方
右用曲頭雞翎蘸藥一匙先汁吹惡心自然破

治咽喉痛
用臘月豬尾血末木瓜灰之

又方
含雞屎白良

又方 出肘後方
用巴豆去皮針線穿咽入牽出

又方 出聖惠方
用馬蘭子半升水二升煮取一升半服之

又方
煮桃皮汁三升服之

治喉痹及毒氣 出肘後方
以附子一枚破作大片蜜塗炙令黃含嚥汁甘味盡更塗炙如前法

治喉痹卒不得語
用商陸苦酒熬令濃熱傅之

含香法 出 治喉閉物鯁不可進之
含乳香一塊良久其物自化又面東下字六轉水一碗令患人呷水流順
七遍便咽水立下

治急喉塞閉方 出衛生寶鑑方
霜地蜂窠燒灰
用竹筒吹入喉內或燒巴豆閉煙立效

又方 出聖惠方
大黃　鬱金　巴豆 去皮 各等分

右等分為末，每用一字，生薑汁調，搽牙。如不能合下，即以鵝毛蘸藥
掃喉中，吐涎立愈。

（奪命散）治喉中生[illegible]，治喉風。

膽礬 一兩 白殭蚕 [illegible] 天竺黃 [illegible]

右和勻，每用一二字，以鵝翎蘸藥探喉中，吐出痰涎[illegible]
見[illegible]水出方，用涼水調灌，或用[illegible]吹[illegible]。

（白礬散）治[illegible]喉閉[illegible]

白礬 三錢 巴豆 [illegible]

右用礬入鐵[illegible]內熔化，將巴豆[illegible]去巴豆，取礬研末，以竹
管吹入喉中立愈[illegible]

（奪命湯）治喉風

每服用皂角三莢，去皮子，入[illegible]二錢[illegible]水一盞煎至[illegible]
[illegible]去[illegible]入[illegible]
[illegible]

白礬 一兩

用刀[illegible]鐵[illegible]內[illegible]入巴豆[illegible]
為末，用管[illegible]吹入喉中[illegible]

（吹喉散）治急喉閉喉痺

用生白礬研為細末，冷水調下二錢[illegible]

（針砂散）治喉痺

朴硝 [illegible] 黃丹 [illegible]

右相拌和[illegible]吹入喉中即破
吐[illegible]即愈[illegible]

（解毒玉壺散）治[illegible]喉風喉閉及喉痺[illegible]
並不能療者[illegible]

白茯苓 管仲 鵬砂 馬屁勃 紫河車
山豆根 烏魚骨 山藥 金絲馬尾草 白朮
白殭蚕 [illegible] 大甘草 一兩 寒水石 [illegible] 桔梗 [illegible]
丸者 [illegible]

右各[illegible]為末，[illegible]丸者[illegible]
細[illegible]為丸如彈子大，每用一丸[illegible]
藥一丸[illegible]

（一字散）治喉風

白殭蚕 [illegible] 紫河車 [illegible] 玉雲膽 [illegible] 甘草 [illegible]

右為細末，每服一字，吹喉中。
[illegible]喉閉[illegible]不能[illegible]
[illegible]強人服之[illegible]

（二聖散）治喉閉[illegible]

[illegible] 白礬 [illegible]

右二味[illegible]
在喉中[illegible]

（治喉閉）

用生礬末吹喉中

（治急喉閉[illegible]）

右以[illegible]
氣[illegible]入喉中[illegible]
[illegible]研以[illegible]
[illegible]

（金鎖匙）治喉閉及纏喉風

白殭蚕 [illegible] 烏[illegible] [illegible]

右同為末，每服半錢，生薑汁調下[illegible]

（又方）

用白礬一錢[illegible]
[illegible]作末[illegible]

（治[illegible]）

以馬蘭根[illegible]

一方雄雞冠血令人扶頭中[illegible]十二更立通老者根再吹亦效

一方青黛和研末吹入喉中〇一方用雞子青調服之

（治喉痹又名乳蛾又名纏喉風又名走馬喉風）

蟬蛻去足用

右研水下一二錢或再下愈

（治纏喉風）

雄黃 白礬 等分

右為末和研填喉內須臾飲之

（又方）

野苦薺汁 [illegible]

以和者為小服之

（又方）

用白礬一兩巴豆去殼二十一箇白礬入銚內炙熬將礬化開置巴

豆於礬內令去豆研末用筆管吹入喉內即愈

治走馬喉痹一法如左右喉痹於擣上令左右頭髮用力拔之則無有

世去此法老年多時常見亦云喉痹人甚多不得其說近與子正話

又書得其治

（治喉痹）

和雞子一枚將黃取令相得吞小咽甚驗

（又方）

剉升麻細剉含之喉塞亦然

（治喉已死有餘氣者）

用巴豆一粒去皮心研碎分兩丸綿裹內兩鼻孔須臾開悉[illegible]

餘餘皮又大棗[illegible]喉吐則瘥去之

（治暴喉閉氣欲絕）

用乾老絲令燒灰箇半及之

（治雪[illegible]喉閉）

硼砂 白礬 [illegible] 馬牙硝 [illegible] 硇砂 [illegible] 新巴豆 [illegible]

黃丹 [illegible]

右為細末[illegible]一箇先[illegible]丸[illegible]丸下[illegible]黃丹次下巴豆[illegible]

醉巴豆先打破逐箇旋下[illegible]一箇[illegible]之又一次[illegible]

以成汁候結硬末以每服少許以筆管吹在喉中

（治喉痹方）

元公秉火卿[illegible]卿[illegible]帝士人[illegible]入京[illegible]可[illegible]喉痹[illegible]

在[illegible]有[illegible]卿人云[illegible]行[illegible]水[illegible]一[illegible]部[illegible]之[illegible]

世[illegible]帝[illegible]合[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

（又方）

以皂角汁[illegible]末[illegible]服之

（紫金丹）治喉痹風急喉閉牙關緊急不省人事舌木舌重舌[illegible]

蒼竹木鶴骨[illegible]

白殭蠶 [illegible] 山豆根 寒水石 [illegible] 貫衆

蛤[illegible]仁 紫河車 乳[illegible] 馬屁勃 [illegible]

白茯苓 [illegible] 烏賊魚骨 [illegible] 石 [illegible] 烏[illegible]

[illegible]砂 一錢 [illegible] 甘草 [illegible] 飛羅麵 [illegible]

金星礬石 [illegible] 一兩

右為細末酒水為丸一兩可作十五丸每服用冷水磨下[illegible]

[illegible]不拘時候

（消毒丸）治喉痹口舌腫痛

白殭蠶 [illegible] 牛蒡子 [illegible]

右等分為細末煉蜜為丸每一兩作十五丸每服一丸含化食後

（烏犀膏）治喉痹纏喉風

皂角 [illegible] 焰硝 [illegible] 大黃 [illegible]

右件並入皂角水內煮至二升去滓不用再熬成膏子入新[illegible]

器內風乾[illegible]入朴硝末一兩攪勻令入碗[illegible]末一兩如前收之如

急喉痹[illegible]以甘草[illegible]茶清化下[illegible]入口咽之含如[illegible]

以好[illegible]之不拘時候

（牙皂散） 今察[illegible]

草麻子七粒 [illegible]

右爲細末 [illegible] 每用少許 [illegible] 吹入 [illegible]

（附子散） 治喉 [illegible]

附子 [illegible]

右用蜜炙黄 [illegible] 含咽 [illegible]

（又方）

白礬 一錢

右用入巴豆三十一粒 [illegible]

（消風豆勛散） 治咽喉

柴胡　升麻　牛蒡子 [illegible]　石膏 [illegible]

乾葛　甘草 [illegible]　防風 [illegible]　荆芥 [illegible]

赤茯苓 [illegible]　川芎 [illegible]　桔梗 [illegible]

右麓爲每服四大錢水一盞半 [illegible] 煎服 [illegible]

煎服忌 [illegible]

本朝方書之三十七　十八

（治人喉咽氣不和） 急以茶 [illegible] 之 [illegible]

（一捻金散）

鬱金 三錢　[illegible] 三錢　巴豆 一錢

右爲末 [illegible] 服及食 [illegible] 一錢 [illegible]

（神効方） 治喉痺

桔梗　甘草 [illegible]

右水一升煮服 [illegible] 即 [illegible]

（喉痺）

右白礬 [illegible]

（[illegible]）

右巴豆 [illegible]

[illegible] 吹 [illegible]

（治急喉痺） 以礬石生含咽下

（治喉痺） 以菉荷 [illegible] 爲末水調服

又方 [illegible]

又方

以附子去皮 [illegible]

治喉痺 [illegible]

千金 喉閉 [illegible]

杏仁去皮 [illegible] 如泥 [illegible]

治喉痺 [illegible]

治纏喉風方

用白礬 [illegible]

治喉中似物吞吐不出 [illegible]

取白囊荷根 [illegible] 汁服 [illegible]

治喉痺

草茶根 千金 [illegible]

右二味等合 [illegible]

治喉閉腫脹 [illegible] 諸風欲死者 [illegible]

本朝方書之三十七　十九

鬱金　天南星 [illegible]　巴豆 [illegible]

右除巴豆 [illegible]

藥乃微 [illegible]

丸治先以手 [illegible]

喉閉未有 [illegible]

瘀散即破 [illegible]

巴豆一箇微 [illegible]

豬牙皂 直者爲末 [illegible]

剉用水五盞煎 [illegible]

末桂薑各 [illegible]

姜散

治喉痺咽喉塞喘息不通 [illegible]

川椒 [illegible]

治咽痛 [illegible]

右用白礬一小塊 [illegible]

治喉痺（方一 [illegible] 水調下一字 未瘥再服）
用白礬嚼嚥汁服之立效（[illegible] 天南星 [illegible] 之）
又方用蕎麥根以水煮服之
本方
周內重湯疣中青龍水調灌之效
治纏喉風咽中如束氣不通
用甜瓜蒂不拘多少為末每服一字 [illegible] 五已下及老羊字 [illegible]
井花水調下一食時頃含沙糖一塊 [illegible] 如水出年深者延盡吐
一塊如延不水止如此矣 [illegible] 含沙糖一兩日 如吐多用麝香 [illegible]
湯一盞即止矣 [illegible] 用溫水調下 此藥不大 [illegible] 出延水 [illegible]
[illegible]
導引法
（出養生方）
養生方云兩手拓兩頰手不動樓肘使急腰內亦然住定放兩肋
頭向外附膊腰葉 [illegible] 大開 [illegible] 來去七遍 去喉痺

咽喉生癰 論
夫肺氣上通於喉 胃經外連於咽 若其氣和平則呼吸出納無所妨
若脾肺壅熱 [illegible] 上 [illegible] 攻於咽喉 結聚腫痛 不得消散 熱氣 [illegible] 致
結成癰 妨害吐納 古方論一寸為癤 二十至五寸為癰 其狀使人寒熱
鼓頷 緩漏 甚用鍼者 [illegible] 其可刺宜速破之 仍旋以點飼之劑 ○喉嚨者
呼吸之道路 氣之所上下也 懸雍為發音之門 脹胎有伏熱氣上衝喉
咽氣血壅而結於懸雍毒氣不散故腫痛妨悶甚者或不數 以通喉
出入不得食息宜急治之
方
天門冬煎 治喉癰咽塞不利
生天門冬汁 人參二兩 生地黃汁 生薑汁一升
生地黃 一升 桂 [illegible] 赤茯苓 [illegible] 半夏 [illegible]

甘草 [illegible] 生薑 [illegible]
右除四味汁外餘一味為末先以天門冬 [illegible] 汁煎 [illegible] 次入生
薑汁 又次入地黃汁 [illegible] 六味末同煎 [illegible] 入白蜜一
斤 [illegible] 四兩同煎 [illegible] 合 [illegible] 以 [illegible] 水調下一匙 以差為度
防風散 治喉癰及咽喉壅塞 [illegible]
防風 [illegible] 白附子 三分 川芎 一兩 麝香 [illegible] 研 丹砂 研
朴消 [illegible] 白朮 桂 [illegible]
赤茯苓 [illegible]
右為散每服半錢 [illegible] 溫酒調下 [illegible]
治懸癰咽中生癰 [illegible] 舌腫 [illegible]
用羊蹄 [illegible] 汁 [illegible] 吐 [illegible] 良
射干湯 治喉癰咽喉塞腫塞及心脾熱 [illegible] 吐納不利
射干 二兩 升麻 大黃 [illegible] 生薑 [illegible] 木通 各三分
馬藺子 [illegible]
右麁搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉七片煎七分去滓下馬牙硝半

錢匕攪令勻不拘時細細溫服
治懸癰腫痛咽喉不利
射干 半兩 木鱉子 [illegible] 甘草 [illegible] 川大黃 [illegible]
川升麻 [illegible] 杏仁 [illegible] 去皮尖 [illegible] 炒 [illegible]
右為末鍊蜜和丸如小彈子大常含一丸嚥津
玄參散 治懸癰腫痛不下食
射干 大黃 [illegible] 甘草 [illegible] 玄參 [illegible] 升麻 [illegible]
右細末每服三錢水一盞煎至七分放溫時時含嚥 良驗
破毒散 [illegible] 方
白礬 巴豆 [illegible] 紅內消 草烏頭 豬牙皂角
薄荷 [illegible]
右為末 [illegible] 主 [illegible] 入口內勿吞 以鹽湯漱
喉癰開關散 [illegible] 方
白明礬 [illegible] 牙硝 [illegible] 胭脂 [illegible]
右研細 烏梅肉丸 [illegible] 含嚥

治心疳乘熱暴脹長痛咽中生息肉舌腫方 [illegible]

乾姜 [illegible] 半夏 [illegible]

右等分末以少許著舌上 [illegible] 用從破和 [illegible] 又人先開口用

鈹針刺破血出後用藥少許 [illegible] 之和功若痒時以生姜汁解之

喉中懸癰垂長咽中妨悶

白礬燒灰 鹽花各一兩 [illegible]

啓闔散 [illegible] 上 [illegible]

[illegible] 甘艸 [illegible]

右為散每服二錢以水一盞煎 [illegible] 分放令之良久咽下

馬牙硝散 治喉痹 [illegible] 後以疳閉塞不通 [illegible] 上作 [illegible] 用馬牙

硝半兩細研為散每服一錢綿裹含咽津以通為度

又方

用童子小便四五合煮一合 [illegible] 錢二文令一方用藍不用錢

治懸癰腫痛喉咽不利胸中煩熱宜服此方

射干 一兩 玄參 半兩 川升麻 半兩 白礬 半兩 白藥 半兩

黃藥 半兩 竹黃 [illegible] 犀角屑 半兩 馬牙硝 [illegible] 甘草 炙半兩

右為末入研了藥令勻煉蜜和搗三二百杵丸如小彈子大不計時

候以綿裹一丸含咽津

犀角散 [illegible] 治咽喉中生瘡疼腫痛

犀角屑 [illegible] 玄參 三分 黃耆 [illegible] 黃芩 三分 絡石 三分

敗醬 三分 白斂 三分 川大黃 [illegible] 甘草 [illegible]

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓入川朴硝一錢攪令勻

不計時候溫服

治咽喉卒生癰腫飲食不通方 [illegible]

用燒秤錘令赤內一盞醋中令淬止飲之 一方用酒

治懸癰腫脹數寸咽喉水入不得食方

令病人大開口以箸抹舌下燒小烙鐵於竹管中烙即愈少根不去

須更烙之明以從通為度

硼砂散 [illegible] 治懸癰腫痛

硼砂 [illegible] 馬牙硝 [illegible] 滑石 寒水石 [illegible]

腦子 [illegible] 白礬 [illegible]

右研令極細每服半錢新汲水調下不計時候

鉛霜散 [illegible] 治懸癰腫脹疼痛

鉛霜 [illegible] 甘草 [illegible]

右都研為散每服 [illegible]

治懸癰咽中生息肉舌腫方

日初出向日張口使人以左手拈其 [illegible] 上七下痊

治喉內生疳 [illegible]

用五倍子為末入 [illegible] 向 [illegible] 食化其痛自破

治喉痹卒腫 [illegible]

用 [illegible] 人參二枚細末一方用一兩水一大盞煎至五分去滓頓服

之

喉痹卒腫 [illegible]

用硼砂半錢綿裹含咽津瘥

喬鍾風即喉閉痛瘡長短有長數寸著 [illegible]

用食篋喉過熱毛蕪下即消不須針破則傷人 一方綿裹箸頭挂鹽

揩日六七度 易名雪花散

聖惠簡治咽喉腫痛喉閉塞急令開口看有瘡若有須是針破方

可若望不見以草麻子打碎用綿裹作筒一頭燒烟起以烟熏咽

喉內自然可開照望見以三稜針刺破出血 [illegible] 便愈更有

貴官之家不喜用針者以筆蘸藥 [illegible] 刺之

一方用巴豆依前法煉熏或只以草麻子巴豆一處搗油在紙上作

紙撚子燒用

治咽喉腮生肉層層相疊漸漸腫起不痛多日乃有竅子臭氣自出

[illegible] 葉前湯 [illegible] 服食

用臭橘葉煎湯連服食

治咽喉生瘡藥不下咽閉 [illegible]

生麻油 [illegible]

右以生麻油 [illegible] 時含嚥之吐出 [illegible]

治喉痹方

楊立之自廣府通判歸楚州，喉間生癰，既腫潰而膿血流注，晝夜不止，寢食俱廢。醫者束手。適楊吉老來赴郡，守招立之兩子延往數之。至，熟視良久，曰：不須看脈，已得之矣。然此疾甚異，須先啖生薑片一斤，乃可投藥，否則無法也。語畢即出。子有難色，曰：喉中潰膿痛楚，豈宜食生薑？立之曰：吉老之術通神，其言不妄。試取一片嚼之，如不從，定則再去無害。遂食之，殊為甘香，稍復加益，至半斤許，痛處已寬；滿一斤，始覺味辛辣，膿血頓盡，粥餌入口了無罣礙。明日招吉老謝而問之，對曰：君官南方，多食鷓鴣，此禽好啖半夏，久而毒發，故以薑製之。今病源已清，無庸他藥。予記唐小說載崔魏公暴亡，醫梁新診之曰：中食毒。僕曰：常好食竹雞。新曰：竹雞多食半夏苗，蓋其毒也。命搗生薑汁折齒灌之，遂復活。甚與此相類，并錄記。

治喉痹方

以山豆根常含，嚥汁。

治舌腫喉痹

用白礬半兩，燒過去入半夏和湯調，遂口服之，血泡隨手自消。若

輕少驟變作血風瘡

半夏厚朴湯　治咽中如炙臠

半夏五兩　厚朴三兩　茯苓　紫蘇葉二兩

右為細末，每服五錢，水二盞，姜五片，煎一盞，去滓服。

雄黃散　治咽喉瘡，切生結喉上，如瘰癧，咽後有核子

雄黃　寒水石　各一錢　粉三分　乳香一字

右為研細末，每用白梅湯調，含已破，去膿方，乾貼。

破毒丹　治單雙蛾

右用巴豆一枚，紙裹火內炮令熟，破開兩處，去紙，將起頭皮，少子左蛾塞右鼻，右蛾塞左鼻，若雙蛾則著兩處，待時餌破膿血下也。

白丁香丸　治咽喉雙蛾單蛾

用白丁香二十個，以少糯米飯研極爛，一塊同研，分作三丸，每一丸用薄綿子裹，令含在口內，當時即愈，甚不過兩粒。

也。北松有奇功。

治卒喉中生肉

以綿裹箸頭，拄鹽揩，日六七度，易。

咽喉生瘡　論

夫咽喉生瘡，或白或赤，其白者多涎，赤者多血，此由上焦有熱，脾肺不和，熱搏其經，蘊發咽喉也。

方

半夏散　治咽喉生瘡，聲如蛇，語聲不出

半夏　麻黃　乾薑　杏仁　紫菀花　陳橘皮　吳茱萸　桂去皮　獨活　當歸

右㕮咀，每服五錢，以水一盞半，煎至一盞，去滓，食後服，日三。初病一二日可發汗，病久者可加大黃一兩半，初秋夏月暴雨，冷宜天行暴熱者，以效於內宜加生薑二兩、乾姜、茱萸、枳實各一兩，依製如前法。

黃耆散　治咽喉內生瘡疼痛

黃耆　甘草　梔子仁　黃芩三分

赤茯苓　犀角屑　川升麻　紫菀

麥門冬去心　玄參一兩　牛蒡子

右為散，每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓，不計時候溫服。

治喉中有瘡，儘血不下食，宜服此方

黃耆一兩　馬牙硝　蔓荊根　滑石一兩

射干一兩　羚羊角屑　甘草　川大黃

玄參半兩

右為散，每服四錢，水一中盞，煎至六分，去滓，不計時候溫服。

療喉中及舌生瘡爛方

用剉薔薇根，濃煮汁，含嗽之，冬用根，夏用枝葉。

又飲酒舌生瘡方　治連月飲酒，咽喉爛，舌上生瘡

用水中螺蚌肉，蔥、豉、生椒煮汁，飲三兩盞，差。

療喉口中及舌生瘡爛方

用黃連一兩炒水三升煮取一升稍稍含之嚥之 [illegible] 含水

黃耆湯 治咽喉痛生瘡

黃耆 甘草 麥門冬 山梔子仁 人參

黃芩 人參 赤茯苓 [illegible] 貝母

紫苑

右麁搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓溫服食後日三

去毒錢泥丸 治上焦有熱咽喉生瘡赤根白頭疼咽痛含口中嚥化之

五倍子 紅雪

[illegible] 朱砂 麝香 馬勃 升麻

龍腦 甘草

右為細末煉蜜和丸如雞頭實大每一丸含化下不計時候

犀角散

生犀角屑 玄參 升麻 生黃耆 麥門冬

生粉草 當歸 大黃 赤芍藥

右為麁末每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服無時候

龍膽煎 治喉中瘡并口瘡

龍膽 黃連 黃蘗 升麻 苦竹葉

槐白皮 大青 白蜜

右細剉七味如麻豆以水三升煮取七合絞去滓下蜜攪勻再煎五六沸每服一匙頭含化嚥津日可五六服差

秘紅散 治咽喉中生瘡腫赤紫色苦咽喉痛嚥物有妨

金箔 銀箔 丹砂 馬牙硝 甘草

鉛白霜 凝水石 太陰玄精石

右研每服一字甘草水調下如要丸以棗肉和丸如皂子大含化

琥珀犀角膏 治咽喉口舌生瘡

真琥珀 生犀角 辰砂 茯神

去心 真龍腦 酸棗仁 人參

右人參茯神犀角為細末入乳鉢內研和 [illegible]

青黛丸 [illegible] 每服一彈子大以麥門冬去心

煎湯化一日三進 [illegible]

利膈湯 治脾肺有熱虛煩上壅咽喉生瘡

薄荷 荊芥穗 防風 桔梗 人參

牛蒡子 甘草

右為末每服一錢 [illegible]

生地黃湯 治咽喉中生瘡 [illegible]

生地黃 升麻 玄參

赤茯苓 麥門冬

右除地黃外 [illegible]

白藥丸 治咽喉中有瘡

白藥子 黃藥子 玄參 射干 甘草

桔梗

右件為末煉蜜為丸如彈子大綿裹含化嚥津

牛黃金虎丸 治風壅毒氣上攻咽喉舌腫生瘡 [illegible]

牛黃 龍腦 人參 甘草

丹砂

右研細以 [illegible] 和丸如雞頭實大一丸含化

救命散 治脾胃熱毒上攻心肺咽喉有瘡 [illegible]

大黃 黃連 白殭蠶 甘草

膩粉 五倍子

右為細散每服一字大人以竹管子吹 [illegible] 小兒 [illegible]

治咽喉瘡 [illegible]

龍腦 薄荷葉 大黃 甘草 盆硝

蒲黃

右為細末 [illegible]

生地黃散 治咽喉內生瘡吐血不下心胸且悶
 生乾地黃 五兩 心焙 雞蘇葉 赤茯苓 麥門冬 去心 玄參 一兩 甘草 半兩 炙
右為散，每服三錢，水一盞，入竹茹一分，煎至六分，去滓，不計時候溫服。

治咽喉熱毒所攻生瘡且服此方
 中等子 甘草 升麻 玄參
 黃藥
右為末，煉蜜和丸，如彈子大，含化一丸咽津。

治熱病口瘡咽喉生瘡水漿不得入者
 射干 升麻 附子 白藥
 當歸
右㕮咀，以漿用四兩，先煎，取汁含之，日四五度。

小鵝砂散 治咽喉壅塞生瘡
 鵝砂 馬牙硝 桔梗 甘草
右為細末，乾摻咽中。

薔薇根飲 治咽喉生瘡連舌頰痛不可忍者
 薔薇根皮 升麻 生乾地黃 黃柏 鉛白霜
右擣羅四味為末，入鉛霜研勻，每服二錢匕，水一盞，入蜜半匙，煎至七分，稍溫，口熱漱咽喉，令即吐之，及時用藥末摻瘡上。

升麻湯 治咽喉生瘡
 升麻 甘草 炙 石膏 牡丹皮
右麤擣篩，每服三錢匕，水一盞，煎至六分，去滓，細細服。

黃連散 治咽中生瘡久患傳方不下食日漸羸瘦
 黃連 豉 蔥白 豬膽
右先以童子小便八合，煎黃連豉蔥白，取四合，去滓，下豬膽。

治咽喉內生瘡疼痛宜用此方
 龍腦 黃丹
 射香

右先以水化開，半以火熬，黃丹煎成膏，每服如杏仁大。
含化咽津。
大粉末
杏仁丸 治咽喉及舌生瘡
 杏仁 甘草
右搗研和勻，蜜丸，含化。
治口中瘡
 治舌
 右
烏犀丸 治舌上瘡
 黃連
右為末，煉蜜丸如梧桐子大，每服三十丸，食前。
千金地黃丸 治
 黃連 生地黃
右為末，蜜丸如梧桐子大，每服三十丸。

可
含瘡口方 出危氏方
 滑石 黃丹
右為末，研勻，甘草二錢。
治咽中瘡腫方 出衛生方
 蒲州膽礬 一錢
右搗末研勻，一字入竹管內吹瘡上。
治咽中瘡腫方 出聖惠方
 麻子 朴硝
右同研。
治咽喉及舌生瘡爛方
 黃連
治連月飲酒咽喉爛舌上生瘡
 大棗仁

右五味末之每服[illegible]一匙白湯[illegible]

【咽喉生瘡令咽喉不利者】[illegible]

[illegible]

【硼砂散】治[illegible]

取木香量服至瘡[illegible]

南[illegible]　升麻　白茯苓　[illegible]

[illegible]　山豆根　甘草　[illegible]

蒲黃　[illegible]

右為細末入研藥每服半錢[illegible]

痛甚無妨不拘時候

【龍腦散】治[illegible]咽喉生瘡

朴硝　甘草　龍腦　薄荷

右為末[illegible]生瘡用筒吹入口瘡處井花水調嗽

【膽礬散】治瘡

膽礬一錢　硼砂一錢

右為細末搽瘡處立效寧則用含瘡口效

【乾艮散】[illegible]

右各等分為細末水[illegible]

主咽喉腫痛

【半夏金屑】

半夏　南星　白殭蠶

一方[illegible]

【咽喉生瘡】

取杏仁去皮熟令赤和桂末研如泥[illegible]含之

【治咽中及口舌生瘡爛】

川黃連　[illegible]

【治咽喉生瘡方】[illegible]

尸咽喉

論

夫道家服氣務先去三尸蟲尸蟲為人害也尸咽之病亦本

於此復中尸蟲上蝕咽喉作[illegible]生瘡或痛如瘡如癢之候

者是也若補生瘡[illegible]亦[illegible]治之勿使妄

動則善矣

方

【黃藥湯】治尸咽喉閉塞出[illegible]乾嘔咽痛食不

下

黃藥　升麻　木通　[illegible]

竹茹　[illegible]　玄參

前胡　[illegible]

右[illegible]每服三錢[illegible]去滓入芒硝末一錢

攪令勻[illegible]

服不計時候[illegible]

【金露丸】治尸咽[illegible]風熱[illegible]

硃砂　[illegible]

[illegible]

右[illegible]丸如[illegible]大每服不食後[illegible]

【治尸咽喉痒痛[illegible]宜服此方】

[illegible]

右為散每服三錢水一盞[illegible]

【蛇蛻散】治尸咽喉痛

蛇蛻皮　白梅肉　甘草　[illegible]

右為散每用[illegible]一錢以[illegible]含化[illegible]不計時

【治尸咽喉痛方】

杏仁[illegible]

右為末煉蜜為丸如彈子大含化[illegible]

【一捻金散】治尸咽及走馬[illegible]

雄黃　[illegible]

右[illegible]

【杏仁散】治尸咽喉內[illegible]失聲

杏仁 桂心 人砂一

右爲散每服一錢匕綿裹含化咽津

治尸咽喉痒痛

射干一兩 薔薇根 升麻

右爲散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治尸咽方

用蜣螂燒爲灰暖水服之

治咽喉中痒痛吐之不出咽之不入似得蠱毒方

用含生薑五十日瘥

又方

用青布裹麻黃燒以竹筒引煙熏咽中

治尸咽方

用燒麻子脂服之

治飛尸遊蠱喉中有物吞吐不出方

用蚺蛇肉作鱠食之

○狗咽論

夫狗咽者喉中忽塞是結塞不通如狗喉之狀是也蓋陰陽之氣出於脏腑循喉嚨而上下者風熱毒氣客於喉間氣結蘊積而生熱故有結塞之候俗云此疾由誤吞狗毛所致治法亦有用飯與狗分食取瘥者撰去之法也

方

昆布丸 治因喉中氣結氣塞不通狀如喉痹者

昆布洗去鹹 訶梨勒皮 二兩 檳榔 一兩 松蘿 乾薑炮

桂去皮 海藻洗去鹹 木通 各二兩

右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服空心下二十丸食後臨臥服

馬牙消散 治狗咽氣塞喉痹氣欲絶者

馬牙消 木通 升麻 川朴消 犀角屑

馬藺子各一兩 射干 玄參各一兩

右細剉以水五盞煎至二盞半去滓下白蜜二兩再煎成膏每服一匙頭含化咽津

玄參散 治狗咽氣塞

玄參 杏仁 甘草炙 赤茯苓

白朮 桔梗 人參各半兩

右爲散每服二錢匕熱湯調下日三五服

丹砂湯 治狗咽喉中忽覺結塞

丹砂 桂去皮 絳礬

右爲末綿裹用好酒少許浸良久含之即效

三灰散 治狗咽纏喉風

燈心燒灰 炭上白灰 白殭蠶

右同研爲散生薑蜜水調下一錢匕

如聖散 治狗咽及咽喉腫痛急

赤芍藥 防風 天麻

右爲散每服一錢茶調下不拘時候

石膽散 治纏喉風及狗咽

石膽 白礬

右件細研每服半錢匕溫漿水調下取吐出惡涎後轉一兩行瘥

雞子法 治狗咽

半夏 雞子一枚

右先開雞子頭去黃只留白入半夏末於殼中攪令勻安雞子坐於塘灰中使煎熟取出候稍冷就殼分溫三服之

治狗咽喉方

用粟米飯三合以手團爲一塊與狗分而食之即愈

治咽喉忽覺氣塞喘息不通須臾欲絶方

用獨顆蒜一枚削去兩頭可塞鼻竅患左塞右患右塞左鼻候中膿血出立效

惡實散 治風熱咽塞咽喉腫結

用惡實一合半生半炒擣羅爲散每服溫水調下一錢匕立瘥 一方取生薑汁研含咽上 薫 椎一 蝦破肉咽中 一方用生鼠粘子爲末

為丸噙化又用枳殼二錢以人參二錢煎六分去滓分五服
一字散
（硼砂丸）治喉中忽熱結塞
（黃回散）治纏喉
芒硝 一兩 硫黃 一兩
右先將芒硝於銚子內放令沸然後入硫黃末攪令勻
傾在新瓶內放冷研細如粉每服一錢新汲水調下
○咽喉生穀賊
論
夫喉中生穀賊者喉中結腫不痛不痒飲食噎此由禾中有芒
之芒誤吞喉中如芒刺不上不下風熱加之則結腫不能消了
治之遲則能殺人
方
除芒散 治咽喉中生穀賊如穀狀不上不下吞嚥妨悶
象牙末 一分 甘草 大者一寸 滑石 半分 綠豆末 一兩 鬱金 半兩
乳香 研 硼砂 研 麝香 研 各等分
右為散每服半錢新汲水調下
（五味子湯）治咽喉中生穀賊結腫疼痛妨害飲食
五味子 乾薑 麥門冬 去心 桂 去皮 各一兩 桑根白皮
粳米 一合
右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至五分去滓溫服日三不計時
（射干湯）治咽喉生穀賊妨悶
射干 升麻 桔梗 玄參 大黃
甘草 各半兩
右粗搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉七片煎至六分去滓食後溫
服如要通利加大黃一兩以利為度
（治）咽喉生穀賊腫痛方
童子小便 [illegible] 木通 [illegible] 大黃 [illegible]
半夏 [illegible]
右為末煉蜜和丸如梧桐子大以綿裹一丸含化咽津

乳香丸 治喉中生穀賊 [illegible]
乳香 [illegible] 硼砂 [illegible] 琥珀 [illegible] 龍腦 [illegible]
右各研為末再研和勻煉白蜜為丸如雞頭大每服一丸含化咽津
[illegible]
（茯苓散）治喉中生穀賊 [illegible]
茯苓 黃芩 [illegible]
右為細末乾摻一錢喉中次以水送下
治穀賊立效方
硼砂 牙硝 各等分
右細研每服半錢 [illegible]
（麻仁散）治穀賊咽喉中痒誤吞穀芒滯刺在喉
用麻仁不以多少為末湯調服凡穀賊屬 [illegible] 不可不分
治穀賊喉中 [illegible] 咽喉中 [illegible]
用礬石生研為末少少 [illegible]
含咽津 [illegible]
又方
用蛇蛻燒灰 [illegible] 一小 [illegible]
錢匕含
（升麻湯）治咽喉生穀賊 [illegible]
（穀賊方）
木鱉子仁 川大黃 牙硝 各一十 山豆根
川升麻 白藥 各等
右為末煉蜜丸如皂子大以綿裹含 [illegible]
（如神丸）治咽喉中忽然結塞不通 [illegible]
咽喉中如有物妨悶
論
夫咽者謂之 [illegible]
有物者乃脾胃 [illegible] 熱 [illegible] 積結於咽喉使然故聖惠 [illegible]
逆並結皆主是 [illegible]
方

防風散 治咽喉中如有物妨悶噎塞寒[illegible]
防風 人參 白术 桔梗 羌活
天麻 芎藭 白芷 赤茯苓
細辛 高良姜 前胡 甘草 京三稜
半夏
右爲散每服三錢匕食前調下[illegible]日二不拘時
杏仁煎 治肺胃壅咽喉中如有物妨悶
杏仁 桑根白皮 大棗 貝母
生薑 地黃 酥 紫菀
甘草 桔梗 五味子 赤茯苓 地骨皮
人參
右先以杏仁以水五升[illegible]同煎至二升以綿濾去
滓下酥及地黃汁[illegible]煎[illegible]含一匙[illegible]
射干散 治咽喉中如有物妨悶噎塞疼痛[illegible]不下
射干 犀角屑 川升麻 桔梗

鄕藥集成方卷之七十三 五六

紫蘇子 赤茯苓 枳殼 檳榔 甘草
木通 木香
右爲麤末每服三錢水一盞煎至八分去滓温服不拘時候
木香湯 治咽喉噎塞如有物妨悶
木香 陳橘皮 厚朴
半夏 白术 甘草 桂
大腹皮 前胡 人參 桔梗 芍藥
右麤搗篩每服二錢水一盞入生姜一棗大拍碎同煎至六分去滓食
後熱服日三
半夏湯 治咽喉中如有物妨悶
半夏 人參 甘草 桔梗
桂 吳茱萸
赤小豆
右件如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生姜三片大棗三枚擘破
同煎至八分去滓温服

射干散 治咽喉中如有物噎塞
射干 桂心 枳殼 半夏
訶梨勒皮 川升麻 木通 大腹皮
右爲散每服四錢水一盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候温服
含化龍腦丸 治咽喉中有物如彈丸日數深遠[illegible]難嚥
藏即須吐[illegible]結聚散盡妙
龍腦 川升麻 甘草 馬牙消
射香 [illegible] 川大黃 生地黃
右爲末入研了藥研令匀以地黃汁相和更入鍊了蜜和丸如櫻子
大不計時候以綿裹一丸含嚥[illegible]咽喉通利爲度
人參湯 治咽喉如有物噎塞
人參 桂 甘草
陳橘皮 烏梅 射干
右麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓温服不拘時候服之
羚羊角湯 治咽喉如有物妨悶食即噎塞不下

鄕藥集成方卷之七十三 五七

羚羊角屑 赤茯苓 半夏 木通
射干 倉粟米 桔梗 蘆根
右麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生姜一棗大拍碎煎至八分去滓食
後温服日三
竹茹湯 治咽喉中如有物噎塞胃氣不出
竹茹 甘草各一兩 人參 赤茯苓 桂
麻黃 五味子 木通
右麤搗篩每服三錢匕水一盞入生姜半分拍碎煎取六分去滓食
不計時候日二
木香散 治咽喉中如有物噎塞不通吞不能入吐不能出
木香 犀角屑 玄參 羚羊角屑 射干
桑根白皮 川升麻 紫菀
檳榔
右爲散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候温服
射干湯 治咽喉中如有物噎塞不下

射干 升麻 杏仁 百合 木通 各一

桔梗 赤茯苓

右麄搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食後溫服如要通利每服加朴硝末一錢匕未夬再煎入攪勻服

黄芩射干湯 治咽喉如有物噎塞

黄芩 射干 枳殼 半夏

甘草 升麻 桂

右麄搗篩每服五錢匕水一盞半入生姜五片同煎至八分去滓溫服日二

絡石湯 治咽喉中如有物噎塞

絡石 射干 升麻 桔梗

木通 赤茯苓

右麄搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫服如要利加芒硝末一錢匕攪勻服之

黄耆甘草湯 治咽喉似有物噎塞寒下氣上衝飲食減少

黄耆 甘草 桂 人參 芍藥

茯苓

右㕮咀如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑三片大棗二枚擘破同煎取八分去滓溫服

前胡散 治咽喉中如有物妨悶宜急不急

前胡 人參 桂心 甘草 檳榔

陳橘皮

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

半夏散 治咽喉中如有物妨悶

半夏 厚朴 赤茯苓 一兩

紫蘇子 前胡 枳殼

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

半夏木通湯 治咽喉如有物塞氣飲食妨悶

半夏 木通 乾薑 竹葉

桑根白皮

右麄搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓熱服一方搗為細末煉蜜丸如梧桐子大每服十五丸食後生姜湯下漸加至二十丸

麥門冬湯 治肺胃氣壅風熱客搏咽喉妨悶

麥門冬 半夏 人參

甘草 食糧米

右麄搗篩每服三錢匕以水一盞入棗一枚擘破煎至五分去滓溫服日不計時候

桔梗湯 治咽喉中如有物妨悶

桔梗 人參 甘草 半夏

右麄搗篩每服三錢加至五錢匕水一大盞入生姜五片同煎至六分去滓溫服食後臨臥

人參丸 治咽喉如有物妨塞氣噎飲食不下

人參 一兩 桂 甘草 陳橘皮

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食後生姜湯下漸加至三十丸日再

四味湯 治咽喉中如有物吐不出

半夏 赤茯苓 厚朴 陳橘皮

右麄搗篩每服三錢匕水一盞入生姜一棗大拍碎煎至六分去滓食後溫服

厚朴湯 治咽喉中如有物

厚朴 紫蘇葉 赤茯苓 半夏

右麄搗篩每服三錢匕水一盞入生姜三片同煎至六分去滓食後服日三

杏人丸 治咽喉食即噎塞如有物不下

杏人 桂 人參 枇杷葉

石爲末煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸含化嚥津以瘥爲度

治咽喉中如有物吞嚥不下宜用此方

桂心一兩 半夏一兩湯洗七次 陳橘皮一兩湯浸去白焙

訶梨勒皮一兩

石爲散每服水一中盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫服

一方每服三錢

石羌活散 治咽喉如有物噎塞飲食不下

石羌子以人參 作頭擇 [illegible]

石京搗篩每服三錢以水一盞煎至六分去滓溫服食後日三

天竺黃散 治咽喉中如有物妨悶或在左或在右名曰氣結積氣杖於咽喉之間多爲此疾宜服此方結氣之疾使每宜服之

小大黃 牛蒡子 甘草 [illegible]

石爲散每服三錢水一中盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候服

桔梗湯 治咽喉中如有物妨悶

桔梗 半夏 [illegible]

石等分剉如麻豆每服五錢以水二盞生姜七片同煎至七分去滓溫服

杵糠丸 治咽喉中如有炙臠食即噎塞

用碓杵頭細糠二合爲末煉蜜丸如彈子大空腹含化一丸嚥津

薄荷方 治咽喉中似撥吞吐不出服雖 [illegible] 亦治口舌生瘡

取白薄荷根絞汁服之立出 如口舌生瘡以前汁含之

台飛絲生於喉舌之間此亦是腫也小者亦宜刺破不其 [illegible]

細辛湯

玄參升麻湯 治咽喉中如腫氣 [illegible]

連翹二分 升麻五分 桔梗二分 牛蒡子一分 防風一分

玄參二分 甘草一分 炒黃芩一分 白殭蠶二分 黃連五分

右件生如麻豆大作一服水二盞煎至七分去滓稍熱噙嚥

嚥之前證良驗

咽喉腫塞論

夫咽喉者生於肺胃之氣也咽者嚥也口可嚥物又謂之嗌主通利水穀胃氣之路故爲胃之系咽重十兩廣二寸半至胃長一尺六寸也喉嚨者空虛也言其中空虛可以通於氣息呼吸出入主肺氣之流通故爲肺之系喉嚨重十二兩廣二寸長一尺二寸有九節故知咽門與喉嚨並行其實兩異也若風熱所喉腫塞氣不能通其則口噤若脇寒則咽喉如有物礙悲哀痰多是嗔是以熱則通之寒則補之不熱不寒依經調之寒熱和平病不生矣儒門事親書云一婦人病咽喉腫塞藥閉不下數日腫不退既難下針亦無功戴人以蔥歸芥甘草煎使稍欲之以冷水探其兩手不五六日痛減腫消飲食如故咽喉之病甚急不可妄用針藥

方

會仙救苦丹 治咽喉閉塞不通有妨嚥救亦治骨鯁

採甘草 寒水石 烏賊骨 白殭蠶 硼砂 人參

白茯苓 官仲 麝香少許 朱砂 象牙末各一

右爲細末蜜和丸如雞頭大用硼砂爲衣每服一丸噙化嚥

半合和取庚申甲子日

二參丸 治心肺壅熱咽喉閉塞不通

玄參 紫參 白藥 大黃 山梔子

地骨皮 甘草 前胡 桑根白皮 防風

右搗篩每服三錢以水一盞煎至七分食後去滓溫服

天門冬煎丸 治咽喉腫塞

天門冬 麥門冬 款冬花 貝母

紫苑 赤茯苓 升麻一兩 白藥五兩

酥一 生地黃汁一升

右將前十味細末以水三升煎取一升絞去滓內地黃汁并蜜及酥再熬入瓷器中重湯上煎成膏丸如彈丸大每服一丸含化嚥津

烏姜丸 治喉咽者肺胃之候若風熱喉則腫塞神氣不通服也

生烏姜 升麻 羚羊角 通草

竹葉各二 生地黄各四 蘘荷根各一 猪脂二斤 艾葉六銖生者大佳
右㕮咀綿裹苦酒一升半漬一宿內猪脂中微火煎取苦酒盡膏成青不
鳴為度去滓薄綿裹膏似大杏人內喉中細細吞之

鵬砂散治咽喉腫痛閉塞不通
鵬砂 白僵蚕 百藥煎 川芎各一兩 山豆根
龍腦 薄荷 紫河車各半兩 青黛一錢
右為細末大人每服半錢小兒一字吹於咽中或水調服

升麻散出聖惠方治咽喉閉塞口噤
川升麻一兩 防風去蘆頭半兩 黄耆銼一兩 甘草炙微赤銼 細辛一分
黄芩二兩 杏人一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄 羚羊角屑半兩 羌活半兩
右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候温温灌
之

半夏散出聖惠方治心脾風熱咽喉閉塞口噤
半夏一兩湯洗七遍去滑 玄參一兩 川升麻半兩 犀角屑一兩
黑豆皮一兩半 牛蒡子一兩微炒 甘草半兩炙微赤銼 木香半兩 枳殼半兩麩炒微黄去瓤
右為散每服三錢水一中盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候
温温灌之

麝香朱砂丸出聖惠方治咽喉腫塞閉隔或作瘡痛或舌本腫脹滿口生
瘡津液難嚥
燒寒水石一兩 硼砂一兩 鉛白霜 龍腦各二分
麝香二分 甘草一兩 朱砂一兩 馬牙硝生一兩
右研勻細用甘草膏子和丸如梧桐子大朱砂為衣每服一丸噙
化嚥津不拘時候

金命丹治急喉痺纏喉風結毒腫閉塞涎壅氣不得通水漿不下以致危
殆者
黄連 井泉石 寒水石 白礬
訶子去核 鉛白霜 青丹各三 五倍子去瓤
右為細末每服一錢分三丸調和稀糊時時呷之或乾摻亦得其効如
神亦治白口瘡惡瘡瘡

升麻湯治喉中瘡閉塞不通
升麻半兩 木通一兩 射干 絡石 羚羊角屑三兩鎊
竹茹 淡竹葉 杏人一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒
右除竹葉外麤搗篩每服三錢水一盞入竹葉七片煎至六分去滓
温服日三

川升麻散出聖惠方治咽喉閉塞不通壯熱飲食不得
川升麻半兩 絡石一兩 射干半兩 犀角屑半兩
甘草炙微赤銼 杏人湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄各半兩 木通銼一兩
右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

犀角丸出聖惠方治咽喉腫塞不通舌强
犀角屑半兩 羚羊角屑半兩 川升麻半兩 生乾地黄半兩 黄耆半兩
甘草炙微赤銼 馬藺根半兩 馬牙硝一兩
右為末煉蜜和丸如梧桐子大每日四五度以薄綿裹一丸噙津

皂莢煎出聖惠方治咽喉閉塞腫悶宜服
皂莢不蛀者四十挺 搗麻根一大握 天蓼根一握去心
白蘭根一大握 消石四兩研 白鹽一兩 硇砂一兩細研
右先以皂莢槌碎以水二升浸一宿熟挼濾以汁煎諸草根及杏至
至一升漸去滓下消石等末煎候十沸攪令稠每服一兩更取候如
稀餳收令以瓷器貯及鵝翎蘸藥點於咽喉膿出如

玄參散出聖惠方治熱毒伏在心脾攻於咽喉心胸壅滿口噤
玄參一兩 牛蒡子微炒一兩 川升麻一兩 犀角屑一兩
甘草一兩炙微赤銼 桑根白皮一兩 黑豆皮半兩
右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時候温温灌
之

無比散出聖濟方治咽喉
青黛 白殭蚕 甘草 馬牙硝 板藍根
紫河車 薄荷 桔梗各等
右為細末乾摻喉內或蜜丸噙化亦可

蒺藜散出聖濟總錄治咽喉
蒺藜 白礬二兩細研 猪牙皂角三茎去皮 雄黄一分
粉草 北薄荷各二

右為細末，既服少許，治咽喉閉塞，用竹管子吹入即愈
乳香散 出聖濟總錄 治咽喉
乳香 青黛 朴硝 鵬砂 粉草
雄黄
右各等分，為細末，乾下一字
茯苓湯 治咽喉閉塞不利 咽
治咽閉塞不通
用馬屁宗茵量十丸
漏蘆丸 治積熱發為喉痹，毒氣壅塞咽喉，痛塞藥水
藥不下，一切危急痹症
漏蘆 升麻 大黄 黄芩 藍葉
玄參 各二兩
右剉，每服二錢，水煎，腫熱甚加芒硝二錢半
射干丸 治咽喉閉塞不通，含化
射干 一兩 川升麻 一兩 豆豉 半兩 芍藥 一兩 杏仁 湯浸去皮尖
枳殼 麩炒 甘草 炙 各半兩
右為末，煉蜜和丸，如半棗大，每日四五度，以新綿裹一丸含咽
治咽喉閉塞口噤 出聖惠方
桂心 一兩 杏仁 一兩 石膏 一兩 甘草 半兩 川升麻 半兩
羚羊角屑 半兩
右為散，每服三錢，水一中盞，入生薑半分，煎至六分，去滓，不計
時候，温服
五香散 出聖濟總錄 治咽喉腫痛，諸惡氣結塞不通，含咽服之
木香 沉香 雞舌香 薰陸香 各一兩 麝香 半兩
右為末，入麝香研令匀，每服二錢，水一中盞，煎至六分，温服，不拘
時候
通氣散 治時氣頭面赤腫，或咽喉閉塞不通，用之取嚏，以泄
其毒則退，若有病之人用此藥，諸不得嚏者
玄胡 一兩 藜蘆 半兩 躑躅花 二錢半 川芎 猪牙皂角 各
右為細末，每用紙捻子蘸一米許，紙於鼻中，取嚏為效

鵬砂散 出丹溪心法 治咽喉閉塞
鵬砂 研 膽礬 白馬牙硝 各一錢 龍腦 一錢 鉛白霜 三分
右研細，每以筋頭點於喉痹子兩處，如開口不得，以竹管吹之立效
龍腦散 出聖濟 治咽喉閉塞痛
龍腦 一分 石膏 二兩 研 寒水石 半兩 朴硝 一分 鵬砂 一分
右細研為散，每服不計時候，以新汲水調下半錢
升麻丸 出聖濟 治咽喉閉塞不通
川升麻 半兩 射干 一分 白礬 一分 馬牙硝 一分
右為末，煉蜜和丸，如棗子大，用綿裹，含一丸咽津
治咽喉閉塞口噤方 出聖惠方
皂莢針 一兩 搗白皮 半兩
右為散，每服水一中盞，煎至六分，去滓，細細温服
射干丸 出聖惠 治喉痹塞，咽門不能咽
射干 杏仁 湯浸去皮尖 附子 炮 桂心
右為細末，煉蜜為丸，如雞頭大，每服一丸，以新綿裹，含咽
漱口地黄散 出聖濟 治脾熱氣上攻，咽喉腫痛，生瘡，閉塞不通，或
生舌腫
黄芩 一兩 甘草 炙 荊芥穗 三兩 薄荷 一兩
右為細末，每用二錢，水一盞，入薄荷少許，煎三二沸，去滓，熱漱，冷吐
不計時候
四神散
川大黄 寒水石 各一兩 牛蒡子 芒硝 各半兩
右為細末，新水調下，治腫毒咽喉腫塞，生瘡，含化嚥津
趂生散 治時疾頭面腫，咽喉腫塞，氣壅難通
山豆根丸 治積熱咽喉閉塞腫痛
山豆根 一兩 北大黄 川升麻 朴硝 各半兩
右為末，煉蜜丸，如皂子大，每一粒，以新綿裹，含嚥
世效 治咽喉閉塞不通
大黄 甘草 芒硝 防風 去叉 各等
右麁搗篩，每服三錢，水一盞，煎至八分，去滓，食後服，不計時候

妙聖散 治時氣纏喉風漸入咽塞水穀不下牙關緊急不省人事
雄黃 藜蘆 白礬 猪牙皂角
右各等分為細末每用一豆大吹鼻內嚏出立甦
立通散 治咽喉閉塞不通
硼砂 二礬 白梅肉 一七枚
右為散每用半錢吹入喉內或水調下得吐立通
吳茱萸散 治喉痹
蜜 荊芥 甘草 各等分
右為末水調三五錢去渣服
異功金散 治咽喉急壅塞
鬱金 白礬 雄黃 膽礬
猪牙皂角 巴豆
右為細末每服半錢新汲水調下
喉下如口噤以巴豆油紙捻成條子燒煙熏鼻
子醋調用鵝毛掃患處痰出為度若不效更進一服

治咽喉閉塞不通含嚥
甘草 馬勃 甘草
右為末煉蜜和丸如□大每日四五度以新綿裹一丸含嚥
治咽喉閉不通 出聖惠方
赤馬頭汁 生薑汁 童子小便 一合
右相和攪令勻徐徐灌入喉中即立通
鬱金散 治咽喉腫結閉塞
鬱金 膽礬 全蠍
右為末以鵝翎蘸藥入喉中少頃吐出毒涎
水調下候吐出毒涎即愈未吐再服
金散 治咽喉閉塞不通
白礬 巴豆
右等分細研為散每服半錢以
硼砂散
硼砂 馬牙硝

夭

右細研令勻每服以新汲水調綿裹含咽
又方 出聖惠方
馬藺花 一兩 蔓荊子 一兩
右為散每服不計時候以溫水調下一錢
治咽喉閉塞口噤方 出聖惠方
羌活 甘草
右先以水三升煮羌活取一大升去滓入白礬
去毒丸 治一切喉風閉塞咽喉
青礬 胡粉
右味等分研為末醋煮糊丸如皂子大每服一丸
下如口不開用白礬吹入鼻內口即開吐下毒立止
治風熱閉塞咽喉連身浮腫 出聖惠方
用牛蒡子一合半生半炒杵為末以溫酒調下一錢匕日三服
裹二錢以水調含嚥立愈
治咽喉閉塞口噤 出聖惠方
用□□研細每服以水調半錢匕
治咽喉閉塞不通 出聖惠方
用桑上白耳不拘多少搗羅為末以生蜜丸如半棗大綿裹含化
喉下須臾即通
治咽喉閉塞不通甚者 出聖惠方
用□□半兩含之即愈
治咽喉閉塞腫痛水米不通 出聖惠方
用蝸牛一枚綿裹水浸含之須臾便通
治喉閉命不辨人方 出聖惠方
用銅青如杏核大熱湯研化灌之立愈
治咽喉閉塞喘息不通須臾欲絕方
用地龍一條研爛以雞子白相和攪令勻灌入口即通
又方 出聖惠方
用猪牙皂莢三挺去皮炙黃搗羅為末每服以當水調半錢
治喉閉

用膵月猪尾燒末水服之

又方　用舌頭草汁白

治咽喉疾　用膵片猪膽一箇同枯礬（大黃　大黃　甘草等分）爲細末入在猪膽內陰乾爲細末用一字吹之

治喉風腫　用鴨嘴膽礬爲細末以醋調一二滴呷入口吐即愈如吐不止呷米飲即止

青金散治咽喉（出治三年起居）

用益元散加薄荷青黛生蜜丸如彈子大噙化

治咽喉塞鼻中蕁出及瘡腫痛食不下方

用生鷄子一箇開頭取白去黃着米酢拌攪煮沸候起熟下再定更頻三度成熟趁熱飲不過一二度

治咽喉閉咽塞不通甚者

用巴豆去皮針線穿入喉中出一方用一枚去大皮頭中心綿裹含有出氣處用於鼻中頃肚在卧時將咽氣中出效

咽喉甘露散（出治心肺）治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿不下或生喉瘡重舌木舌腫脹並可服之（見口舌咽門甘露條）

如聖湯治咽喉堅塞咳嗽膿血者

桔梗二兩　甘草炒　陳皮　半夏各等分一兩

右爲粗末每服三錢水一盞半生薑七片煎至五分去滓不拘時食後

大青湯（出治）治喉中熱塞及舌上瘡生者

大青　黃蘖（去皮）　升麻　射干　薔薇根各二兩

苦竹葉（一握）　生地黃半兩　玄參一兩　天門冬（去心）　白蜜二兩

右除蜜細剉用水三升煎取一升去滓下蜜再煎成膏每服半匙含化嚥津不拘時

治喉閉咽痛

用馬勃去粗以蜜揉拌少以水調呷之

治咽喉閉塞及聲湯水下咽宜服此方

用牛蒡一大盞入火鹽燒稍頃服立效

治咽喉閉塞腫痛水漿不通方

用白礬如棋子大含之頃里便通

碧硝散治咽喉閉塞腫痛（方見本門）

治一切熱毒咽喉腫閉不能吞物口舌生瘡舌根緊強言不正腮頰腫痛

蒲黃　青黛　硼砂　焰硝　甘草各等分

右爲細末每用半指捻摻於喉中半時或冷水送下頻頻嚥之

治喉中塞

用雞內金燒爲末服之良

咽喉腫痛論

夫足太陰之脈爲脾絡胃上膈挾咽連舌本足陽明之脈其支者從大迎前下人迎循喉嚨咽者脾胃之候也脾胃有熱風毒乘之其氣上衝熱毒壅滯故咽喉爲之腫痛或有風毒腫痛連頸外痛甚則水漿不下便難餒入其咽便人寒熱似傷寒者宜速治之咽喉生瘡痛毒脾肺暴熱胃膈壅滯上攻咽喉故發腫痛也亦有服餌丹石過度毒氣在胃多啖五辛酒麪熱衝於脾肺皆發此疾其證雖不同其爲熱則一

方

龍腦聖丹（出治）治心脾客熱毒氣攻衝咽喉赤腫疼痛或成喉痺或結硬不消愈而復發經久不差或舌本腫脹滿口生瘡飲食難嚥並宜服之

川芎一兩　生地黃　犀角屑　羚羊角　南琥珀研

南玄參　桔梗　連翹各半兩　馬牙硝研　赤茯苓去皮

人參　牛黃研　麝香研　牒子研　升麻各三錢

硃砂飛半兩　金箔五片　鉛白霜一錢　南鵬砂（各細研）

右爲細末煉蜜和丸每兩作十五丸用金箔爲衣每服一丸用薄荷湯化下或新水化服亦可更或細嚼服并噙化嚥津亦可服食後臨卧進三兩服

雞毒丹治大人小兒咽喉腫痛舌本強硬或滿口生瘡涎潮喘急咽膈不利飲食難進（出治）

牛黄一分 人參一兩 南鵬砂 犀角屑
桔梗 生乾地黄 雄黄 升麻 三分
南星 鉛白霜 腦子 三分
金箔 寒水石
右爲細末入研藥同研勻煉蜜丸如小彈子大金箔爲衣用磁器收每服
一丸薄荷湯化下或新汲水化服亦可食後日進三兩服更
或含化嚥津亦可
木香散 治咽喉腫痛……入於咽喉間舌強頰和身體疼痛
咽喉閉塞
沉香 木香 射干 防風 甘草
當歸 黄芩 升麻 藿香 藿香葉
鷄舌香 獨活 麻黄 大黄
右㕮咀每服三錢以水一盞煎至六分去滓食後温服日三服
丹砂丸 治膈中熱氣每相和上攻咽喉腫痛
丹砂 人參 遠志 半夏
雄黄 麥門冬 甘草 烏梅肉
赤茯苓 牡蠣 白梅肉 麝香 龍腦 紫雪
右研爲末以乳糖和丸如雞頭大金箔爲衣每服一丸米飲乾水
嚥下含化嚥亦得食後臨臥服
犀角散 治咽喉毒氣結塞不通水漿不下
犀角屑一兩 沉香 木香 馬牙硝 雞舌香一兩
羚羊角 川升麻三分 射干二分 甘草 黄芩
麝香一分細研
右爲散每服二錢水一中盞入竹葉二七片煎至六分去滓不計時
候温服
治咽喉腫
薔薇 甘草 馬牙硝 研細將來含水調
加入薑 治咽喉風熱不能飲
大青湯 治咽喉痛腫口舌瘡並口甘面赤
大青 升麻 大黄 生乾地黄 三兩

右㕮咀每服二錢以水一盞煎至七分去滓温服之利即愈
香水散 治脾肺熱咽喉赤腫疼痛
大黄一兩 芒硝 甘草 各三兩
右爲細末每服二錢食後新水一盞調服入蜜少許亦可
玉屑散 治小兒大人咽喉腫痛口舌生瘡
寒水石 馬牙硝 鉛白霜 鵬砂
右爲細末每服少許乾摻口中不拘時候
大青丸 治咽喉腫痛上焦實熱口舌生瘡
大青一兩 黄芩 梔子仁 黄藥子 黄連
薔薇根皮一兩 川升麻 ……根 知母
石膏 馬牙硝
右爲末煉蜜和搗三二百杵丸如酸棗大綿裹一丸含嚥津
鵬砂散 治風熱毒氣咽喉生瘡腫痛
衣主腫悶塞水漿不下
南鵬砂二兩 白茯苓 滑石末 荊芥穗
山豆根 南玄參 甘草 薄荷葉
右件味研藥五味外搗羅爲末同合和勻每服半錢新水調下
或摻舌上嚥津無妨不拘時候
三合湯 治喉痛風毒積於咽喉毒氣閉塞不能言
治咽喉痛……不合子母……咽喉一同三合
之
升麻 桔梗 甘草
右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分食後服之
治喉痛
用白僵蚕細水和……新磚一片入藥水中……如水不……
又磨水……入大便……出
鷄毛……如喉腫眼無妨
治咽喉腫痛口舌生瘡凡脫毒之劑
用升麻一兩細剉水一升煎……汁服
治咽喉中痛方

甘草生半兩

右麁擣篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓温服病甚者倍之

丹砂甘黄丸治咽喉腫痛解藏腑諸毒化涎

丹砂研 硼砂研 生甘草末一兩 黄丹 蟾酥研

龍腦研 甲子 凝水石研

右將七味同研令勻用甘草末熬膏和丸如雞頭大每服一丸食後

含化嚥津

羚羊角湯治脾熱喉中腫痛咽塞不通

羚羊角屑一兩 射干 滑石研 大黄剉 升麻各三分 木通剉

芍藥 生地黄

右麁擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓下芒硝末一

錢匕攪勻温服得利即瘥

桔梗散治咽喉腫痛結毒氣衝心胸

桔梗 犀角屑 羚羊角屑 赤芍藥 川升麻二兩

梔子人一兩 甘草 [illegible]

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時温服

鉛霜散治咽喉腫痛風熱上攻胸膈心神煩熱

鉛霜 龍腦 馬牙硝 犀角屑 黄芩

右為散都研令勻每服不計時候以冷水調下一錢

龍腦散治咽喉卒腫痛

龍腦研 犀角屑 丹砂研 白藥子各二 真珠研

黄耆剉 甘草 牙硝研

右為散拌勻每服二錢匕新汲水調下不拘時候

治咽喉疼痛含嚥丸

黄藥 白藥 薤根 牛蒡子 馬勃各一兩

玄參一兩 硼砂 蜜

右件六味為末煉蜜并丸如彈丸大不計時候含一丸嚥津

馬藺根散治咽喉卒腫痛熱毒在胸膈

馬藺根 川升麻 射干一兩 犀角屑 玄參半兩

用紫芽龍牙草含嚥之効

治咽喉頸外腫痛黄藥子散方

黄藥子 土瓜根一兩 黄連 黄耆一兩 生薤根二兩

黄藥 滑石一兩 馬牙消一兩 苦葶藶子二兩 川大黄二兩

射香一分細研

右為散入射香研令勻生油調可腫處傅之 更佳即

丹砂

絡石葉散治咽喉毒氣腫痛攻心胸悶

絡石葉 赤芍藥 桔梗 射干 玄參

升麻 青竹茹 木通 馬牙消 生犀角

梔子人各三分

右麁擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓 服以通利為度

人參犢脾散治肺不利咽喉腫痛

附宜用此散

人參 甘草 山梔子 盆硝各二兩 薄荷葉

白附子

黄芩 川大黄 連翹二兩 黄連

右為麁末每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食後温服

胃毒丸治脾胃毒攻上攻咽喉腫痛化涎生津

五倍子 馬牙硝 甘草 蓬砂 白礬

升麻 馬勃 丹砂 麝香 龍腦

右為末 和丸如雞頭大每服一丸含化不拘時

犀角湯治咽喉腫痛風毒衝心胸

豉一升 犀角 射干 杏人 甘草各二兩

芍藥三兩 梔子 升麻 羚羊角一兩半

右㕮咀以水九升煮取三升去滓 分三服

已

青金散治心 上攻咽喉腫痛

薄荷 甘草 百藥煎 白礬 青黛

硼砂 馬牙硝 白僵蚕

D 內

右除研藥外同為細末入砂糖丹砂研細每用少許時時按舌上細細嚥下

薑蠶散 治喉痺腫塞語聲不出 方見木舌門

治喉中腫痛閉上裏紅赤覺便沒不能麻咳痒亦緩服如可也

用硼砂含化嚥下 一方治喉痺兩禾水調嚥之

治風熱上壅咽喉腫痛

用新把草炒研篩末少頃調服之有効

牽牛散 出聖惠 治咽喉疼痛四肢實熱瘡退壅滯頰頸腫痛

牽牛頭二分 馬牙硝一分 白礬一分 川升麻三分 甘草半分

桔梗半兩 細辛一分 石膏 前胡三分

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

射干散 出聖惠 治風毒攻咽喉腫痛水漿不下宜服

射干一兩 赤芍藥一兩 川升麻二兩 甘草半兩 牛蒡子一兩

根香一兩 葛根二兩 羚麻黃 杏人

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治咽喉壅塞頭面腫痛宜服此方 出聖惠方

川升麻一兩 羚羊角屑 木通二兩 赤芍藥二兩 桑根白皮

川大黃 枳殼 甘草 漢防己三分

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

青龍砂散 治咽喉赤腫疼痛不消有時飲食

防風 白茯苓 五倍子 牙硝 薄荷葉四兩

白礬 訶子 甘草二兩

牛蒡子湯 治風熱上攻壅咽喉腫痛或生瘡瘍有如閉塞

牛蒡子 玄參 升麻 桔梗 犀角

黃芩 木通 甘草

右㕮咀每服四錢水一盞煎三分煎八分溫服不拘時

一方無犀角有羚羊

知母散 治咽喉腫痛

知母 川芎 山梔子仁 人參

黃芩 赤茯苓 天門冬

E

木通一兩 麥門冬一兩 甘草半兩

右為麤羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

馬牙硝丸 治咽喉風毒腫痛煩熱不止四肢不利宜服含化

馬牙硝 犀角屑 川升麻 甘草 真珠末

黃藥 硼砂 牛黃

右為末入研了藥令勻煉蜜和丸如雞頭大每服一丸含化嚥津

治風毒咽水不下及瘰癧腫方

升麻 芍藥 射干 杏仁 楓香 葛根

麻黃 甘草

右㕮咀以水八升煮取二升半分三服

勝金散 治咽喉腫痛風急語聲不出入有發寒不可用瘡不問皆通用若喉虛不應於閉甚加膽礬少許立效或吐立差

青金 大硃砂 南硼砂

乾胭脂 蒲黃 白礬 輕粉

右為末研薄荷汁同研少許調服

天門冬丸 治上膈煩熱咽喉腫痛唇舌乾燥頰生瘡脾化痰毒並宜服之

天門冬 玄參 牛蒡子 百藥煎 紫蘇葉

甘草 人參

右為細末煉蜜和丸如皂子大每服一丸噙化嚥津食後

備急散 治咽喉腫痛生瘡延者水米難下

玄參 紫河車 貫眾 消黃 甘草

薄荷二兩 蠶蛻

右為細末入瓶研勻吹於咽喉中或投不住吹一方無貫眾

天門冬丸 治上焦咽喉腫痛

天門冬 玄參 甘草 人參

硼砂 龍腦

右除硼砂五味爲末與別研二味拌勻煉蜜和勻搗三百杵丸如皂子
大每服一丸食後臨臥湊生薑湯嚼

射干丸 治咽喉腫痛水漿不入

射干 桔梗 山大豆 苦藥子 硯石 甘草 [illegible] 升麻

右爲細末煉白蜜和丸如彈丸大每服一丸含化嚥津不計時候

乳香丸 治咽喉腫痛喉痺及咽喉諸疾

乳香 石亭脂 阿魏 [illegible] 硇砂 麝香 [illegible] 安息香

右除安息香外搗研爲末用安息香和丸如菉豆大每服五丸
茶清下日三服食又以熱茶投令吐更欲服只用蔥湯

含化升麻丸 治咽喉腫痛熱毒在肺脾上焦壅[illegible]
空服

川升麻 川大黄 玄參 甘草 射干
馬牙硝 杏仁

右爲末煉蜜和丸如芡實大每服以綿裹一丸含嚥津日五六服

射干散 治脾肺壅熱咽喉痛腫腮頰腫[illegible]不利

射干 川升麻 羚羊角 木通 赤芍藥 絡石 川大黄

右爲散每服三錢以水一中盞入地黃一分煎至六分去滓溫服
如人行五七里再服以利爲度

絡石散 治咽喉卒腫痛

絡石 細辛 玄參 黃藥 甘草
赤芍藥 川大黄

右爲散每服三錢水一中盞入竹葉二七片煎至六分去滓不
計時候溫服

牛黄散 治咽喉風毒腫塞疼痛

牛黄 龍腦 真珠末 金薄 硼砂
犀角末 太陰玄精

右都研令細每服以新汲水半盞調下一錢日五七服右乾合半
錢嚥津亦得

治咽喉腫痛急慢喉痹熱毒乳蛾鯁物不下

訶子散 黃芩

明礬 牛蒡子 甘草 薄荷 膽礬

右爲細末先用生薑擦舌上少許大小以薑蘸吹在喉中吐出涎
痰使用熱茶嚥下再吹二次用熱粥三次再吹仍用熱茶或粥盛熱
食之加朴硝少許舌上生瘡吹之口立去痰

硼砂丸 治大人小兒風壅積熱咽喉腫痛舌腫生瘡口乾煩渴

麝香 硼砂 甘草 牙硝 梅花腦
寒水石

右爲末甘草膏和搜每兩作四百丸每服一丸含化嚥津常作化
痰利膈生津止渴[illegible]二分

龍腦散 治咽喉腫痛咽因風熱在於脾臟內毒壅滯咽膈不
利或發瘡及急喉痹閉塞腫痛[illegible]

硼砂 腦子 硃砂 滑石 石膏
甘草

右爲細末每服半錢用新汲水調服或臥擦嚥津亦得

龍腦飲 治蘊積邪熱咽喉腫痛口舌生瘡[illegible]嗽中暑
煩渴一切風壅

甘草 砂仁 山梔子 天花粉 石膏
藿香

右爲末井花水調下一錢食後服一方無砂仁名玉芝飲子

碧玉散

硼砂 青黛 蒲黃 盆硝 甘草
[illegible]

右爲末每用少許吹咽喉內嚥之[illegible]

烏犀膏 治咽喉腫痛一切結喉爛喉纏喉風急喉痹
[illegible]入喉逆舌木舌等證

皂角 百草霜 [illegible] 硼砂 [illegible] 白梅霜

右斟酌拌勻以可掃爲度若有刺患物挂毛點少許於喉中有惡涎
自出或下喉可一兩次引氣方歇患丈惡物出盡爲度却以甘草二
寸煎汁〇若大段先以粗布蘸水揩去令出次用藥片擦之然後用
藥掃咽中䏻

硝石射干散治咽喉腫痛咽物不得

硝石 射干 升麻 露蜂房炙

芫荽子

右麤搗篩每服三錢已水一盞煎至六分去滓入馬牙硝一錢已攪
勻食後臨臥呷服細細含嚥亦得

五香飲治咽喉腫痛

沈香 木香 雞舌香 薰陸香 麝香

連翹

右除五香各搗研爲末外餘搗爲散每服三錢已水一盞半煎至一盞
去滓入五香末一錢半已再煎至八分溫服不拘時

麻黃湯治風熱客於脾肺經喉痛腫聲語不出

麻黃去節 龍膽 細辛去苗葉 五味子 桂去粗皮

半夏湯洗七次

右麤搗篩每服三錢已用水一盞煎至七分去滓溫服食後日三

馬兜鈴散治咽喉疼痛喘息急促

馬兜鈴 黃芩 甘草 杏仁

玄參 硝石

右爲散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治咽喉風熱腫塞疼痛食不下

牛黃 龍腦 石膏 馬牙硝 硼砂

寒水石

右都研如粉每服不計時候以新汲水調下一錢

治咽喉內生瘡疼痛

牛蒡子 川升麻 甘草 陳橘皮

白藥 川芒硝

右爲末化蜜和丸如雞頭實大每服以綿裹一丸含嚥津

龍腦丸治咽喉氣壅及喉閉腫痛不易嚥下

朱砂 龍腦 牛黃 硼砂 麝香

馬牙硝

右都細研用大羊膽一枚取汁和丸如梧桐子大鋪於紙上令乾收於
瓷器中如患者將一丸分爲兩片安在兩邊鼻孔內良久吐出惡涎即差

治咽喉頸外腫痛

山豆根 沈香 麝香 木香 黃藥

川大黃

右爲末研入麝香令勻以蜜爲膏塗貼腫處

天麻餅子治咽喉腫痛

硼砂 訶子 天麻子 蟾酥 白梅

鹽

右搗羅爲末和餅子如錢大以一片用綿裹於口含之吐出涎延令盡自愈如
吞得時吞嚥亦不妨此卻是妙

治咽喉壅塞頸頷腫痛

川大黃 川升麻 射干 甘草

玄參 羚羊角屑

右爲散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

碎金散治咽喉腫痛嚥物妨礙及口舌生瘡

龍腦子 朱砂 硼砂 馬牙硝 寒水石

右各研末和勻每用一字摻於舌上用津嚥之或用甘草煎湯爲丸如菉
豆大每服五丸含化亦得食後臨臥服

生犀散治脾肺積熱膈結咽喉腫痛痰嗽不利

大黃 芒硝 荊芥 薄荷 甘草

右爲麤末水煎食後或爲末蜜水調下

黃耆湯治咽喉中腫痛微嗽聲不出

黃耆 人參 赤茯苓 桂 甘草

右麤搗篩每服三錢已水一盞生薑半分拍碎棗二枚擘破煎至五分
去滓空腹食前各一服

凉膈甘露丸治咽喉痰壅多痰

丹砂一 龍腦一 甘草一 鵬砂 川百藥煎

右爲細末研勻用煉蜜和丸如梧桐子大每服一丸

白龍散 治大人小兒咽喉腫痛爛口生瘡

西鵬砂 鉛霜 寒水石

右爲細末每用少許[illegible]津液咽不拘時候

青龍散 治咽喉腫痛

石膏 青黛 甘草

右爲細末每服二三錢[illegible]調[illegible]咽不拘時候

如聖丸 治咽喉腫痛水漿不下

甘草 桔梗 牛黃 硼砂

右爲細末煉蜜爲丸每兩作二十丸每服一丸含化細細咽不拘時

續筆新添 治喉中腫痛[illegible]

藜蘆 川芎 細辛 草烏頭

右爲細末每用少許鼻內搐之

神效破棺散 治咽喉腫痛

膽礬 銅綠 白殭蠶 馬牙硝

右等分爲末每用一字竹筒吹入喉中立效如走馬喉痹牙關緊急不省人事用鐵物斡開口以冷水調一字灌之立愈

鵬砂丸 治咽喉腫痛及走馬喉痹

鵬砂 馬牙硝 丹砂 [illegible]

右爲末生薑汁煮麵糊丸如梧子大每服三丸臘茶下

一捻金散 治風熱咽喉腫痛飲食妨悶

延胡索 馬牙硝 甘草

右搗研爲散每服一字[illegible]於舌上

蓖麻子散 治[illegible]咽喉腫[illegible]

蓖麻子 馬牙硝 寒水石 大黃

右爲細末每服三錢[illegible]調下不拘時候

射干散 治咽喉[illegible]

貝母半 甘草 升麻 射干

白礬[illegible]研[illegible]每服二錢[illegible]

玉屑散 治咽喉[illegible]

白丹 朴硝 豬牙皂角

右[illegible]每服[illegible]入口中[illegible]上下[illegible]喉

[illegible]

四味如聖湯 治咽喉腫痛

桔梗 甘草

右㕮咀每服二錢水一盞半煎至八分去滓[illegible]

貫眾[illegible] 治咽喉腫痛

寒水石 白礬 青黛

右爲細末[illegible]

千金[illegible] 治咽喉腫痛

陳皮 升麻 射干

右㕮咀三錢水一盞生薑五片煎七分去滓食後服無時

真珠散 治手足心煩熱咽喉腫痛

真珠 太陰玄精石 不灰木

右同研極細用糯米飯爲丸如雞頭大每服一丸食後[illegible]地黃[illegible]

[illegible]研化下日二

龍膽膏 治咽喉腫痛及喉痹[illegible]難下

龍膽 硼砂 乳香

右研爲細末以豬脂和丸如皂子大每服一丸噙化[illegible]

附子散 治咽喉腫并喉痹[illegible]熱上攻[illegible]

附子 [illegible] 馬藺子

右搗羅爲散每服一錢[illegible]冷水調下[illegible]

通喉散 治熱上攻咽喉腫痛

黃連 豬牙皂角 礬石

右等分於瓦器[illegible]細[illegible]每用一字[illegible]在喉[illegible]取出涎[illegible]

[illegible]

地黃煎 治咽喉腫痛[illegible]

生地黃　　白礬　　馬牙硝

右先以地黃汁八分入於石器內煎，投白礬、馬牙硝攪令勻，用瓷合盛，不計時候，以一杏核大含嚥津，或以冷水調下亦得。

治咽喉中生穀賊氣攻疼痛

射干　　川升麻　　川朴硝

右羅為散，每服三錢，以水一中盞煎至六分，去滓，放溫細細呷之。

又方，以咽喉不烏翣

右湯煎受咽喉

貝母　　杏仁　　地龍草

右同為末服

治風毒攻咽喉及頭面腫痛方

用杏仁三兩湯浸去皮尖熬令黃，以雞子黃和攪令勻，入瓷器中，候乾即易之，日七八度差。

治咽喉腫痛

生甘草　　生白礬

右等分為末，每服半錢，入口中嚥下，亦治喉閉立效。

治咽喉腫痛

生礬　　銅綠

右等分，以銅綠火煅，用右手掛指之頂[illegible]

速則針火陽穴，在手大拇指內側，[illegible]右針右穴，仍指嚥[illegible]

白礬散　治喉中熱塞腫痛，散取消痰

白礬　　朴硝

右為末，以小管吹入喉。

蜒蚰散　治咽喉腫痛，無物不愈

蜒蚰　　馬勃

右搗羅為散，每服一錢，以綿裹含嚥津立瘥。

丹砂散　治咽喉腫痛，喉物妨悶

丹砂　　芒硝

右研勻，每用一字，時時吹入喉中。

龍腦丸　治咽喉腫痛立效

龍腦　　白礬

右研勻，入龍腦，如無龍腦，麝香亦可，含一丸嚥津。

治咽喉內生腫痛

馬兜鈴根　　甘草

右為散，每服二錢，以水一中盞煎至六分，去滓，不計時溫服。

治咽喉頸外腫及咽乾痛方

生梁豆黃

右入鹽同搗為末，塗腫上，日三易更佳。

又方

牛蒡子

右炒令熟，敷腫上立效。

如聖湯　治風熱毒氣上攻咽喉疼痛，及肺壅咳嗽，咯唾膿血，胸滿振寒，咽乾不渴，時出濁沫，氣息腥臭，久久吐膿，狀如米粥，又治傷寒咽痛。

桔梗一兩　　甘草二兩

右為粗末，每服一錢，水一盞煎七分，溫服，小兒時時呷服，食後臨臥。

一方有荊芥穗

乳香湯　治瘰癧咽喉腫痛

大黃　　甘草

右為末，每服四錢，水一盞半煎六分，去滓，化乳香，不拘時。

治喉痺痛

朴硝　　甘草

右為末，每以半錢乾摻喉中，腫甚者以竹管吹入喉中為佳。

治咽喉腫痛方

用山豆根先爭[illegible]入口中嚥[illegible]

此藥[illegible]一方作末子，每用半錢，乾摻患處，細嚥津。

如聖散　治咽喉腫痛

用白殭蠶[illegible]

升麻[illegible]

八[illegible]

須泥到將大黃一塊煨火炮熟切片晝夜如一米粟切片以兩指大
一片口內含汁嚥之一食頃再換一片含至三片即止或患人語不
得及自嚥不下即扶起令將仰坐以令藥在口以筆管注入鼻中
男左女右其藥即下即扶令正坐頃更吐之不即扶起令吐自鼻中
出已吐了含熱大黃如前法[illegible]

治喉腫痛飲食不可入者

用猪牙皂角一挺去黑皮并核米醋浸炙以上炙令乾再浸再炙七遍黃
色為末入生薑汁調末每用少許以管吹入喉內吐出痰涎即止

又方

用蛇床子三四塊入小瓶內用火燒瓶內烟出之卻用筆管入瓶
內用口吸烟吐涎出即止

又方

用野鹿蔥一握隨生者搗碎同白礬包塊以醋炙成一大塊用乾硬
處取着牙外牙根即時藥味入喉立便吐出痰涎

又方 治喉腫痛

用直殭蠶白礬不以多少研為末入米醋少許和丸含化嚥津所腫
即破矣

治傷寒毒攻咽喉腫方

用真蜀葵花甲大內口中嚼汁嚥勤微覺為度

治喉中腫痛不得飲食[illegible]

用燒筆頭灰漿飲下方寸匕

治壅熱咽喉腫痛方

用百兩金一寸含咽津

治咽喉腫痛方

用鬱金草根切片含之立愈

治咽喉腫痛語言不出[illegible]

[illegible]

治卒[illegible]

用杏仁[illegible]乾[illegible]七八度[illegible]醋

[illegible]

又方用醋含上好醋口含[illegible]

[illegible]頂丹治大人小兒喉咽腫痛

用甘消四兩炒過研細先[illegible]坑子[illegible]入甜[illegible]在[illegible]尽出火
毒取出入[illegible]甘草末半兩[illegible]各一錢[illegible]馬牙硝
一兩丹砂一錢半[illegible]研[illegible]如雞頭大一丹服一丸含化嚥津 小
兒只作[illegible]新汲水調下[illegible]

治咽喉卒腫不下食[illegible]

取[illegible]入喉中如[illegible]以[illegible]

治喉卒腫痛不下食方

用[illegible]子半枚[illegible]用竹管內吹入喉中

治喉卒腫痛不下食[illegible]

用生地龍十四枚搗爛塗喉外[illegible]又方取地龍
一條着鹽合化為水[illegible]許調[illegible]之

治咽喉卒腫痛不下食方

用白礬不計多少以苦酒和塗喉外腫處

治咽喉卒腫食飲不通[illegible]

用黃藥搗傳腫上[illegible]用苦酒和末[illegible]

治蓮[illegible]治咽喉卒腫食飲不通

用蓮[illegible]和[illegible]方[illegible]以鼻
[illegible]之

治咽喉肉卒腫痛[illegible]方

用商陸根[illegible]即[illegible]之立愈

治咽喉頂外腫及咽乾痛方[illegible]

用皂莢[illegible]去皮子[illegible]為末水調[illegible]之

治風毒[illegible]不下

用木服[illegible]子末二錢匕神[illegible]

又方

用桑根皮汁三升服

[illegible]砂散 治咽喉腫痛

[illegible] 甘草 [illegible] 馬牙硝 人參 [illegible]

右爲[illegible]錄已含化無津不拘時

如聖散 [illegible]

防風 [illegible] 羌活 牛蒡子 白桑子 [illegible]

[illegible] 大黃 [illegible] 細辛 川芎

紅芍藥 鬱金 山豆根 甘草 牙硝

薄荷葉

右爲末研勻每服[illegible]茶清調下食後[illegible]

治咽喉腫痛[illegible]以手力用頂心髮立[illegible]若纔拔心定即安之

鄭大夫傳此方未識[illegible]一卒[illegible]咽喉不能言[illegible]即以

意思令人用力拔其頂心髮[illegible]

[illegible] 治咽喉[illegible]上[illegible]

備急散 治[illegible]咽喉纏喉風氣息[illegible]

吉仁丸 治咽喉嚨腫[illegible]

治咽喉卒腫不下食

以韮一把搗熬傅之冷即易之 方書載

治卒咽痛

燒炊箕之[illegible]服方寸匕

發聲散 治咽喉痛不妨咽物[illegible]

非熱也

[illegible]薑 白殭蠶 桔梗 甘草

右件爲細末每用少許乾摻咽喉中[illegible]左右有紅或只一壁紅

腫長大水米難下用此散一錢朴硝一錢此和勻乾摻[illegible]如喉

中生赤腫或有小白頭瘡用[illegible]一錢[illegible]細研作粉半錢

和勻乾摻

通關散 治一切咽喉危病

盆硝 甘草 蒲黃 白殭蠶 青黛

右爲[illegible]

鬱金散 [illegible]

[illegible]

右末各[illegible]

[illegible]

青龍 [illegible]

水[illegible] 白[illegible] 防風 川芎 甘草

桔梗 [illegible] 人參 [illegible] 杏仁

[illegible]

右件爲細末[illegible]每服二錢作一十丸

每服一丸含化[illegible]方[illegible]

[illegible]散 治上焦壅熱咽[illegible]不[illegible]

牛蒡子 [illegible] 甘草 [illegible]

右件三味同爲細末每服[illegible]水三分[illegible]去滓溫服大[illegible]

[illegible]

治丈夫婦人咽喉腫痛飲食不下喘息不通頭項[illegible]

此之魂散[illegible]大心[illegible]吹[illegible]人命[illegible]

消石 [illegible] 半夏 殭蠶 天南星

右爲細末以蘆[illegible]管盛一錢吹在[illegible]

[illegible]

若未[illegible]吹之以氣通[illegible]若[illegible]息已通[illegible]

麻黃 荊芥穗 [illegible] 牡丹皮 [illegible]

殭蠶 連翹 消石 大黃 [illegible]

半夏 [illegible]

右爲細末用白[illegible]水[illegible]五十

丸[illegible]作數子[illegible]服三錢水一盞[illegible]

吐[illegible]即[illegible]只以[illegible]

桔梗湯 治咽喉腫[illegible]

麻黃 [illegible] 桔梗 甘草 當歸 黃芩

白殭蠶 [illegible] 桂枝 [illegible]

右件[illegible]作一服水二大盞[illegible]服之

[illegible]

消咽喉[illegible]

[illegible] 甘草 生[illegible]

右四味為細末每服一錢冷水調灌甚者二錢須頻頻細細呷下咽之

治咽喉腫痛 用山豆根切片噙咽之

又方

白礬 三錢 巴豆 二个

右以白礬熬化去巴豆只研礬為末每用少許吹入喉中

黃芩 去 治咽喉腫痛口舌生瘡

黃芩 黃連 黃柏

右各等分為末每用少許撒口中效

龍腦丹 治咽喉腫痛舌生瘡嗽頭痛腮腫咽乾多痰眠臥不穩

龍腦 丹砂 人參 白茯苓 懸實

羚羊角 犀角 甘草 升麻

麥門冬 去心 牙硝 真珠 各一分

右為末用甘草膏和丸如雞頭實大每服一丸含化咽津臨臥

治咽喉閉生肉層層相疊漸漸腫起不拘多日乃至有竅子臭氣自出遂退飲食用臭橘葉煎湯連服自愈

治卒咽塞懸木杓燒末水服方寸匕日三

代針散 治咽喉腫痛氣息難通

硼砂 白礬 牙硝 一分 硝石 一兩 黃丹 五錢

巴豆

右用鵝翎子一管先以全蠍後以草劑下巴豆吹咽使有火焰盡又入一管蛇退皮一條燒之以大蒜汁後搖乃成也每用少許以竹筒子吹在患處雖丈夫婦人見喉腫用合之

秘傳解毒丸 治一切諸毒之疾咽喉腫痛

貫衆 山豆根 黃藥子 牙硝 寒水石

草龍膽 乾葛 雄大豆 百藥煎 紫河車

甘草節 薄荷 梔子 大黃 豆粉 各二兩

加山慈菇 二兩大戟

右細末煉蜜為丸每一兩作十丸如前銀箔為衣服

治喉閉痛

用木通煎湯服之

又方

用甘草煎湯去滓溫服一盞日三服

治一切咽頷腫毒

右用蟾酥一两為末以猪膽汁和蜜調傅患處即消

治咽喉痛失音不語

杏仁 桂心

右二味各一兩同研如泥用半合和如櫻桃大綿裹含之

每日五次夜三次大效

○語音不出 論

夫喉嚨者為氣之道路會厭者音聲之門戶若風邪熱毒在於脾肺則陰陽不和氣道否澀上壅聲塞風熱之氣上衝喉攻塞會厭故令喉痛語聲不出也

方

苦參丸 治咽喉腫痛語聲不出痰喘唾涎

苦參 白礬 山梔子仁 木通 防風

杏仁 甘菊花 大黃 射干

玄參 甘草 懸實 白藥 馬勃 二分

右為末煉蜜丸如酸棗大每服綿裹一丸夜後含化嚥津如喉不開

春去白礬

通聲膏

五味子 款冬花 甘草 人參 細辛

青竹皮 桂心 菖蒲 杏仁 薑汁

白蜜 二升 棗膏 二升 酥 五升

右㕮咀以水五升微火煎三上三下去滓內薑汁棗膏酥蜜煎令

調和酒服棗大二丸

治肺胃受寒風冷所傷咽喉腫痛語聲不出宜服此方

桂心 木通 防風 射干 附子

桔梗 人參 獨活 羚羊角屑

杏仁

右為散每服二錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服
生薑膏方 治咽喉腫痛聲嘶不出並咽門蒼腑之候若臟
熱咽門閉而氣塞若腑寒咽門破而聲嘶故宜服之
母薑汁一升 牛髓三兩 麻黄一兩 芎藭一兩 獨活一兩
秦椒 去目 桂一兩 防風一兩半 酥一兩
右為末內薑汁中煎至相和乃下髓酥白蜜攪令勻以慢火煎成膏
每服不計時候以温酒調下半錢
黄芩湯 治風熱客於肺經上搏咽喉氣塞喉痛語聲不出
黄芩 知母 升麻 木通
芍藥 前胡 杏仁 羚羊角
石膏
右麁搗篩每服三錢匕以水一盞煎至五分去滓溫服熱甚者加
大黄一兩
杏仁煎 治暴嗽失聲不語
杏仁 桑白皮 生薑 蜜 砂糖
木通 貝母 紫菀茸 五味子 各一兩
右將桑根白皮木通貝母紫菀五味子六味剉散以水二升慢火煎取
一升絞去滓入杏仁膏蜜薑汁砂糖慢火熬成膏不拘時含化
小續命湯 治卒然咽閉不能語言
防己 麻黄 人參 肉桂 黄芩
甘草 白芍藥 杏仁 川芎 各一兩 附子 半兩
防風 一兩半
㕮咀每服四錢薑七片棗二枚水煎杏仁七粒煎不拘時候温服
又方 出聖惠方
丹參 升麻 雄黄 細研 杏仁
鬼臼 甘草 射干 各一兩 麝香 細研
右為末以蜜丸如梧桐子大粥飲下一丸加至五丸日三服含服亦佳
咽痛失聲不利用之良外臺秘要無丹參有丹砂
治咽喉腫痛脾肺壅熱語聲不出宜服此方 出聖惠方
木通 杏仁 葛 三分 川升麻 二分

羚羊角屑 三分 麥門冬 去心 射干 三分 甘草 一分 炙微赤剉
右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服
射干湯 治風熱客搏於脾肺經上冲咽喉腫痛語聲不出
射干 紫菀 款冬花 麻黄 去節 細辛
五味子 半夏
右麁搗篩每三錢匕以水一盞入棗二枚擘破煎至五分去滓入地黄
汁半合分温二服食後臨臥
發聲散 治語聲不出胸痛短氣欬嗽咽喉噎塞
桑白皮 升麻 桔梗 川芎 各一兩 甘草
馬兜零 羌活 各
右為細末每服一錢水一盞入竹茹同煎六分去滓食後温服
治咽喉腫痛聲音不出方
生薑汁 二合 生地黄汁 一合 桂心 杏仁
蜜 三合 牛酥
右相和熬令稠每服不計時候含杏核大嚥津
治咽傷語聲不徹方
酒 酥 乾薑 通草 桂心
石菖蒲
右合和服一匕日三
治語音不出
硼砂 生薑汁 白礬 蛇蛻草 木馬麻草
右各等分為末用竹筒吹入喉中立可
菖蒲丸 治咽喉腫痛語聲不出
菖蒲 二兩 杏仁 木通 皂莢
右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸煎鬼箭羽湯
下不計時候
荊芥湯 治風熱肺壅咽喉腫痛語聲不出或如有物哽之則痛甚
荊芥穗 半兩 甘草 桔梗 二兩
右為粗末每服四錢水一盞薑三片煎至六分食後溫服
治咽傷語聲不徹

右以酒一合酥一匕乾薑末二匕相和服日三食後服亦治肺痿
發聲散 治咽喉語聲不出
括蔞皮 白殭蠶 甘草
右為細末每服一二錢用溫酒調下或張生薑汁調服更用半錢綿
裹噙化嚥津亦得並不計時候日三兩服
出聲散 治肺虛失語
訶子 甘草 桔梗
右為末每以二錢用童子小便和茶調五七次並服甚者不過五服
一方入砂糖一小塊以水煎服治感寒語聲不出
杏仁丸 治喉塞欬嗽及治咽喉痒痛失音不語
桂心 杏仁
右為末蜜丸如杏仁大綿裹非時含之細細嚥之日夜勿絕
治喉痺失音語聲不出方
用馬蘭根十三合入白蜜一合相和慢火熬成膏徐徐含之日可五
七度一方用子半升水二升煮一升半服若不瘥用子四十五粒為
末水調服立愈一方取馬蘭根水煎之若無根用子亦可一法用一
握以水絞取汁稍稍嚥之以瘥為度
槐花方 治失音
用槐花新瓦上炒香熟二更後床上仰臥隨意食之亦治咯血從
彥文謝服有效
桂心散 治失聲音若陽證傷寒失音者不可用須察其證而用
之陰證傷寒方可用
用桂心搗碎每服三錢水二盞煎至一盞食後溫服一方用末舌
下漸嚥汁
白芨散 治人無聲
用豬肺一箇生薑五兩煮熟切作片子向炙二十文研為末蘸盡搏
肺喫
治感冷失聲咽喉不利方
用蘘荷根二兩研絞取汁酒一大盞相和令勻不計時候溫服半盞

治卒失音方
用生大豆一升青竹算子四十九枚長四寸濶一分和水煮熟日夜
二服瘥又每食後含蘿蔔吞嚥少大令人長生不服時身似重一
年已後便覺身輕又益陽道
橘皮湯 治卒失聲咽不出方
用橘皮五兩水三升煮取一升去滓頓服
治咽喉痒痛失音不語
治卒聞風失音不語方 用好生荊汁一合頓服即愈日再服止
治取好聲方
用杏仁一升去皮尖酥一兩蜜少許和如梧桐子大空心米飲下十五丸
治語聲不出如有物梗 用荊芥為細末
增損如聖散 治心肺風熱攻衝會厭語聲不出咽喉妨悶腫痛並皆
服之
桔梗 甘草 防風 枳殼
右為細末每服三錢水一大盞煎至七分去滓入酥如棗大攪勻溫
服食後
治咽喉腫痛語聲不出
用豉半升水二盞煮取濃汁分為二服相繼稍稍服之令有汗出
大附方 治腫全欲語聲不出者及喉痒毒氣咽閉不能咽用大
附子一枚炮令裂削去皮切如豆每含一塊嚥其汁食間即瘥烏頭
亦得忌豬肉冷水一方蜜塗炙指含之嚥汁甜盡更塗炙任前
含嚥之汁極驗
通聲丸 治寒邪客在肺經咽嗌至塞氣聲不出咳嗽及憂思悸
怒氣道閉病為短氣
石菖蒲 肉桂 杏仁 乾薑 青橘皮 各等分
甘草 半之
右為末蜜丸每一兩作十丸每服一丸食後含化嚥
玉粉丸 治冬月寒痰結咽喉不利語音不出
半夏 草烏頭 桂
右同為細末生薑自然汁浸蒸餅為丸如雞頭仁大每服一丸至

夜含化多年不愈方有効黄帝鍼經中説寒氣客於會厭卒然
如瘂此藥治之

甘桔湯　治咽痛
用桔梗一兩　甘草二兩　水煎　食後服
治咽喉　如無熱咽痛喉痹
用辣桂　半夏　甘草　等分　以咽水煎一半　候冷呷嚥服

出聖濟方
訶子　木通　甘草
右以涸用水三升煎至升半入地黃汁一合再煎數沸放温分六服
食後日作半劑

治瘂病　以雞蛽是皮研一錢已井花水服

治卒瘂　取杏仁三分去皮尖熬別杵桂一分和取杏核大綿裹含細
細嚥之日五夜三

治喉痺卒不語　煮豉汁一升服覆取汗亦可末桂着舌下漸嚥

治咽喉痺瘂失音不語
杏仁　桂心
右二味各一兩同研爛如泥用蜜熟煉和丸如櫻桃大新綿裹含之
細嚥日五夜三次大効

○咽乾

論
夫脾肺不利上焦有熱則津液枯燥搏於喉咽故令乾痛甚則生瘡矣

方
絡石煎丸　治咽喉乾燥熱疼宜服
絡石　射干　川大黃　木通　白藥
川升麻　牛蒡子　玄參　甘草　白蜜
白蒺藜　馬牙消　黃藥　地黃汁
右除藥汁外搗羅為末先以地黃汁及蜜於銀鍋中以慢火煎成
膏後入諸藥末相和令勻丸如小彈子大用綿裹一丸含嚥津

龍腦雞蘇丸　治上膈虛熱咽乾
龍腦　雞蘇　甘草　烏梅　紫蘇葉

麥門冬　白梅　人參各　天門冬
麝香　甜硝
右為細末再同研勻煉蜜和丸如雞頭實大每服一丸食後人參
湯嚼下

升麻散　治咽喉熱毒上攻乾燥疼痛宜含化
川升麻　射干　白礬　絡石　甘草
白藥　黃藥　天竹黃　羚羊角屑　白龍腦
馬牙硝
右為散入研了藥令勻於瓷合中盛每服一錢以綿裹含化嚥津

犀角丸　治風熱上攻咽喉乾痛如故生瘡心胸壅悶
犀角屑　川升麻　川大黃　黃芩
玄參　人參　黃耆　甘草　藍葉
桔梗　杏仁
右為散煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食後以溫水下二
十丸

甘草湯　治咽乾喉唾如膠或腎氣不足心中悒悒目視䀮䀮少
氣耳聾消渴黃疸一身悉痒骨中疼痛小腸拘急
甘草　磁石　玄參　防風
五味子　牡丹皮　桂　桃子　黑豆
右㕮咀每服五錢水一盞半入生薑半分拍碎煎至一盞去滓
食後服日再

射干膏　治咽乾口瘡牙齦心肺熱盛
射干　升麻　梔子人　玄參
黃藥　赤蜜　地黃汁　大棗　小豆卷
右除蜜并地黃汁外細剉如麻豆以水五升煎至一升半去滓下蜜
與地黃汁慢火煎成膏細細含化嚥津

治咽喉熱毒乾痛心膈煩躁宜服此方
羚羊角屑　川升麻　梔子人　淡竹葉　木通
麥門冬　枳殼　甘草　生乾地黃
右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

貝母湯 治咽乾口燥上焦熱欬嗽痰壅

貝母 百合 紫菀 桑根白皮 桔梗

麥門冬 甘草 大黃

右麄擣篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓分溫二服食後

雞蘇人參湯 治上焦有熱乾喉咽乾痛

雞蘇葉 惡實 玄參 甘草 防風

人參 天門冬

右麄擣篩每服三錢匕水一盞入薄荷三葉同煎至六分去滓食後溫呷之

龍腦散 治咽喉熱乾燥津液不足

龍腦 雞蘇 荊芥穗 白藥 甘草

右件細研每用半錢匕溫水調下含化

半錢匕服 味丸含

乾地黃丸 治咽喉乾痛風氣不能飲食

生乾地黃 人參 赤茯苓 天門冬

右爲末煉蜜和丸如梧桐子大每服十丸米飲下日二

厚朴湯 治咽喉乾痛心腹痛悶不能飲食

厚朴 赤茯苓 陳橘皮 人參

右麄擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分拍碎煎至一盞去滓分

溫二服

如聖湯 治咽喉腫痛咽物妨悶毒攻心狂悶

朴硝 黑豆皮 木香 大黃

右除朴硝外麄擣篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓下朴硝

攪令匀不計時候服以微利爲度

桔梗湯 治咽喉痛

桔梗 甘草 惡實

右麄擣篩每服二錢匕水一盞入竹茹一彈丸大煎至六分去滓溫

服不計時候

貝母丸 治咽喉中乾肺熱咳嗽多痰

貝母 甘草 杏仁

右爲末煉蜜丸如彈子大含化嚥津

治咽喉中乾如有刺此乃熱厭肺氣上壅

荊芥穗 防風 甘草

右爲末每服二錢食後溫水調下

○咽喉不利

論

夫咽喉者氣不調榮衛上下虛壅結積於咽喉而不利或寒或壅

故咽喉不利也

犀角散 治咽喉不利胸膈風熱方唾稠黏

犀角 玄參 枳殼 人參

麥門冬 射干 馬兜零 防風 木通

升麻 桃人 甘草 防己

右麄擣十二味每服三錢匕水一盞煎至五分去滓入芒硝少許再

煎食後溫服日再

紫菀湯 治咽喉痒欬嗽

紫菀 貝母 桑根白皮 桔梗 茈胡

麥門冬 赤茯苓 百部 杏仁

甘草

右麄擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食後溫服日三

牛黃涼膈丸 治風壅痰實蘊積不散頭痛面赤心煩潮躁痰涎壅塞

咽喉不利精神恍惚睡卧不安口乾多渴唇焦咽痛口舌生瘡

牛黃 牙硝 寒水石 紫石英 膽星

腦子 麝香 甘草 石膏

右爲末蜜丸如豆大每服一丸細嚼下

生乾地黃散 治脾肺壅毒咽喉不利腫痛煩熱

生乾地黃 犀角 雞蘇 赤茯苓 射干

麥門冬 玄參 甘草

右麄擣爲散每服三錢水一中盞入竹葉二七片煎至六分去滓

不計時候

龍腦丸 治肺壅熱咽喉不利宜服通津液利咽喉

龍腦一分 牛黃一分 朱砂一分 赤茯苓一兩
羚羊角 ... 人參 ... 麥門冬 ...
右爲末入研了藥令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以溫
水下十丸
茯苓湯 治咽喉熱塞不出如腹塞痛
赤茯苓 桂 人參 甘草 生乾地黃 焙
竹茹 前胡 麥門冬 [illegible]
右麁擣篩每服三錢以水一盞入棗 枚擘破同煎至七分去滓食
後溫服日三
青…射干湯 治 [illegible] 咽喉 [illegible] 瘡疹
甘草 [illegible] 瓜蔞根 桔梗 紫蘇葉 [illegible] 紫蘇莖
荊芥穗 鼠粘子 [illegible]
右爲細末每服一二錢食後熟水調下
犀角散 治咽喉毒氣所攻喘息不利心胸煩悶
犀角屑一兩 川升麻 木通 射干 前胡
川大黃 [illegible]
右爲散每服二錢以水一中盞入竹葉二七片煎至六分去滓更入
朴硝末一錢攪令勻不計時候溫服
射干煎方 治咽喉風熱不利疼痛咽乾舌 [illegible]
射干一兩 川升麻一兩 犀角屑一兩 當歸一兩 杏仁 [illegible]
甘草 [illegible]
右爲末以猪脂半斤微火煎三上三下去滓入白蜜四兩攪令勻以瓷
合盛每服杏子大綿裹含嚥津以利爲度
真珠丸 治心肺壅熱咽喉煩多痰唾咽喉不利
真珠 [illegible] 甘草 [illegible] 龍腦 [illegible] 硼砂 [illegible] 凝水石 [illegible]
[illegible] 馬牙硝 [illegible]
右 [illegible] 黃蠟 [illegible] 丸如雞頭大每服一丸食後臨臥含化嚥津
潤下人參丸 治 [illegible] 生 [illegible] 數 [illegible] 寒
人參 [illegible] 青木香 桂 [illegible] 羌活 [illegible] 大腹人

檳榔人 [illegible]
右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食後溫湯下日二
治咽喉不利下氣方
射干 杏仁 人參 附子 桂心 [illegible]
右爲末蜜丸如指大含一丸稍稍嚥之令藥味相接 [illegible]
小兒犀角散子 治大人小兒咽喉腫痛不利夜睡不 [illegible]
腫痛須結核 [illegible] 毒 [illegible] 瘡疹 [illegible]
甘草 [illegible] 荊芥穗 [illegible] 防風 [illegible] 鼠粘子 [illegible]
右爲末每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服食後 [illegible] 瘡 [illegible] 出及
未出熟者 [illegible]
甘桔湯 治 [illegible] 胃中結氣咽喉不利下一切氣
桔梗 杏仁 [illegible] 甘草 [illegible]
右㕮咀每服五錢水一鍾半煎至一盞去滓微溫時服
治咽喉
薄荷一兩 荊芥穗 甘草 炙
右爲細末煉蜜爲丸如彈子大臨卧含化
療口中咽喉不利當歸含丸方
當歸末二兩 杏仁 [illegible]
右擣篩以蜜和爲丸如梧子大以綿裹含咽汁日三夜再
秘方防風散 治一切風熱上壅咽喉不利
防風 [illegible] 白藥 [illegible]
右爲細末每服一錢匕茶酒任下食後服
治上焦壅熱外冷傷脾 [illegible] 咽喉不利
隨所患左右刺手小指爪甲令血出效
治咽喉不利腫塞氣道不通宜用此方
用以生艾葉擣爛傅腫上兩手即消冬月以熟艾和水擣爛塗之亦
生 一方用嫩艾葉擠取研汁逐時吞下
治咽喉逆氣不能食方
用麻子一升熬令黑以酒一升淋取汁空心一服一升漸至二升多汗
好覆勿觸風冷 此方兼理產後及丈夫中風如角弓反張口噤不開

大驗與藥湯參力風

犀角散 治小兒骨台利咽膈下庚

大黄一兩 荊芥穗半兩 甘草一兩 薄荷半兩

右為麄末每用四錢水一大盞煎三分去滓溫服 壹散二錢細細服食後

川芎丸治咽喉不利骨鯁不出及風熱上壅面赤鼻塞不聞香臭

石膏 桔梗去蘆 荊芥穗 薄荷葉去土 川芎

牛蒡子炒 已上五味各一兩 甘草炙半兩

右件為細末煉蜜和丸每一兩作一十五丸每服一丸含化食後臨卧服

一方有縮砂無牛蒡子

王醫師法

用生蘿蔔切作片又月臨卧時喫三兩片可無咽喉之患

白霜圓 右咽喉中病哽核不通水食 因飲所著大効

右用金底百草霜不拘多少研細蜜和為圓龍眼大每一圓新汲水化嚥灌下甚者不過三圓即愈

○骨鯁

論

凡療病皆以其類至如治鯁之法皆宜以鸕鷀治魚鯁狸虎治骨鯁磁石治鍼鯁髮灰治髮鯁皆至於何其蘊白鵞筋綿薤等事乃可通於治鯁用耳○用藥之法有不取於其類者特以意為用者若魚網反骨之治骨鯁是也然鯁鸕鷀魚乃魚之所畏虎能伏獸乃獸之所畏其所制伏既不同則用之亦異矣

方

神仙化鐵丹 治一切骨鯁

香白芷 貫仲 木蘭皮 京墨

金星石 銀星石 山豆根 水仙根 木香

烏芋 象牙屑 玳瑁 犀角屑 各二

右為末又細以頭髮雪水微研丸如龍眼大用蘇青為衣懸風處陰乾合時忌婦人孝子猫犬每用一丸含化

靈砂散 治物鯁喉

靈砂 丹砂 附子 鉛丹 雄黄 各一分

芎藭 金箔 巴豆

右研如粉若誤吞銀及魚骨等在喉咽內每服一字取下 三枚

去皮研為末

附子丸 治骨鯁在喉中

附子 細辛 桂 陳橘皮

青橘皮 白石

右為末煉蜜丸如小皂子大每含一丸嚥津 如丙盞茶久未應即用

桂末煎湯服之其骨立出

磁石丸 治骨鯁在喉中不出

磁石 陳橘皮

羚羊 白礬灰 飛過

右為散以用漿水和丸如芡實大每含一丸咽津 一方有馬鞭

礬灰散 治骨鯁在喉中不出

白礬灰 烏賊魚骨 桂 陳橘皮

漿水脚

右擣研細炒黑色候冷細研為散每服一錢匕屋漏水調下仍並漏令

鯁以綿裹一錢匕含咽 覆蓋鼻唯噴即出

鯁骨散 治喉中諸鯁

赤茯苓 陳橘皮 甘草 縮沙人 各等分

右為散每用二錢匕先撈口中次用新水一盞調下

象牙丸 治骨鯁在喉中不出

象牙屑 烏賊魚骨 陳橘皮

右為末用寒食麵和餳和丸如雞頭實大含化嚥津

橘糖丸 治骨鯁在喉中不出

陳橘皮 烏賊魚骨 沙糖 各一分

右為末煉蜜和丸如皂子大綿裹含嚥

栗皮丸 治諸骨鯁在喉中不出

栗子内上皮 乳香 鮎魚肝 各一分

右同研為丸如梧桐子大看骨遠近綿裹一丸水潤外留綿線吞之

即鈎出

玉鑰匙散 治一切骨鯁或竹木簽刺喉中不下

硼砂 [illegible] 寒水石 [illegible]

右先研貫眾為末入[illegible]研為散每服一[illegible]取一[illegible]

以冷水調之其鯁自然化下見

桂香散 治[illegible]鯁及雞魚骨鯁在喉中

桂 去皮 陳橘皮 各等分

右為散每服一錢匕錫粟米飲[illegible]調下[illegible]

一白散 治諸鯁

白芷 白斂 各一兩

右為散每服一錢匕水調下

半夏散 治骨鯁竹木鯁在喉中不下及刺在肉中折不出

半夏 湯洗 白斂 各一兩

右為散每服半錢匕溫酒調下日三 半夏戟人喉宜生薑汁解之立愈

半夏白斂散 治諸鯁

半夏 白斂 各等分

右為散每服一錢匕水調下即嘔出

治諸鯁方

取鹿筋漬之令濡合而纏之大如彈丸以線繫之持筋端吞之候

推至鯁處徐徐引之鯁著筋出 一方用牛筋亦可

又方

用絲作[illegible]令骨[illegible]綿裹[illegible]中令至鯁處[illegible]引之[illegible]出

治骨鯁在喉累治不出

取糯米粉丸如雞子黃大吞之不去更吞 大作丸可至十丸止 一方服

沙糖水

又方

用燒虎狼屎服之

又方

吞豬膏如雞子不瘥更吞瘥止

治魚骨鯁 一十方

用楮桃葉研細取自然汁水調服

治骨鯁

用獺[illegible]食之如無以獺[illegible]為末以[illegible]水調服

治鯁

縮砂仁 甘草 等分

右為粗末如一切鯁以綿裹含之旋嚥其津[illegible]之隨涎出

治魚雞骨鯁

用貫眾為末并[illegible]令[illegible]大作一口[illegible]便下用生者研細絞

汁服尤妙[illegible]

根名貫眾[illegible]

骨之屬用之皆不效者令服此藥連進三劑至夜一咯而出[illegible]云

管仲之力也

治骨鯁

用野苧根洗淨擣爛如龍眼大每用[illegible]如被雞骨所傷以雞[illegible]

化下如被魚骨所傷以魚汁化下

骨鯁散

用寒食日收飛麵四兩包裹五月五日好烏梅肉[illegible]要[illegible]用

四十九箇去核為末臘[illegible]宿至午時打[illegible]一所[illegible]

[illegible]忌貓犬生人[illegible]令[illegible]烏梅[illegible]用石[illegible]丸如彈

大線穿掛風內陰乾如治魚骨鯁[illegible]線穿繫於患[illegible]一宿立效

鯁骨方

細剉象牙末 去[illegible] 少[illegible]調含之 鯁也化為泥

又方

紫白玉簪根 [illegible]分 竹筒吹入喉 不可近牙根

治魚骨入喉方

用文[illegible]朽[illegible]竹根[illegible]

鯁膽煎

用鱖魚膽一味臘月收[illegible]掛於北簷下陰乾[illegible]有魚鯁[illegible]取一

皂子許以酒一合煎化呷之得逆便吐骨隨涎出未吐更飲溫酒以

吐為度又未出更煎一服無不出者此藥治一切鯁在臟腑中日久疼

療者愛甚寐服之皆出君卒無鯿魚鯉魚鯽魚亦可惟有
臘月收者最佳

治諸魚骨鯁在喉中方[illegible]

用蜜不拘多少煎化稟飴用綿一兩蘸飴定頭處又以瓠炙熱對其綿上來出再作吹嘅皂角末少許吹鼻中即出一方用蜜煎投稍稍服之

苟須散[illegible] 治諸魚骨鯁在喉中

用苟須已捕魚者燒灰研細每服一錢匕溫飲調下

狗骨方[illegible] 治諸魚骨鯁在喉中

用狗骨一味[illegible]煎濃汁五下一方燒灰水調服又用爪於喉嚨外爬之即下

魚鱗散[illegible] 治諸魚骨鯁在喉中

用鯉魚皮鱗不拘多少燒灰研細每服二錢匕新汲水調下

魚骨引方[illegible] 治諸魚骨鯁在喉中

用魚骨一片替令人將置鯁人被頭勿令覺之即下或置頂上亦可云雀欲即出

鸕鷀散[illegible] 治諸魚骨鯁在喉中

用鸕鷀毛翅十片燒灰研細每服一錢匕煎橘皮湯下或以綿裹含嚥即下一方用屎末服方寸匕又用糞水調塗咽喉外即出

雞足散[illegible] 治諸魚鯁在喉中

用雞足二枚燒灰研為散每服一錢匕煎湖下立出溫水調服亦可

艾蒿酒方[illegible] 治諸魚骨鯁在喉中及誤吞銅錢

用生艾蒿一握以水酒各一盞煎至八分去滓分溫二服一方用水煮又方用硇砂煎湯調末下一方用艾蒿數升水酒共一斗煮取四升稍稍飲良

薔薇散[illegible] 治諸魚骨鯁在喉中

用薔薇根不拘多少擣為散每服一錢匕水調下日三服亦療折箭刺入膿囊不出及鼠瘻等患服之十日皆穿皮出效一方服薔薇灰末方寸匕

百合散[illegible] 治諸魚骨鯁在喉中

用百合五兩擣羅為散用蜜水調塗帛上四邊貼在項上不過三五上

魚尾引方 治諸魚骨鯁在喉中

用魚尾一枚取置衣領中即瘥

立竹湯[illegible] 治諸魚骨鯁在喉中

取立死竹從地高二尺以上刮去皮細[illegible]用水二盞煎至七分去滓頓服一方取雞翅下如土朽竹刮去五尺以手撚細蜜調丸如龍眼大以綿裹[illegible]其骨自消即去綿啣嚥下[illegible]

鷹屎散[illegible] 治食內鯁

用鷹糞燒灰細研為散每服一錢匕水調下亦治服諸畫皆可服之

虎骨散[illegible] 治諸獸骨鯁

用虎骨搗研細每服一錢匕水調下狸骨亦得

雞翮散[illegible] 治食鯁刺不下

用白雄雞左右翮大毛各一枚燒於銀器中研作灰每服一錢匕用米飲調下一方以水調服之取所食者骨左右反覆擲背後則下也

螻蛄散[illegible] 治諸鯁并刺不出

用螻蛄頭一枚為散以墨衣帶[illegible]令鯁人知右刺不出者以金刺簪上自出耳

紅糖湯方 治諸骨鯁在喉中不出

用蓖子紅者不拘多少臨時細嚼先口嚥[illegible]用新水吞下如無新者只嚼紅蜜丸為末用之

治諸骨鯁及吞錢[illegible]

用李炭皮為末研令極細[illegible]炭[illegible]二錢末下每服七日四服以鯁下為度一方炭灰擣羅為末用[illegible]水調一錢服方寸匕一方羊脛炭碾為細末米飲調下

治魚骨鯁方

用象牙一兩不以多少搗羅為末少許丸如綠豆大每含化一丸鯁軟一方煎湯調下

諸鯁方

用薤白[illegible]以綫繫定[illegible]手中執定綫[illegible]吞[illegible]之度[illegible]引鯁即出[illegible]

[illegible]

治鯁魚諸骨鯁經日不下者隨其便而用之 出惠民方

諸骨鯁用藥王草頭搗水服又方以朴硝研細對入雞蘇丸別丸如彈子大仰卧含化不過三四丸自然而化之又方南鵬砂新汲水滌洗含化其骨脫然而失

治骨鯁入喉 出經驗良方

用寒水石煅為末令水調下

又方 出經驗良方

用桑螵蛸用醋細細嚥飲

又方 出經驗良方

用白藥剉細用米醋煎細細吞下在上即出在下即下

治骨鯁不下 出經驗良方

先磨白茯苓一錢重次以白磬易嚥下一方白茯苓為末所硬骨煎湯調下

治魚骨鯁 出經驗良方

用白膠香細細吞下

治魚骨鯁 出聖惠方

用橘皮為末好酒一升入少糖一兩煎或膏子令香嚥下口含鐵器嚥立愈一方細剉令水吞下又常含橘皮即下煎湯服亦可

治魚骨鯁兼喉痺

以青魚膽火乾口中含嚥唾即愈臘月取陰乾良

治食魚肉為骨所鯁

取泉水一杯令噎人合口向水吹以取水氣鯁當自下

治骨鯁 出危氏方

用金鳳花子嚼爛噙下無子用根亦可口中含氣下便用温水漱齒

兔頭藍雞骨尤效一方搗碎水化服

玉屑無憂散 [illegible] 白訣各留 [illegible] 塞不下 [illegible]

神効解毒丸 治諸骨鯁 [illegible]

殺骨鯁及咽中刺

用象牙梳或牙笏等磨末嚥下又火上炙去黃末醋煎濃漱自下

治魚骨鯁不下出 出經驗良方

用蒜內鼻中即出獨顆蒜錢兒去殼入鼻最良

治魚骨在腹中刺痛及刺入肉者

用食茱萸煎汁一盞服之其骨軟出如骨刺在肉中搗封之骨自爛

出一方用吳茱萸水煮一盞汁服之及搗封之

治骨鯁中頭 [illegible]

用麥曲為末含咽下如一方劫舌上嚥下立效

治魚骨鯁在喉中 [illegible]

用鵬砂少許口中咀嚼之立下

治骨鯁 出危氏方

用白芍藥細剉嚼咽之

又方 出危氏方

用五倍子研細末摻喉中立消

治骨鯁在腹刺痛 [illegible]

取大棗錢燒灰研細熟水調下

麻煎丸 出危氏方 治骨并魚刺鯁在喉中

取研草麻子仁去殼入百藥煎研勻為丸如彈子大青黛為衣井花水磨下半丸嚥之即下

消化骨鯁

用千金石以火煅水淬數次研又用糖勻攪魚竹并象牙屑一處或丸或末含水嚥下可消

深師療食魚骨鯁方 出聖惠方

用鯯魚鯝一小片燒灰服刀圭匕良細研米飲調一錢服之一方乳香湯調下温服甚者併三兩服一用魚網覆頭立下一用魚鱗燒灰細研水調一錢服

治鐵鍼竹木諸刺在肉中折不出及鯁不下 出聖惠方

用鼠腦厚塗瘡上則出亦可用治箭鏃大效

千金療鯁方 兼主竹刺不出 出聖惠方

取瞿麥為末水調服方寸匕

治咽喉魚骨鯁

右馬屁勃不以多少為末蜜和丸彈子大噙化嚥津

三聖散 治猪鵝骨刺在喉中不下
取五月五日猪子晒乾白茯苓各等分為末每服一大錢小兒半
錢研乳香湯調下旦服
治骨鯁
用藍葉鳳仙花用井花水二盞煎至一盞諸般鵝猪骨吞下軟
如綿
又方
取燈心燒灰從中諸骨魚骨竹枝等能上下者以此味吹入喉中
血動
又方
取所餘者骨左右手交覆擲背後立出
治雜物鯁方
解衣帶白兒下部不下即出用紙撚鼻打噴嚏鯁自出
青雪散 治魚骨鯁咽喉內不出 方見本門後前當出
療鯁方
用東流水一杯東向坐以手指畫水上作龍字訖飲水不自視書
令他人持手書良
又方 凡書文曰天有門地有根諸家入口者皆當得吞集驗同
治骨鯁歌勝法
以鯁賊以見所食前急制禁依前氣食飯即鯁自下勿令人知
又方 咒骨鯁
以淨器盛新汲水一盞捧之面東默念云謹請太上東流順水急
急如南方火帝令勅一氣念七遍即吹一口氣入水中如此七吹以水
飲患人立下有一稱姓用此咒水可以食針并竹
草麻丸 治一切鯁
草麻人 紅麯
右等分研細用沙糖和丸如皂子大以綿裹含之痰出立效
治骨鯁方
苗天子樹取根用嘴醋煎最汁時時呷嚥猪山本草云曾有人被鵝骨
鯁項頸腫大可畏用此嚥至三數更吐出王九哥又云當有司彭丽官

治骨鯁取苗天子樹根搗汁入鹽少許用綿裹吞下牽引使於喉
中上下往來忽然骨出蜀綿裹之去綿以備當用醋煎
服法為勝本草集議云苗天子樹根取汁敷鵝骨
神効解毒丸 收藏年深愈見神効
青黛花一兩 大黃 山豆根各四兩 朴硝一兩 黃藥子一兩
自然銅四兩 貫衆 山梔子 宮粟 猪貝子
山茨菇各二兩 白滑石一斤二兩 鉛光石 芭蕉自然汁
川芎一兩
右為末糯米糊和丸不可見日不然折法一料可作一千
十圓如用每一丸可治諸般骨鯁井水磨下一丸作勢一吞即下○
香肥皂癥腫咽喉瘡痛青油調水磨化○兩脇脹下血薄荷湯○赤
眼腫痛井水全磨毒蛇咬水磨化塗大蜂蠍螫蟲毒用水磨塗傷處
○誤吞竹木刺井水○諸般惡毒消腫及井水
縮砂散 治骨鯁
縮砂仁 甘草 管衆 等分
右搗為粗末如一切鯁以綿裹少許含之旋旋嚥汁久則隨痰出雅
州蔣教授因食鱸魚王美人為咽骨所鯁凡治鯁藥如象牙屑
之屬用之皆不効或者令服此藥連進三劑至食頃而出啇歟云
骨仲之力也
王膏無憂散 治魚骨鯁
用貫衆濃煎汁下效不可言
神効膏 治諸般骨鯁
馬鞭草 地松 [illegible]
右件各一小握不用根入陳白梅肉一枚同搗一大拇指面許研令極
細取一彈子大以綿裹作一毬子線繫頭上其餘藥即將無灰酒
一盞研取藥汁細細呷之令盡如不能飲亦強呷數口然後如綿毬
子於喉間旋旋嚥其藥汁其骨鯁即當自下去
白龍散 治魚骨鯁
柑子皮 白礬 象牙屑
右件各等分同為細末每用一錢綿裹含化

厭勝法學法治骨鯁
以所食魚骨密置患人頂上勿令知覺人即下。它魚骨亦可
治食諸魚骨鯁久而不出
右以皂角末少許吹入鼻中得鯁出多效
咽中骨鯁
剪刀草如野茨菰生於籬笆間其根白研之則如膠用順水吞下
即吐出骨不過兩三口效研萱草根順水下亦佳
青雪散 治魚骨鯁咽喉內不出并急慢喉痺
盆硝二兩 牙硝三錢 白殭蠶去絲炒為末 甘草一兩炒令黃
青黛二錢
右為末每服二錢用井花水半盞調藥細細呷服或以藥頻乾
摻咽中亦佳
主骨鯁
以鼓皮細覆鯁者咽喉如煮汁飲之骨當下矣
治魚骨在人腹中刺痛
煮吳茱萸汁一盞服之止又骨在肉中不出者嚼吳茱萸封之骨
當爛出
治魚骨鯁不可出者
取獺足於項下爬之亦煮汁飲
治鯁及魚骨入肉不可出痛甚者
取魚狗燒令黑為末頓服之煮取汁飲亦水獺乃令之翠鳥小
者是也
治食諸魚骨鯁雜物鯁
以好蜜匕抄稍稍服之令下
治魚骨鯁
口稱鸕鷀則下
治鯁
用琥珀作珠一物貫串著鯁推令前入至鯁所又復推以牽引出矣
若水晶珠亦得如更無以堅硬物摩令滑用之亦得
治草芒砂石類喉中不出
用鵝帶燒灰水調飲之即出
百日骨鯁右常含橘皮即下
○誤吞諸物
論
夫誤吞諸物若金銀銅鐵之類雖非病之由以欺無術以出之又則
害人若骨鯁如礎石出鯁皆有方之主不可取其性味皆療之可
謂用心精微者矣○豫心事親書云針誤吞一錢在咽中不下者當
皆不能取亦不能下乃命數人數人共思之忽得一策以白表紙令
卷實如箸以刀縱攢亂其端作鬚髯之狀又別取一箸縛鉤於其端
令病人不可飯先下咽中輕提輕撥一擇之覺鉤入於錢竅然後以紙卷
納之咽中與鉤夫相鉤覺鉤夫入於卷之端不能脫因提之而出
治誤吞銅鐵金石竹木針鉤諸魚諸骨鯁
方
川山豆根 山蜈蚣 威靈仙 山茨菇 滑石
馬牙硝 金星鳳尾草 急性子一兩 苧麻根五錢
筆管灰 甘草節 硼砂
右為末白麥五兩黃蠟木瓣一處和煮成錠子如梧桐子大每服一
錢令水磨化即下骨鯁若金石鐵錫以生薑汁磨化下之
如聖散 治吸物誤置喉中不出
桔梗二兩 杏仁 皂角
甘草炒三
右先研桔梗杏仁為末以甘草皂角末如為餅子銘中均令乾重搗
為細末每服一錢七調下黃臘火熬水半盞同煎七分熱服亦得末
如聖服
通氣散 治誤吞銅錢物及針鉤之類在咽喉不下
鵝毛燒灰 磁石 象牙末
右為細末每服半錢新水調下
治誤吞竹木魚骨所鯁雜物不下咽痛
貫眾 茯苓 甘草
右等分為末每服二錢新汲水調徐徐呷之

治誤吞錢出肘後方

用莫耳頭一把以水一升浸十餘度飲水愈

治誤吞鐵石骨刺等不下危急者出聖惠方

王不留行 黃蘗等分

右等分為細末水浸蒸餅丸如彈子大以線穿之挂當風處每

用一丸冷水化開灌下立效

治誤吞金銀物或錢在腹內不下方出聖惠方

石炭 硫黃

右件為末酒調下不拘時

血餘散 治食中吞髮繞喉不去

用亂髮燒末酒服一錢匕或飲調一錢一方以水調服

治誤吞金銀環及釵方兼治誤吞錢及鐵枝竹木

用白糖二斤一頓漸漸食之多食亦佳即自消化

誤吞環及指鐶方出聖惠方

用鵝毛燒灰用二七枚末服之錢別以水調一方寸匕飲服之

誤吞釘針及箭鏃等方

但多食脂肥肉并脂令與自裹出一方食肥羊脂諸般肥肉

誤吞錢針出千金方

用磁石棗許大一塊含之立出

誤吞錢開氣不通出百一選方

用南京棗三兩嚼之

治誤食桐油出百一選方

用食乾柿解之白礬少許入湯水中飲下尤妙

治誤吞鉤綫在喉中不出方出聖惠方

若鉤綫在手者莫引之但盃以珠璫意苡子等就貫著綫稍稍推至鉤處小引之即出也

治誤吞蜈蚣出□□方

用生豬血令病人吃再吃生清油灌口中惡心其蜈蚣滚在血中吐出繼與雄黃細研水調服愈昔有店婦人同用大竹筒吹火不知筒中有蜈蚣藏焉用以吹火蜈蚣驚迸竄入喉中不覺下胸膈□人

無措矣遽有人云可討小豬兒一隻割喉取血

灌之 物不能化者

用貫眾砂糖服其蜈蚣自下又用生菜汁飲之頃間吐出其蜈蚣自化

治誤食竹木簽骨中及入喉不出

炭為末米飲下於大便內下如烏樣狀

治誤吞鉤線方

用皂角末吹鼻中取嚏即出

用旱蓮□□一味□□□□□□□入□□□□□□□□□□□引七矣

若水晶珠等無珠等物皆令滑用之

治誤吞竹木入喉喉出入不得

用故鋸燒令赤漬酒中及熱飲之

治誤吞鐵枝竹木出□□方

用白糖但數數多食自消化

治誤吞銀鐶及釵出□□方

用水銀一兩服之釵便下亦可以胡粉一兩搗調用之分再服令如泥也若吞金銀物在腹中皆服之令消并出之

治誤吞鉤出聖惠方

用小羊喉以杏□推至鉤處當退脫小引則出

又方

但大戾頭四向鋼小引之則出

又方出聖惠方

用常思草頭一把二升水淘煮之十餘沸取汁飲之

治誤吞水蛭

用青靛調水飲即瀉出或為此蟲咬亦用靛塗之

又方出□□方

用蜂蜜末一錢熱水一盞服之後則必吐其物從出無恙

又方出□□方

用蒸餅半個於口中嚼成在餅上少頃再用半個依前捲法吃後其物自然失

誤吞銅鐵珠璫鐵石硬者方

用燒鋼研令末酒中飲之立愈

誤吞錢 出百一選方

用生鳧茈取汁細嚥錢自軟消化 鳧茈即荸薺也

誤吞釵方

用曝韭令萎莖熟勿切食一束即出或生麥葉亦繩如韭法

皆可用但力急多食自出一方薤白亦如前法

誤吞錢不出及誤吞針方

用葵菜不以多少搗取汁令飲之即出一用葵花煮汁服之

治誤吞錫錢

用胖曲細末燒存性為末濃煎艾湯調二錢無曲以炭止服艾湯亦效

又方

用百部根四兩酒一升煮一宿温作二服

又方

用木賊草為末每服一錢用雞子白調下

又方

用滑石末錫糖丸如豆大噙化一丸

治誤吞錢

用羅炮蜜二升即出矣

治誤吞救閉氣不通

萆薢一兩　茸草麩炒　狗脊一兩

右為細末食前以酒飲調下二錢一方不用萆薢用貫衆半兩

萆薢　狗脊各一兩

治誤吞釣線方

用螻蛄摘去身但吞其頭數枚勿令鯁人知

治吞錢方

用艾蒿五兩以水五升煮取一升頓服之便下

治一切諸雜骨木竹片諸鯁 鯁喉宜服此方

代赭　硝石　黄丹

右細研為末每服半錢米飲下

治一切竹木簽刺諸骨鯁喉

栝樓　狼毒　自然銅

右為細末凡有鯁喉即抄藥末一字入口中津液嚥下

治喉中物鯁欲死

用白鳳仙子研水大呷以竹筒灌入硬物即軟去切物經不牙軟

又方骨鯁不下之〇魚骨砂糖大塊含即軟去

又方

蚌粉一兩　草麻去殼　黄丹一分

右為末每服一錢水調下

又方

用綿包橙肉如小指大以線繫線令吞下直鯁物之處牽出物隨出

又方

用生鱔魚大者以線穿縛其頭以尾先入咽中頭來出即牽出之

治誤吞錢及骨至效

用木賊去節為末米飲調二錢末下再服至三必效

治誤吞鐵錢及骨

古文銅錢十數枚　入白梅十箇包過細研

每服一丸如菉豆大侵晨取流水吞下即出

巧匠取喉釣方

咸平中職方魏公在潭州有數子弟皆幼因相戲以一釣竿垂釣

作餌垂鈎戲誤一子吞之而誤吞其鈎至喉中急引之鈎以逆須

不能出乃令之諸醫不敢措手魏公大恐令人遍問老婦必能發

時有一老婦九十餘歲言亦未嘗見此切科何智識者可出入時本

郡有一莫都料性甚巧令問魏公公呼老婦責之曰五子誤吞鈎莫

都料付能治之老婦曰聞莫都料意也其莫都料嘗水中打撈名

仰見魏公大喜其為人之言誦之公遂召莫都料至沉思久之言要得

一蠶繭及大念珠一串公與之莫都料遂剪蠶繭如錢大用物推四面

令軟以油潤之仍中通一竅先穿上鈎線次穿數珠三五枚令兒正

坐開口漸添引數珠投之到喉覺至繫鈎處乃以向下一推其鈎即

下而脫即向上急出之見蠶繭裹定鈎線鬚而出並無所損

魏公大喜厚贈之公曰心明者意必巧也意巧心必善醫

治鯁以類推方

治鯁之法皆以類推鸕鷀治魚鯁磁石治針鯁髮灰治髮鯁狸虎治骨鯁亦各從其類也

治[illegible]蛛飛絲入口

用紫蘇葉不問新舊嚼之即愈

治誤食髮令腹有蟲

以雄黃類之○昔魏立言仕唐為太常坐有道人令腹滿煩滿二歲立言訝曰腹有蟲誤食髮而然令餌雄黃一劑少頃吐一蛇如人小指惟無目燒之有髮氣乃愈

鈎吻葉與芹葉相似誤食之殺人

用薺苨八兩水六升煎取二升為兩服解之

又方　治誤吞水蛭 [illegible]

用酒及藍靛絞汁月頭粉三四五日空心服

治誤吞錢器物

用鉛粉一兩研細分作二服水調服之令食水銀金化如泥若誤吞金銀物在腹中服之令消成出

治誤吞下錢

右以羊脛燒灰為末空心米飲下二錢

普濟方卷之二十七畢

考盛官寓理吳鼎
秀才金予麟
對方醫官士姚銳
楊彬　齊達
消某孫文宣　芳中
學正趙亭等

原缺

[illegible]丸　[illegible]順氣散　羌桂湯　治男子婦人[illegible]風疾
[illegible]之散　[illegible]香辟風散　小續命湯
中風[illegible]逆[illegible]喘　附子酒　壽寒方　[illegible]中風人湯[illegible]下下
[illegible]丸　治男子女人中風　治中風[illegible]欲死者
治中風面目相引偏僻　瓊田草　治三十年風不效者
預養中風　治婦女姓人多患風者　又方
療中風服藥不問輕重便須吐逆　葉氏十味剉散
治中風心煩恍惚　神力丸　治中風語澀四肢拘急產後婦人宜之
治中風傷寒頭痛　治中風面浮腫喉咽不通　治小風中
治中風頭眩心肺浮熱

○肝中風　論一道　方三十二方

龍腦丸　牛黃散　赤箭丸　天麻丸　羚羊角散
羌活散　附子散　拔[illegible]湯　羌活散　獨活散
犀角散　仁壽丸　犀角丸　地黃酒　天麻散

茯苓散 薏苡人散 石膏湯 白鮮皮湯 秦艽散
枸杞子散 麥門冬散 雄黃丸 真珠丸 天麻丸
[illegible]散 丹砂丸 大麻湯 竹瀝湯 羚羊角散
治中風重候偏痹不遂 二散子

心中風 論一道 方二十五方

定神鎮心丸 遠志丸 牛黃散 荊瀝湯 羚羊角散
牛黃丸 犀角丸 人參飲 人參丹砂丸 生犀丸
朱砂丸 天雄湯 前胡散 茯神散 金箔鎮心丸
牛黃遠志丸 麻黃散 沙參散 茯神散 防風丸
辰砂天麻丸 羌活散 丹砂丸 烏犀散 解語丹

脾中風 論一道 方十六方

天麻丸 人參 赤芍 羚羊角丸 當歸丸 秦艽湯 一名麻
羚羊角丸 茯神丸 一名羚羊 攢抑丸 青茯苓散
羌活湯 防風散 獨活丸 獨活湯 麻黃湯
獨活散 牛膝丸 一名 丹砂散 一字散
羚羊角散 細辛散 凝[illegible]花散 前胡散 甘草散
赤茯苓散 竹瀝湯 前胡丸 人參散 七聖散
牛黃丸 [illegible]丸

肺中風 論一道 方十七方

牛黃丸 八風防風散 犀角散 防風散
白殭蠶散 白花蛇散 防風散 大排風天麻散
獨活散 芎藭散 麝香丸 羚羊角散 麻黃散
依 麻黃續命湯 全不[illegible]七

腎中風 論一道 方十一方

萆薢散 蝌[illegible]丸 獨活散 天麻丸 天雄散
石斛浸酒 附子散 附子湯 海桐皮散 杜仲丸

防風湯 五味子丸 白花蛇丸 防風丸 紫蘇大腹皮散
牛黃天麻散 天麻浸酒 白殭蠶風 治[illegible]風毒氣遍身虛腫
羌活湯 當歸湯 治胃家風虛積熱

胃中風 論一道 方二十方

胃風湯 草厚朴湯 厚朴黃散 豆蔻丸 白豆蔻丸
厚朴陳橘皮湯 白朮丸 橘子皮方 木香丸
胃風湯 去四肢中浮風

卒中風 論一道 方[illegible]方

金水靈丹 何[illegible] 白[illegible]丸 山梔子丸
大竹瀝湯 秦艽[illegible] 治卒得風覺耳中恍惚者
蛇蝎續命湯 牛黃丸 防風湯 急治[illegible]
聖餅子 耳打[illegible] 蝎梢散 烏頭丸 治卒中風[illegible]氣
虎掌丸 白圓丸 天麻丸 [illegible] 龍腦丸
白殭蠶丸 芎藭湯 [illegible]延丸 杏仁散 天麻散
天麻丸 青金丸 金箔丹 白丸子 透[illegible]丸
治卒中法 中黃丸 [illegible]散 大醒風湯 一名大醒
續命散 蠟彈丸 省風湯 續命散 返魂丹
治卒中法 三生飲 [illegible] 天仙膏 救生散
奪正散 三化湯 稀涎散 一名[illegible]
二聖湯 追風餅子 治卒中手足不遂
搐鼻法 八毒膏 一名[illegible] 萬功散 治急中風口閉
石膏散 治卒中風 麻黃膏 生薑生附湯
天南星膏 治卒暴中風 蒸湯方 皂莢膏
杏仁膏 治風方 治卒中風皆慎 延壽丹
治卒中風 四物湯 治男子婦人中風延綿
至寶丹 勝金丹 牢寶通神丹 香附湯
四神湯 蛇黃散 通關散 治卒風毒腫急痛
開關散 治卒中風不語舌根強硬 附香飲 一名附香

普濟方卷之三十四目錄　腎

腎臟總論　腎風論　治腎虛冷耳不聽　治腎風

長　陽　痼安　溺　路　唇面偏　狀之　身　[illegible]

普濟方卷之三十四

諸風門

總論

夫風爲天地浩蕩之氣，正順則能生長萬物，偏邪則能傷害品類。人或中之，鮮有不致斃者。是以聖人推爲百病之長。夫風與氣一也，塞乎天地之間，則陰陽不同；在乎人身之中，則吹呴有別。陽爲風，故風無形而有其勢；陰爲氣，故氣有質而無其威。吹則爲風，呴則爲氣，和則爲氣。是以四時之內，八風二十四氣，皆以候陰陽消長之機也。大塊噫氣而爲風，山澤蒸而爲氣，風動則氣濁，氣聚則風息。在人亦然。人生天地之中，負陰抱陽，稟中氣以爲和。上古之人，其知道者，法於陰陽，和於術數，飲食有節，起居有常，不妄作勞，故能精氣內守，形神俱全，安從來。今時之人，以酒爲漿，以妄爲常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持滿，不知御神，務快其心，逆於生樂，致陰陽不調，臟腑氣偏，衛失度，營血錯亂，然後中風。非不由外邪因得以傷之。風邪之中人也，其狀奄忽，蓋風性緊暴，善行數變，其中人也卒，其傷人也暴，致人迷亂昏人神亂。千金方風論有七十二種，今其大法，則以五風爲首。五風者，謂肝心脾肺腎五臟之中也。其書至死者亦不同。肝風之狀，踞坐不得低頭，青色，頭旋目瞤者可治，宜於肝俞灸之；若上而目直視，唇口俱青或黑，目大青黑，一黃一白者死。心風之狀，汗自出，但仰臥不可轉側，唇色正赤，語言狂妄者，宜於心俞灸之；若唇面青黃黑赤色不定，眼瞤動不休，或面目時時懷動者，心絕也，五日而死。脾風之狀，身通黃，四肢不收，口吐[illegible]者，尚可治，宜灸脾俞；若手足俱青，未[illegible]，土敗必死。肺風之狀，但倨而喘，鼻不休，身汗出，鼻不聞香臭，不得語，目鼻不至口色白者可治，宜於肺俞灸之；若先血及妄言，色黃，不出七八日而死。腎風之狀，踞坐而腰脊重痛，脇肋[illegible]者可治，宜於腎俞灸之；若齒黃，面知土色者，死。至于六腑本無中風，唯胃有言。以胃爲水穀之海，最能納入而五臟，風邪得以中之。胃風之狀，額上多汗，惡風，食飲不下，隔塞不通，腹善滿，失衣則䐜脹，口眉息心下

寺院宮觀常住濟人有效方者皆許抄錄勿得借去恐有失落

善　　腸　　萌
　　　　　　剤

暖　識　士　　言　敝　　眩　笙　　經　　唐　　老

[illegible]

胃　涎　　　　　　　　　　痢

髮　涌　者

[illegible]

邪

虚

木

夏本自不同夫八正之氣風其至以時可生長化育也賊邪之氣寒者有
而亂有大者則有崇則甚大者折木飛石風行後賊人中其病暴之重風
冬天大寒之風中人則甚死淺之天冒其見也不得出入其血氣
不得和循入于經脈有痛苦然後出見也皆無節也若冬月中風乃傷風
下令安世至春和升往之時皆言風寒可致其病用辟邪之氣上行者
是也故曰清氣上升濁氣下降……
作肝膽之氣上升于天則肅殺之氣一發不能兩持……
蘇養天真元氣此即生化之主萬化者也又不來氣則……
則食膽肝膽之氣故風不可犯也曰去正則問有元氣本空虛……
使之大苦冬之月安下之人能節制不妄……
知而養用以至傷生是以行往之有故也

中風

天風者天地山川之氣也所發遠近有一隅有天地八方四時五行
之氣為近風寒秋冬夏冬春其時從東南而北天運地承八卦之位來
者為主風溫中寒者天之至氣而通其處冲虛以得十二節之氣也
是京東自為氣光氣也節則癱瘓然離然令食前先天地之風也後
諸有風者非其時中來邪之氣不能山川疏泄之所之人間定其所
寇賊之至則為天罰風之生其有異之則人長居其中者精之天所能
害人命其內入入百骸流其五臟六腑則致生病焉也乃然求者各九十
日名曰有風傷人為肝風夏九十日名曰陽風傷人為心風秋九十日
名曰涼風傷人為肺風冬九十日名曰寒風傷人為腎風其分布八方
亦異名也太一之神所居其鄉者各王四十五日風從其所居之方來
方民之氣立春王名為條風一名明庶風王四十五日東方震之氣立春分
王名為明庶風一名嬰兒風王四十五日東南方巽之氣立夏王名為
清明風一名弱風王四十五日南方離之氣夏至王名為景風一名大弱
風王二十七日合中夏也中夏中央之氣分己王十八日合夏至都四
十五日王皆同在此仲夏者非正中之位也是天地之王中五行之所
會四季之所各其一動而天土二氣王之分夏故為一位故為仲夏也

土

西南方坤之氣立秋王名為涼風一名謀風王四十五日西方兌之氣
秋分王名為閶闔風一名剛風王四十五日西北方乾之氣立冬王名
為不周風一名折風王四十五日北方坎之氣冬至王名
為大剛風王四十五日也凡八風之變為生八風八風者八方之風也
君從其鄉來者主長養萬物則人少病若不從其鄉來而從所勝來者
為賊邪害於萬物則人多病是故聖人云避風如避矢然風之傷人或
為寒熱或為熱中或為寒中或為癘風或為偏枯或為賊風或
行而數變其病各異其名不同也○中風者凡五〜傷人或為寒中或
為熱中而為癘風或為偏枯以春甲乙傷於風者為肝風
以夏丙丁傷於風者為心風以四季戊己傷於邪者為脾風以秋庚辛
傷於風者為肺風以冬壬癸傷於風者為腎風風中五臟六腑之俞亦
為臟腑之風各入其門戶所中則為偏風風氣循風府而上則為腦風
風入頭則為目風眼寒飲酒中風則為漏風入房汗出中風則為內風
新沐中風則為首風久風入中則為腸風飧泄外在腠理則為泄風故曰風
者百病之長也至其變化乃為他病無常方然致有風氣也
在人肌膚中內不得通外不得泄因人動靜乃變其性有風遇寒則食
不下遇熱則肌肉消而寒熱有風遇陽盛則不得汗遇陰盛則汗自出
肥人有風肌肉厚則難泄喜為熱中目黃瘦人有風肉薄則常外汗
身中寒目淚出有風遇於虛腠理開則外出凄凄然如寒狀覺身中有
蟲嚙狀時如針刺吹之此是其證也有風遇於實腠理閉則內伏令人
熱悶是其證也○肝中風者人迎并左關上脈浮而弦在天為風在地
為木在人臟為肝肝主春中風為頭相從故脈應在左關肝風之狀多
汗惡風色微蒼頭目瞤左脅偏痛嗜甘如阻婦人狀
以其色青○心中風者人迎與左寸口脈洪而浮在天為熱在地為火在
人臟為心心主夏邪風乃子母相因故脈應在左寸口心風之狀多
汗惡風色焦赤善怒於熱病不能言欲飲食則嘔在舌其色赤
脾中風者人迎與右關上脈浮而微遲在天為濕在地為土在人臟為
脾脾屬中風邪為勝故脈應在右關上脾風之狀多汗惡風
四肢怠惰身體不欲動發熱不能飲食昏臥如醉人診在唇其色黃
肺中風者人迎與右寸口脈浮而澀在天為燥在地為金在人臟為

眼　人　療

[illegible]

有伏中[illegible]當以[illegible]下是[illegible]可也，其四出者亡出是時間伏

[illegible]小兒驚風亦不可正出，大其名與大人同

才其發搐搦之時不可抱住手足，抱住則[illegible]不歸手[illegible]

之可也。凡中風是竊於心乎，然中則當問伏入漸重[illegible]正生用[illegible]

暗疾埋之[illegible]入口[illegible]者邪

是重者亦有人事難不可更[illegible]火入伏[illegible]

[illegible]

結　根　牟　痞　胃　痳　兩　原

治遺尿[illegible]心[illegible]主[illegible]令一身[illegible]不可關也

方

[illegible]　水銀　[illegible]　青[illegible]　丹砂

雄黃　白石英　紫石英　[illegible]　[illegible]石

胡粉　[illegible]

以上十一味各細研入瓷合中[illegible]

[illegible]

龍腦　[illegible]　牛黃　天竺黃

虎骨　[illegible]　烏蛇　[illegible]　天南星

白附子　[illegible]　麻黃　[illegible]

木香　[illegible]　附子　[illegible]　獨活　[illegible]

白朮　白殭蠶　[illegible]

右除前[illegible]研外，餘並[illegible]為末[illegible]

[illegible]

十九後便[illegible]又住三五日

即更[illegible]

能有可五七服服此藥多者疾去後[illegible]

[illegible]

磁石[illegible]

[illegible]

熟艾[illegible]次入磁石[illegible]

[illegible]

牛黃 龍腦 [illegible]

[illegible]

仙靈脾 大麻[illegible]

七味[illegible]

木香[illegible]

[illegible]

即吉[illegible]

[illegible]

白附子[illegible]

[illegible]

胡黃連[illegible]

里　　　　有效之　　　　青　　　　　述宜看之　　　　拾

羌活　骨皮　人參　茯苓　杜蠣
細辛　桔梗　麻黃　乾葛　附子
白术　桔梗　川芎　防己　當歸
黃芩　柴胡　牛膝　天雄　石斛
杜仲　甘草　烏頭　羌活　獨活
防風
右[illegible]每服[illegible]錢[illegible]一日三服[illegible]
[illegible]一[illegible]
至寶[illegible]散　治中風痰涎壅盛[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
犀角　仙靈脾　真珠末　滑石　胡黃連
[illegible]　人參　[illegible]　白茯苓　[illegible]
[illegible]　枳殼　鬱金　大黃　牛黃
血竭　木通　[illegible]　[illegible]
荊芥穗　[illegible]　柴胡　[illegible]
天麻散
右為末[illegible]中風不語用新水調下一錢[illegible]
[illegible]
[illegible]
通中[illegible]散　治中風手足不遂[illegible]
[illegible]
羌活　防風　[illegible]
[illegible]
天雄　[illegible]　防風　人參
[illegible]
[illegible]
右剉[illegible]
[illegible]
[illegible]

通神散　[illegible]
麻黃　天麻　[illegible]
獨活　[illegible]　石斛　[illegible]
乾[illegible]
藁本
右件剉為散每服一錢至三錢[illegible]調下日三服
大秦艽散
大豆　[illegible]　麻黃
天雄　[illegible]
細辛　[illegible]　白术　[illegible]
[illegible]　秦艽
[illegible]　桂[illegible]
右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服[illegible]二十丸日三服
[illegible]
白术　人參　白茯苓　附子
甘草　防風　川芎　白芷　白殭蠶
知母　[illegible]　獨活　細辛
[illegible]　藿香　[illegible]
右為細末煉蜜為丸每兩作十丸每服一丸[illegible]
清肺飲　[illegible]
大秦艽散　[illegible]
[illegible]
桔梗　芍藥
前胡　[illegible]
天麻　[illegible]　防風
[illegible]
羚羊角散
[illegible]　人參

丹參　柏子仁　酸棗仁炒　附子炮去皮臍　人參
牛黃各　茯神去木　防風去叉　乾薑炮　黃芪　麥門冬各去心
南木香　牛膝酒浸　薏苡仁各二兩
右為細末煉蜜和丸梧桐子大每服空心溫酒下三十丸日二服
大鐵彈丸　治五臟中風癱瘓口眼喎斜筋骨疼痛皮膚頑麻
　白附子　五靈脂　白附子
　烏頭　麻黃去節　乳香
　全蠍　安息香　當歸
　烏蛇肉　木鱉子去殼　朱砂
　虎骨酥炙
右為末以酒煮安息香入藥同搗勻為丸彈子大每服一丸溫酒化下
防風通聖散　治一切風熱鬱結氣血壅滯筋脈拘攣手足麻痺
頭目昏眩瘡瘍腫毒耳鳴鼻塞口苦舌乾咽喉不利胸膈痞悶
大便秘結小便赤澀腸胃燥結便溺淋閉表裏俱實不能
宣通者
熱極生風涎潮搐搦陽毒... 久不已
者或熱勢... 風熱...
及語... 風癇... 陽毒...
斑疹及調理傷寒發汗不解頭項肢體疼痛宜服之
防風　川芎　當歸　芍藥　大黃
芒硝　連翹　薄荷葉　麻黃　石膏
桔梗　黃芩各一兩　白朮　山梔子　荊芥穗各
滑石三兩　甘草二兩
右為粗末每服一兩生薑三片水煎服
一方加牛膝人參半夏
若涎嗽加半夏勞汗當風...
自汗去麻黃加桂枝...
小便淋閉去麻黃加滑石
連翹荊芥...香末二錢...

第一服內加一錢...每一兩
加荊芥穗大黃各二錢...
小兒急慢驚風大便秘結...
驚悸...
一錢　若...
蔓荊子...
服一半稍熱服汗出...
二錢...
藿香...乳香末各二錢
三錢...
...
防風...治中風...

白花蛇散
　白花蛇　天南星
　白附子　白僵蠶　烏蛇
　天麻　麻黃
　全蠍　乾蠍
　朱砂研　水銀
　雄黃　桂
右前一十五味搗羅為末各類一處後四味各細研用
黃蠟...
取一...
斷手...
留...
...
...
大...

羌活 石膏各一 甘草 川芎 當歸
羌活 獨活 防風 黃芩 白芍藥
白术 白芷 生地黃 熟地黃 白茯苓各一
細辛五分
右剉每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服無時如遇天陰加生薑
七八片如心下痞每服一兩加枳實一錢同煎有依稀實
備急如聖神丸 治中風神仙大驗備急丸
雄黃研 硃砂研 丹砂研 硫黃研
水銀 [illegible]
[illegible]
上件研者末並入鐺子中 [illegible] 以火煅 [illegible]
[illegible] 不合 [illegible]
[illegible] 火 [illegible] 入 [illegible]
[illegible] 不得 [illegible] 出 [illegible]
重 [illegible] 二日三夜 [illegible] 起 [illegible]
[illegible] 十六
麝香 [illegible] 研細入後藥末
犀角 [illegible] 牛黃 [illegible] 天竺黃 [illegible] 鹿茸 [illegible]
升麻 天麻 [illegible] 木香 [illegible] 乾蝎 [illegible] 阿膠 [illegible]
天南星 [illegible]
右件十味除研外搗羅為末入前五味 [illegible]
同研 [illegible] 大棗 [illegible] 如 [illegible] 一千杵 [illegible]
[illegible] 大中風 [illegible] 不開用豆淋酒生薑 [illegible]
丸至三丸 [illegible] 下如人行五里更一服 [illegible] 三服汗出 [illegible] 食生
薑酒粟米粥 [illegible] 三月至五月五日 [illegible] 日 [illegible] 室中 [illegible]
[illegible] 婦人 [illegible]
五積散 [illegible]
陳皮 [illegible] 麻黃 [illegible] 白芍藥 川芎
當歸 甘草 茯苓 半夏 肉桂
白芷 [illegible] 枳殼 [illegible] 乾薑 [illegible] 蒼术 [illegible]
桔梗 [illegible]

蘇合香丸
[illegible] 一方只加 [illegible] 香
蘇合香 [illegible] 治 [illegible] 暈
白术 青木香 朱砂 沉香
麝香 訶黎勒 烏犀屑 白檀香
香附子 [illegible] 蓽撥 [illegible]
安息香 [illegible] 丁香 [illegible]
右末入研藥 [illegible] 研 [illegible]
[illegible] 宜 [illegible] 不知人事
大通丸 治中風 [illegible] 四肢 [illegible] 不知人事
丹砂 [illegible] 研砂 [illegible] 粉霜
雄黃 [illegible] 金箔 [illegible] 金牙研
[illegible] 天麻 [illegible] 巴豆 [illegible]
乾蝎 [illegible]
右為末 [illegible] 丸如 [illegible] 大 [illegible]
[illegible] 十四
[illegible] 服一丸 [illegible] 各 [illegible] 薄荷 [illegible]
[illegible] 下風痰 [illegible]
[illegible] 中風 [illegible] 身不遂 [illegible]
[illegible] 不利 [illegible]
[illegible] 不 [illegible] 男
[illegible] 人 [illegible] 服之
貫眾 甘草 板藍根 [illegible] 乾薑 [illegible]
龍腦研 [illegible] 青黛 [illegible] 牛黃 [illegible] 生犀
珠子 [illegible] 薄荷 [illegible] 川大黃 [illegible] 辰砂 [illegible]
桂
右 [illegible] 同 [illegible]
[illegible]
[illegible] 風 [illegible]
[illegible] 大有 [illegible] 一方 [illegible]
牛黃 [illegible] 中風 [illegible] 不 [illegible]

如服之神验

牛黄 [illegible] 朱砂 [illegible] 麝香 [illegible] 生犀末 [illegible]

脑子 [illegible] 白霜 [illegible] 雄黄 [illegible] 别星 [illegible] 龙脑 [illegible]

人参 [illegible] 金箔 [illegible] 银箔 [illegible]

右件同研 [illegible] 大 [illegible] 服 [illegible]

紅雪通中散 [illegible]

大黄 [illegible]

[illegible] 大腹 [illegible] 槟榔 [illegible]

右剉 [illegible] 朴硝 [illegible]

[illegible]

附子 [illegible] 中风 [illegible] 不能语 [illegible]

芎藭 [illegible] 白术 [illegible]

[illegible] 十八

防风 [illegible] 防己 [illegible] 附子 [illegible] 人参 [illegible]

桂 [illegible] 川芎 [illegible] 天麻 [illegible] 黄芩 [illegible]

右剉如麻豆 每服五钱 以水一盏半 生姜 [illegible] 去滓 [illegible]

五灵脂丸 [illegible] 中风 [illegible]

五灵脂 [illegible] 附子 [illegible] 天麻 [illegible] 白僵蚕 [illegible] 天南星 [illegible]

乌头 [illegible] 乌蛇 [illegible] 地龙 [illegible] 白花蛇 [illegible]

[illegible] 白附子 [illegible] 牛黄 [illegible] 龙脑 [illegible] 麝香 [illegible]

右为末 [illegible] 丸如 [illegible] 服 [illegible]

神验散 [illegible] 中风 [illegible] 不 [illegible]

木香 [illegible] 白茯苓 [illegible] 人参 [illegible]

[illegible] 羌活 [illegible] 附子 [illegible] 远志 [illegible] 菖蒲 [illegible]

[illegible]

右为末每服一钱 [illegible] 日午夜卧服

[illegible] 治中风 [illegible]

知

独活汤 [illegible]

独活 [illegible] 防风 [illegible] 芎藭 [illegible]

桂 [illegible] 细辛 [illegible] 甘草 [illegible]

麻黄 [illegible] 白茯苓 [illegible] 当归 [illegible] 附子 [illegible]

右剉如麻豆 每服五钱 以水一盏半 生姜五片 [illegible]

日午夜卧温服 若 [illegible] 有汗 [illegible]

[illegible]

[illegible] 加陈橘 [illegible]

[illegible] 加茯苓 [illegible]

加减 [illegible] 本方服四五日 以后更 [illegible]

[illegible] 治中风 [illegible] 手足 [illegible]

[illegible] 后中风等

[illegible] 十九

[illegible] 天麻 [illegible] 乌头 [illegible] 白僵蚕 [illegible]

[illegible] 龙脑 [illegible] 丹砂 [illegible]

右以前 [illegible] 每服一钱 [illegible]

[illegible]

惊风 [illegible]

防风汤 [illegible] 治中风不语 四肢不 [illegible] 手足 [illegible]

防风 [illegible] 羚羊角 [illegible] 独活 [illegible] 当归 [illegible]

麻黄 [illegible] 桂 [illegible] 杏人 [illegible] 川芎 [illegible]

[illegible] 秦艽 [illegible]

右 [illegible] 每服四钱 以水一大盏 [illegible] 至七分 去滓 [illegible]

[illegible] 散 [illegible]

人参 [illegible] 风 [illegible]

[illegible]

胃寒　堂　参　克　由　已湯 易佐 不法　物二六　方　急　證

復患胃虛腸不收多因酒措神不爽不思飲食並吐 善心霍亂吐
瀉脫前產後但是氣虛百病皆可服之 [illegible] 衛進食去風通脈
氣

天台烏藥五兩　桔梗　白芷
陳皮　白朮　麻黄
乾薑　人参　川芎　枳殼　甘草　炙

右細末每二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分食前 [illegible]
頭疼 [illegible] 中風 [illegible] 五氣 [illegible] 一方去白朮人参加 [illegible]
[illegible] 乾薑 [illegible] 肥木生薑 [illegible] 手足 [illegible]
大率經 [illegible] 痛 [illegible] 中風 [illegible] 世人
[illegible] 名烏藥順氣散 [illegible] 氣風 [illegible]
中日中氣 [illegible] 則生風 [illegible]
[illegible] 風 [illegible] 先通 [illegible] 不 [illegible] 風 [illegible] 自 [illegible]
[illegible] 命湯 [illegible] 治風 [illegible] 無 [illegible] 不可獨用 [illegible]

已上 [illegible]

[illegible] 方 [illegible] 用 [illegible] 木瓜湯 [illegible] 方治悶
[illegible] 身体不能 [illegible] 痛 [illegible] 一方服方年
[illegible] 加天麻一兩 [illegible] 服 [illegible] 氣 [illegible] 飲食
加減續命湯 [illegible] 中風不 [illegible] 口服 [illegible]
手足 [illegible] 言 [illegible] 神情 [illegible] 多 [illegible]
[illegible] 不能 [illegible] 治 [illegible] 服之 [illegible] 有病
風人 [illegible] 不可 [illegible] 以防 [illegible]

麻黄　人参　黄芩　白芍藥　川芎
甘草　防已　杏人　桂　防風

附子 [illegible]
右 [illegible] 服 [illegible] 水一盞半薑三片棗二枚煎 [illegible] 溫服取
汗 [illegible] 治節 [illegible]
不能 [illegible] 中 [illegible]
[illegible] 心神 [illegible] 加 [illegible] 附子 [illegible] 加 [illegible]
[illegible] 大便 [illegible] 附子 [illegible] 大便自利 [illegible]

屢效　寒胃　瓜蔞　獨　脫　方　北 [illegible]　苦　形　丹

[illegible] 附子 [illegible] 加 [illegible] 附子 [illegible] 多 [illegible] 人参 [illegible]
[illegible] 中 [illegible]
[illegible] 身 [illegible] 上氣 [illegible]
[illegible] 汁 [illegible] 二 [illegible] 問又
[illegible] 加 [illegible] 四 [illegible] 冬 [illegible]
附子 [illegible] 一兩 [illegible] 二兩 [illegible] 一兩 [illegible]
[illegible] 手 [illegible] 上 [illegible] 自
[illegible] 失血 [illegible] 各二兩 [illegible]
[illegible] 白朮各二兩 [illegible] 附子 [illegible]
生 [illegible] 一兩 [illegible] 加牛膝 [illegible]
[illegible] 各一兩 [illegible] 杜仲各半兩 [illegible] 防方
[illegible] 杏仁 [illegible] 方 [illegible] 方有毛
治 [illegible] 防已 [illegible] 水 [illegible]
一方 [illegible] 名防已湯此方 [illegible] 風 [illegible] 不同 [illegible] 服

[illegible]

[illegible] 風 [illegible] 多汗惡風 [illegible] 一日 [illegible] 不可 [illegible] 日 [illegible]
[illegible] 附子 [illegible]
[illegible] 風 [illegible] 而 [illegible] 多汗 [illegible]
[illegible] 汗出 [illegible] 白朮各 [illegible]
[illegible] 三 [illegible] 風 [illegible] 多汗 [illegible]
口 [illegible] 不能 [illegible] 人参 [illegible]
[illegible] 各三分 [illegible] 四 [illegible] 三片 [illegible] 湯
方中風 [illegible] 本方
[illegible] 中風不 [illegible] 加減 [illegible] 也
[illegible] 中 [illegible] 加 [illegible] 湯 [illegible]
之中風無汗惡寒

麻黄　防風　杏仁

依本方加 [illegible] 太陽 [illegible]
小續命湯 [illegible] 中風有三 [illegible] 以天地之 [illegible] 風 [illegible] 中風
一者 [illegible] 風 [illegible] 本氣 [illegible] 四 [illegible]

之於經有也若或臟則閉有之可形或一不果則此治主如臟腑通經絡
便是中風本經重者三中血脈則喎斜所有無風聚重陽之者也
中腑則發中臟則性命危急此三者各不同如中血脈外有六經之
形證則從小續命湯加減文疏風為治之中腑內有便溺之阻隔
宜三化湯或局方中麻仁丸通利外無六經之形證內無便溺之阻隔
宜養血通氣大秦艽湯羌活愈風湯治之中臟痰涎昏冒宜至寶
丹之類鎮墜若中血脈中腑之病初不宜用龍麝牛黃為麝香治脾入
肉牛黃入肝治筋龍腦入腎治骨恐引風深入骨髓如油入麵莫之能出
又不可一概用大秦艽羌活愈風湯大便積其陰血其氣愈虛方列于後

治風經驗方

麻黃去節　人參去蘆　黃芩　芍藥　甘草炙
川芎　杏仁去皮尖　防己　官桂　防風
附子炮去皮臍

右除附子杏仁外搗為粗末後入二味令勻每服五錢水一盞半入
生薑五片煎至一盞去滓稍熱服一方有熱者加桂枝麻黃[illegible]

素問病機氣宜保命集卷中　十二

[illegible]黃芩加作二兩去附子一本云恍惚者加茯神遠志驗方有白
术不用杏仁救急方無川芎杏仁近年方無防風昔有人又患[illegible]
服此六七劑乃愈忽有風寒人天陰即輒合服之可以防瘖瘂

附子續命湯　治中風無汗身涼
附子　乾薑　甘草各三
宜針隱白穴去太陰之賊也此一證太陰經中風也

桂枝續命湯　治中風有汗惡風
桂枝　芍藥　杏仁
依本方加一倍宜針風府此二證太陽中風

白虎續命湯　治中風身熱無汗不惡寒
石膏　知母　甘草
依本方加一倍

葛根續命湯　治中風身熱有汗不惡風
葛根　桂枝　黃芩
依本方加一倍宜針陷谷刺厲兌針陷谷者去陽明之賊也刺厲兌

者瀉陽明之實也此二證陽明中風也

羌活連翹續命湯　治中風無汗身涼此四證六經有繫於少陽厥陰者或肢節攣
痛或麻木不仁
小續命八兩　羌活四兩　連翹六兩
右古之續命混淆無經今立分經治療又分各經針刺別無不愈者
治之法[illegible]大抵刺以通其經少陽之經絕骨厥陰之經以引其熱此通
經引熱是與灸同象治法之大體也

桂附續命湯　治中風有汗無熱
甘草　桂枝　附子
依本方加一倍宜針太谿此一證少陰經中風也

續命湯[illegible]治中風入臟四肢不能言語昏昧不知痛處或
筋脈拘急中外疼痛不得轉側[illegible]

大通聖金丹[illegible]治中風
金箔　丹砂　雄黃
胡粉　紫石英　鉛霜　水銀
曾青

素問病機氣宜保命集卷中　十三

[illegible]
右取[illegible]兩[illegible]用火[illegible]泥固[illegible]下金[illegible]
十斤炭下火子同研[illegible]
五味[illegible]
子只[illegible]
方大通水銀丸同用[illegible]
如梧桐子大凡中風[illegible]
犀角[illegible]
[illegible]治中風[illegible]
[illegible]
烏梅[illegible]
地骨皮　人參　麥門冬
若[illegible]
小許[illegible]
服後[illegible]下

治中風肢體[illegible]精氣[illegible]

麻黃[illegible] 天麻[illegible] 防風[illegible] 石膏[illegible]

右為細末每服五錢以水一盞半煎至一分去滓溫服如人行五里再服用熱生薑稀粥投手出汗為度[illegible]

乾薑[illegible] 木香[illegible] 白茯苓[illegible] 連翹子 木通

青皮[illegible] 陳皮[illegible] 紅豆蔻[illegible] 牽牛頭末[illegible]

生犀角[illegible]

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸食後[illegible]

益生薑[illegible]

乳香[illegible]丸 治風癱[illegible]不遂手足[illegible]

[illegible]

治肢體手足[illegible]不能舉步[illegible]

乳香 川烏 沒藥 五靈脂 白膠香

地龍 白僵蠶 半夏 五加皮 赤小豆

右為末[illegible]如梧桐子大[illegible]

[illegible]治中風[illegible]

神仙[illegible] 治風一切[illegible]

麻黃[illegible] 人參 白朮 乾薑[illegible]

茯苓 附子[illegible] 白膠香[illegible]

全蠍[illegible]

右件為細末[illegible]

末和丸如彈子大每服一丸溫酒下日三服

除濕[illegible]

[illegible]小便不利[illegible]

桑白皮 白茯苓 蒼朮[illegible] 藿香葉[illegible] 甘草炙

橘紅 厚朴[illegible] 半夏[illegible] 附子[illegible] 生薑[illegible]

右[illegible]每服三錢[illegible]

[illegible]治中風[illegible]

麻黃[illegible] 石膏[illegible]

人參[illegible] 防風[illegible]

乾薑[illegible] 桂心[illegible]

半夏[illegible]

右[illegible]每服[illegible]

[illegible]丸 治中風

水銀[illegible] 朱砂[illegible]

硫黃[illegible]

右[illegible]

附子[illegible]

[illegible]

服藥效人者

青金丹 治中風不省痰涎壅塞牙關緊咽喉如拽鋸聲 [illegible] 三兩
丸或吐或利量虛實加減丸
膩粉 粉霜各一 滑石 水銀 半夏
雄黃 青黛 [illegible] 腦子
麝香 [illegible]
右為末同研令勻水丸如梧子大每服三兩丸煎生薑白湯下或溫酒
為化亦得
大聖散 [illegible] 治中風 [illegible] 不語手足顫曳 [illegible] 中風中腑也
並風中於臟口眼喎斜風中於經 [illegible] 中臟則性命危凡風中於腑病淺者
胃弱 [illegible] 不甚 [illegible] 汗而痊 [illegible]
天南星 半夏 黑附子 白附子 川烏
[illegible] 人參 白茯苓 [illegible] 川芎
右㕮咀每服一錢水一盞煎至七分去滓服 [illegible]
本書一七片煎
防風湯 [illegible] 治 [illegible]
水鍊丸 [illegible] 治中風 [illegible] 口眼喎斜 [illegible] 手足 [illegible]
水銀 [illegible] 茶末 [illegible] 青州棗 [illegible]
右將棗肉先同水銀研令星盡 [illegible] 後入腦麝 [illegible] 丸如
皂子大每服一丸 [illegible]
防風湯 [illegible] 治中風內虛腳弱語澀
石斛 乾地黃 杜仲 丹參 [illegible] 防風
川芎 麥門冬 桂心 川獨活
右為粗末每服五錢水一大盞棗二枚同煎八分去滓溫服
金白丸 [illegible] 治中風語澀 [illegible] 頭目 [illegible] 口眼 [illegible]
清陽 [illegible] 涎 [illegible] 風痰 [illegible]
天南星 半夏 白附子 雄黃
[illegible] 人參 [illegible]
右為末 [illegible] 丸 [illegible]
茯苓湯 [illegible]

經驗 [illegible] 中風 [illegible] 不省 [illegible] 或 [illegible] 風氣在內
令 [illegible] 千五 [illegible] 病
茯苓 芎藭 乾薑 芍藥 白朮
當歸 人參 桂心 甘草
右細切以水七升煮取三升 [illegible] 人行五里頃一服
[illegible] 不差 [illegible]
排風湯 [illegible]
牛黃丸 [illegible] 治中風 [illegible] 不省人事口眼喎斜手足顫曳
[illegible]
牛黃 [illegible] 天南星 [illegible] 天雄 [illegible]
白附子 [illegible] 天麻 [illegible] 羌活 [illegible]
烏蛇 [illegible]
右除 [illegible] 研 [illegible] 丸如雞頭大每服一丸或二丸
[illegible] 不計時候
羌活湯 [illegible] 治中風身體疼痛四肢 [illegible] 不遂
羌活 [illegible] 葛根 [illegible] 甘草 [illegible] 乾地黃 [illegible]
桂 [illegible] 芍藥 [illegible] 麻黃 [illegible] 黃芩 [illegible]
右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後良久溫服
服汎 [illegible] 覆取微汗為度
[illegible] 丸 [illegible] 治中風 [illegible] 口眼 [illegible] 手足不遂 [illegible]
是一切風疾並宜服之
雄黃 [illegible] 朱砂 [illegible] 龍腦 [illegible] 麝香 [illegible] 白附子
天南星 [illegible] 白殭蠶 [illegible] 烏蛇 [illegible]
右除 [illegible] 丸如梧桐子大如中風 [illegible] 牙關不開 [illegible]
大蒜 [illegible] 用豆淋酒化下 [illegible]
[illegible] 丸如 [illegible] 風 [illegible] 牙緊 [illegible] 用豆淋
酒化 [illegible] 頭目眩暈 [illegible]
丸用 [illegible]
八味順氣散 [illegible] 中風 [illegible] 服此 [illegible] 者 [illegible] 其宜
白朮 白茯苓 [illegible] 青皮 [illegible] 白芷 陳皮 [illegible]

人參一兩 甘草半兩 天台烏藥一兩

右爲細末每服三錢水一大盞煎至七分溫服不拘時候可加生薑

木香以酒化蘇合香丸兼服蘇沈良方謂蘇合香丸祇宜

人參烏藥[illegible]則白朮[illegible]如古方用[illegible]多不効[illegible]調[illegible]之[illegible]有不

酒者古方未嘗服有風之人亦宜服此又進爲風藥

舒風散子

羌活三兩 桂心半兩 人參二兩 川芎 茯神

防風 生薑 生犀角

右切以水一大升煮取二升合分爲三服如熱下竹瀝一盞忌生葱

七寶丸 治中風不計緩急及瘈瘲不知人者

丹砂 牛黃 金箔 水銀 龍腦 膩粉

麝香

右再同研令水銀星盡用蒸棗肉丸如梧桐子大病輕者每服十丸

重者二十丸溫水化破服利下延須服此藥[illegible]日後時服慢治

風引湯○治中風及驚癇不下[illegible]精神昏憒不省人事者用[illegible]

經齋半夏丸 治五臟內虛中風昏冒涎潮壅塞

雄黃 丹砂 膩粉 麝香

半夏 牛黃 天竺黃

右研極細用生薑自然汁調麪和丸如梧桐子大每服一粒食後薄荷湯下

薑湯下如要吐風涎空心服二粒甚妙

綠粉丸 治中風痰涎不得精神昏塞不省人事

水銀 安中 牛黃 麝香

輕粉 天南星 白附子

右除先研外爲細末後同研令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服半丸至一丸荊芥

湯化下如大便不利薄荷湯調膩粉一錢匕下少頃服[illegible]

如豆大一二丸

扶危[illegible]湯 治[illegible]中風[illegible]手足不遂口眼喎斜

筋脈攣急半身不舉不省人事

川烏 草烏 地龍 五靈脂 南星

[illegible]子 射干

右[illegible]爲末[illegible]

先[illegible]日午夜臥[illegible]服二十丸必[illegible]如中風不[illegible]

口服[illegible]服二三丸

紅龍散 治一切中風[illegible]

朱砂 五靈脂 金箔 茯神 草[illegible]

膩子 麝香

右爲細末每服二錢溫酒調下[illegible]

十三味至聖散 治風中氣中

陳皮 厚朴 半夏 藿香 甘草

人參 茯苓 白朮 石菖蒲 木香

遠志 薏苡仁

右除人參外銼爲粗末每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎

八分服

[illegible]丸 治一切風涎[illegible]至昏迷若心風只服此方

辰砂

龍腦 膩粉 白附子

半夏 天南星

右研勻麪糊丸如菉豆大研[illegible]爲衣每服十五丸同膩粉牛黃

[illegible]散 治中風不省人事口噤痰涎[illegible]

及卒中風涎即吐[illegible]

[illegible] 石菖蒲 合精草 東平薄荷

芎藭 藿香 細辛

右爲細末[illegible]

[illegible]

三丈[illegible]

分疎散 治中風[illegible]

[illegible]人湯

[illegible] 麥門冬

右粗擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分切煎至八分去滓入竹瀝一合再煎一二沸服食後日午夜卧各一服

附子湯 治中風手足不仁口面喎斜昏冒失音眼目瞤動牙車緊急不得轉動

附子 [illegible] 桂心 [illegible] 細辛 [illegible] 防風 [illegible] 人參

乾薑 [illegible]

右剉如麻豆每服四錢水一盞半生薑五片棗一枚煎七分去滓食前服或為末用調二錢服亦可

青龍湯 治中風發三春秋冬夏不分短長可療

甘草 [illegible] 麻黃 [illegible] 桂心 [illegible] 大棗 [illegible] 生薑

芍藥 [illegible]

右㕮咀以水六升煮取二升半分為再服初服覆取汗後即止忌海藻菘菜生葱等物

三陽湯 治中風發二夏秋及冬忌夏不分 [illegible]

當歸 [illegible] 生薑 [illegible] 甘草 [illegible] 麻黃 [illegible] 杏人 [illegible]

石膏 [illegible]

右㕮咀以水八升煮取三升分再服忌海藻菘菜等物

扶金湯 治中風發三秋脉弦大而洪長

葛根 [illegible] 獨活 [illegible] 附子 [illegible] 石膏 [illegible]

右㕮咀以水八升煮取三升服九合日三夜一忌豬肉冷水等物

[illegible]湯 治中風發三冬脉浮大者

芎藭 [illegible] 石膏 [illegible] 甘草 [illegible] 黃芩 [illegible] 杏人 [illegible]

麻黃 [illegible] [illegible] 防風 [illegible] 桂心 [illegible]

右㕮咀以水八升煮取三升分二服忌海藻菘菜生葱等物

五虎湯 治中風牙噤目睛上視牙關緊急延痰昏塞不省人事

[illegible] [illegible] [illegible]

右㕮咀每服 [illegible]

[illegible]

強不語痰涎壅盛精神昏憒手足偏廢不能舉運等證候不問攻及此可服之

天雄 [illegible] 附子 [illegible] 川烏 [illegible] 木香 [illegible] 沉香 [illegible]

右㕮咀每服四錢水二盞生薑十片煎至七分去滓服空心食前

勝金丸 治風中忽然昏倒 [illegible] 不以 [illegible] 於上

踈氣開 [illegible] 不通

生薑 [illegible] 藿香 [illegible] 末砂 [illegible] 豬牙皂角 [illegible] 人參 [illegible]

右將硃砂半兩與二味末研匀 [illegible]

[illegible]

論中風 [illegible]

開緊急氣閉不行 [illegible]

不省 [illegible]

荊瀝湯 治初得中風四肢不收心神昏憒眼不識人不能言語失服

荊瀝 竹瀝 生葛汁 [illegible] 生薑汁 [illegible]

右和匀 [illegible] 每服 [illegible]

一服服訖 [illegible] 次更服後防風湯

次服防風湯

防風 [illegible] 麻黃 [illegible] 杏人 [illegible]

芎藭 [illegible] 防己 [illegible] 人參 [illegible] 甘草 [illegible]

芍藥 [illegible] 黃芩 [illegible] 桂 [illegible] 石膏 [illegible] 附子 [illegible]

羚羊角 [illegible]

右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑半分切煎至八分去滓更入竹瀝 [illegible] 服日二夜一 [illegible]

次服防己竹瀝湯

防己 [illegible] 防風 [illegible] 升麻 麻黃 [illegible]

桂 [illegible] 芎藭 [illegible] 羚羊角 [illegible]

右 [illegible] 每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓更入竹瀝一合 [illegible]

偏風內方

煎三五沸溫服日二夜一手足逆冷加生薑三兩白朮二兩風若未除
更服後防風獨活湯

次服防風獨活湯

防風 獨活 秦艽 黃耆 芍藥
人參 茯神 白朮 芎藭 山茱萸
薯蕷 天門冬 桂心 羚羊角 升麻
麥門冬 甘草 丹參 五加皮
石斛 地骨皮 遠志
陳橘皮 附子 麻黃
甘菊花 石膏 薏苡人 熟乾地黃
牛膝

右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑半分切煎至八分去滓空心日午夜臥各溫一服

瀝湯 防風湯

也良方治偏風偏枯者加防己二兩可再服本類

荊瀝湯

小竹瀝湯 治中風涎潮謇語昏塞四肢緩縱不收
秦艽 防風 附子 獨活
右以水煎生地黃汁竹瀝合煎三五沸去滓分四服不拘時熱服病去以他藥扶持未知再作

羌活湯 治中風腰脊心風手或身體不仁身體疼煩劇掣痛不可屈伸或身癱瘓
羌活 附子 白朮 甘草
右等分每服四錢水一盞生薑五片煎至七分去滓溫服不拘時

睢附湯 治中風涎潮牙關緊急不省人事
附子 天雄 南星
右㕮咀每服五錢水一盞生薑七片煎至七分不拘時

三化湯 治中風外有六經之形證先以加減續命湯隨證治之內有便溺之阻隔復以三化湯導之
厚朴 大黃 枳實 羌活

右剉如麻豆大每服三兩水三升煎至一升半於日服之以微利為度無時
去三四肢不舉俗曰癱瘓故經所謂太過則令人四肢不舉又曰土太過則敦阜高也敦厚也既厚而又高則令除去此真所謂膏粱之疾非肝腎經虛何以明之經所謂三陽三陰發病為偏枯痿易四肢不舉王注曰三陰不足則發偏枯三陽有餘則為痿易二為痿易者用而痿弱無力也其治則瀉令氣弱陽衰土平而愈或三化湯調胃承氣湯選而用之若脾虛則不用也經所謂土不及則卑陷卑下也陷坑也故脾病四肢不用四肢皆稟氣於胃而不能至經必因於脾乃得稟也今脾不能與胃行其津液四肢不得稟水穀氣日以衰脈道不利筋骨肌肉皆無以氣以生故不用焉其治可補十全散加減四物去邪留正

桂枝湯 治中風身體煩疼惡寒而自汗出頭強痛急
桂心 生薑 甘草 葛根 芍藥
大棗
右切以水七升煮取三升半服八合日三溫服取汗忌生葱海藻菘菜

秦艽散 治中風汗出不止
秦艽 白朮 桂枝 附子 石斛
右為散每服三錢匕空腹溫酒調下日

葛根湯 治中風困欲洄湯而不能言語手足不隨精神恍惚得病一兩日服
生葛根 竹瀝 生薑汁
右先取生葛根洗剉去皮搗研壓取汁每搗以竹瀝沃搗壓取汁盡為度稱量汁和勻同用五沸不拘時候食前溫服如覺氣即後且服如此服七日後可服九味附子湯

治中風面目相引口偏著耳牙車急舌不得轉方
獨活 竹瀝 生地黃汁
右合煎取一升頓服之即愈

大豆紫湯 治中風頭眩惡風自汗吐冷水及產後百病或中風痱痙背強口噤直視煩熱

治

木香羌活散 治中風頭目昏痛心悶氣逆膈帶調順
榮衛進飲食
青木香 藁本各三分 羌活 川芎 人參
白朮 已上 薏苡仁 大腹皮各二 枳殼 白茯苓
荊芥穗各半兩
右為末每服三錢匕水一盞生姜二片同煎至七分去滓稍熱服
省風保膽中切痛
星附湯 治因虛中風痰延壅塞不省人事脈沉伏脈沉無
附子 南星 各一兩 木香 半兩
右㕮咀每服四錢水一盞半生姜九片煎至七分去滓溫服不以時
無寒者加熟附〇風引手足厥冷者加川烏名三生飲〇弱甚者
加天雄名三建湯〇痰延壅塞者加攢錢硃砂藥不下宜灸關元丹田
二穴灸之〇氣虛正人事稍甦痰下卻用南星八錢木香二錢名
星香湯〇或兼用小續命湯看證時量輕重
解毒雄黃丸 治中風卒然倒仆牙關緊急不省人事
并解上膈壅熱痰涎咽喉腫閉一應毒
夢仙備成丹 治卒急中風痲痺口眼喎斜語言不正不省人事一切
風證 川烏 五靈脂 麝香
右研為末糊和丸如彈子大每一丸服藥先以薄荷七
葉同煎七分去滓細嚼藥一粒
臨臥服
治手足搐搦語言謇澀行履不正
大川烏 沒藥 五靈脂 五兩
右入麝香不拘多少研細拌和為末丸如彈子大每服一丸生姜汁研
化和酒量力服之
三建湯 治中風風延不省人事
天雄 烏頭
右每服一兩生姜一兩水一大盞煎至一盞去滓溫服
人參訶子散 治中風痰延不省人事

8

8

人參 訶子 甘草
右件各等分為細末每服二錢白湯點服 中風痰壅不省人
事急投此藥即醒
桂枝湯 治中風手出汗
桂 甘草
右切以水五升煮取一升半分三服一方用生姜二五兩忌生葱海藻
菘菜
三生飲 治卒中昏不知人口眼喎斜半身不遂咽喉作聲痰氣上
壅無問外感風寒內傷喜怒或六脈沉伏或指下浮盛並宜服之兼治
痰厥飲厥及氣虛眩暈悉有神效但口噤手散眼合遺尿聲如鼾
睡者難治
烏龍丸 治中風破傷風癱瘓
吐痰白礬散 治初中風失音不語昏冒不知人先宜吐風痰令
省覺次可服諸湯散
白礬 生姜
右先細研白礬為末入生姜湯調灌服後痰從咽中吐出
每服前須避風可救治急氣衰力弱不宜用猛性藥吐之致吐得痰
毒潤[illegible]痰勢
救延丸 治中風病不語喉中如拽鋸口中涎出
皂莢 天南星
右為末用糊丸如梧桐子大每服三丸
治中風涎伏在胸上
藜蘆 人參
右為細末每服半錢溫茶清調下吐出風涎為效
稀延神搐散 治中風不省人事涎潮口噤語言不出手足
病之日便進此藥可使風退氣和不成廢人
之得力
梔葉 芎藭
右研水一升同煎一二十沸去滓溫服不拘時如不飲

每貼分作四五服水盞半方進他藥

三聖散 治中風

雄黑豆半升 皂角針半斤

右用無灰酒二升同煎至半升去柤服 江南度

薑附湯 治中風口噤四肢強直失音不語或卒然暈倒口吐涎沫狀如暗風手足或冷或復煩燥兼治陰證傷寒大便自利而發熱者及中寒重者又續灰水心腹冷痛霍亂轉筋四肢厥逆

乾薑 熟附子各二兩

右㕮咀每服四錢水二盞煎至六分去滓溫服若其人未蘇則先用三生飲方出治法次方服此藥虛者以大附子理中湯相繼服無薑附湯本治傷寒經下之後又復發汗內外俱虛身無大熱晝日煩燥夜則安靜不嘔不渴六脉沉微方出附子生用名白通湯治傷寒發熱大便自利〇一方用白通湯倍加白朮甘草減半名生附白朮湯治中風濕昏悶恍惚腹痛身重手足緩弱自汗失音不語便利不禁〇一方用姜附湯加麻黃白朮甘草人參等分名附子麻黃

湯治中寒擁昏暈緩弱腰背強急口噤戰掉語聲混濁心腹脹氣上喘急不能動彈已上證候各宜服審用之 澹寮方云千金方治卒中風痰壅塞生姜八兩附子一兩生並用生者同 陳氏三因方用等分炮熟姜附 王氏因之俱就姜爲生姜附子用熟者既知其未顯當從古方可也乃持兩端以書試未爲切當其云治中寒口噤無證傷宜知 陰證傷寒下利不止手足逆冷小便及利汗出甚多發熱欲絕此將脫之證兼服炮姜炮附更未爲甚令中寒人事倒口吐痰涎而盡服熱附烏知寒邪不因補而盛耶當先以生姜附之或未効徐投以半生半熟者人或盧甚後以熟姜附未晩也是雖陳氏不審之故而王氏不能發明之安得不任其咎

木香湯 治丈夫婦人中風氣厥其疾作之初切不可以治風猛烈之藥與服若大段有涎即略與不須叢者下涎藥方定如手足疲弱不遂即便與此藥服 方見氣類

蘇青丸 和氣血散風痰亦可常服

右以蘇合香丸與青州白丸子打和薑蘇湯化下

桂心方 出千金良方 治中風雖語牽動舌口噤言不正

用官桂一兩碾爲細末每用半兩以好酒一盞煎五七沸灌之成膏全向不喎處欠用紙或軟帛子貼蓋之仍斬元一斤火上炙換煖令熱熨貼藥上候勝處口正便去藥用乃溫法之如左喎貼右右喎貼左〇一方以酒煮汁服繞病上〇一方治舌強不語以桂末着舌下咽汁慢慢嚥汁亦可於去涎湯〇一方治風失音用水煎服之覆取汗亦可

旋覆丸 治中風不省人事涎潮口噤語言不出手足軃曳得病之日便進此藥可使風退氣和不成廢人卒有此證無藥去處用之得效又治中風及宣

用旋覆花即金沸草淨洗焙乾末煉蜜丸如梧桐子大夜臥茶湯下五七丸至十丸

治風涎暴作氣塞倒仆

用瓜蒂約半寸許曝令乾不限多少爲細末量疾每用一二錢匕膩粉一錢匕以水半合同調勻灌之良久涎自出或覺有涎用諸藥行化不下但如此服涎即出或服藥良久涎未出含沙糖一塊下嚥即涎出此物甚不損人

治中風不省人事牙關緊急者

用藜蘆一兩去蘆頭濃煎防風湯浴過焙乾碎切炒微褐色爲末每服半錢溫水調下以吐出涎爲效如人行三里未吐再服

治中風心肺風熱手足不遂及風痹不仁筋脉三緩恍惚煩躁

用熊肉一斤切如常法調和作腌臘空腹服之

治筋脈急強中風 方見本州中風有熱

治中風

取杏人去皮熬令赤和桂末研如泥綿裹如指大含之

治風方 治項強身中急痛者

取活鼠破其腹去五臟就熱傅之即可〇一方治卒中風腰脊反張牙關口噤四肢強直用鼠一頭和尾燒灰爲末以臘月豬脂傅之

又方 療兒風疾數年不効者 朱真人治風坑場 野人閑話 朱真人靈驗篇云有病者患風疾數年不較 風科集驗方

掘坑令患者解衣坐於坑內逡以熱湯上淋之良久復以簟蓋之

救急散 治中風救氣麻痺風疾

龜下腋慶 以酥炙炒為細末 每下二錢 用釣藤和豆淋酒服之 一方治中風手足骸搐掣 為末以飯為丸 每服二十丸 溫酒下

治中風立有奇效 出聖惠方

附子天麻一斤 去皮臍 以生絹袋盛 好酒一斗 浸之 春夏一七日 秋冬二七日 每空心午初夜各溫飲一盞 老幼臨時加減 若常服 日只每朝一盞

破棺散 出... 治中風牙已緊 以此藥...

治三十六種風 出...

到聖湯 出... 治中風虛熱 狂言恍惚驚悸

牛黃 人參 麥門冬 去心 升麻

鐵精 龍齒 茯苓 天門冬 去心 梔子仁 各二兩

右除牛黃鐵精外 餘並為末 每服五錢 水二盞 入竹瀝 各壹合 煎一盞 去滓 入牛黃鐵精各一字匕 再煎一兩沸 溫服

醫方類聚卷之二十四 二二七

鎮青丸 出... 治中風 自汗昏冒 發熱不惡寒 不能安臥 此是風熱煩燥

當歸 川芎 梔子 羌活

大黃 防風 各等分

右為細末 煉蜜為丸 如彈子大 每服一丸 竹葉湯下

五珍丹 出... 治男婦人中風 足輒不語 牙關緊急 半身不遂 口眼喎斜

天南星 炮 白殭蠶 炒 川烏頭 炮 半夏

全蝎 已上五味各一兩

右件為細末 醋煮麵糊為丸 每一兩作一十五丸 每服一丸 用生薑自然汁化下 不拘時候

川芎散 出... 治中風中氣 先服此藥

川芎 人參 枳殼 各一兩 沈香 香附子 各三錢

木香 一兩

右為細末 每服三錢 以沸湯入鹽點服之

治中風手足偏痺 頭痛急 腳膝疼痛 不能行步 ...奇方

牛膝 川當歸 防風 芍藥 五加皮

生薑 羌活 川芎 桂心 甘草

薏苡人

右剉為末 分作七貼 每一貼水一斗 棗十三枚 同煎至六合 無時服

大有風湯

附子 吳茱萸 一兩 天南星 防風

藿香 一分

右為散 每服三錢 生薑五片 煎 去滓 常服 以防天陰雨作

來蘇丸 治中風 延停留肩上 令吐

生薑 皂角

右件三味 研勻 用... 膏子和丸 雞頭大 每服二七 溫酒吞下 口噤者用物幹開口 灌之 得藥下 直吐為佳

治中風

醫方類聚卷之二十四 二二八

夫中風者 五臟俱虛 乃得是病 ...者不治其本 先以去風藥加減

命調風之散 ... 見手前實急 便下重實 至實 朱砂 牛黃之為 以稍為上 是無 不可 ... 子此不復得為全人矣 ... 續命排風湯

中有右人病 實之 ... 若設 ... 而虛 必為 左癱右瘓之人 ... 真氣

來虛 ... 脉 ... 也 大凡治風之藥 往往性涼 ... 宜 ... 服

為實者 ... 脉 ... 是中風之候 亦有 ... 中風者 宜先服生附

子湯 ... 三十 ... 煎得 ... 不作口眼歸正 能辨人事 ... 以木附子香

即不 ... 開 ... 六味 ... 月 餘 ... 補正氣血脉 自 ... 風

...風 ... 命排風以 ... 之以此教 ... 百 ... 一失中 ... 不難

內外 ... 在 ... 者 ... 其始耳 或初得疾 便 ... 亦須 ... 開

氣化 ... 未宜 ... 用太熱之藥 更在詳 ... 之也 安 ... 宜為

若 ... 不能不食 ... 則必保 天年矣

六味 ... 散

白朮 ... 白茯苓 一兩 人參 一兩 陳皮 二兩

青皮 二兩 甘草

右為細末 每服三大錢 水一盞半 棗一箇 薑二片 煎七分 溫服 日

二四服
羌桂湯 治中風手足一切風痺功倍桂枝湯
川羌活三兩 桂枝二兩 芍藥一兩 甘草一兩半
右為麤散每服四錢水一盞半生姜五片棗二枚同煎七分去滓溫
服日三服不拘時候
治男子婦人諸中風手足 手口推動摩吻服兩科全安方見本門諸風雜治
犀角升麻湯 出三因方 治中風麻痺不仁鼻額間痛唇口頰車髮際皆痛不可開口雖言語飲食亦相妨左額頰上如糊急手觸之則痛此乃足陽明經受風毒血凝滯而不行故也
犀角一兩二錢半 升麻一兩 防風 羌活各七錢半 川芎
白附子 白芷 黃芩各半兩 甘草二錢半
右為細末每服五錢水二盞煎至一盞去滓通服食後日三服足陽明胃也經云腸胃為市故無所不有也六經之中血氣俱多腐熟飲食故飲食之毒聚於腸胃故此方以犀角為主解飲食之毒也陽明經絡環唇挾口起於鼻交頞中循頰車上耳前過客主人循髮際至額顱故王公所患正一經絡也以升麻佐之餘藥皆涂除風散壅為使也
普濟方卷九十三 九
稀涎散 出拾遺方 治風涎不下喉中作聲狀如牽鋸
半夏大者十四枚 豬牙皂角一挺炙
右作一服水二盞煎一盞去滓入姜汁少許溫服不能嚥徐徐灌之
壽命通關散 治中風涎上有人事
蓽撥花 川芎 蓽澄茄 細辛 龍腦薄荷
右為末每一分日日乾嚥為末用少許以筆管吹入鼻中如噴嚏乃可救患得生治子一錢須重一兩以上者去皮薄切入藥則切連皮老生姜十片水一碗半同煎至半碗通口灌嚥
小續命湯 出本事方 治本草序例云有男子年六十腳腫生瘡因食肉不安醫利得愈時出外中風手足冷頭面累腫紫黑色多痛耳輪上有浮胞小瘡黃汁出乃與小續命湯倍加乳香服之而愈
中風氣逆有痰逆 蘇合香丸調以下咽次用有風小續命多增木香附

香前以往往中風之證多因喜怒不常或飲食不節或思慮傷神思慮過多損於心臟用前方蘇合香丸三丸生姜自然汁化開灌下咽喉次用前方首風湯小續命湯各加麝香木香依去前服一方無麝香
附子酒 出聖惠方 治中冷痰麻脹滿諸痺
大附子一枚炮去皮臍
右用醇酒一斗春夏五日夏三日秋冬七日每服一合日三服以痺住為效未知再作
省風湯 治凡中風一時諸證並作定則為省風湯合蘇合香丸之間藥不可不有多用蘇合香丸擦起牙關或吹鼻生半夏皂角末吹鼻收其痰或服真香油調麝香灌以吐其痰又或用麝香煎五積散合之兼行藥備或不然殆至風氣日增不得安愈
凡中風人湯食不下不能者藥亦不下不開則用黑豆二三升炒青煙出…
豨薟丸 出成訥進表 治中風口眼喎斜時吐涎沫語言謇澀手足緩弱
普濟方卷九十三 四十
豨薟草
右江陵府節度使成訥進豨薟丸方臣有弟訮年三十中風床枕五年百醫不差有道人鍾針者因覩此患曰可餌豨薟丸必愈其藥多生沃壤高三尺許節葉相對其葉當夏五月已來收每去地五寸剪刈以溫水洗泥土摘其葉及枝頭凡九蒸九暴不必太燥但取蒸為度仍熬搗為末丸如梧桐子大空心溫酒或米飲下二三十丸服至二千丸所患忽加不得憂慮是藥攻之力服至四千丸必得復故五千丸當復丁壯臣依法修合與訮服果如其言鍾針又言此藥與本草所述功效相異蓋出處盛在江東彼土人呼豬為豨呼臭為薟氣以為名但經蒸暴茶香氣自然每當服後須…
三五典藥之五月五日採者佳奉宣付醫院詳錄
治男子女人中風 出本草
以羊乳和蠟作羹食之
治中風急候痺欲死者 出本草
用白殭蠶以火焙乾令黃色搗篩為末用生姜自然汁調灌之

治中風面目相引偏僻牙車急舌不可轉
用桂心以酒煮取汁故布蘸搨病上正即止左喎搨右右喎搨左常
用大效
蓖麻草 治中風
用蓖麻草根葉生搗為丸服之
治三十年風不治者
以松葉一斤細切之以酒一斗煮取三升頓服取汗出即差
療卒暴中風
用荊芥細生薑取時漏風以竹刀截前刀刮去皮用生布絞
取汁一大升和均熟煖審四大合溫分為兩服每服相去五六里初
服得汗汗出便差此方得之岳州中丞鄭頋得暴風服食一頓
熱酒便中暴風外生書人為相識此方當時便服得汗隨差
治頓食暴忄人多患風者
須飲酒食肥將息及服藥可以學其壽
又方
用紅藍子一升搗碎以無灰酒一大升八合拌了暴令乾重搗篩蜜
丸如桐子大空腹酒下四十丸
治中風痰塞咽喉不通便須吐涎然後次第治之
用皂莢五大挺以水一大斗煎取五升去滓更入好酒半升和之以
生薑汁半升下前金磁鍋以煎為丸對服取吐如已吐合服陶
蒲之更不可用下藥及鍼灸但取用補治湯自差
第八十味散 治中風如發即合服之
附子 當歸 桔梗 獨活 白朮 白芍藥 川芎 防風 肉桂 茯苓
熟地黃
右㕮咀每服四錢水一盞薑八片棗三枚煎食後臨卧服
治中風八頰脫口嚙或服中當滿成時已而復起者
取釜下土五升搗末以冷水八升和之取汁盡服之口已噤可以物強開
以筒灌之使得下入便愈甚效

神力圓 治中風足失力麻痺嘑叫打撲風血破滯走疰作痛反痓
眼等疾
乳香 沒藥 當歸 草烏
木香 蒼朮 五靈脂
右為末用酒糊丸如梧桐子大食後臨卧用溫酒下五七丸
加至七八丸服藥後避風物少時出于家常用甚效
治中風頭痛四肢拘急煩壅或時欲入事者宜服之
右麻黃三兩為末每服五錢水一盞煎至六分去滓不拘時
服溫服
治中風傷寒頭痛
用蒼耳根莖生搗和酒絞取汁溫服 日三服甚驗
治中風面目牽引口喎不遍
用皂角作末和醋作餅敷之良
治小風中
用鯉魚不以多少細切如鱠和以鷄頭大每覺中者便用薑汁
酒送下一圓良久便吐甚效如醒令人以手撩之候吐涎神効
治中風頭痛心胸壅熱手足無力筋骨煩疼言語似澁一身動搖
用烏雞頭一枚燒灰如法藥令極熱細切更以豉汁內著五味調
點少麻食之効

肝中風 附論

內經謂以春甲乙中風為肝風蓋體虛之人腠理開疏肝氣不足風邪
所傷筋脈拘攣手足不收言語蹇澁頭背強直身汗惡風善悲嗌乾善
怒時憎女子者有頭目瞤兩脅痛行常傴僂嗜甘如阻婦狀者有但踞
坐不得低頭繞兩目連額上色微有青唇青面黃者合灸肝俞百壯
若大青黑面一黃一白者此為肝已傷不可復治數日而
死矣

方

龍腦丸 治肝臟中風口眼不正四肢拘急手語蹇澁昏沉
龍腦研入 犀角屑 羌活 防風 麻黃

漢防已半两 天雄半两炮裂去皮臍 萆薢半两 甘菊花半两
赤箭一两 獨活半两 白殭蚕半两微炒 桂心半两 芎藭半两
當歸半两剉微炒 羚羊角屑半两 鹿角膠半两搗碎炒令黃燥
烏蛇二两酒浸去皮骨炙令微黃 乾蝎半两微炒 牛黃一分細研
朱砂一分細研 麝香一分細研
右為末入研了藥令勻煉蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每服
十丸以溫荊芥湯下不計時候

牛黃散 治肝臟中風筋脈攣急口眼喎斜精神昏憒

牛黃細研 龍腦細研 羚羊角屑半两 天麻半两
防風半两去蘆頭 麻黃 羚羊角屑半两 細辛半两 甘菊花半两
荊芥半两 桑螵蛸微炒 桂心半两 附子半两炮裂去皮臍
獨活半两 白殭蚕微炒 烏蛇二两酒浸 乾蝎微炒
阿膠 蟬殼 朱砂一分 麝香一分
右為末入研了藥更研令勻每服一錢以豆淋酒調下不計時服

赤箭丸 治肝臟中風攻手足軟弱口眼喎斜精神不定行步艱難

麻黃半两 天雄半两炮裂去皮臍 犀角屑半两 天南星半两炮裂
白花蛇酒浸炙 防風半两去蘆頭 芎藭半两
白附子炮 川烏頭 白朮半两 白殭蚕微炒 桑螵蛸微炒
當歸 細辛半两 乾蝎半两微炒 牛黃一分細研
朱砂一分細研 麝香一分細研 龍腦一分細研
右為末入研了藥令勻煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服
不計時以豆淋酒下二十丸忌動風猪肉羊血毒魚等

天麻丸 治肝臟中風筋脈不利四肢麻痺

天麻二两 沙參三两 萆薢二两 細辛 赤箭二两
地榆一两 人參三两 牛膝 桂心
防風 當歸 附子 芎藭一两
木香一两 赤芍藥二两 陳橘皮 乾蝎
獨活一两 藁本 威靈仙 酸棗人二两
右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下日二服不計

時候

羚羊角散 治肝中風筋脈拘急舌強語澀頭項強直四肢不利心膈煩熱頭目旋眩

羚羊角屑 防風 前胡 犀角屑 麻黃
人參 旋覆花 芎藭 赤芍藥 桂心
羌活 當歸 漢防已 赤茯苓
黃芩 荊芥 甘菊花 甘草 酸棗人
右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓入竹瀝一合
更煎一二沸不計時溫服

羌活散 治肝中風筋脈拘急口眼偏斜四肢疼痛

羌活三分 天麻三分 芎藭 酸棗人 鹿角膠
荊芥三分 羚羊角屑三分 人參
白附子三分 牛膝 肉桂 薏苡人 烏蛇肉
萆薢三分 犀角屑三分 白鮮皮三分 地骨皮 柏子人
防風三分
右為末每服不計時以豆淋酒調下一錢禁雞猪魚蒜等

附子散 治肝中風上攻頭目昏運心驚悸胸膈煩急

附子 酸棗人 防風 羚羊角屑
人參 桂心 羌活 甘菊花 蔓荊子
白鮮皮 茯神三分 黃芩 龍齒一两
芎藭 天麻 黃耆 枳殼
右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計時溫服

桂枝酒 治肝虛寒卒然喑啞不能語四肢不得屈伸面目青黑四肢緩弱遺失便利厲風所損方

桂枝 芎藭 獨活 牛膝 薯蕷
甘草 附子二两 防風 茯苓 天雄
茵芋 杜仲 蒴藋根 白朮 乾薑五两
大棗 猪椒葉皮各一升
右㕮咀以酒四斗漬七日每服四合日二加至五六合

羌活散 治肝臟中風頭旋拘攣疼痛眉排風

羌活 天麻二兩 當歸一兩 酸棗仁 人參一兩
桂枝 薏苡仁 麻黃 附子 羚羊角
犀角 芎藭 白朮 地骨皮
柏子仁 牛膝
右為散空腹豆淋酒調下一錢漸加至二錢日二夜一

羌活散 治肝臟中風手足少力脈拘急項背強痛
癱瘓口面喎斜頭目眩暈
羌活 桂心 白芷 芎藭
天麻 荊芥 藿香葉 羚羊角 黃芪
桂心 乾蝎 麻黃 附子
右為散每服二錢 不計時候

犀角散 治肝中風四肢拘攣項強面頰疼言語蹇澀風盛口
眼喎斜頭目無力
犀角屑一兩 羌活 羚羊角屑 人參
甘菊花 獨活 芎藭 白朮 黃芩

永樂大典卷 四五

石膏一兩 防己 防風 黃芩 天麻
枳殼 荊芥 當歸
右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

仁壽丸 治肝腎虛風筋脈攣動口眼喎斜腳膝無力緩弱
或有風手足拘攣常服補肝元行榮衛益氣血
桂心 白茯苓 杜仲 山茱萸
五味子 續斷 枸杞子 熟地黃 巴戟
防風 牛膝 兔絲子 附子
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三五十丸溫酒鹽湯空心食前任下
一方有白茯苓菖蒲一兩

犀角丸 治肝臟中風眼目拘急頭痛旋運
犀角 獨活 芎藭 羚羊角
防風 天麻 人參 乾蝎 丹砂
龍腦 麝香 白僵蠶 天南星
右除研三味外搗羅為末入研藥再研煉蜜和丸如梧桐子大每

服十五丸 荊芥茶下食後臨臥服

地黃酒 治肝風在肝臟筋脈拘攣大便多秘
附子 當芎 羌活 牛蒡根
防風 芎藭 石斛 丹參
天麻 杜仲 牛膝 桂枝
右細剉 以酒浸之 日空心

天雄丸 治肝中風 四肢無力 筋脈拘急
天雄 山茱萸 桂心 附子
獨活 山芋 乾薑 狗脊
乾蝎 防風
右為末 每服二錢 溫酒下 空心日午 臨臥三服

赤茯苓散 治肝臟中風氣 語澀 四肢拘急
赤茯苓一兩 麝香 人參 防風
羚羊角屑 羚羊 芎藭

永樂大典卷 四五

獨活 枳殼 甘草
右為散每服三錢水一中盞入竹瀝三七 煎至五分去滓入荊
瀝半合更煎一二沸不計時溫服

薏苡仁散 治肝中風四肢攣急身體強直
薏苡仁 防風 麻黃 附子
芎藭 桂心 獨活 酸棗仁 石膏
細辛 羚羊角 枳殼
右為末每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

石膏湯 治肝風中風筋脈拘攣手足不隨或緩或急
足
石膏 芎藭 芍藥 桂 黃芩
甘草 人參 當歸 防風 麻黃
杏人
右麄搗篩每服五錢匕水一盞半生薑半分拍碎煎至八分去滓服
空心午時 汗出 外風

白朮湯 治肝虛中風[illegible]
白朮 人參 [illegible] 羌活
百合 [illegible] 茯神 防風
黃芩
右細剉，每服五錢，水一盞半，[illegible]至八分，去滓，入[illegible]半合
煎，不拘時候温服。
秦艽散 治肝中風語言蹇澁，[illegible]行履不得
秦艽 茯神 [illegible] 羚羊角
木通 麥門冬 [illegible] 漢防己
酸棗人 甘草
右為末，每服三錢，水一中盞，生姜半分，煎至六分，去滓，不拘時候温服。
拘杞子散 治肝中風筋脈[illegible]
無力
拘杞子 薏苡人 牛膝 天麻 萆薢
茯神 羚羊角 芎藭 菌芋
防風 [illegible] 黃芪
右為散，每服三錢，水一中盞，生姜半分，煎至六分，去滓，不拘時候温服。
麥門冬散 治肝中風語言蹇澁四肢拘急
麥門冬 茯神 木通 羚羊角 川升麻
防風 獨活 黃芩 川朴硝 漢防己
甘草
右為末，每服三錢，水一中盞，煎至六分，去滓，入竹瀝半合，更煎一二沸，不拘時候温服。
推氣丸 治肝中風四肢攣急身體強直
推氣 續斷 桂 天南星 烏頭
羌活 菌芋 白附子 木香 天麻
右為細末，煉蜜丸如梧桐子大，每服十五丸，溫酒下，日三夜二。
真珠丸 治肝經因虛內受風邪，臥則魂散而不守，狀若驚悸
真珠 [illegible] 熟地黃 人參
酸棗人 柏子人 犀角 茯神 沉香
龍齒
右為末，煉蜜丸如梧桐子大，辰砂為衣，每服四五十丸，金銀薄荷湯
下，日午夜臥服。
天麻丸 治肝風筋脈[illegible]動，手足拘急，肢體[illegible]
天麻 [illegible] 防風 [illegible]
威靈仙 [illegible] 地榆 烏頭
龍腦 麝香
右搗羅細，用[illegible]
內臼中[illegible]
一丸，細嚼，茶酒下
獨活散 治肝中風[illegible]
獨活 羚羊角 麻黃 桂心
當歸 五加皮 附子 甘草
右為散，每服三錢，水一中盞，生姜半分，煎至六分，去滓，不拘時候温服。
禁忌豬肉等
丹砂丸 治肝臟中風手足麻痺[illegible]
丹砂 芎藭 羌活 荊芥 白附子
天南星 半夏 [illegible]
右為細末，[illegible]如梧桐子大，[illegible]服下十丸，日三服
升麻湯 治肝虛中風頭痛目眩胸中客熱氣衝心煩悶
升麻 玄參 地骨皮 前胡
羚羊角 酸棗人
右粗搗篩，每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓，入竹瀝半合
三兩沸，放溫，食後服，如人行五六里更進一服
竹瀝湯 治肝中風心神煩熱言語謇澁少得

羚羊角散 治肝中風筋脉拘急舌強語澁

羚羊角屑一兩 獨活一兩 附子[illegible]

右麁末每服三錢水一中盞生姜半分煎至五分去滓入竹瀝一合更煎一二沸温服

治肝元風虚侵傷肝氣 非時兩肋下隐痛背膊上疼痛面多青色宜服此方 聖濟方

白蒺藜去刺 京三稜 芫花醋炒 芍藥 木香

檳榔 羌活各等分

右為細末非時熱湯調下二錢

白散子 治肝腎虚為風所襲卒中涎潮昏塞不語嘔吐痰沫頭目眩暈上實下虚真陽耗竭兼治陰證傷寒六脉沉伏昏不知人又治霍亂吐瀉飲食不進及小便淋瀝不通止及赤白痢咽喉冷痛一方治痰涎上壅面赤戴陽四肢逆冷口眼喎斜語言不出牙關緊急凡有風涎證皆可服之

大附子生去皮臍 桂府滑石半兩 圓白半夏湯洗七次

右為末每服二錢水二盞薑七片蜜半匙煎至七分空心冷服如心躁加辰砂如霍亂加藿香如小便不利加木通燈心茅根煎此藥雖有差互亦無所害

心中風 附論

心中風之狀多汗惡風焦絶善怒嚇赤色病甚則言不快診在口其色赤夫心受風氣則生熱熱盛則汗不止心之液為汗故也汗多則腠理疎疎則真邪相搏是以惡風又心惡熱熱極則唇焦内燥多怒心之聲為言病甚則言不快心氣通於舌故也又其證肩背拘急不可傾側手心熱盛面赤頭痛將發熱不能安臥怔悸汗出恍惚不安以心主血脉其風日久隨榮衛行内外相搏證精而然也若唇正赤尚可治急灸心俞百壯服續命湯若唇或青或白或黄或黑者此為心已壞為水面目不時摇動者不可復治在五六日而死矣

方

定神琥珀丸 出聖惠 治心中風發由不知所成癇病驚悸恍惚

琥珀細研 真珠細研 天竺黃 鐵粉研

龍齒細研 朱砂研 羊角 甘草炙 龍腦

升麻 露蜂房微炙 丹砂 防風去叉 黄芩去黑心

麥門冬去心焙 白附子 鈎藤 人參 遠志去心

知母焙 天門冬去心焙 茯神去木 乾蝎炒 麝香研一分

金箔一百片 牛黃 [illegible] 菖蒲 [illegible]

右除別研外為末入研者同研令勻煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服二十丸食後煎荊芥薄荷湯下日二夜一

芎藭丸 治心中風驚恐悲憂喜怒悶亂若風邪流入五臟則注來煩悶嗟嘆吁吸驚氣發悸恍惚身體心中悶弱忽起顛倒手足厥冷飲食惡逆

芎藭 龍骨 白茯苓 紫石英 防風去叉

細辛去苗 鐵精 麥門冬 甘草炙

枳實 丹參 羌活 桂去粗皮

人參 大黄 附子 乾薑 白芥子

遠志去心 吳茱萸 烏頭 [illegible]

右先將一十九味為末與別研三味和勻煉蜜丸如梧桐子大每服七丸溫熟水下食後臨臥各一服

本事散 治心藏中風心神恍惚恐畏悶亂不得睡臥志意不定言語錯誤

牛黄一分 犀角屑一分 朱砂研 麝香 羚羊角屑一分

防風 天麻一分 獨活一分 人參 茯神一分

沙參 天竺黃 鉛霜 川升麻一分 龍齒一分

麥門冬 白鮮皮一分 遠志 龍腦

甘草

右為細散每服一錢用麥門冬湯調下不計時候

荊瀝湯 治心風建熱發如狂煩悶則半身不仁

羚羊角散 治心病中風言語蹇澁恍惚驚悸神志錯亂面赤心煩四肢不利

8 8 8

羚羊角屑一分 麻黄一兩去節 獨活三分 赤茯苓三分 黄耆三分
黄芩三分 麥門冬一兩去心 遠志去心 桂心三分 芍藥三分
人參一兩去蘆 葛根 石膏二兩 赤箭一分 白鮮皮三分
沙參 甘草半兩炙 杏仁
右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓溫服
牛黃丸 治心中風恍惚驚悸言語不利短氣煩悶口苦舌強
牛黃細研 麥門冬 丹參 銀屑
遠志去心 甘草 防風 細辛
茯神 紫石英 蜀椒 桂
乾薑 人參 附子 紫菀
菖蒲
右先將十五味為末與別研三味和勻煉蜜丸如梧桐子大每服五丸
溫酒下日三夜一忌
犀角丸 治心臟中風言語顛倒心胸煩熱
驚悸不安

太平聖惠方卷 五一

犀角屑 天麻三分 防風 遠志去心 羌活三分
沙參 茯神三分 龍齒一兩 川升麻三分 天門冬
麩 羚羊角 鐵粉 金銀箔
玄參三分 牛黃 朱砂 麝香
右為末入研了藥都研令勻煉蜜和擣五七百杵丸如梧桐子大每服
不計時以薄荷湯下十五丸
人參飲子 治因於驚邪風入心包或如前狀因病驚悸小腹脹
寒熱心煩悶色青黃赤白黑治虛勞驚風邪諸疾
人參 甘草 獨活 麻黄
當歸 芍藥 石膏 杏仁 白朮
細辛 桂 梔子 防風
赤芍藥 乾薑 黃芩 杏人
右㕮咀如麻豆每服三錢以水一盞煎至七分去滓溫服日三
人參丹砂丸 治心中風恍惚驚悸安神志化痰涎
人參 丹砂 紫石英 白石英 龍齒

細辛 天門冬 生乾地黃
龍腦 羌活 菖蒲
麝香 防風 白茯苓
右為末煉蜜丸如小雞頭大每服一丸不拘時服
主事丸 治二十六種風主心虛悸
驚心腸氣 鐵粉 人參 天麻
牛黃 天麻 人參
遠志 人參 肉桂 茯神
朱砂 麝香 石菖蒲
羚羊角屑
右搗羅為末煉蜜丸如梧桐子大食後臨臥溫水化下或加
丸至七丸
朱砂丸 治心臟中風手足驚掣心神狂亂恍惚煩悶言語蹇澀

太平聖惠方卷 五二

朱砂一兩 龍齒一兩 犀角屑一兩 天麻三分
人參 紫苑 川升麻三分 羚羊角屑
防風 茯神一兩 黃芩 鐵粉
遠志 黃芩 防己三分 鉛霜
右為末都入乳鉢內同研令勻煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大
每服不計時以荊芥湯飲下二十丸
防風湯 治心虛寒風氣煩心驚悸
胃味好自笑言風傷心方
荊芥三兩 母薑 麻黃 白朮 芎藭
防風 桂心 升麻 茯苓 遠志
人參 羌活 當歸 防己 甘草
右㕮咀以水一斗五升煮麻黃兩沸去沫次下諸藥煮取三升去滓
分溫三服
犀角散 治心臟中風言語不利煩悶
犀角屑 二分 防風 沙參

羌活三分 甘菊花一分 麻黃三分去節 羚羊角屑二分
茯神三分 遠志二分去心 人參二分去蘆頭
白鮮皮二分 人參 柴胡三分去苗
秦艽三分 甘草一分炙微赤剉
右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候
溫服
茯神散 治心臟中風恍惚不知人夢寐驚恐心煩語澀舌強時自
汗出四肢不利
茯神三分 獨活一分 當歸 桂心二分 黃芩三分
防風三分去蘆頭 赤芍藥三分 秦艽 杏人三分
沙參二分 羚羊角屑一分 甘草
右為粗散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓入竹瀝半合更煎一
兩沸不計時候溫服
金箔丸 治心中風恍惚語不正
金箔 琥珀 朱砂 白茯苓 真珠

人參 犀角 天南星 麝香
雄黃 安息香 牛黃 琥珀 龍腦
甘草炙半兩
右為末和勻用煉蜜和丸如雞頭大每服一丸食後
人參湯化下
牛黃定志丸 治心中風精神不寧驚悸心忪健忘神
牛黃 乾蠍 白殭蠶 白附子
雄黃 丹砂 天麻 半夏
乾地黃 烏蛇 麝香
天南星
右為末煉蜜和丸如雞頭大每服一丸細嚼荊芥人參湯下食後
臨臥服
麻黃散 治心中風虛驚煩心驚掣手足口喎目
沫好笑
麻黃 白术一兩 防風 桂心 川升麻

8

芎藭一兩 茯神 遠志 人參 羌活三分
當歸 漢防己 甘草
右為粗散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至五分去滓入荊瀝半合
更煎一兩沸不計時候溫服
小人參丸 治心臟中風昏憒自旋眩恍惚不定
沙參 麥門冬 石膏 防風 人參
赤茯苓 芎藭三分
獨活三分 枳殼 遠志 甘草
羚羊角屑三分
右為散每服四錢水一中盞生薑半分煎至五分去滓入竹瀝半合
更煎一兩沸不計時候溫服
茯神散 治心臟中風語澀昏悶四肢沉重精神不守
茯神一兩 羌活 蔓荊子 龍齒一兩 人參
薏苡人三分 防風 赤芍藥 麥門冬 遠志
犀角屑 麻黃 甘草
右為散每服四錢以水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計時溫
服
防風丸 治心風中風驚悸言語謇澀煩熱恍惚心神不安
防風 茯神一兩 人參 天麻三分
麥門冬 羚羊角 白鮮皮 犀角屑一兩 薏苡人三分
甘草二分 天竺黃 牛黃一分研入
右為末入研了牛黃令勻煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服
不計時以溫水飲下二十丸
朱砂天麻丸 治心神驚悸諸風和濡筋骨疼痛
肥瘡麻痹
朱砂 天麻 半夏 天南星 蠍梢一分
白附子 藿香 牛黃 白殭蠶
右為末水煮麪糊為丸如梧子大每服二十丸荊芥湯下不計時候
犀角散 治心風中風精神昏昧煩熱多汗口乾面赤驚悸頭痛
麻黃 薏苡人 白鮮皮 麥門冬 茯神三分
犀角屑 石膏 防風 遠志 甘草

右為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓入竹瀝半合更煎一二沸不計時溫服

（丹砂丸）治小兒中風心神不寧驚悸煩亂

丹砂 雄黃 牛黃 大黃 當歸

麝香 龍齒 沒藥 膩粉 一錢

右為末研生白蜜和丸如綠豆大每服三丸

煎荊芥薄荷湯化下小兒可服半丸

（烏犀散）治小兒中風精神昏悶恍惚多驚

烏犀角屑 丹砂

人參 防風 全蝎 獨活 遠志

右為散每服一錢已上食後溫水調下日三

（[illegible]）治小兒心脾中風舌強不語半身不遂

白附子 石菖蒲 遠志 天麻 全蝎

羌活 僵蠶 木香 牛膽南星

右為細末以麵糊丸如黍米大每服三十丸薄荷湯下

脾中風（附論）

脾中風者其脉浮緩舌強語澀口面喎斜肌膚不仁身體怠惰四肢不欲舉也膚肉瞤動而目瞤兩腳黃也

內經曰脾者土也其色黃又曰諸濕腫滿皆屬於脾脾主四肢故脾中風則身體怠惰四肢不欲動脾者倉廩之官故病則不嗜食診在舌中央之位也其色黃黃土之色也其聲歌也

發熱風之候也而加肢人黃頸氣也若吐鹹汁不能者尚可治

若脾絕者目下青手足青者不可復治矣

方

（天麻丸）治脾藏中風身體足情四肢緩弱是風頭旋舌本強直言語蹇澀心悶煩亂

天麻 獨活 羌活 麻黃 附子 桂心 人參

丹砂 麝香 一分 烏蛇肉

防風 細辛 當歸 白朮 羚羊角屑

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下不拘時候

天南星 白附子 半夏 龍腦 一分

蠶沙 人參 乾蠍 羌活

酒下

（天麻丸）治脾藏中風手足緩弱舌強語澀四肢不欲舉

羌活 附子 乾薑 石斛 澤瀉

防風 桂心 梔子人 人參 天雄 防風

獨活 烏頭 萆薢 肉蓯蓉 附子

細辛 白朮 黃芩 一兩 山茱萸 牛膝

右二十二味㕮咀每服五錢水三盞煎至一盞去滓溫服

三合前加減每服空心日再

（羚羊角丸）治脾藏中風口面偏斜語澀手足不遂

羚羊角屑 防己 白附子 獨活 白茯苓

防風 酸棗人 杏人 麥門冬 薏苡人 桂心 獨活 柏子人

人參 梔子人 麻黃 附子 芍藥

桂心 當歸 羌活 附子

熟乾地黃 各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心溫酒下三十丸

（當歸丸）治脾中風身重不舉便利無度脾胃不調氣壅

當歸 乾薑 酸棗人 肉蓯蓉 地骨皮 乾地黃

芎藭 天雄 桂心 防風 附子

萆薢 秦艽 麥門冬 大棗

五味子 黃芪

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸日再服

（秦艽湯）治脾藏中風四肢不能語四肢不舉

秦艽 石膏 赤茯苓 當歸

防風 桂心 白朮 人參

防己 附子 杏人 乾薑

麻黃[illegible] 附子[illegible] 羌活[illegible] 各[illegible]
右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑五片棗三枚同煎至八分去滓不拘時候
服日二

羚羊角丸[illegible] 治中風手足不隨口眼喎斜心神恍惚
宜汗大便秘

羚羊角[illegible] 防風[illegible] 人參[illegible] 柏子人[illegible]
白殭蠶[illegible] 熟乾地黃[illegible] 大麻人[illegible] 羌活[illegible] 茯神[illegible]
桂[illegible] 芎藭[illegible] 杏人[illegible]
阿膠 甘草[illegible]
右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下三十丸

茯神丸[illegible] 治中風手足不隨肢節[illegible]
殭蠶[illegible]
檳榔[illegible] 防己[illegible] 赤芍藥[illegible] 羚羊角[illegible] 人參[illegible]
白茯苓[illegible] 芎藭[illegible] 桂[illegible] 獨活[illegible] 防風[illegible]
當歸[illegible] 薏苡人[illegible] 酸棗人[illegible] 柏子人[illegible]

附子[illegible] 熟乾地黃[illegible] 杏人[illegible]
右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服空心食前溫酒下二十丸

赤茯苓散[illegible] 治脾臟中風語言謇澀四肢不[illegible]
赤茯苓[illegible] 羚羊角[illegible] 羌活[illegible] 麥門冬[illegible] 蔓荊子[illegible]
石膏[illegible] 甘菊花[illegible] 人參[illegible] 黃耆[illegible] 防風[illegible]
羚羊角[illegible] 遠志[illegible] 前胡[illegible] 枳殼[illegible]
甘草[illegible]
右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

藿香湯[illegible] 治脾中風多汗惡風身體怠惰四肢不欲動而色黃不嗜食宜服此方
藿香葉[illegible] 人參[illegible] 羌活[illegible] 陳橘皮[illegible] 白朮[illegible]
獨活[illegible] 木香[illegible] 草豆蔻[illegible] 芎藭[illegible]
乾薑[illegible] 甘草[illegible] 吳茱萸[illegible] 薏苡人[illegible]

半夏[illegible]
右[illegible]每服三錢水一盞入生薑三片煎至六分空心服

防風散[illegible] 治脾臟中風手足緩弱舌強語澀胸膈煩悶志意恍惚身體沉重
防風[illegible] 麻黃[illegible] 人參[illegible] 芎藭[illegible] 桂心[illegible]
附子[illegible] 羚羊角[illegible] 黃耆[illegible] 赤茯苓[illegible]
酸棗人[illegible] 白朮[illegible] 獨活[illegible] 甘草[illegible]
桑根白皮[illegible]
右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計
時候溫服

獨活丸[illegible] 治脾臟中風四肢緩弱志意恍惚
獨活[illegible] 黃耆[illegible] 桂[illegible] 巴戟天[illegible]
[illegible]木香 人參 枳殼[illegible] 白茯苓[illegible]
澤瀉 [illegible] 天雄[illegible] 白蒺藜[illegible]
芎藭[illegible]

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸到二十丸溫酒下

獨活湯[illegible] 治脾臟中風[illegible]
獨活[illegible] 麻黃[illegible] 白茯苓[illegible] 羚羊角[illegible]
人參 前胡[illegible] 沙參[illegible] 旋覆花[illegible] 黃芩[illegible]
半夏[illegible] 附子[illegible] 防風[illegible] 甘草[illegible]
右剉如麻豆每服三錢匕以水一盞入生薑半分切同煎取七分
去滓溫服不拘時候日三一方名獨活散無麻黃

麻黃湯[illegible] 治脾中風身體緩急手足不隨不能言語
麻黃[illegible] 桂[illegible] 甘草[illegible] 白朮[illegible]
附子[illegible] 石膏[illegible] 防風[illegible] 杏人[illegible]
人參 芎藭 黃芩[illegible]
當歸[illegible]
右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半生薑五片煎至八分去滓溫服
日二夜一不拘時候

獨活散 治脾臟中風身體[illegible]語不利[illegible]

86

87 88

獨活[illegible] 茯神[illegible] 防風[illegible] 羚羊角屑[illegible] 人參[illegible]
附子[illegible] 前胡[illegible] 旋覆花三分
麝香[illegible] 甘草[illegible]
右為散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分，去滓，不計時
候溫服。
（牛膝丸）[illegible] 治脾中風，手足不仁，行步艱難，腰腳疼痛
麻痹不仁。
牛膝[illegible] 桑寄生[illegible] 二兩 人參[illegible] 天門冬[illegible]
細辛[illegible] 附子[illegible] 巴戟天[illegible] 石斛[illegible]
桂心[illegible] 獨活[illegible] 五加皮[illegible] 杜仲[illegible]
右件藥，[illegible] 生[illegible] 以[illegible] 三十丸，[illegible] 十日後七日[illegible] 五日[illegible]
日每服二合，漸加至三四合，日二夜一服。
（天麻散）[illegible] 治脾中風，四肢不舉，[illegible]
丹砂[illegible] 天麻[illegible] 人參[illegible] 威靈仙[illegible] 白朮[illegible]
當歸[illegible] 麝香[illegible] 烏蛇[illegible] 羚羊角[illegible]
[illegible]
右為散，每服一錢，以溫酒調下，漸加至二錢，日三服。
（一字散）[illegible] 治脾風，多汗惡風，身體怠惰，四肢不收，色黃，面微腫，
福（腹）滿氣
白附子[illegible] 天麻[illegible] 乳香[illegible] 天南星[illegible]
沉香[illegible] 牛黃[illegible] 乳香[illegible] 麝香[illegible] 雄黃[illegible]
右除四味研外，餘同為細末，後入研藥一處研令極細，每服一字[illegible]
並溫酒下，如要丸，煉蜜和丸如梧桐子大，急風豆淋酒[illegible]
一切風疾，頭目昏暗，[illegible] 疼痛，每下一丸，小兒化半丸。
（羚羊角散）[illegible] 治脾中風，四肢不舉，[illegible] 痰[illegible] 語[illegible] 痛[illegible]
飲食不時。
羚羊角屑[illegible] 獨活[illegible] 羌活[illegible] 羌人[illegible]
人參[illegible] 旋覆花[illegible] 前胡[illegible]
右為散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分，去滓，不計時候溫服。
細辛散[illegible] 治[illegible] 中[illegible] 肌[illegible] 頭[illegible] 大[illegible]
[illegible] 色[illegible] 黃[illegible]

細辛一兩 枳實[illegible] 防風[illegible] 石膏二兩 白朮一兩
麻黃[illegible] 附子[illegible]
右為散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分，去滓，不計時
候溫服。忌生冷、油膩、粘滑、豬[illegible]。
（旋覆花散）[illegible] 治脾藏風壅，多涎，心胸不利，頭目昏重。
旋覆花[illegible] 細辛[illegible] 前胡[illegible] 赤茯苓[illegible] 羚羊角屑[illegible]
半夏[illegible] 防風[illegible] 枳殼[illegible]
犀角[illegible]
右為散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分，去滓，不計時
候溫服。忌生冷、油膩、飴糖。
（前胡散）[illegible] 治脾藏風壅，痰涎多，胸膈滿悶，不下飲食。
前胡[illegible] 半夏[illegible] 枳殼[illegible] 赤茯苓[illegible] 甘草[illegible] 大腹皮[illegible] 桔梗[illegible]
旋覆花[illegible]
麥門冬[illegible]
右為散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分，去滓，不計時
候溫服。忌生冷、油膩、飴糖。
[illegible]
（半夏散）[illegible] 治脾藏風壅，頭昏，頭目昏悶，不利。
半夏[illegible] 旋覆花[illegible] 防風[illegible] 赤茯苓[illegible]
前胡[illegible] 桑根白皮[illegible] 麥門冬[illegible] 枳實[illegible]
甘草[illegible]
右為散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分，去滓，不計時
候溫服。
（赤茯苓散）[illegible] 治脾藏風壅，心胸痰滯，嘔吐，不思飲食。
赤茯苓三分 旋覆花[illegible] 枳殼[illegible] 細辛[illegible]
甘草[illegible] 蔓荊子[illegible] 桔梗[illegible] 羚羊角屑三分
白蒺藜[illegible]
右為散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分，去滓，不計時
候溫服。
（防風散）[illegible] 治脾中風，入擬經年，四肢不遂，舌強語澀。
威靈仙 附子 桔梗 防風 枳殼

川芎　當歸　荊芥穗各[illegible]

右麁末，每服四錢，水一盞，竹瀝半盞，生薑三片，同煎至八分，去滓溫服，日三四服。

前胡丸　治肝臟風熱，頭目昏痛，心[illegible]

前胡[illegible]　旋覆花　檳榔　川大黃　枳殼

牛蒡子　羌活[illegible]　枳殼

青茯苓

右爲末，煉蜜和搗二三百杵，丸如梧桐子大，每服不計時候，以荊芥薄荷湯下二十丸。

人參散　治肝中風，手脚不遂[illegible]

桂[illegible]　烏蛇[illegible]　乾薑[illegible]　羚羊角[illegible]

附子[illegible]

細辛[illegible]

右以銼分末，遂合青兒乾白，夾白，青與辛研爲細散，每服溫酒調下一錢至二錢，巳空心午時各一服，稍加至三錢巳。

七聖散　治肝臟中風，心煩壅，頭面微腫，冷汗出

天麻　枳殼　烏蛇　骨皮半兩

白蒺藜　川大黃　羌活　人參二分

右爲散，不計時候，用溫水調下二錢，忌生冷、油膩、豬雞肉。

牛黃丸　治肝臟風，言語澁，多忘

牛黃　白附子一兩　天竺黃　天麻一兩半

烏蛇　麝香

右爲末，部研令勻，煉蜜和搗百餘杵，丸如梧桐子大，每服不計時候，以荊芥湯下七丸。

定涎丸　治肝臟風痰，咽喉閉塞，四肢八節拘攣

下利

白僵蠶　天竺黃　半夏

硃砂　皂莢子人　金箔

右以半夏皂莢子人搗羅爲末，共諸藥同研令勻，用糯米粥和爲丸，如菉豆大，每服七丸，不計時候，生薑湯下。

肺中風 附治

肺中風之狀，多汗惡風，色皏然白，時欬短氣，晝日則差，暮則甚，診在眉上，其色白。又口燥而喘，身運而重，冒而腫脹，[illegible]出，夫熱主風，[illegible]熱，[illegible]多汗，[illegible]，故惡風，[illegible]所以惡風，[illegible]然而白，金之色也。在變動爲欬，又肺主氣，故欬短氣也。風陽也，晝則在表，暮則在裏，陽主表而受之，故暮則甚也。診在眉上，其色白，肺之色也。身運而重，風使然也。冒而腫脹，[illegible]而脊痛，短氣以主氣故也。又噤啞顫掉，語聲嘶塞，身體[illegible]，[illegible]皆肺中風之候也。

方

牛黃丸　治肺中風，項強背痛，四肢緩弱，言語不出，胸中煩悶，手足顫搐，心胸短氣，面如白[illegible]，心中[illegible]

牛黃細研　羌活　細辛　桂心

當歸　甘菊花　防風　天雄

麻黃　蔓荊子　白朮　薄荷　茯神

杏人　山茱萸　羚羊角屑　芎藭

犀角屑　五加皮　五味子　阿膠

人參　麝香　天南星　白附子　龍腦

麝香一分

右爲末，入研了藥，更研令勻，煉蜜和搗二三百杵，丸如梧桐子大，每服不計時候，以荊芥湯下十五丸。

八風防風散　治肺中風，虛損，語音嘶，氣，用力戰掉，羸瘦

風入肺

防風　獨活　芎藭　秦椒　乾薑

黃耆　附子　天雄　麻黃　石膏

五味子　山茱萸　秦艽　桂心

薯蕷　細辛　當歸　防己　人參

杜仲　甘草　貫衆　紫菀

右治下篩，每服方寸匕，酒調，漸至兩匕，日再。

犀角散 治肝臟中風項強皮毛焦痛心煩頭目不利四肢
犀角屑 天竺黃 人參 茯苓 赤箭
羌活 防風 芎藭 桂心
獨活 五加皮 藁本 菊花 麻黃
[illegible] 細辛 當歸 枳殼 天門冬
[illegible] 甘草 半夏 前胡
右為散入研了藥令勻每服不計時候以荊芥薄荷湯調
下一錢
防風散 治肝臟中風項背強直氣血[illegible]行四肢無力
防風 天麻 白僵蠶 白附子 烏蛇
人參 [illegible] 白茯苓 羌活
獨活 蟬殼 厚朴 羚羊角
[illegible] 白蒺藜 蔓荊子
當歸 大腹 郁李人 檳榔
牛黃 麝香
右先將二十二味搗羅為散入研了藥同研令勻每服食後溫酒
調下二錢日二夜一 如要丸入麝香半兩與本同研煉蜜和丸
梧桐子大每服溫酒下十丸日三服
白蒺藜散 治肝臟中風頭項強痛風中[illegible]行筋脈拘急語澁
不思四肢頑痺大腸不利
白蒺藜 羌活 沙參 丹參
麻黃 白朮 羚羊角屑 細辛 萆薢
五加皮 五味子 生乾地黃 赤茯苓 薏苡
人參 枳殼 桂心
郁李人 附子 木通
檳榔
右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時
候溫服忌生冷毒滑魚肉
白花蛇散 治肺中風入腑頭項強背強直皮膚不仁
白花蛇 人參 白茯苓
當歸 甘草 白附子 麻黃 天麻
芎藭 羌活 藁本 細辛 乾蠍
白芷 附子 防風 白殭蠶
麝香 牛黃 丹砂
右除別研外搗羅為散入研藥再羅令勻每服二錢七以蔥白臘茶
調下
防風散 治肝臟中風入背痛項強皮毛焦 頭疼身寒四肢
不利偏身瘙痒
防風 人參 赤茯苓 貝母 前胡
半夏 芎藭 木香 天麻
羌活 甘菊花 細辛 麻黃
附子 桂心 藁本 桑根白皮
杏人
右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分薄荷二七葉煎至六分
去滓不計時候溫服忌熱麵雞豬魚等
大排風天麻散 治肝中風痺麻不仁手足無力
天麻 羌活 獨活 烏蛇
桂心 白芷 當歸 秦艽 細辛
青箱子 附子 枳殼 白蒺藜
羚羊角 芎藭 麻黃
右為散每日空心及晚食前溫酒調下二錢七
獨活散 治肝臟中風令頭疼項強骨痛肩背心悶語聲不出耳
中少氣四肢無力疼痛
獨活 細辛 附子 甘菊花
麻黃 木通 五味子 赤茯苓 薏苡
桂心 白朮 芎藭 桑根白皮
杏人 甘草
右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時溫服
芎藭丸 治肺臟中風項強頭旋胃滿短氣噎乾嗽喉顫語澁

芎藭 防風 獨活 桂心 前胡
甘菊花 附子 麻黃 細辛
五味子 黃耆 杏人 人參
茯神 山茱萸 甘草
右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時
候溫服忌生冷毒滑油膩
蕎芘湯 治[illegible]中風[illegible]語聲不出喉鳴痰急胸滿短氣
蕎芘 防風 人參 羌活
赤箭 芎藭 羚羊角 麻黃 桔梗
前胡 甘草 石膏 黃芩 白鮮皮
右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分溫服食後臨卧服
羚羊角散 治中風項背強直心胸煩悶汗出語謇
[illegible]
羚羊角 人參 防風 赤箭 麻黃

藁本 羌活 細辛 甘菊 赤芍藥
當歸 枳殼 麝香 甘草
牛黃 研一分
右除研二味外搗羅為散入研藥再羅勻每服荊芥薄荷湯調下二
錢日三不計時候
麻黃散 治臟中風心胷氣促項背強硬皮膚不仁
麻黃 附子 天麻 防風
白花蛇肉 細辛 芎藭 菖蒲
荊芥 桑根白皮 白蒺藜
杏人 牛黃 麝香
右為散每服不計時候以溫荷酒調下一錢
依源麻黃續命湯 治肺虛寒偏風所中聲嘶戰掉[illegible]塞而散
下氣息短憊四肢痿弱面色青葩遺失便利冷汗出
麻黃 大棗 杏人 白朮 石膏
桂心 人參 乾薑 茯苓 當歸

芎藭 甘草
右㕮咀以水一斗二升煮取四升去滓分三服
舊方無白朮茯苓今方無杏人[illegible]以依經逐症增[illegible]敗
羚羊角丸 治[illegible]風[illegible]
羚羊角 白鮮皮 附子 萆薢 天麻
參 蒺藜
右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服[illegible]桑根白皮湯[illegible]十五丸日三服

腎中風 附論

腎風之狀多汗惡風面龐然浮腫脊痛不能正立其色炲隱曲不利診在肌上其色
黑夫腎之本在腎受五臟六腑之精氣[illegible]
之氣不能上至於頭面故有面龐然浮腫之證[illegible]
腎主骨骨不強則脊痛不能立精神衰弱則隱曲之事不利肌上黑色
如炲也又踞而腰痛不可俛仰或為冷痺或為偏枯耳鳴聲渾志意昏
沉善恐多忘皆腎風之證視脇左右未有黃色如餅粢大者尚可治急
灸腎俞百壯服續命湯若齒黃赤鬢髮直面土色者不可復治矣

方

萆薢散 治腎臟中風腰腳疼痛腳膝偏枯耳聾語音渾
濁兩耳虛鳴舉體乏力面無顏色志意不樂骨節酸疼宜服
萆薢 一兩剉 杜仲 石南
天雄 石龍芮 獨活
附子 狗脊 當歸
麻黃 乾蠍 桑螵蛸 菖蒲 赤箭
甘菊花 牛膝 木香 芎藭 麝香
右為細散每服食前以溫酒調下二錢
螂螂丸 治腎臟中風腳膝麻痺無力腰背強直疼痛言語不
利面色萎黑肌體羸瘦
螂螂 白附子 防風 天麻 茴香
天雄 白花蛇 萆薢
桂心 獨活 丹參 當歸 安息香

海桐皮　萆薢　牛膝　生地黃
麋茸
右為末，煉蜜和搗一五百杵，丸如梧桐子大，每服以溫酒下三十丸，
日二服。
獨活散　治腎臟中風，腰脊疼痛，不得俯仰，兩腳冷痹，緩弱不遂。
獨活　附子　芎藭
萆薢　天麻　羚羊角　菖蒲
當歸　細辛　山茱萸　白朮　甘菊花
牛膝　枳殼　甘草　丹參
右為散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分，去滓，不計時
候溫服。
天麻丸　治腎臟虛中風，腰腳緩弱無力，面色不華，志意昏沉。
天麻　附子　巴戟　鹿茸

麻黃　石斛　萆薢
杜仲　牛膝　天雄　獨活
丹參　當歸　杜仲　防風
磁石
右為末，煉蜜和搗三五百杵，丸如梧桐子大，每服空心及晚食前以
溫酒下二十丸。
天雄丸　治腎臟風邪所中，語音蹇吃，腰脊疼不可轉側，腳膝緩弱疼
痛，頭旋耳鳴，身體沉重無力。
天雄　石龍芮　獨活　防風
麻黃　茯神　杜仲　萆薢
丹參　桂心　羌活　五味子　細辛
牛膝　當歸　人參　枳殼
右為散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分，去滓，不計時
候溫服。
石斛浸酒　治腎臟中風下注，腰腳痹弱，骨節疼痛，頭面

風，補虛方益氣力
石斛　菖蒲　牛膝
人參　杜仲　五味子　白茯苓
山茱萸　山芋　萆薢　枸杞子
防風　細辛　薏苡仁　天門冬
右細剉，以生絹袋盛，以清酒五斗於瓷器中浸七宿，初溫服
三合，日三夜一，漸加至六七合，一依常有酒氣，不至大醉。
側子散　治腎臟中風，腰脊疼痛，不得俯仰，兩腳冷痹，緩弱不遂，頭昏耳聾，語音渾濁，志
意不定。
側子　麻黃　羌活　當歸
海桐皮　牛膝　羌活　防風　白朮
桂心　甘菊花　羚羊角　附子
萆薢　五加皮　甘草
右為散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分，去滓，不計時
候溫服。

腎瀝湯　治腎臟風所傷，語音蹇吃，不得俯仰，兩腳緩弱，腰脊不
能轉動，口噤耳聾，便利，四肢煩疼，腰背相引。
羊腎一具　黃耆　芎藭　桂心　人參
當歸　防風　甘草　五味子　玄參
芍藥　茯苓　磁石　地骨皮　生薑
右剉散，以水一斗，煮羊腎取五升，下諸藥，取一升，分二服。
海桐皮散　治腎臟中風，腰腳痹痛。
海桐皮　五加皮　萆薢　薏苡仁　虎骨
枳殼　牛膝　赤芍藥　酸棗仁　防風
續斷　杜仲　郁李仁　熟乾地黃
一兩
右為散，每服二錢，溫酒調下，加至三錢，空心食前各一
杜仲丸　治腎臟風，腰腳不遂，骨節疼痛，筋脈拘急，行履艱
難，兩膝無力。
杜仲　萆薢　牛膝

前胡 防風 五味子 生薑
石斛 附子 赤芍藥
羚羊角 枳殼
右為末煉蜜丸如梧子大空心暖酒下三十丸
防風丸 治腎中風踞而腰痛不仁骨節痠疼不能久立動覺身重
防風 獨活 當歸 蔓荊子 五加皮 杜仲
桂 赤芍藥 薏苡人 羚羊角 萆薢
附子 木通 當歸 川芎 牛膝
右件藥等分為末每服三錢水一盞煎至七分去滓空心溫服及晚食前再服
吳茱萸丸 治腎中風惡風多汗面龐然浮腫腰脊痛不能正立面色始黑
吳茱萸 山茱萸 石斛
細辛 芎藭 附子 羌活
白茯苓 獨活 木香

萆薢 菟絲子
右為末用醇酒半盞煉蜜半盞拌和丸如梧桐子大空心日午臨卧鹽湯或溫酒下三十丸 一方無細辛
白花蛇丸 治腎中風腰膝骨節疼痛轉動不得
白花蛇 羌活 白附子 桂
芍藥 乾蝎 防己 麻黃
附子 乾薑 蜀椒 牛膝
右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心鹽湯下十丸至十五丸如要出汗先溫酒下次服熱酒或葱湯下汗出避風
踈風丸 治腎中風踞坐腰痛
防風 白茯苓 五味子 桂
石斛 人參 山茱萸
熟乾地黃 杜仲
右為末煉蜜丸如梧子大空心酒下二十丸至三十丸
紫蘇大腹皮飲 治腎藏風毒攻手足浮腫心腹急脹疼痛

腎虛熱或手足虛腫反生瘡來大氣不足
紫蘇葉 一兩 桑白皮 木通
獨活 木瓜 荊芥 前胡 羌活
枳殼 大腹子 青皮 吳茱萸
右每服四錢薑白二寸棗五片水一盞半煎七分日三服
羊肉天麻散 治腎中風腰脊疼痛不得俯仰言語蹇澀志意不定
人參 牛膝 天麻 枸杞子
白附子 羌活
右為末每日三服食前溫酒調下一錢匕
天雄湯 治腎中風不得屈伸手不得用
天雄 當歸 防風 獨活
乾薑 白附子 烏頭 肉桂
右剉如麻豆用生絹袋盛以酒一斗五升浸之春夏五日秋冬七日開取每服一合漸加至一合半空心臨卧各一服
將舊滓為散每服半錢加至一錢匕服時候如前

治腎癃風
蛇床子 吳茱萸 乾薑 牡礪
右為細末瘥後時用以手內摩
治腎風囊氣
炒萊菔為末每酒調三錢
澤瀉散 治腎風面腫
澤瀉 天雄 白茯苓 防風 一兩
枳實
右為末每服五錢水二盞煎至一盞去滓服
黃芪 蒺藜 積實 赤小豆
右為細末每服二錢米飲調下
治腎家風氣
以枸杞根皮細剉熬汁作粥煮熟取之去對氣充足

胃中風

門論

胃風之狀頸多汗惡風食飲不下膈塞不通腹善滿失衣則䐜脹食寒[illegible]

衣[illegible]風[illegible]

凡胃不通腹善滿者[illegible]中焦也失衣則䐜脹者[illegible]

過於風邪係胃內也食寒則泄者因寒又傷於胃以泄注也形瘦[illegible]

不營也腹大者氣未通也或因飲食飽而入水自責令人大腹而為水

病或胃病有風有風及少氣口乾喜渴[illegible]

[illegible]不知胃[illegible]不欲自[illegible]斷其證矣

方

胃風湯 治虛風證能食麻木牙關[illegible]目內瞤動胸[illegible]面腫

升麻 白芷 葛根 蒼朮 炙甘草

柴胡 藁本 蔓荊子 羌活 黃柏

麻黃 當歸身 草豆蔻 棗四枚 乾生薑

右剉如麻豆大分二服每服水大盞內二盞煎至一盞去滓食後

服

溫中厚朴湯 治[illegible]入客腸胃腹脹泄利

厚朴 當歸 乾薑 桂

赤茯苓 白朮 人參 桔梗 甘草

右爲散每服三錢匕以水一盞煎取七分去滓早晚食前溫溫服之

豆蔻丸 治胃虛中風[illegible]飲食不下[illegible]不

通腸胃滿[illegible]則䐜脹食寒則泄形瘦而腹大一名[illegible]

肉豆蔻 羌活 防風 桔梗

薏苡仁 人參 陳橘皮 獨活

草豆蔻 芎藭 甘草 木香

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸至四十丸米飲下日三

夜一爲[illegible]

白豆蔻丸 治胃風[illegible]服[illegible]飲食

白豆蔻 乾薑 甘草 訶黎勒

人參 厚朴 白朮 陳橘皮

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸生薑棗湯下日四五服

不拘時

厚朴陳橘皮湯 治風邪于胃食物不化便利完出病名飧泄

厚朴 陳橘皮 甘草

肉豆蔻 赤茯苓 防風 吳茱萸

芎藭 羌活

右爲散每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服空心食前

厚朴湯 治胃風冷氣攻心腹疼痛飲食不消四肢羸瘦

厚朴 訶黎勒 木香

蒼朮 枳殼 當歸 桔梗

陳橘皮

右爲散每服三錢匕水一盞棗一枚去核煎至七分溫服不拘時

木香丸 治胃風腹痛飲食不消化四肢不和

木香 檳榔 赤芍藥 枳殼 訶黎勒

桂 陳橘皮 吳茱萸

右爲細末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服三十丸粥飲下不

拘時

胃風湯 治風冷入中客於腸胃水穀不化飧泄注下腹痛腸鳴

胃中腸鳴或下瘀血

人參 赤茯苓 芎藭

芍藥 白朮 桂 當歸

右等分每服三錢匕水一盞半粟米百粒同煎至一盞去滓溫服

或腸胃濕毒下血或下如豆汁皆可服

白朮丸 治胃風腹脹飧泄不止

白朮 人參 赤茯苓 甘草

厚朴

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸米飲下日四五服不拘時

〔枳子定方〕治痰心胃痛

右用枳子炒和粉將之細細食之

〔去胃中痰〕以枳子數枚去殼十枚切如飯常常食之

卒中風〔附論〕

夫內經謂邪風之至疾如風雨□□之□□也卒中風之人由飲食
不謹勞倦太過氣血衰弱榮衛不足以致風之毒邪乘虛而入所以
氣語言蹇澀痰涎壅盛口眼喎斜人事不省者是其證也

方

〔全永靈丹〕治卒暴中風昏運手足顫掉口面喎斜手足麻木搖頭
戰掉或角弓反張目睛上視口噤不語每日三服中風數年不能步履
服至十九後舊病中風三服可服常服半丸益氣固五臟補益真元通
流關節袪逐風邪強筋健骨服者不及

全蠍 水銀一兩 辰砂

麻黃 自然銅

乾蝎 天南星 藿香葉

官桂 烏蛇 白花蛇

白朮 白芷 殭蠶 蓽澄茄

羌活 牛膝 附子 川芎 川烏

虎骨 沉香 天麻

木香 安息香 白附子 當歸 防風

右先將二十六味為末細研前五味拌和入安息香膏搜和再入白
中搗五百下每一兩作十丸每服一丸空心細嚼溫酒送下一方有
龍腦巴豆丁香麝香□長於治風不長於□□具亦□□□而□□
世多難得故未取錄

〔阿膠丸〕治肺腎之虛氣血弱卒中風邪及癱緩等疾

阿膠 蛤粉炒 犀角屑 麝香 人參半兩

白鮮皮 白殭蠶炒 天南星 半夏

天麻 桔梗 黃芩 當歸一兩 沉香半兩

羌活 虎頭骨 白茯苓 麻黃

白芷 附子 防風 芎藭

乾蝎 桂心 白花蛇

木香 乾薑 烏蛇

羚羊角屑

右細剉焙乾為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸生薑薄荷湯下中風
書者擣嚼口亂丸以溫酒化下每服一丸立有

〔白龍丸〕治男子婦人卒暴中風口眼喎斜神昏不醒脈弦及遊風瘡
體項強頭目旋運痰涎心忪口眼喎斜偏正頭疼皆風所致小男子腎
風婦人血風攤緩頭疼鼻塞小兒驚風涎潮痰盛手足麻木
癱瘓偏風心煩多痰治一切諸風功效不盡

白附子 川天麻 藁本 縮砂仁 劉寄奴

川羌活 細辛 獨活 石膏一兩 薄荷葉

藿香葉 麻黃去根 甘松 葛根 防風

白芷 芎藭 寒水石 桔梗 香附子炒

木鱉 川烏

右為細末用天麻煎汁和丸每兩作一十丸別用寒水石粉為衣陰乾每服
一丸細嚼茶清下食後日二服□□□□薄荷
痛者用□□□□□□為妙

〔山梔子丸〕治卒中風

山梔子 山茱萸 地榆 桔梗 細辛

羌活 獨活 革薢 萆麻

鹿茸 虎脛骨 紫菀 白芷 藁本

紅藍花 烏蛇 防風 桂 胡椒

殭蠶

右為末一半為末餘一半煉蜜和丸如梧桐子大每服□□□破傷風身強
癱緩風先頭□浴中□口眼喎斜□□□□□之所□□
重日又以生薑薄荷□□□調下散子每服二丸至五丸立効甚

着豆豉薄荷葉煎數串數至二盞匕下七匕至十九日三夜一

豆汁煎 治卒中風不得語

煮大豆煎汁如飴含之亦濃煮汁飲復服之尤良

大竹瀝湯 治卒中風口噤不能言四肢緩縱偏痹攣急風經五臟恍惚恚怒無常手足不隨

竹瀝一升 獨活 芍藥 防風 茵芋

甘草 白朮 葛根 細辛 黃芩

芎藭 桂心 防己 人參 石膏

麻黃 生薑 茯苓 烏頭

右㕮咀以竹瀝煮取四升分六服先未汗者取汗一狀相當即服之

秦艽散 治卒中風無問新久得不知人四肢不仁一身盡痛偏枯不隨不能屈伸洒洒寒熱頭目眩倒或口面喎僻

秦艽 乾薑 桔梗 附子 天雄

當歸 天門冬 人參 白朮 蜀椒

烏頭 細辛 甘草 白芷 山茱萸

麻黃 前胡 防風 五味子

右治下篩酒服方寸匕日三老人少服之腳弱加天門冬麥門冬有蒼草桂心防己萆薢白斂當歸各二十三味

治卒得風覺耳中恍惚者

急取鹽五升甑蒸使熱以耳枕之冷復易

蛇蠲痺湯 治卒中急風牙關緊急精神昏憒口眼喎斜不省人事痰涎不利喉中作聲

白花蛇 全蝎 獨活 赤箭

天麻 附子 人參 防風 芎藭

肉桂 白朮 藁本 白附子 甘草

細辛 白茯苓 半夏 白殭蠶

麻黃

右為麤末每服五錢水一盞入生薑五片煎至七分去滓稍熱服不拘時候

牛黃丸 治卒中風仆倒悶亂語言蹇澀痰涎壅盛

牛黃研 麝香 蜈蚣 天竺黃研 真珠

沒藥研 丹砂研 檳榔子 龜甲 丁香

木香 乾蝎 羚羊角 龍腦 雄黃研

木通 麝香

右為末每抄半錢入鉛粉三錢再研勻煉蜜丸如梧子大每服五丸金銀薄荷湯下不拘時大小加減

研勻丸如小豆大每服一丸至二丸

半丸小兒驚風一丸分作六服

防風湯 治卒中惡風口噤不能言服經絡緩急拘攣

防風 赤芍藥 獨活 黃芩 狗脊

芎藭 防己 白朮 甘草 茵芋

麻黃 烏頭 白茯苓 生薑 細辛

桂心

右剉如麻豆每服三錢匕水一盞研石膏一錢匕同煎至七分去滓溫服不拘時

羌活湯 治卒中風悶亂語言蹇澀牙關緊急

羌活 桑根白皮 麻黃 天雄 當歸

桂心 地骨皮 遠志 大腹皮 甘草

芎藭 薏苡仁 枳殼 菖蒲

杏仁

右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑三片煎至八分去滓溫服無時

至聖丸子 治卒中風涎潮昏塞口眼喎斜手足厥冷語言蹇澀大小風病

丹砂 鐵粉 牛黃 鉛霜 麝香

龍腦 硇砂 天麻 白芷 犀角鎊

白殭蠶 芎藭 天雄 烏頭 附子

天南星 蝎梢 [illegible] 狐肝

[illegible]

右為末煉蜜和丸分作六十丸每服一丸薄荷酒化下小兒驚風

一錢分作五服，荊芥湯下
甘草湯[illegible] 治卒中風[illegible]口噤不語，昏不知人，鍼灸不知痛處
獨活散 治卒中風四肢緩縱，口噤不語，氣塞不識人，閉目不開，鍼灸不知痛癢
獨活 防風 桂心 麻黃 附子
漢防己 白术 甘草 秦艽 人參
羚羊角屑 細辛 芎藭
右為散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至五分，去滓，入竹瀝
一合，更煎三二沸，不計時候
烏頭丸 治卒中風四肢麻痺，筋脈拘攣，不能行
川烏頭 [illegible] 麻黃 [illegible] 海桐皮 [illegible] 白花蛇 [illegible]
[illegible] 天麻 天竺黃 乾蝎
乳香 防風 [illegible] 白鮮皮 地龍
獨活各三分

七七

右為末，研令勻，煉蜜和搗三五百杵，丸如梧桐子大，每服不計時候
溫酒下二十丸
[illegible]治卒中風寒冷濕氣入腠，[illegible]心[illegible]不遂，[illegible]
汗不出，反得偏廢 [illegible]金方
吳茱萸 當歸 麻黃 獨活 甘草
桔梗 茯苓各二 桂心 青木香 石膏
大黃 犀角各三
右㕮咀，以水九升，煮取三升，分三服，日三
虎掌丸 治[illegible]卒中風不語，口中如拽鋸聲
虎掌 [illegible] 烏頭 [illegible] 白殭蠶 [illegible] 雄黃 [illegible] 桂心
白附子 [illegible] 大豆黃卷 [illegible] 天南星 [illegible] 板藍根一兩 麝香
龍腦 [illegible] 牛黃 [illegible]
右為末入研了藥，都研令勻，煉蜜和搗五七百杵，丸如梧桐子大，每服
不拘時候，以溫酒研下五丸
白聖丸 [illegible] 治卒中風語澀多涎

白聖 [illegible] 天南星 [illegible] 附子 [illegible]
天麻 白附子 [illegible] 白殭蠶 [illegible] 飛騎 [illegible]
麝香 [illegible] 烏頭 [illegible]
右為末入[illegible]都研令勻，[illegible]丸如雞頭大
服一[illegible]以溫酒下，[illegible]一丸
天麻丸 治丈夫婦人卒中風，[illegible]手足麻痺，[illegible]口噤不語
言不得，[illegible]身[illegible]頭昏[illegible]心[illegible]煩熱，[illegible]小兒驚
[illegible]等疾
天麻 地[illegible] [illegible] 防風 烏頭
丁香 [illegible] 丹砂 [illegible] 麝香 [illegible]
[illegible] 龍腦 [illegible]
右除丹砂[illegible]龍腦[illegible]外六味，[illegible]為末，[illegible]
前[illegible]蜜和丸，[illegible]新[illegible]合歡[illegible]丸，大人如彈子大
[illegible]每服一丸，日午[illegible]用[illegible]水磨下
白[illegible] 治[illegible]中風口噤不語，[illegible]
白[illegible]不遂 [illegible]金方

七八

獨活 芎藭 黃芩各三 甘草 防風
芍藥 芎藭 麻黃 [illegible] 人參一兩
烏頭三枚
右㕮咀，以水一斗，竹瀝二升，合煮取四升，分四服，日三夜一
龍腦丸 治卒中風心神煩悶，肢節拘急疼痛
白龍腦一錢 硃砂 [illegible] 琥珀 [illegible] 雄黃 [illegible] 牛黃 [illegible]
麝香 [illegible] 白殭蠶 [illegible] 附子 [illegible] 蛇[illegible] 天麻一兩
安息香一兩 [illegible]
右為末入研了藥，都研令勻，用安息香膏和搗三二百杵，丸如梧桐
子大，每服不拘時候，以溫酒下十丸
白殭蠶丸 治卒中風
白殭蠶 [illegible] 白附子 [illegible] 天南星 [illegible] 桑螵蛸 [illegible] 藿香葉
乾蝎 [illegible] 天麻 [illegible] 烏蛇 [illegible] 麝香 [illegible] 天雄 [illegible]
右先將丸[illegible]入麝香再研令勻，以糯米粥研和為丸，如大麻粒

別以膩粉為衣每服涵下七丸至十丸日二夜一

芎藭湯 治卒中風四肢不仁身笑不息

芎藭 黃芩 石膏 當歸 秦艽

麻黃 桂心 甘草 乾薑 杏仁

右㕮咀以水九升煮取三升分三服

分涎丸 治卒中風忽然倒仆昏迷至甚不省人事

水銀 乾蝎 粉霜 膩粉 腦子

麝香 天竺黃 硃砂 天南星

右研勻石腦油丸如雞頭大每服三五丸薄荷湯下一歲小兒服半丸至一丸

杏仁散 治卒中風言語蹇澀肢體不仁

杏仁 麻黃 芎藭 附子

秦艽 獨活 當歸 桂心 乾薑

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不拘時溫服

天麻散 治卒中風仆倒不識人口角喎斜

七九

天麻 白殭蠶 乾蝎 防風

羌活 麻黃 牛黃 麝香

右為散入研了藥令勻每服不拘時候以溫酒調下一錢

天麻丸 治卒中風諸風

天麻 烏蛇 天南星 白附子

烏蛇 丹砂 麝香

右為細末煉蜜和丸如雞頭大每服一丸薄荷茶酒任下牙關緊急用少許揩牙即開

青金丸 治卒中風涎潮昏憒不省人事

滑石 膩粉 續隨子 青黛

半夏 龍腦 麝香 水銀

右研勻滴水和丸如豌豆大煎淡白湯化下五丸至七丸

金虎丹 治卒中風涎潮發搐

天竺黃 白礬 丹砂 膩粉

龍腦 牛黃 天雄

右為細末煉蜜和丸搜和一兩二錢作十丸大人中風用一丸入膩粉少許新汲水化下常服每丸分四服小兒分八服新汲水化下

白丸子 治卒中風口眼喎斜手足不遂

天南星 半夏 白殭蠶 乾蝎 胡粉

膩粉 麝香

右生搗研如粉用生薑汁和丸如菉豆大每服二丸至三丸當歸湯下若牙關緊如中風口噤研化灌服之

透冰丸 治卒中風忽然仆倒昏亂言語蹇澀痰涎壅塞皆治之

粉霜 乾蝎 天南星 膩粉 水銀

龍腦 麝香

右先研天南星乾蝎為末了同前五味入乳鉢細研入石腦油和丸如梧桐子大每服三丸溫薄荷水化下大段困加二丸小兒十歲已上兩丸一丸臨時相度

治卒中涎方

八十

白天南星 木香 蒼朮 甘草

白羊眼半夏 辣細辛 石菖蒲

右剉散分作二服水一盞半生薑七片煎取其半乘熱調蘇合香丸三丸灌下痰甚者加全蝎二枚炙 治一切卒中不論中風中寒中暑中濕中氣及痰厥飲厥之類初作皆可用此先以皂角去皮弦細末或半南星末夏末木香以管子吹入鼻中候其噴嚏即進前藥牙噤者中指點南星細辛末并烏梅肉頻擦自開

牛黃丸 治卒風瘖風搐逆痰厥頭痛目昏驚邪言語蹇澀等疾

牛黃 烏頭 粉霜 半夏

丹砂 麝香

右搗研和令勻生薑自然汁旋入臼內同藥杵和為丸如梧桐子大每服一丸薄荷自然汁少許和溫酒下疾甚服三丸研灌之

神靈散 治卒中風涎潮

粉霜 丹砂 硼砂 牛黃

龍腦

右同研勻細每服一字已上煎陳皮米飲調下

大醒風湯 治卒中風痰涎壅盛語澀神昏

附子 生去皮 南星 三兩 全蝎 [illegible] 防風 各一

右剉散每三錢薑七片煎服氣不和加木香

奪命散 治卒暴中風涎潮氣閉手足瘈瘲口眼相引項背反張牙關緊急

目上視不省人事破傷風搐搦及小兒急驚風證並皆治之

甜葶藶 香白芷 天南星 半夏 [illegible] 巴豆 去殼不去油

右為細末每服半錢用生薑自然汁一呷調下牙關緊急湯劑灌不下者

以藥斡開口[illegible]小兒以利痰或吐為愈

稀涎丸 治卒中風神志昏憒牙關緊急目睛直視手足瘈瘲口面

喎斜[illegible]語言謇澀痰盛[illegible]不仁

風喉閉腫痛[illegible]經絡流注

乳香 [illegible] 沒藥 [illegible] 川烏頭 [illegible] 麝香 [illegible]

五靈脂 [illegible]

右先將乳香沒藥[illegible]細研次入麝香次入藥末再研滴水和

丸如梧子大每服一丸薄荷酒化下食後臨臥服 一方治中風癱瘓

手足不遂以溫酒為丸或[illegible]不可

省風湯 治卒急中風口噤全不能言口眼喎斜筋脈攣急抽掣疼

痛風盛痰實[illegible]頭目眩重胸膈煩滿左癱右瘓手足麻痺骨

節煩疼步履艱辛恍惚不定神志昏憒應有一切風證可預服之

防風 去蘆 南星 生用 半夏 白者水浸洗生用 黃芩 去朽

甘草 生用二兩

右㕮咀每服四大錢用水二大盞生薑十片煎至一中盞去滓溫服

不拘時候

奪命散 治中風卒倒不省人事口面喎斜失音不語但吐涎沫或

口噤不開目瞑患死一切風疾

黑豆 [illegible] 烏鵲糞 [illegible] 龍膽 [illegible]

右先將鵲糞及豆同以[illegible]入龍腦為牙硝[illegible]同入[illegible]煎

去滓溫分三服不拘時

返魂丹 治卒中風精神昏憒及中惡不省人事

朱砂 [illegible] 丹砂 [illegible] 雄黃 [illegible] 白芥子 一分

右為同研極細煉蜜[illegible]安息香和丸如雞頭大[illegible]五日[illegible]

丹[illegible]治一切卒中風不語伏如中惡或用上劑得愈[illegible]或累

卒者名不[illegible]以丹二丸末又斡口開令人

扶起[illegible]薄荷湯化下以丹入口後以手輕輕摩拍之人背上至項

但得此丹入口通[illegible]可救八九[illegible]再活

常中風但以兩丸[illegible]小兒熱毒風小便下二丸

一方治中風不語精神昏悶者加麝香一分

治卒中痰 [illegible]

南木香 [illegible] 生南星 [illegible] 生薑 [illegible] 石菖蒲 [illegible]

右煎取清汁[illegible]調南木香末一錢蘇合香丸三丸與之

三生飲 治卒中昏不知人口眼喎斜半身不遂咽喉作

聲痰氣上壅無問外感風寒內傷喜怒或六脈沉伏或指下浮盛並宜

服[illegible]

川烏頭 [illegible] 附子 [illegible] 木香 [illegible] 天南星 [illegible]

右㕮咀每半兩水二盞薑十片煎六分去滓[illegible]

[illegible]上用木香[illegible]

氣[illegible]附子[illegible]

木香二錢㕮咀分二服每服水二大盞生薑十四片煎至六分去滓

[illegible]服名星香飲 ○ 氣虛人用生附子半兩木香二錢㕮咀分二服每

服水二大盞生薑十四片煎至六分去滓溫服名附香飲 ○ 用天雄

生附子等分㕮咀每服三四錢加南木香少許水二盞薑十四片

煎至七分去滓服名中風麻痺手足十指疼痛名星附湯 ○ 用

附子烏頭天雄二味等分生用薄切每一兩生薑對半用水三盞煎

一盞半去滓溫服治中風涎不省人事名三建湯 ○ 一方用附子

一枚重七錢名天雄一枚一兩重者天南星一枚一兩重者並生用

去皮臍[illegible]生薑煎服治中風涎潮牙關緊急不省人事

宜服此藥名[illegible] ○ 用附子天南星各一兩生用全蝎半兩

川芎防風各一分㕮咀為散…治諸風卒中涎潮痰飲神效名大
醒風湯用天南星四兩生用防風二兩甘草一兩㕮咀每五錢水二
盞薑十片煎七分去滓溫服〇治中風口噤全不能語左癱右瘓口
眼喎斜半身不遂手足頑麻諸風交作頭目眩暈並皆治之若氣不
和加木香二錢半頭目如玉行者加全蝎一錢頭肢疼痛者加天麻
半兩煎臨熟入麝香少許名三奇湯〇省風方用附子南星各一枚
八錢以上重者生去皮臍㕮咀以水四升薑一十片同煎候水稍半
即濾去滓調蘇合香丸三丸分三服〇治中
風語澀痰涎盛四肢不舉用附子一箇生去皮臍木香各一兩㕮咀每半兩
水四盞慢火煎至二盞去滓分二服〇治中風偏癱名危急散用
附子炮乾薑等分㕮咀每四錢水二盞煎至六分去滓溫服治中風口
噤四肢強直失音不語無辛熱實側口吐涎沫狀如暗風手足厥冷
或復煩躁名薑附湯〇用熟附子人參各半兩白茯苓…
各一分㕮咀…每服七錢半㕮咀生薑…煎治…
所中惡風多汗身疼骨痛…風名…手湯…之為病…

其中人也卒其性人也氣…人…神亂倉卒之間何者為治
治者不過烏附南星木香等…用亦須審量其人氣…虛實
伐性…則…不失一諸方用藥…近…有少差耳…參三生
飲下以笑…不省人事者以蘇合香丸擦牙…以生薑自然汁
天仙膏 治男子婦人卒暴中風口眼喎斜
天南星 草烏頭各一枚 白殭蠶七枚
白芨二分
右細末生鱔血調傳喎處覺正便用溫水洗去
救生散 治卒中風
白礬 半夏 天南星
右為細散每服以好酒一盞藥末二錢七生薑三片煎七分通溫灌
之當吐涎後令正坐經一復時不得令卧如卧則涎舛出良久再灌
去前藥一錢後常服只半錢
牽正散 治卒… 中風口眼喎斜半身不遂
白附子 殭蠶 全蝎 各等分

右為末每服一錢…下不以時
三化湯 治諸卒中風不省人事…上壅一切危急之證大便秘
結至五七日不利宜服之
大黃 牽牛 朴硝
右㕮咀量人虛實加減一服水一盞半煎至一盞却下硝煎一二沸
稀涎散 治卒中風昏昏若醉心神皆悶四肢不收或倒
仆不省或口角似斜微有涎出斯須不治便致殞絕此由風涎潮於
上膈痺氣不通宜用救急
豬牙皂角 白礬
右研細為散每服半錢重者三字匕溫水調下不大嘔吐只是微微冷涎
稀冷出或一升二升當時省覺次緩調治不可大…攻過則傷人
弱者不可吐用養正丹三十丸…南木香煎湯…下仍…南星
附子…痰…心…不能…風頑氣
二聖湯 治卒中風先用不蛀皂角搗汁…陰…擦牙關

即時後用二聖湯
白殭蠶 附子
右將附子切作八塊用水二大盞生薑三十片同煎至一大盞去
滓分作兩處調白殭蠶末一半服不省再服
追風餅子 治卒中風痰盛四肢不舉…
風邪一名二生散治…虛有風覺虛濕身如在空中
附子 天南星
右為末不須羅用生薑研自然汁和作八餅子每服一餅水一盞
半生薑二十片同煎至八分去滓溫服不拘時候
治卒中手足不遂…
右用麥麩伍升入烏頭皮夫一升連翹半升同於鍋炒令大熱攤
在席下以手足不遂處…之令熱…出汗為度日用三次
只使元藥…兩日外別換新藥如無烏頭皮夫只用烏頭
半升不去皮大碎…
搐鼻法 治卒暴中風昏塞不省牙關緊急藥不得下咽者

右以細辛洗去土葉豬牙皂角去子各一錢為末每用少許以紙
撚蘸藥入鼻候噴嚏然後進藥一方以半夏末搐鼻
八毒膏（一名赤丸子 出本事方）治卒中風毒腹中絞刺痛飛尸入臟及魘寐
不寤尸厥奄忽不知人宿食不消溫酒服如麻子大得下止若毒
氣甚咽喉閉塞不能嚥者折齒內葱葉口中以膏灌葱葉中令
下病腫者向火摩腫上若臟中多溫酒者病及行病疫中溫服之內鼻中亦得
蜀椒　當歸　雄黃　丹砂各二兩　烏頭
巴豆各一斤　薤白一升　莽草四兩
右以咀苦酒三升漬一宿用豬脂五斤東向竈葦薪火煎之五上五
下候薤白黃色絞去滓研雄黃丹砂如粉內之攪至凝乃止膏成盛
不津器中諸蜈蚣蛇蜂等毒者以膏置瘡上病在外悉傳之摩之
以破除日合一方用礜石一兩蜈蚣二枚附後不用巴豆莽草名五
毒膏
烏功散（出聖濟總錄）治卒暴昏憒不知人事牙關緊硬藥不下咽
黑牽牛末一分　茴香末二錢半

右用生薑自然汁調前藥少許灌之鼻中立醒一方用黑牽牛并木
香丸佳
治急中風口噤涎上欲垂死者服即瘥（出本事方）
江子（二粒去皮膜）　白礬（一兩如拇指大為末）
右於新瓦上煆令江子焦赤為度為末煉蜜丸如雞頭大每服
一丸用綿裹放患人口中近喉處良久吐痰立愈
石膏散　治若暴中風自汗出如水者（出事證方）
治卒中風（出直指方）
右急取頂心髮一撮毒撚之以省人事為度
麻黃膏（出聖濟總錄）治中風不省人事卒然倒地
用王相日乙卯日採麻黃一秤揀去根一寸長取東流水三石三斗
以無油膩鐺量大小盛五七斗者可先煮五沸掠去沫逐旋添水盡
至三五斗以來漉去麻黃澗在盆中澄定良久用細羅子濾去滓取
清者鐺內再熬至一斗再澄再濾取汁再熬至升半為度只是勤攪
勿令着底恐焦了熬時忌雞犬陰人見澄時須蓋覆不得飛入塵土

其膏放一二年不妨如膏稠用水解熬再勻服之甚效
生薑生附湯（出直指方）治卒中風涎潮昏塞不知人并主痰冷痞氣胸
滿嘔沫頭痛飲食不消
用大附子一枚生去其皮臍切八片以水二盞生薑一兩切同煎至
一大盞去滓溫冷服不拘時候滓在煎忌豬肉冷水一法加沉香
一錢一法加辰砂末少已凡中風無問冷熱虛實皆可服並能正
氣消痰散風神効
天南星膏（出本事方）治卒暴中風口眼喎斜
用南星不以多少為末薑自然汁調攤紙上左喎貼右右喎貼左正
便洗去
治卒暴中風昏中忽然倒地不省人事左癱右瘓口眼喎斜凡中
風人不可便食風藥中暴人不可便食氣藥或見有此證請藥
未服者服此藥（出經驗良方）
用真好麝香內三錢研極細以麻油不拘多少調令稀薄可飲
為度即令患人一服頃盡如牙關緊即拗開灌入候少頃有不

醒只治中風之藥為奇然後服紫湯方
紫湯方
用川獨活剉洗去沙土薄切以豆淋酒濃煎汁服之未服至一二升
無害服此二藥永無手足偏廢語言蹇澀之患見得是中風只服小
續命湯之類見得是中暴只服勻氣散自然無事武義唐丞李
潤名灌作漢東教官得之太守張少術名珍屢試有効李潤亦以治
數人矣云麻油麝香又勝麝香煎五積散
皂莢膏　治卒中風口喎（方見中風口眼喎斜類）
杏仁膏　治卒中風面　背腫
研杏人膏傅之又用松栢葉浸酒或用松節煮酒及用松柄湯煉二
三十次為末酒為丸服之並瘥
活鼠方　治卒中風痰香反張牙關口噤四肢強直（方見中風類）
治卒中風昏憒若醉痰涎壅盛四肢不收（出聖惠方）
用砒霜如菉豆大研以新汲水調下少許用熱水投大吐即愈若未
吐待再服

延壽丹 治卒風涎潮，昏重，口眼喎斜，四肢癱瘓，口噤不省
丹砂研 膩粉研 鐵粉研 白附子各三 蛇黄煆研
附子 牛黄 巴豆
生金 生銀 麝香 羌活 牛膝
蠍稍炒 天南星
右為細末，錬蜜和粟米飯丸如雞頭實大。中惡風癱瘓及諸癇痰，薄荷酒磨下一丸；年老半丸；小兒驚癇十歲以上一丸分四服，四歲已下一丸分五服，新生小兒一丸分七服，並用薄荷水磨下。如中風髮直，面如桃花色，口眼俱閉，喉中作聲，汗出如油，及汗出不流，多要下泄，或瀉血者，並是惡候，更不用服。唯口噤眼開者，藥下立差。纏喉風壅塞，氣息不通，用生薑薄荷酒急化一丸。

治卒中風 急煎五積散，候熟入麝香一錢，熱服，連進三服，汗透便睡，快如目前未便効，卻別下藥，終亦為力，不為療人。每見人中風，便進靈寶丹，無不死者，惟是進此藥後，徐進他藥無害。

回陽湯 治丈夫婦人無問老幼，卒暴風中，氣中，左癱右瘓，手足不遂，語言謇澀，口眼喎斜，筋脉攣縮，半身不遂，不省人事。屢用果有神効。廣陽李教授名撝傳
乾薑炮製 益智仁 大川烏炮去皮臍 青皮去白
附子
右為㕮咀，每服秤半兩，水二大盞，生薑十片，棗子一枚，入鹽少許，同煎七分，去滓，空心食前溫服，併滓再煎。

治男子婦人中風涎潮，於心卒然中倒，當即時扶入暖室，扶策正坐，當面作好醋炭熏之，令醋氣衝入口鼻內，良久其涎潮聚於心者，自收歸舊經者，即時甦省。重者亦省人事，惟不可與一滴水湯入喉也，如與湯水，則其涎永繫於心絡，不能去，必成廢人。今只以醋炭熏之，既得涎歸於心，漸甦省者。
右以生料五積散加麝香煎服之

至寶丹 治卒中風，急不語，中惡氣，卒中諸物精風，卒中熱疾毒，陰陽二毒，山嵐瘴毒，誤中水毒，產後血暈，口鼻血出，惡血攻心，若煩燥，心肺積熱，霍亂吐利，風注轉筋，大腸風澀，神魂恍惚，頭目昏眩，眠睡不安，唇口焦乾，傷寒狂語，小兒急驚風熱，卒中客忤，不得眠睡，煩燥驚風搐搦，已上無不療者
辰砂 生犀 麝香 玳瑁 牛黄
龍齒 龍腦 人參 銀箔 琥珀
安息香 雄黄 金箔
天南星
右件為細末，用安息香膏次煉一處，搜和為劑，旋丸如梧子大，每服三丸五丸，煎人參湯下；小兒一丸至兩丸，亦用人參湯下。

勝金丹 治中風涎潮，卒不語，合吐利者當服，此吐利風涎
青薄荷 豬牙皂角
瓜蒂末 朱砂 粉霜
洛粉
已上四物研勻細，入去前膏內
右拌和入臼內二三千下，丸如櫻桃大，以朱砂為衣，每服一丸，酒磨下。急即研細酒調灌之。病中才知覺有證狀，每於四季月服五……自餘有病可服

家寶通神丹 治卒中風，病右癱，口眼喎斜，偏正頭疼，夾腦風及小兒一切驚風
五靈脂貳兩 乾蝎壹分
大川烏貳兩 草烏 沒藥
天南星 白殭蚕 朱砂
麝香 木香 輕粉
滴乳香
右為藥末，合和勻合，特須用端午日或臘日以臘水煮麵糊搜和，搗千下，圓如此大○，每服一圓，及生薑一片，薄荷一葉，食後茶湯嚼下，或酒亦得。

香附湯 治卒暴中風，涎潮目瞑，口面歪斜，偏風癱瘓，精神昏憒，便利不禁，數服立効
大附子 木香 甘草
右剉碎，分作二服，每服用水二大盞，生薑二十片，煎至七分，去滓空

心溫服大凡中風昏困此藥通澀須氣者服取効自可永差

四神湯 治卒中風牙關緊急不省人事極妙

附子 木香一兩 五靈脂

真麝香

右剉碎每服二大錢水二盞生薑二十片煎至七分去滓放溫斡

開口灌一服定省未知再服才開口能言即須服餘徐徐與藥粥

能黃散 治暗風忽然仆地不知人事良久方醒 蛇黃

右爲細末每服二錢溫酒下數服便愈年深者亦効

通關散 治卒暴中風昏塞不省牙關緊急藥不得下咽喉

細辛 薄荷葉 牙皂去子

雄黃一錢

右研爲末每用少許銅管吹入鼻候噴嚏然後進藥或用

白梅擦牙更以菖蒲末著舌下牙關即開倉卒可用之

治卒風毒腫氣急痛

以柳白皮一斤剉以酒煮令熱帛裹熨腫上冷再煮易之甚妙也

開關散 治急中風口噤牙關緊閉藥不下者

用天南星搗爲末白龍腦二件各等分研自五月五日午時合

患者只使一字至半錢以中指點末揩齒三二十揩在牙左右其

自開始得下藥

治卒中風不語舌根強硬

陳醬五合三年者妙人乳汁五合二件相和研以生布絞取汁不計

時候少少與服良久當語

附香飲 治一切卒中風偏癱經絡不通手足軟弱腳腿疼及

風證始作脈息不洪數者先宜服此藥及治風氣流注手足十指浮痛

麻木

附子 木香

右㕮咀分兩服每用水一盞半薑十片煎取八分溫服虛人可用

星香飲 治證如前一方治中風有熱氣實者服之

南星八錢 木香二錢

右剉分二服每用水一盞半薑十片煎熟六分溫服氣盛人用此一方

治中風痰盛服熱藥不得者多星香湯

醒風湯 治卒中風倒地牙緊眼閉者

用皂角槌碎泡湯入分礬令濃入清明白礬末二錢挑牙關開

灌之以鵝毛掃藥上舌痰出即愈

治痰涎卒中不語

銅綠 麝香

右銅綠淨洗於乳缽內研細以水化去石澄清將銀器慢火熬

令乾取辰日辰時於辰位上修合再研細入麝香同研以糯米糊丸

如彈子大陰乾如卒中者每丸作二服用薄荷酒研下擦藏一切

風用硃砂酒化下須吐涎出沫青碧色瀉下惡物差

治卒中風

生薑 附子

右二味細切以水五升煮取二升分爲二服忌豬肉冷水

寺院宮觀常住濟人
有求方者皆許抄錄
勿得借用恐防失落

考論官長史魏得壽

對方醫士趙鏜先馮景文

寫書沈山等

刊字匠王官等

普濟方卷之三十四